

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社


四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書


子部
第四九冊



魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

EB66/02

四庫全書存目叢書·子部四九

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 53.375 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第四九冊目次

子部・醫家類

證治大還六種四十三卷

〔清〕陳治輯
北京圖書館分館藏清康熙貞白堂刻本

.....

證治大還六種四十三卷

〔清〕陳治輯

北京圖書館分館藏清康熙貞白堂刻本

附《四庫全書總目·證治大還

四十卷》提要

小

古之聖人其愛民也至
周憂民也至切恐燥濕
之不時而寒暑之失宜
也于是為之醫藥以佐
其所不及使民各順其
性而無扎瘥夭昏之患
其用心可謂至矣故其
書自素難以降代有傳
書其人自和扁以還代

有傳人始於周禮疾醫
諸職自時厥後史遷陳
壽之徒作史者靡不三
致意焉然而南北異其
地剛柔異其性古方新

醫治大選

吳序

二

病難以執一言矣或者
曰古之醫者皆神人也
故能見垣一方若夫心
之精微口所不能言言
之精微書所不盡傳而

執是以論母乃以為瑱
乎不知在則人亡則書
語有之矣擬議以成變
化未始不可若夫胸無
成竹漫曰吾醫也舉藥

醫治大選

吳序

三

以投之猶未能操刀而
使割也其為害豈淺鮮
哉華亭陳子三農長于
詩古文辭博聞廣記雖
屢困北闈而著述益富

岫華而佩實其于軒岐
之學陰陽易理諸書靡
不討論貫穿抉其奧而
探其源矣亦既沈研殫
思支擘理解之于是出

證治大還

吳序

四

其術以救人正如淮陰
用兵無所不勝庖丁解
牛無非中窾但見屢者
起絕者蘇人亦不知其
藐之精何以遂至此也

豈吾向所謂其人者殆
是耶君既以其術救人
矣猶恐身所未至不能
遍及遂以暇日發軒岐
以來之秘要集為成書

證治大還

吳序

五

名曰證治大還夫醫之
為書亦夥矣躊躇間出
君乃能芟其繁而擷其
精此近代以來所罕見
也吾向所謂其書者庶

足當之矣。吾又聞陳子
於吳趨創育嬰之會所
全活者數千人矣。其用
心為何如也。于公之駟
馬比干之賜策古之人



有明徵矣。陳子既能以
術救人又能廣是書也
以傳學者。傳曰為善者
不改其度。故能有成。陳
子勉之哉。其功正未艾

也。余故樂得而書之以
為為善者之勸。是為序

省

康熙乙丑秋九月漢陽

吳正治書



序

古今書籍莫重乎六經而前乎此者有靈樞素問一書蓋當艸昧初開民生伊始聖

證治大還

石序

一

君賢相即以養生之道教世所以贊化育於天地其一端也上古淳樸壽多至百外歲間有數百歲者後

世澆風日滋壽不及古則補救之法可不亟歟夫病未至而能却病者上智也病已至而能救病者良醫

證治大還

石序

二

也然世亦難其人矣雲間陳子三農本儒而精於醫究心已久屢試輒效蒐集家秘各種名曰證治大還

欲行於世乞余為弁
言余知陳子之意以
一人而思濟天下其
所及者有限布其書
則將使天下後世之

證治大還

石序

三

人皆知調攝皆知補
救其為利濟之功不
可量矣聞之至治之
世物不疵癘民不夭
札今

聖天子養育羣生欲使
咸登於仁壽之域是
書也非即贊化育之
一助哉

康熙歲次丁丑初夏

證治大還

石序

四

長白石琳撰



序

予曾大父節垣公宦游雲間嘗
道九峰三泖之勝甲天下山川
清淑之氣婉蜒盤結故自漢唐
以迄有明奇人碩士代有所鍾
其上者立德立功炳炳麟麟敬
序一

風幼節士衡輩尚已其次者類
能著書立說以鳴其所得或且
假詩歌技術以傳於世陶宗儀
錢惟善以及顧野王之流載之
史冊可攷也維時襁褓謹拜志
之勿忘比長會自雲間來者訪

以奇人碩士輒道三農陳君侗
儻磊落有古人風亦竊心志之
弱冠脫籍匏繫京華者二十載
卽敝鄉弁嶺茗水一二石隱尚
難通姓氏况九峰三泖距桑梓
更數百里外耶今年秋奉

序二

天子命巡視兩粵度庾嶺涉珠江
遙望羅浮溟海諸概急欲得奇
人碩士相與揚扈風雅家伯兄
詹山曾宦斯邦首以雲間陳君
示予謂三農先生固產于九峰
三泖而流寓于庾嶺珠江者也

跡其爲人大約敦慷慨重然諾
坦城府能人之所不能且其發
爲詩歌上埒漢魏下並唐宋家
伯兄已序梓問世非誠倜儻磊
落而能著書立說以鳴其所得
者耶居逾月粵中士大夫多艷
序三

稱之更得其證治大還全笈予
撫而披閱之觀其于陰陽五行
之理草木金石之性生尅消長
君臣佐使之義無不元元本本
酌見根底俾世之習其學者咸
得心存利濟于以福世而壽民

即起蘇耽董奉于今日度亦無
能贊易一字者昔神農嘗藥而
辨寒溫晰虛實開岐黃之祖間
攷五帝功德每稱首焉以故奇
人碩士不遽爲名相卽願爲良
醫蓋相臣坐廟堂握密勿宣猷
序四

布化以仁壽萬國而良醫生挾
其神妙洞臟腑之癥起沈疴之
疾歿者康札者寧廣狹不同而
其所以致仁壽者無不同也夫
以陳君之才之學惜未能置身
通顯大展宣猷布化之爲而手

著一書播之當時傳之後世爲
長桑之授爲肘後之方計所存
活奚止億億功豈出相君下哉
是固九峰三泖之勝之所婉挺
盤結且兼庾嶺珠江之靈異而
以鍾其清淑之氣者也以立言

序五

而媲美立德立功何多讓焉於
是愈服膺先曾大父之遺訓著
龜以勿替也爰序而歸之

賜進士第中大夫

欽命巡按兩廣鹽課掌河南道事
山東道監察御史加七級歷掌



京畿浙江江南山東山西名道
事

經筵侍直甲戌丁丑癸酉丙子充
文武殿試鄉會監試官稽察錢
局管理

登聞事務

序六

欽命巡視中城前翰林院清書庶
吉士年家眷弟沈愷曾頓首拜
撰于羊城官舍



醫學近編小敘

近編者使人灼見而易知分門晰類無事遠求也蓋
臟腑經絡之所繫四時六氣之所染與夫榮衛陰陽
氣血寒煥之所變遷皆于羣書中掇精華採集衆
腋彙成一裘以濟危險矣竊恐提綱攝領要言不煩
淵博之士謂非全豹余何敢辭愚以爲殊途錯綜不
若合理專司但期中節有當危者安之昏者蘇之弱
者強之悴者壯之亦足以濟人于顛沛之頃矣故曰
不以辭害不以文疵吾存吾義醫學在茲

證治大還

醫學近編
小敘

白堂
方書

證治大還 醫學近編目錄

一卷

中風 類中風 類傷寒

二卷

熱 溫 風 暑 痧疹 煩燥

三卷

溼燥 火 癲狂 粵閩各種瘡癤治法

四卷

頭面 耳 鼻 齒 口舌

證治大還

目錄

一 貞白堂

五卷

霍亂 脾胃 內傷

六卷

痺症 附 身痛 麻木

七卷

痢 瘧

八卷

胃脘痛 胃風 腹痛 脇痛 腰痛

九卷

驚悸 自汗 盜汗 惡寒 寒熱
泄瀉

十卷

虛損 勞瘵 怔忡

十一卷

痰火 欬逆 送氣 短氣 噎氣 嘔吐

十二卷

乾嘔 噎 噎膈 咽喉 瘡

十三卷

證治大還

目錄

三

貞白堂

鬱 諸氣 痰 積聚

十四卷

發熱 消癰 秘結

十五卷

水腫 瘰癧 疔疽

十六卷

眼症 癰閉

十七卷

痞 鼓脹 諸血

十八卷

諸飲 喘 哮 眩暈 厥

十九卷

夢遺 赤白濁 前陰 小便不通 腳氣

脫肛

二十卷

厲風 破傷風 跌撲 諸硬 湯火 桀刺

筋斷 循衣 邪祟 五絕

證治大還

目錄

三

貞白堂

雲間陳 治三農甫述 男

栳璣先 校 師柴燕愚

毘陵鄒言正仲衡甫參

門人 范 崧壽民 闕 王 願贊皇

中風

按中風有真中風類中風真中風邪在西北極寒之地則有之東南溫和之地甚少其間或有之者亦

必所挾而然經曰邪之所湊其氣必虛不可便以

證治大要

醫學近編 中風 一 貞白堂

真中風論治。況雜症類中風者甚多如中氣中惡

中寒中暑中濕食厥痰厥熱厥血脫房勞虛暈皆

卒暴僵仆。症類中風候投風藥救人多矣治此症

者西北風高真中須分臟腑經絡東南地濕類中

須辨氣血諸邪今以真中類中各細分門施治庶

無差悞。

脈法

微而數浮而大浮而數無熱皆為風浮遲為寒浮澀

為濕浮而緩皮膚不仁遲緩浮滑皆癱瘓沉伏浮

通虛者易治急大數實堅疾者難治陽浮滑陰濡弱者宜吐

中分內外

經曰仆擊偏枯肥貴人則膏粱之疾也又曰三陰三陽發為偏枯痿易四肢不舉靈樞云其有三虛而偏中於風邪則為仆擊偏枯又曰風中五臟六腑之俞亦為臟腑之風各入門戶所中則為偏風

中分淺深

經曰虛邪客於身半其入深內居榮衛榮衛稍衰則

證治大要

醫學近編 中風 二 貞白堂

重氣去邪氣獨留發為偏枯偏枯者身偏不用而

痛也若言不變志不亂此邪氣之淺者病在分腠

之間也益其不足損其有餘乃可復也邪病身無

痛四肢不收志亂不甚言微知可治甚則言瘖智

亂者邪氣入裡不可治也又曰榮氣虛則不仁衛

氣虛則不用榮衛俱虛則不仁止不用人身與志

不相有曰死偏枯者即半身不遂也以半身無氣

以榮運也非者廢也廢則周身無以榮運故身無

痛也

仲景云、脈之爲病、當半身不遂、經絡空虛、賊邪不
或左或右、邪氣反緩、正氣即急、正氣引邪、喎僻不
仁、邪在於絡、肌膚不仁、邪在於經、則重不勝、入腑
則不識人、入臟則難言、吐沫、醫學入門云、入筋
則掣、入皮膚則痒、入骨節則痛、與衛氣相搏、則不
仁、與榮氣相搏、則半身不遂、挾熱則痿、挾寒則
拘攣、挾濕則腫滿、

華陀云、心脾中風、則舌強不能語、腎肝中風、則手足
不能遂、其脈虛浮者、自虛得之、實大者、自實得之、

證治大遺

醫學近編

中風

三

頁白堂

弦緊者、汗出、得之喘乏者、嗜酒得之、癰厥者、自勞
得之、手足不遂、語言蹇失者、房中得之、癰疹者、淫
濕得之、歷節疼痛者、醉犯房勞得之、聾盲瘡癩者、
飲食五味冒犯禁忌得之、

東垣云、中腑多着四肢、惡風寒、拘急不仁、或手足不
能運動、語言塞澀、口目爲僻、脈浮、此爲表中風邪、
宜以疎風湯、小續命湯、麻黃人參防風湯已用
芍桂枝白朮芍藥黃芩
加減以發散其邪、中臟多滯九竅、腎經
失音、耳聾、鼻塞、眼眇、便秘、或聲如拽鋸、手攣、

脈澀、此爲裡中風邪、宜以三化湯、本搜風丸
草薢疎導其滯、此雖合汗下、亦不可過、蓋多汗則
損其衛、多下則損其榮也、若外無六經之形症、內
無便溺之阻隔、但口眼喎斜、或手足不能舉動、舌
強不能言語、此中血脈、與中經、因血弱不能養筋
也、宜大秦朮湯、秦朮羌活防細辛石羔酒炙生地熟
地黃歸川芎白朮白芍茯苓甘草
補血以養筋、若內外症俱有、先解表而後攻裡、若
內邪已除、外邪已去、只以愈風湯加減、類中以行
中道、然亦不可失於通塞、或一氣之微汗、或一句
之通利、乃爲常治之法、久之清濁自分、榮衛自和
矣、又小便不利者、俟其自利、不可用滲利藥、損其
津液、無以制火也、

證治大遺

醫學近編

中風

四

頁白堂

薛立齋云、真中風邪、當辨中腑、中臟、中經絡、而治眼
瞽者、中於脛、舌不能言者、中於心、唇緩便秘者、中
於脾、鼻塞者、中於肺、耳聾者、中於腎、此內中五臟
病深難愈、其中血脈者、外無六經之形症、內無便
溺之阻隔、但肢不能舉、口不能言、用大秦朮湯主
之、中腑者、多兼中臟、如左關脈、肝浮弦、面目青左

脇偏痛筋脉拘急目瞶頭暈手足不收坐踞不得

此中胆兼中肝肝與胆為表裏也用犀角散本門之類如左

寸脉心脉浮洪面紅舌赤多汗惡風心神顛倒語言

蹇澁舌強口乾怔忡恍惚此中小腸兼中心心與小腸為表裏也用加味牛黃散本門之類如右關脉脾脉浮緩

或浮大面唇黃多汗惡風口喎語澁身重肉瞶皮

膚不仁腹脹不飲食此中胃兼中脾脾與胃為表裏也用

防風麻黃散本門之類如右寸脉肺脉浮澁而短鼻流

清涕胸中冒悶喘急短氣自汗聲嘶四肢痿弱此

證治大還

醫學近編

五

貞白堂

中大腸兼中肺肺與大腸為表裏也用獨活細辛散本門之

類如左尺脉腎脉浮滑面目黧黑腰脊疼痛不能俛

仰兩耳虛鳴足痿善惡隱曲不利多汗惡風此中

膀胱兼中腎腎與膀胱為表裏也用獨活散本門之類此皆

真中風之症治也然亦有氣血之分焉蓋氣虛而

中者由元氣虛而賊風襲之則右手足不仁用六

君子參朮茯苓甘加黃芪鈞藤南星天麻防風竹

瀝薑汁血虛而中者由陰血虛而賊風襲之則左

手足不仁用四物湯當歸芍藥地加黃芪防風荆芥秦

芎藭藤紅花竹瀝薑汁氣血俱虛而中者左右手

足俱不仁用八珍湯參朮茯苓芍藥地入前所加藥卒

中昏憤口眼喎斜痰氣上湧咽喉有聲六脉沈伏

此真氣虛而風邪所襲也急用三生飲本門加入參

兩錢入竹瀝二盞姜汁少許煎服痰涎壅盛口噤

不能下藥者宜吐以黎蘆入麝香少許鼻內吐之

一吐不已再吐之如口噤挾口不開即用細辛皂

莢薑蒲吹鼻中取嚏若聲嘶遺尿手撒口開此虛

極而元氣暴脫也為不治急以獨參湯灌之或用

證治大還

醫學近編

六

貞白堂

三生飲多加人參黃芪補接之亦有得生者仍灸

臍下關元氣海諸穴三生飲乃行經絡治寒痰之

劑有斬關奪旗之功必多加人參方能助正祛邪

不則適以取敗也

戴復菴云治風之法初得之即當順氣久之須要活

血傳心方云凡卒中涎潮於心忽然倒仆即時

扶入暖室正坐以醋炭薰之令醋氣衝入口鼻內

其涎潮聚於心者入收歸舊輕者即時甦醒切不可

即與米湯如飲一口則涎永聚於心絡終不能

去以成廢人矣。

王宇泰云。偏枯之症。雖多。固未有不因真氣不能周而病者。故黃芪為必用之君藥。防風為必用之臣藥。黃芪助真氣者。防風載黃芪助真氣。以周於身者也。許穎宗治王太后中風。口噤。以二藥薰之。尚愈。沉服之乎。多怒加羚羊角。渴加葛根。秦朮。恍惚錯語。加茯神。遠志。不睡加酸棗仁。不能言加竹瀝。荆瀝。梨汁。陳醬汁。生葛汁。人乳。內熱加梨汁。人乳。生地汁。痰多加竹瀝。荆瀝。姜汁。每治此症。悉用諸

證治大還

醫學近編 中風 七

貞白堂

肝木。治風安脾。

陳三畏云。凡中風。治痰先治氣。氣順痰自利。治風先治血。血行風自滅。中臟者難治。中腑者易治。脉弦滑洪大者難治。自吐遺尿口開手撒。髮直上視。身睡頭搖。汗出如珠者死。卒中心明。但風痰壅盛。口難言語。三四日不死。用皂莢半。夏末。吹鼻中。俟甦醒。以半夏薑汁灌之。以吐痰涎。方能搖動。如大便

秘而不通。以蜜棗導之。下行其氣。正後隨用御參

湯。托住正氣。後用小續命湯。陳皮。半夏。茯苓。甘草。羌活。防風。烏藥。枳殼。黃芩。如虛去苓。加參朮。白芷。咬牙加附子。有死血加紅花。桃仁。姜水煎。磨木香。姜汁。竹瀝調服。如血虛加當歸。熟地。氣虛去白芷。加參芪。大抵半身不遂。症雖不同。治只一法。如屬氣血兩虛。止宜十全大補湯。如便秘。血藥多於氣藥。便瀉。氣藥多於血藥。如此調理。方為得宜。

按古人於中風門云。治痰先治氣。氣順痰自利。蓋

證治大還

醫學近編 中風 八

貞白堂

痰之泛濫頭目。橫行經絡。悉由氣不順所致。氣順則痰自下行。痰下行而經無壅滯。真氣周流。何癱瘓之有。旨哉斯意。惟遂巖先生得之。故烏藥順氣散。木香。沉香。枳實。烏藥。乃半身不遂之先陣也。

口眼喎斜所屬

綱目云。目斜屬足三陽。口喎屬手足陽明。夫足太陽陽明起於目之上下。二綱。少陽起於目銳眥。三經有寒則筋急。急則目不合。三經有熱則筋緩。緩則目不開。手足陽明環乎口之上下。筋脈有寒則筋

手陰 心經 手陽 大腸 足陽 胃經 足陽 脾經 足陽 肝經 足陽 肺經 足陽 腎經 足陽 膀胱 足陽 膽經 足陽 三焦 足陽 心包 足陽 小腸 足陽 手陰 心經

急引頰移口有熱則筋弛縱緩不收故僻目斜灸承泣口喎灸地倉頰車急熨以熱弛治以寒予按亦有痰涎隨風火上壅滯於經絡右實則挺縱於左左實則挺縱於右挺則皮急故目不合亦不可專作寒論故頰中風症多有口眼喎斜也戴復菴云口喎眼斜先燒皂莢烟薰之以逐去外邪次用乳香燒薰之以順其血脉綱目又云痰涎壅盛者宜吐口噤者宜吐眼戴上者宜灸口開手撒遺尿者為陽氣暴脫宜大料參芪以補接之

證治大還

醫學近編 中風 九 貞白堂

醫按

羅謙甫治一太尉冬寒向火左頰有汗適被風寒所襲左頰急口喎於右脈浮緊按之洪緩此風中手足陽明經用秦艽升麻湯而愈

許穎宗治太后中風不語脉沈勢急非大補不可若用有形湯藥恐緩不及事乃以防風黃芪數斤煎湯置於床下滿室薰蒸使口鼻俱受其氣是夕即語

薛立齋治一人卒中口眼喎斜不能言語遇風寒四

肢拘急脉浮緊此手足陽明經虛為風寒所中也用秦艽升麻湯稍可後以補中益氣湯漸愈

又治一婦口眼喎斜四肢拘急痰涎不利惡風寒脉浮緊此風寒客於手足陽明二經先用省風湯二劑後用秦艽升麻湯而愈

疎風湯

治表中風邪惡風寒手足拘急不仁

麻黃 羌活 防風 各一錢半 杏仁 川芎 各一錢半

錢甘艸 炙五 生薑 痰壅氣塞加烏藥枳殼橘紅

半夏南星茯苓 水煎熱服取微汗

證治大還

醫學近編 中風 十 貞白堂

加減小續命湯

千古統旨加減

治卒暴中風不省

人事半身不遂口眼喎斜語言蹇澀

麻黃 桂枝 防風 杏仁 防己 川芎 人

參 白芍 黃芩 各一錢 附子 甘艸 各五錢 姜棗

自汗表虛者去麻黃杏仁 無汗身熱者去桂枝

附子 身不熱去黃芩 身痛加羌活 麻木加

天麻 面痺加白芷蠶絲 痰盛去桂枝附子人

參加南星半夏橘紅 氣不順加烏藥枳殼

秦艽升麻湯

實經

治風寒客於手足陽明經四肢

拘急惡風寒。脉浮緊。口眼喎斜。

秦艽 升麻 葛根 芍藥 人參各一錢 防風

桂枝各三錢 甘草一錢 葱白 生姜

秦艽榮筋湯統有加減 治中風無表裡惡。但血弱

不能養筋。舌強難言。手足難運。

當歸 川芎 熟地 生地 白芍 白茯苓

朮 黃芩 秦艽 羌活 細辛 甘草 痰盛

加石羔竹瀝姜汁 語言不出加菖蒲

省風湯和劑 治中風口噤。口眼喎斜。筋脉攣急。抽

諸治大還 醫學近編 中風 士 貞白堂

掣疼痛。風熱痰實。

防風 南星 半夏 黃芩 甘草 生姜

濟生方有全蝎白附子 川烏木香無黃芩

犀角散 治肝臟中風筋脉拘急。脇脹膝痛。面青語

澁。坐踞不得。口眼喎斜。

犀角二錢 石膏 羌活 羚羊角各一錢 人參 甘

菊 黃芩炒 天麻 枳殼 當歸 川芎 白朮

酸棗仁炒 防風 獨活 黃芪 白芷 甘草各

分 生薑 宜去獨活黃芪白芷加胆星鈎藤全蝎 胆州天竹黃

加味牛黃散 治心臟中風。口乾語澁。心神恍惚。驚悸。多汗惡風。

犀角 羚羊角 牛黃 麝香 龍齒 防風

天麻 人參 茯神 遠志 甘草 白蘚皮

獨活 升麻各二錢五分 天竹黃三錢 硃砂 鉄粉

麥門冬各五錢 麥門冬湯下二錢

一方有沙參龍腦 宜去獨活升麻

遠志湯 治心經受病。善怒不能言語。但偃臥。不得

轉側。悶亂。

諸治大還 醫學近編 中風 士 貞白堂

遠志 人參 菖蒲 羌活 細辛 麻黃 赤

芍 白朮 犀角

防風麻黃散 治脚臟中風。身重怠惰。不嗜食。舌強

語澁。肌肉不仁。口喎斜僻。

防風 麻黃 人參 黃芪 川芎 附子 桂

心 赤茯苓 酸棗仁 獨活 桑皮 羚羊角

甘草 白朮 宜去麻黃加蒼朮白芷乾葛

獨活細辛湯 治肺臟中風。胸滿短氣。冒汗出。骨

鼻色白。

獨活	細辛	附子	甘菊	麻黃	白芷	紫
苑	桑皮	五味子	肉桂	白朮	川芎	杏
仁	甘艸	炙	赤茯苓	防風	宜去獨活細辛附子加人參黃芪	
獨活散	治腎臟中風面目黧黑骨瘦腰痛兩脚冷痺多汗惡風隱曲不利。					
獨活	附子	細辛	桂心	天麻	防風	甘
菊	當歸	川芎	牛膝	黃芪	白朮	山茱
莖	草薢	菖蒲	丹參	枳殼	甘艸	宜去菖蒲丹參
枳殼	甘艸	加	全蝎	虎骨		
證治大還	醫學近編 中風 卷之一 主 貞白堂					
三化湯	藜古	治中風邪在裏便溺阻滯				
厚朴	薑汁	大黃	酒蒸	羌活		
防風通聖散	河間	治表裏一切風熱。				
防風	麻黃	薄荷	桔梗	荊芥	石膏	連
翹	黃芩	梔子	滑石	大黃	芒硝	川芎
當歸	白芍	白朮	甘艸	生薑		
犀角防風湯	統有	治一切諸風口眼喎斜手足蹻				
搜風	四肢麻木					
犀角	防風	羌活	天麻	荊芥	薄荷	桔

梗	細辛	獨活	全蝎	石羔	滑石	連翹
當歸	白朮	甘艸	麻黃	生薑	五片	
熱服取微汗大便秘加大黃						
順風和氣散	良方	治中風中氣半身不遂先宜服此				
白朮	二錢	人參	天麻	各七分	沉香	白芷
木瓜	青皮	甘艸	各五分	烏藥	一錢	生薑
虎骨散	簡易	治半身不遂肌肉乾瘦切忌發汗恐				
津液枯竭	當養血潤筋消風					
證治大還	醫學近編 中風 卷之一 主 貞白堂					
當歸	二兩	生地	二兩	續斷	白朮	藥本
烏蛇肉	各五錢	酒下三錢				
三生飲	簡易	治寒痰通行經絡				
南星	一兩	附子	川烏	各五錢	木香	二錢
每五錢煎服					生薑	十片
星附散	局方	治中風口噤四肢拘攣痰氣上壅				
南星	黃白附子	炮	黑附子	炮	烏蛇肉	全蝎
每五分姜汁酒調下						
奪命散	治中風牙關緊急不省人事涎壅氣閉四					

肢搐搦

草薺 白芷 南星 半夏 巴豆 各等分

每五分姜汁調下

通關散 治中風牙關緊急湯藥不下用此藥搐鼻

取嚏

細辛 薄荷 牙皂 各等分 爲細末以少許搐

鼻內取嚏

清陽湯 東垣 治筋脉短縮牽引口目喎斜

升麻 黃芪 當歸 葛根 紅花 蘇木 黃

諸治大還

醫學近編 中風 五 貞白堂

柏 桂枝 甘艸 臨服入酒半盞

瓜蒂散

瓜蒂 炒黃 赤小豆 各等分 爲末取一錢用豆豉一

合湯二碗煮作稀糜去渣取汁和服

稀涎散 李泰加減 治中風涎潮搐搦氣塞不通昏

迷如醉用此吐痰兼治雙蛾單蛾

牙皂 五錢 白礬 一兩 巴豆 六粒俱 先將礬化開

次入二味攪勻待枯爲末每用三分吹入痰盛者

子和用黎蘆五錢爲末燈心湯調下五分

三聖散 子和 治同前症

防風 瓜蒂 炒各 藜蘆 五錢 每三錢薑非汁

二盞煎去渣溫服瓜蒂吐不止麝香湯解黎蘆吐

不止熱白湯解之

換腿丸 和劑 治腎經虛弱爲寒濕所侵筋脉攣痛

舉動艱難

薏苡仁 石楠葉 南星 牛膝 肉桂 當歸

天麻 附子 炮 羌活 防風 石斛 草薺 黃

芪 續斷 各一兩 蒼朮 一兩 檳榔 五錢 木瓜 四兩

諸治大還

醫學近編 中風 六 貞白堂

糊丸梧子大酒下三十丸

伏虎丹 和劑 專治左癱右瘓

生地黃 蔓荊子 蠶蚕 各二錢 五靈脂 五錢

躑躅花 白膠香 草烏 炮各 酒煮半夏末爲

丸如圓眼大每丸分三次服酒下

四生丸 和劑 治左癱右瘓半身不遂

五靈脂 骨碎補 川烏頭 去皮 當歸 各等分

酒糊丸如梧桐子大酒下二三十丸

跌打丸 和劑 治中風牙關緊急手足癱瘓筋攣骨

癰癰癰偏枯麻木不仁指節疼痛益用此通經絡

活血脈

乳香 沒藥 各一兩 川烏頭 炮去皮臍 一兩五錢 麝香 一錢

五靈脂 酒淘洗 淨四兩 滴水丸如彈子大薄荷酒磨下

一九

勝金丸 本事

瓜蒂 黎蘆 各一兩 硃砂 五錢 用薄荷五錢牙皂

二兩水浸取汁熬膏如彈子大硃砂留一半為衣

溫酒化下一丸以吐為度 一方以明礬三錢姜汁調飲吐之

證治大還

醫學近編 中風 卷之一 七 真白堂

正體散 治口眼喎斜用此取汗

番木鱉 牛油 南星 童便 兩頭尖 濕紙 包煨 蠶 炒各等

共為細末量入虛實燒酒下四五分發汗一二大

切不可見風明早用人參硃砂各五分牛黃一分

燒酒調下

星附丹 治中風風熱上壅痰迷心竅舌強不語口

目喎斜及小兒驚風癱瘓大人怔忡驚悸健忘症

胆星 硃砂 天竹黃 犀角 礞石 各五錢 全蝎

蠶 天麻 白附子 防風 各四錢 青黛 黃連

石羔 各三錢 雄黃 珍珠 各二錢 腦麝 牛黃 各一錢

蜜九彈子大硃砂金箔為衣薄荷湯下一丸

清心導痰丸 治痰涎流注經絡碍氣使真氣不能

周半身不遂

半夏 姜製 胆星 各二兩 天花粉 白附子 各一兩 黃連

鬱金 各七錢 天麻 羌活 各五錢 蠶 八錢 川烏 四錢

鹽水 姜汁糊丸姜湯下五六十九

加味青州白丸子 治風痰壅盛手足癱瘓口目喎

斜痰涎閉塞

證治大還

醫學近編 中風 卷之一 大 真白堂

白附子 二兩 天南星 全蝎 各一兩 枳殼 川烏 各五錢

半夏 川姜 各二兩 天麻 蠶 各一兩 木香

麵糊為丸姜湯下五六十九

轉舌丹 治中風舌強不語

連翹 薄荷 遠志 柿霜 各一兩 黃芩 大黃 酒

炒 梔子 玄明粉 桔梗 防風 石菖蒲 胆

星 甘艸 各五錢 川芎 犀角 各三錢 蜜九如彈子

大薄荷湯下一丸 黍米金丹 治大人中風痰迷心竅小兒驚風風癰

天吊內吊癰癩

南星一兩 明天麻 枳殼 防風 桔梗 半夏

錢各七 礞石三錢 硃砂 雄黃各一錢 大黃 玄明

粉各三 巴霜 輕粉 硼砂各一錢 全蝎 僵蚕各三

錢 米糊為丸

治中風手足不仁

松香 牛膝各四兩 南星 白芥子 大皂莢各三兩

乾姜 川椒 白芷 羌活 烏藥 巴戟 天

麻各一兩 肉桂 乳香 沒藥各五錢 醋薑便各三

證治大還 醫學近編 中風 卷之一 九 貞白堂

碗姜汁一碗葱汁半碗熬膏隔綿紙一層敷之

外臺治漏風半身偏痛

用附子一兩酒浸七日每服一小合

治中風牙噤 經驗方

以南星水片為末指牙上二三十遍自開

口喎敷藥 左喎塗右 右喎塗左

南星 草烏 僵蚕 白芥子 白附子 白芨

錢各一 灰石一合 醋炒 為細末陳米醋調敷

一方止用石灰醋炒醋調如泥帶熱塗之

凡中風昏迷用皂莢末燒烟薰鼻不打嚏者此陽氣已絕於肺肺竅閉塞也不治

中風吐痰用多年陳肥皂為末姜湯調灌為妙

證治大還

醫學近編 中風 卷之一 九 貞白堂

陳氏醫學近編 卷之一

雲間陳 治三農甫述 男

杖幾先 校

長白石文炳右容甫訂

門人 范 松壽民 閩 王 頤贊皇

類中風

脉法

風應人迎氣應氣口浮而滑沈而滑微而虛皆虛與痰沈而數浮而緊沈而遲皆氣中虛大為虛洪大

證治大還

醫學近編 類中 一

頁白堂

為心滑為癰

薛立齋云凡四肢不舉偏枯痿易不可便作風治經曰陽之氣以天地之疾風名之此風非外來風邪乃本氣病也又曰汗出偏阻使人偏枯如樹木一枝津液不到則此枝枯槁被風所傷也又曰三陰三陽發為偏枯痿易四肢不舉亦未嘗必指為風也蓋樞經曰神傷於思慮則肉脫意傷於憂愁則肢廢魂傷於悲哀則筋攣魄傷於喜樂則皮槁志傷於盛怒則腰脊難以俛仰此五志過極而為病

也諸如此類豈可執泥為風沉雜症與中風相類者甚多不可不辨如中寒中暑中濕中氣中惡食厥癰厥勞傷身勞血脫因火因氣悉皆症類中風而實非中風若治以風藥悞人多矣

辨類中風症治

中寒者謂冬月卒中寒氣昏冒口噤肢攣惡寒戰慄腹痛脉浮緊或豁大此因腠理疎故一身受病也不必分經絡宜溫補自解急用好酒薑汁調灌俟甦用麻黃桂枝理中湯或溫經益元湯本之類

證治大還

醫學近編 類中 二

頁白堂

中暑者謂夏月卒冒炎暑也昏悶痠厥吐瀉喘滿其脉虛浮此因暑傷元氣氣散故昏悶卒倒也治詳暑門

中濕者即丹溪所謂濕土生痰痰生熱熱生風也用

清燥湯

黃芪蒼朮橘皮白朮澤瀉五味子麥冬人參當歸生地升麻薤米猪苓茯苓酒柏黃

連柴胡

之類加竹瀝姜汁治在濕門并濕痺門

中濕積受在脾胃二經大便泄瀉小便赤澀脉緩者五苓散利之渾身強直四肢倦怠不舉法當疏利小便切不可輕易汗下宜羌活續斷湯

中氣者由七情過極氣厥上逆故昏冒口噤身冷脉

沈而無痰涎用蘇合香丸本門或八味順氣散之類

中惡者謂卒厥客忤飛尸鬼擊或吊死問喪入廟登

塚因犯不正之氣故忽然手足逆冷頭面青黑口

噤昏悶其脉乍大乍小乍疎乍數用蘇合香丸俟

甦用調氣平胃本門散

因於火者即河間所謂非肝木之風內中六淫之邪

外侵良由五志過極火盛水衰熱氣拂鬱故昏冒

而卒仆也用四君子獨參湯之類

證治大還

醫學近編 類中 三 貞白堂

因氣衰者即東垣所謂中風非外來風邪乃本氣病

也氣衰之人過於勞役耗損元氣脾胃虛怯不任

風寒故昏冒也用補中益氣湯參芪白朮甘州

勞役嗜慾過度者手必撒口必開非大劑參芪不

能挽回元陽也

食厥者即王節齋所謂飲食過多填塞胸中胃氣不

行升降不通故昏冒也用姜鹽湯探吐後以平胃

散加麝藥半夏木香

痰厥者因氣逆痰壅故忽然昏迷卒倒咽中涎潮如

搜鋸聲宜先以瓜蒂散吐之後用本門順氣導痰飲

房勞者因腎虛精耗氣不歸源故昏冒用十全大補

湯參朮熟地黃肉桂加熟附子

血脫者因陰血暴亡陽無所附陽隨陰散故筋骨不

用而卒倒也急用獨參湯後以十全大補湯

機要云四肢不舉俗名癰瘕經謂土太過令人四肢

不舉此膏粱之疾非脾腎之邪瀉之令土平而愈

三化湯厚朴大黃羌活承氣湯脾虛亦令人四肢不舉治

以十全散去邪以甯正也

證治大還

醫學近編 類中 四 貞白堂

原病式云口瘡不能言足痿不能行名曰瘖瘓此由

將息失宜腎水不足心火暴盛痰滯於心胸也用

本門地黃飲子

丹溪云半身不遂大率多痰氣虛則痰飲流注於右

而為右癱宜六君子湯參朮茯苓陳皮加胆星竹瀝姜汁

少佐以熟附子木香以行經血虛則痰飲流注於

左而為左癱宜四物湯芍藥熟地黃加紅花天麻酒炒苓

連竹瀝姜汁亦佐以熟附子木香蓋氣血虛而痰

飲滯於經絡非用辛香雄健之氣以開其滯縱補

養亦無功也。又憂思氣鬱，右手癱，口渴，用補中益

氣湯。參芪朮艸加半夏、竹瀝、姜汁，患怒傷肝，陰火

上炎厥逆，用小柴胡湯。柴芩參加醋炒青皮、炒黃

柏。

元戎云：酒濕為病，亦能令痺症。口目喎斜，半身不遂，

似中風，舌強不正，當瀉濕毒，不可作風治。宜胃苓

湯。二朮二苓澤瀉倍葛根、黃連、滑石、神麴、青皮。

陳三農云：無故而口目喎斜，手足不遂，或舌強而肢

體麻痺，口角流涎，先用順氣導痰湯。本次用秦艸

證治大還。醫學近編 類中 五 貞白堂

榮筋湯加參芪。凡此之類症，皆似中風，而實非真

中風也。夫中風者，內經主於風，此真中風也。若河

間主於火，東垣主於氣，丹溪主於濕，是皆因人因

氣因濕而為暴病暴死之症。類中風而非真中風

也。治者不可不辨。

凡人覺大指次指麻痺，或心中憤亂，神思不怡，此

皆類中風之先兆。即宜補氣消痰，用六君子湯加

天麻、胆星、竹瀝、姜汁，或人參膏尤妙。又半身不遂，

口目喎斜，宜先用順氣導痰湯。本或烏藥順氣

散，使氣一順而痰自下。次隨症調治。因惱怒加青

皮、不食加參朮、風痰加皂莢、天麻、僵蚕、酒痰加葛

根、滑石、神麴、痰加肉桂、川烏、濕痰加蒼朮、防風

若手撒口開，二便遺失，此屬元氣虛脫，急用大劑

參芪加熟附子，或獨參湯，遲則不救。

醫按

子和治一人，目斜口喎，六脉急數，弦而有力，其人年

壯氣充，蓋風火交勝而然，非外來之風。由火盛制

金，金衰木茂，木盛生風也。以承氣湯瀉二三十行。

證治大還。醫學近編 類中 六 貞白堂

繼以解毒湯數服，并降水火，不旬日而愈。

丹溪治一人，口喎目斜，語言蹇澀，口角流涎，半身不

遂。此因元氣虛而受外邪，又兼酒色之過，以四君

子加芎歸、麻黃、羌活、升麻、葛根、荆芥、細辛、天麻、石

羔、酒茶、南星、皂莢、竹瀝、姜汁微汗而愈。

薛立齋治一婦，先胸脇脹痛，後四肢不收，小便不禁，

大便不實，自汗，口噤，目瞶，頗能飲食，或作中風治。

曰：風既中臟，則真氣脫而惡症見焉。能飲食及久

尤甚。胸脹乳痛。肝血虛而肝氣滯也。四肢不收。肝血少而不能養筋也。自汗不止。肝經風熱而津液妄泄也。小便自遺。肝經熱甚而陰挺失職也。大便不實。肝木熾盛而尅脾土也。用犀角散。在風門四劑頓愈。後以逍遙散。柴茯苓歸芍加減調治而安。

又治一人。麻木發熱。體軟痰壅。腿膝俱疼。口噤。語澁。頭目暈重。口角流涎。身如僵行。搔起白屑。口噤。語麻。體軟。脾無用也。痰涎自出。脾不攝也。口噤。語澁。脾氣傷也。頭目暈重。脾氣不能升也。搔起白屑。脾氣不能榮也。以補中益氣湯。加半夏茯苓。神麴。三十劑而愈。

又治一人。素腎虛積勞。足痿不能行。舌瘡不能言。面色黧黑。作腎氣虛寒不能運及所致。用地黃飲子。本門而愈。

又治一婦。因怒。口目喎斜。痰涎上湧。口噤發搐。此脾肺氣虛而肝木旺也。用六君子湯。加釣藤。柴胡。木香。治之漸愈。以上症宜先用順氣導痰湯。加柴胡。釣藤。後用上方。始效速。

證治大還

醫學近編

七

貞白堂

又治一膏粱之人。素不慎起居。忽失音不語。神思昏憤。痰涎上壅。此腎經虛寒。氣厥不能上接清陽之氣故也。須用地黃飲子。不則後必嚙舌。經曰。少陰氣至則嚙舌。少陽氣至則嚙頰。不信。仍用風藥。後果嚙舌。急用煎湯而安。

又治一婦。經行後。口目喎斜。痰涎湧盛。此血虛而肝火動也。用加味逍遙散。歸芍柴加升皮治之愈。

又治一婦。因怒仆地。語言蹇澁。口目喎斜。四肢拘急。汗出遺尿。六脉洪大。肝脉尤甚。皆由肝火熾盛。肝主小便。熱甚則遺也。用加味逍遙散。加釣藤。及六味丸愈。

地黃飲子。宣明治腎經虛寒。氣厥不至。舌瘡不能言。足痿不能行。

熟地 山茱萸 肉蓯蓉 巴戟 白茯苓 石斛 五味子 附子 遠志 菖蒲 薄荷 麥門冬 肉桂 每五錢。姜棗煎服。

愈風湯。潔古治足三陰虧損。風邪乘虛入客。致肢

證治大還

醫學近編

八

貞白堂

體麻木手足不隨

天麻 牛膝 葶藶 玄參 杜仲 當歸 生

地 熟地 川芎 秦艽 羌活 獨活 肉桂

枸杞子 細辛

滌痰湯 治痰迷心竅舌強不語

南星 半夏 枳實 橘紅 茯苓 人參

竹茹 菖蒲 甘艸 生姜

順氣導痰湯 治氣厥痰厥及初中風宜先順氣氣

順則痰自降若遠用散風瀉火豁痰之劑卒不能

證治大還

醫學近編 類中 九 貞白堂

開

烏藥 桔梗 枳殼 橘紅 半夏 南星 茯

苓 黃芩 甘艸 頑痰膠固宜用烏龍丸 川烏

龍腦 麝香 加白芥子 荆瀝烏頭南星半夏殭蚕烏藥白

膠香酒糊爲丸

八味順氣散 濟生

治氣中及中風先宜服此順氣

烏藥 陳皮 青皮 白芷 人參 白朮

茯苓 甘艸

調氣散 治氣中氣滯胸膈虛痞惡心宿冷不消心

腹刺痛

檀香 烏藥 白豆蔻 各一錢 藿香 枳殼 甘

艸 各八分 砂仁 五分 木香 磨入 姜 鹽 少許

調氣平胃散 治中惡

木香 烏藥 藿香 砂仁 檀香 蒼朮 厚

朴 陳皮 白豆蔻 菖蒲 甘艸 生姜

附子理中湯 治中寒

乾姜 炮 白朮 人參 甘艸 各一錢 附子 炮二錢

溫經益元湯 節菴

治元氣虛 痰理疎豁爲風寒所

證治大還

醫學近編 類中 十 貞白堂

中

乾姜 炮 附子 炮 肉桂 人參 白朮 甘艸 炙

茯苓 當歸 半夏 橘紅 吐涎沫加吳茱萸

嘔吐加姜汁 瀉加升麻黃芪 氣攻刺加木香

挾風痺不仁加防風 筋脈牽引加木瓜

天麻丸 潔古

治風因熱而生熱甚則風動宜以靜

勝其燥養血是也

天麻 牛膝 葶藶 杜仲 姜製各 當歸 一兩

生地 一兩 羌活 五錢 附子 炮一錢 煉蜜爲丸

寒水石丸 名甘露 洗心丹 治熱極心煩躁亂不寧口乾狂

言

寒水石 煨六兩 天竹黃 硃砂 胆星 茯神 甘

艸 各二兩 犀角 八錢 片腦 五分 蜜丸彈子大硃砂

為衣沸湯磨服

養血愈風丹 治風癱不能行動筋脉拘攣

木瓜 續斷 杜仲 牛膝 革薺 五加皮

紅花 當歸 川芎 芍藥 生地 枸杞子

白朮 石斛 龜板 虎骨 巴戟 各三兩 秦艽

證治大還

醫學近編 類中 士 貞白堂

防風 羌活 獨活 何首烏 防己 各一兩

桑寄生 桑絡藤 蒼耳子 威靈仙 晚蚕沙

油松節 各一兩 烏頭 炮一兩 酒二十斤浸六七日

煮飲渣為丸服 加乾茄根係 史國公方

蘇合香丸 局方 治暴中風中惡中氣痰涎壅盛口

噤不言

沉香 木香 丁香 麝香 薰陸香 安息香

酒一升 蘇合香 入安息 龍腦 白朮 華撥 各一

犀角 硃砂 各五錢 訶子 壹兩 以安息膏再入煉

蜜為丸如彈子大

類傷寒 正傷寒見 傷寒近

今人但遇頭痛發熱惡寒之症不問是非虛實即以

傷寒名之遂以傷寒之藥治之豈知雜症與傷寒

相似者甚多如傷風傷濕中暑中暈溫疫寒疫風

溫風濕痰症食積陰虛陽乏內傷產後瘡瘍脚氣

等症悉皆頭痛發熱症似傷寒治須詳辨仍審所

挾用藥不比北方傷寒只傷表而裡自和者不同

東垣云內傷極多外感者間而有之丹溪云凡病

證治大還

醫學近編 傷寒 士 貞白堂

與傷寒相似者甚多皆雜症也因雜症亦有六經

所見症故世俗混而無別予得二先生之論遂以

類傷寒諸症分錄於左其真傷寒六經傳變已具

於傷寒摘要茲不復贅

類傷寒諸症辨

真傷寒其寒邪多傷於太陽經而後傳變故先頭痛

身疼惡寒發熱無汗因外感故左手脉緊盛寒熱

齊作而不間精神有餘語言壯厲口鼻氣盛手背

熱而手心不熱因外邪有餘故也

內傷乃陽氣自傷不能升達降於陰分而為內熱故
手心熱而手背不熱躁作寒已而不相併精神怯
弱少氣懶言但覺困倦右手脉盛大而無力因正
氣不足故也

陰虛者由好色傷其真陰陰血既傷則陽氣偏勝陰
虛火旺故午後發熱盜汗遺精咳嗽寒熱但身體
不痛其脉多數而無力也

傷食亦發熱頭痛但不惡寒身不痛氣口脉緊盛或
右關短惡食噎氣吞酸惡心痞悶或胃口作痛重

證治大還

醫學近編

卷之一

三

貞白堂

按疼痛耳

傷風亦頭痛發熱但脉浮緩有汗惡風口鼻氣粗非

若傷寒惡寒無汗也

虛煩亦類傷寒但虛煩心中煩熱鬱鬱不安不惡寒
不頭疼身痛脉不緊數耳

停痰留飲凝結中脘亦令人寒熱狀似傷寒但痰飲

則口吐涎沫脉多沉滑

蓄血亦令人寒熱但血症則忽寒忽熱頭汗昏迷發
黃脇下或小腹痛不可按

溫病亦頭痛發熱身疼但發於天道和燠之時壯熱
口渴自汗而不惡寒為異

溫疫亦發熱頭痛身疼但發於天道和燠之時感天
地疫癘之毒一氣相感長幼之病多相似者

寒疫亦發熱惡寒頭痛身疼但寒疫乃感四時之中
暴寒為病彼此相似故曰寒疫其症亦輕非若冬

時正傷寒之重也

中喝即中熱也蓋傷入陽經與傷寒相似但為病必
汗出身熱而渴或身重而疼

證治大還

醫學近編

卷之一

三

貞白堂

傷暑亦發熱頭痛但躁渴引飲面垢多汗無氣以動

其脉虛遲無力蓋因暑熱傷氣故也治與傷寒大
異寒傷形有餘之症宜瀉暑傷氣不足之症宜補

風溫亦頭痛發熱但風熱相搏則令人四肢不收多
汗昏睡喘息發渴其脉陽浮滑陰濡弱不可汗下

利小便治在本門

風濕亦頭痛發熱但風濕相搏必肢體重痛難以轉
側額上微汗不欲去衣或身微腫小便不利宜利

小便及微發汗忌大汗下

濕溫亦發熱惡寒頭目痛但濕熱相搏則心腹痞滿
倦怠自汗不食兩脰逆冷寸脉濡弱尺脉小急不
可發汗宜清熱利小便

產後亦發熱惡寒頭痛身疼但脉或數而無力或大
而無力寒熱往來似瘧

內傷挾外感亦發熱惡寒頭痛但兼內傷則身體倦
痛下部酸疼左手脉緊盛右手脉浮大無力在表
宜溫和之劑溫經散寒不可大發汗在裏宜中和
之劑加轉藥微下之切禁大攻下

證治大選

醫學近編 卷之十一 五 貞白堂

癰氣亦發熱惡寒頭疼但山嵐瘴氣霧毒皆從口鼻
入內必胸脇飽悶不思飲食治宜清上焦解熱毒
行氣降痰不可發汗

脚氣亦頭痛發熱惡寒身體痛症類傷寒但先起於
足痛為異

瘡瘍初生亦發熱惡寒但脉浮數飲食如常身有痛
處乃生瘡疽耳

凡此之類症雖相似病實不同治法多端最當分
別誤作傷寒發表攻裡是殺之也醫云乎哉

正氣散 局方 治感四時不正之氣及山嵐瘴氣頭
痛發熱惡寒胸膈痞悶

藿香 蘇葉 白芷 蒼朮 桔梗 陳皮 大
腹皮 厚朴 半夏 甘艸 生姜

疎邪清上散 集成 治春秋時月人感山嵐瘴氣霧

毒從口鼻入內令人寒熱胸膈飽悶不思飲食治
宜清上焦解內毒行氣降痰不宜發汗

黃芩 黃連 山梔 薄荷 桔梗 柴胡 升

麻 蒼朮 厚朴 藿香 枳實 木通 半夏

證治大選

醫學近編 卷之十一 六 貞白堂

木香 甘艸 生姜

解肌清熱飲 集成 治寒溫不節汗身脫衣感風寒

之氣氣閉發熱此傷寒之類也但嶺南患此悉皆
胸滿痰壅飲食不進不比北方傷寒只傷表而裡

自和者不同治當解肌清熱降氣行痰不可作正
傷寒治

羌活 蒼朮 柴胡 黃芩 半夏 枳實 橘

紅 川芎 甘艸 生姜 熱服取汗

加味神水散 集成 治山嵐瘴氣

蒼朮 厚朴 陳皮 香附 藿香 菖蒲 木香 甘艸 生姜

五積散

和劑

治感冒寒邪頭疼身熱惡寒或嘔吐

或腹痛或內傷生冷或寒濕客於經絡腰脚疼痛

白芷 茯苓 半夏 當歸 川芎 甘艸 肉桂

芍藥

各一兩

枳殼

各二兩

麻黃

各二兩

陳皮

二兩

桔梗

厚朴

各一兩

乾姜

各一兩

蒼朮

六兩

每服四錢

葱白三根姜三片水一盞服

溫疫

證治大選

醫學近編

卷之十一

七

貞白堂

脉多在肌肉間而不甚浮右手盛於左手由佛熱在

內故也若左手盛或惡寒此重感寒邪若左手浮

大右手浮緩而盛按之無力宜補藥帶表陽脉濡

弱陰脉弦緊更遇溫氣變為溫疫陽脉洪數陰脉

實大更遇溫熱變為溫毒大熱脉沈小細澹者難

治浮大或洪而有力者易治初起骨痛難以轉側

身無大熱者重壯熱煩渴者輕身痛煩渴壯熱脉

細小無力者死

溫病熱病

溫暑治例云經曰冬傷於寒春必病溫蓋冬傷寒邪

不即為病伏寒變熱至春陽氣外發鬱熱之邪因

而發動自春分至夏至前病壯熱口渴而不惡寒

者是也發於夏至後愈加熱而脉洪數者為熱病

重感於寒變為溫證更遇於風變為風溫更遇溫

氣變為溫疫更遇溫熱變為溫毒症有表裡之分

在表者宜辛平之劑微解之在半表半裡者宜辛

涼之劑和解之在裡者宜鹽寒之劑通利之隨經

處治因時致宜此治之善也近時醫者一遇溫熱

證治大選

醫學近編

卷之十一

八

貞白堂

病不分表裡即用九味羌活湯以發之發而不微

隨用雙解散通表裡以治之夫羌活湯既為邪在

表而用羌防芎芷細辛之溫散則不宜復用黃芩

生地之苦寒牽制其邪而不使之外達也若為心

肺有熱而用黃芩生地之苦寒理宜用涼遠溫更

不當復用溫藥又增煩熱也又雙解散既用麻黃

辛熱以發之復用芍藥酸寒以收之用硝黃鹹寒

以泄之又用歸朮甘溫以補之散收不宜並用補

泄理難概施矧天道溫暖玄府易開麻黃性熱可

輕用耶。溫病不惡寒者，由邪熱自內發外，非風寒由外入內，故不惡寒而禁大發汗也。或有遇風寒之氣觸之，客有酒淅畏寒意者，由邪熱在表，表之陽氣受傷，或鬱熱之邪與寒氣不合，故畧覺怕寒，非若卒然感冒風寒，素不向火，畏寒之甚也。止宜柴葛解肌湯，本加生姜以解肌表之邪而已。其有惡寒之甚者，必是宿邪將發，又復感風寒也，宜用感冒發散之劑，加羌活、蒼朮、蘇、芎芷之類。其身體痛者，由宿邪伏匿，發而阻滯，故皮膚按摩俱痛。
 證治大還 醫學近編 傷寒 九 頁白堂
 甚則骨痛難轉側，悉由濕熱鬱蒸而然。非若傷寒腰脊肢體拘急而疼也。宜柴葛解肌湯，加蒼朮、香附、陳皮之類，解散其邪而痛自止。頭痛者，由濕熱之氣上蒸於頭目也。宜柴葛解肌湯，加荆防薄荷之類。身熱者，邪熱在於陽明經，自汗者，邪熱陷於肌肉，熏蒸津液而成汗。口乾者，由邪熱發其津液為汗，津液不足，故口乾也。非若傷寒邪熱入胃，耗其水穀之液，煩渴引飲，舌生芒刺之甚也。身熱自汗，口乾俱用白虎湯。本若身熱口乾無汗

宜柴葛解肌湯以解肌表之邪，切勿誤用白虎以鬱遏其熱，而不使之外達也。耳聾、脇痛、邪熱在於少陽經也。白虎湯加柴胡、黃芩。胸滿而嘔，邪熱客於胸中也。柴胡、白虎湯倍加半夏以散胸中之邪。兼下嘔逆之氣，若嘔逆而渴，欲飲水，此邪氣漸入於胃也。加瓜蒌根以去胸胃之熱，不當更與半夏以重燥之也。若邪客於心胸之間，痞滿微痛者，小陷胸湯。連牛瓜 實加枳實、陳皮、蘇、梗、山梔。若邪客於心胸之間，懊憹煩亂者，宜鮮毒湯。本加
 證治大還 醫學近編 傷寒 干 頁白堂
 麥門冬、天花粉。若嘔吐惡心，此邪氣入客於胃脘，較之邪客胸中尤覺深矣。渴者解渴湯，加竹茹、陳皮、天花粉、麥門冬。不渴，小陷胸湯，加陳皮、生薑、梔子。若煩躁作渴，引飲不止，此火邪在於心脾腎之分，耗其津液，涸其真水也。宜解渴湯，加天花粉、麥門冬、石膏、知母。日進三服，而煩渴不止者，急下之，以救腎水之枯。舌生芒刺者，由心火太盛，腎水太枯，不能上潤也。目睛不了了者，由熱極，故眼目眊朦而不圓，非直視睛定而不動移也。

語者陽明胃實邪熱上乘於心故神思昏亂而妄

言也三者雖宜急下尤當審其滿實若腹如仰瓦

而不脹滿但大便結硬者此腹無凝滯之氣為實

而不滿也用解毒調胃承氣湯本連施麥冬萎根大黃芒硝

若肚腹脹滿而大便不甚堅者此邪熱雖滯於腹

中猶為滿而不實也用解毒小承氣湯大黃朴實若

大滿大實堅此熱勢已極急宜去其邪用解毒大

承氣湯以硝黃蕩堅枳朴泄滿去甘艸恐其緩中

也發黃者謂之溫黃由邪熱鬱蒸於脾胃也黃

證治大還

醫學近編

王貞白堂

而明亮大便秘結者此熱勝也解毒茵陳湯本黃

而昏暗便軟者此濕勝也茵陳二苓湯本

發斑者邪熱鬱於手足太陰經也色紅者輕玄參

升麻湯本色紫黑者重太青四物湯本發狂者

熱毒在胃併入於心重陽則狂也宜解毒大承氣

湯婦人經水適來邪熱乘虛入於血室而狂者桃

仁承氣湯大黃桃仁桂枝芒硝甘草發厥者熱極當下失下

熱深故手足逆冷亦熱極似水也脈來有力解毒

大承氣湯脈來無力元氣弱或過經再傳者不可

證治大還

醫學近編

王貞白堂

大汗而解也不解小柴胡湯柴胡參半加知母若

戰無汗出正不勝邪也柴胡桂枝湯柴胡參半加

人參去黃芩助其正氣使再戰以出汗其餘勞復

食復後復諸症俱同正傷寒傳變調治

陳三農云溫熱病前三日法宜解肌用柴葛解肌湯

連服三四服必愈若病不解必已傳變法當下之

但下之太早則邪熱乘虛入裡恐成痞滿結胸斑

黃等症故後三日宜用解表和中之劑有汗白虎

湯本無汗小柴胡湯柴胡參半涼膈天水合而服之若

病在半表半裏。亦用小柴胡。合服。以和解之。若

裡熱微者。即宜微下。大柴胡。柴胡芍藥枳實大黃合解毒湯。

熱勢不退。大柴胡。合三一承氣主之。以除表裡之

熱。若裡熱甚。急用三一承氣。合解毒湯。以清利之。

雖脈浮數。亦常用也。或胸膈滿悶。或喘。或嘔。陽脈

緊甚。者。瓜蒂散吐之。此後別無他症。止用涼膈散。

通梗芩薄枯竹葉大黃硝芒或柴芩湯。以微其餘邪。若或尚有

微熱。以柴胡天水散。柴芩參甘州竹葉滑石清利之。毋令其

反復也。或發汗後。熱不解。脈浮者。以白虎加蒼

證治大還 醫學近編 類編 卷之一 韋 貞白堂

朮。解之後。以五苓散。二苓澤白木桂枝合天水調之。多進

數服。有大下之後。熱不退。再三下之。其熱愈甚。

或裡熱極甚。致陽厥極深。身冷脈微。此厥陰欲絕。

亢陽極深也。急用涼膈。合解毒湯服之。以養陰退

陽。宜散蓄熱。或大汗。或無汗。氣和而愈矣。有未愈

者。解毒合承氣下之。次以解毒涼膈。合天水散調

合陰陽。而他症愈矣。若成結胸。用大小陷胸湯。

硝黃連連半姜枳脈浮者。不可下。小柴胡。合小陷胸湯。

瓜蒌枳實飲飲過度。濕熱內生。自利不止。解毒湯合

天水散。連芩梗柴參陽毒生斑。涼膈。通梗芩芍藥滑

加當歸。佛熱抑鬱。發黃茵陳湯。茵陳黃芩芍藥大黃調五苓散

或茵陳湯。合承氣下之。煩心不得臥。梔子豉湯。梔子豉

豉。下太早。成結胸。虛痞。涼膈散。加枳桔汗下之。

後煩渴飲水。涼膈合四苓散。二苓或五苓甘露飲

桂心人參藿薤茯苓葛根此皆治溫濕病之聖藥

也。

三農云。疫癘初發時。用人參敗毒散。人參芍藥羌活獨活柴胡

去參發表。熱盛黃連解毒湯。明本與小柴胡湯相參

證治大還 醫學近編 類編 卷之一 韋 貞白堂

服之。服二三貼後。服柴芩湯。一二貼。渴加當歸麥

門冬。葛根五味子。渴甚加滑石。虛加人參。必戰汗

出而愈。不可峻補。如病退後復發者。此元氣虛也。

用生脈散。人參麥冬五味子之類。如發汗吐下後。煩躁者

煩為虛煩。躁為火躁。躁重於煩。四物合生脈散。

雲間陳 治三農甫述 男

栻璣先 校 師柴羔恩

毘陵鄒言正仲衡甫泰

門人 范 崧壽民 閱 王 頤贊皇

熱病

熱病與溫病相同但發於夏至後其熱愈甚故曰熱

病無汗而熱葛根柴胡升麻石膏甘艸自汗煩熱

咽痛梔子大青知母石膏柴胡黃芩甘艸若發熱

證治大還

醫學近編 熱病 一 貞白堂

虛煩不止發於三月後謂之晚發梔子升麻湯

門本

其傳經裡症治同溫病

溫疫

時行溫疫以一方一境病多相似此非傳染由於同

感天地之癘氣也治法與溫病相同與時行寒疫

大異在表宜加味神木散類傷寒門不可大發汗在裡

治同溫病若脉不浮一家長幼相傳者此為傳染

初起邪氣由呼吸而入尚在上中二焦不可遽用

下藥誅伐無過宜清上中二焦邪熱解內毒有汗

用白虎湯

本加蒼朮厚朴陳皮薄荷桔梗連翹梔

子木香甘艸無汗用神木散加薄荷桔梗連翹梔

子木香若毒在肌肉遍身疙瘩腫痛發熱者漏蘆

湯本大便實者漏蘆丸毒在頭面普濟消毒飲

毒在兩耳近項遍腫腫痛此溫毒客於少陽經名

曰蝦蟇溫柴胡連翹湯本毒入胸膈惡心嘔吐煩

亂或瀉或秘竹葉石膏湯本毒入腸毒協熱而利

黃芩芍藥湯本連歸芍大黃枳

毒入腸胃肚腹膨脹大便不通解毒承氣湯裡症

證治大還

醫學近編 溫病 二 貞白堂

治同溫病

寒疫

時行寒疫者四時之中天有暴寒而人犯之家長

幼患頭痛身疼發熱惡寒無汗是也與傷寒相似

但畧輕耳宜平胃香蘇散本裏症治同傷寒

風溫

其脉陽浮滑陰濡弱風熱相搏令人身熱自汗四肢

不收昏睡頭痛喘息發渴不可汗下利小便宜萎

蕤湯本謔語躁擾目亂無精者敗毒散柴前芍羌獨茯苓

參汗後身猶灼熱。知母葛根湯。本門大渴引飲。拍發根湯。本門脉浮身重。自汗。防己黃芪湯。葛根龍胆湯。本門

濕溫

濕溫因先傷於濕。復感於熱。濕熱相搏。故頭目重痛。倦怠惡寒。痞滿不食。壯熱自汗。兩脰逆冷。寸脉濡弱。尺脉小急。若發汗。是虛虛也。宜除濕湯。蒼陳甘曲黃香或白虎湯。加桂枝蒼朮。

溫瘧

證治大還

醫學近編 濕溫溫瘧 三 貞白堂

春末夏初。病瘧曰溫瘧。邪在少陽經也。兼太陽則多寒。小柴胡湯。柴芩參加羌活桂枝。兼陽明則多熱。小柴胡湯。加葛根。括蕪根。寒熱往來。小柴胡湯。先寒後熱。加桂。但熱不寒。白虎湯。本門但寒不熱。或寒多熱少。胸脇微滿。小便不利。嘔而不渴。柴胡姜桂湯。本門大便閉。或間一日發。大柴胡湯。柴芩芍半黃大黃

大頭溫

大頭溫。乃濕熱在高巖之上。宜輕揚辛涼之劑。緩而治之。不可用降下藥。以誅伐無過。宜羌活防風。荆

芥薄荷。柴胡。白芷。桔梗。連翹。玄參。惡實。癰。蚤。酒炒。芩連。其腫而痛者。為實邪。加酒大黃。其腫而赤者。為結熱。倍連翹。不赤者。為雷氣。倍酒芩。虛邪加人參。東垣云。陽明邪熱太甚。莖實少陽相火為之視。

其腫勢在何部。隨經處治。勿令重劑過其病所。如陽明為邪。首大腫。額上而部二目難開。加升麻。葛根。石膏。去防風。羌活。少陽為邪。出於耳前後。頭角紅腫。倍柴胡。加天花粉。太陽為邪。發於頭上。并腦後下項。及目後赤腫。倍羌活。防風。湯藥時時咽之。

證治大還

醫學近編 大頭溫 四 貞白堂

勿令飲食在後。勿可太急攻治。急則邪氣不伏。反攻於內矣。夫頭面乃空虛之地。空則無所不至。故不可急也。大頭溫乃濕熱在高巖之上。受山嵐瘴氣所致。用麻黃杏仁。荆芥。防風。連翹。木通。金銀花。半夏。右膏。甘州生薑。葱白煎服。

却疫法

蘊要云。却疫之法。唯宜內補中氣。中氣實。則腠理固。雖遇疫邪。無能為害。近見世人。於疫癘盛行之際。豫服藿香正氣散。以防未然。豈知邪未傷人。而先服發散之劑。既無病邪抵受。必傷正氣。而疎腠理。

反有開門延寇之患矣可乎哉故補中氣戒坊勞 節飲食實不受邪此其道也凡視病人切忌恐慌 怯則氣餒餒則邪氣乘虛入矣		柴葛解肌湯 治溫病壯熱口乾而不惡寒病在少 陽陽明二經以此解之		葛根 四錢 柴胡 一錢 升麻 白芷 芍藥 各一錢 五分		甘肅 一錢 頭痛加荊芥防 荷 骨痛加蒼 朮香附陳皮		白虎湯 治溫熱病自汗口乾發熱 東垣謂立夏前 多服白虎必小		證治六選 醫學近編 邱汝法 五 貞白堂 便不禁此因陽明津液不能上輸肺之 清氣亦復下降故兩非極熱不宜用		石膏 五錢 知母 三錢 甘肅 一錢 粳米 百粒 用 恐寒涼太過損傷胃氣 用以助脾行藥勢也		黃連解毒湯 治溫熱病用表散藥仍壯熱煩躁口 渴		黃連 三錢 黃芩 黃柏 梔子 各二錢		加減解毒湯 治溫熱之邪客於胸膈懊憹煩亂		黃連 梔子 麥門冬 括蕤根 各二 錢		解毒茵陳湯 治溫黃大便秘結	
--	--	-----------------------------------	--	--------------------------------	--	------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--------------------	--	---------------------	--	-----------------------	--	---------------	--

茵陳二苓湯 治溫黃濕勝大便不結		梔子 茵陳 黃柏 豬苓 茯苓 澤瀉 各等 錢		梔子升麻湯 治三月後晚發壯熱虛煩不止		梔子 柴胡 黃芩 石膏 升麻 各二錢 生地黃 一兩六錢 湯汁		加味神朮散 治時行溫疫表症		蒼朮 厚朴 藿香 葛蒲 香附 葛根 升麻 陳皮 生薑 嘔加半夏		證治六選 醫學近編 邱汝法 六 貞白堂 卷之二		玄參升麻湯 治溫毒發斑		玄參 四錢 升麻 三錢 甘肅 一錢五分		大青四物湯 治溫毒發斑紫黑		大青 阿膠 豆豉 甘肅		三黃石膏湯 治溫毒發斑		黃連 黃芩 黃柏 梔子 玄參 石膏		犀角 知母 大青 麥門冬		加味清涼散 治溫熱病內外俱熱大小便赤秘口 渴舌裂生瘡咽閉目赤血衄譫語發狂煩躁一切	
-----------------	--	---------------------------	--	--------------------	--	-----------------------------------	--	---------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	--	-------------	--	---------------------	--	---------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------------	--	--------------	--	---	--

風熱上壅等症

薄荷 葛根各二兩 連翹 梔子一兩 滑石 赤芍

藥 甘艸各二兩 大黃 芒硝 竹葉 蜂蜜 生

薑

防風當歸飲 治溫熱病汗下熱不退

防風 柴胡 大黃 黃芩 滑石 人參

當歸 芍藥 甘艸

梔子烏梅湯 治瘧後虛煩不眠

梔子 烏梅 黃芩 柴胡 竹葉 知母 豆

證治大還

醫學近編 却病法 卷之二 七 貞白堂

豉 甘艸

漏蘆湯 治溫毒發癰疹疔瘡

漏蘆 升麻 酒芩 藍葉 玄參 桔梗 連

翹 荊芥 鼠粘子 人中黃 便秘加硝黃

腫甚加芒硝 發瘧加蠶蚕

柴胡連翹湯 治蝦蟇溫兩腮虛腫

柴胡 連翹 薄荷 梔子 桔梗 黃芩

普濟消毒飲 東垣 治溫毒發於耳下項間腫通咽喉

黃連 酒炒黃芩 酒炒玄參 連翹 柴胡 白芷

升麻 桔梗 馬勃 蠶蚕 鼠粘子 當歸

板藍根 甘艸 便秘加酒炒大黃徐溫服

竹葉石膏湯 治溫毒入胸膈嘔吐惡心煩亂

竹葉 石膏 黃連 知母 天花粉 麥門冬

甘艸

十味芎蘇散 治時行寒疫頭痛發熱惡寒胸膈痞

滿

川芎 紫蘇 葛根 柴胡 桔梗 枳殼

半夏 陳皮 茯苓 甘艸 葱白

證治大還

醫學近編 却病法 卷之二 八 貞白堂

平胃芎蘇散 治時行寒疫表症

蒼朮 厚朴 陳皮 甘艸 川芎 紫蘇 羌

活 香附 白芷

麝乾湯 治夏月暴寒伏熱咳嗽

蘇葉 前胡 杏仁 桔梗 獨活 紫苑 枳

殼 半夏 肉桂 陳皮 射干 甘艸 生薑

萎蕤湯 治風溫自汗四肢不收身熱昏睡頭痛發

渴喘息

萎蕤 石羔 葛根 羌活 白薇 川芎

杏仁 青木香

知母葛根湯 治風溫汗後身猶灼熱

葛根 升麻 羌活 防風 麻黃 川芎 麴

仁 杏仁 石膏 知母 人參 黃芩 南星

木香 甘艸

括葉湯 治風溫大渴引飲

括葉根 石膏 人參 防風 葛根 甘艸

防已黃芪湯 治風溫脈浮自汗

防已 黃芪 白朮 甘艸 生薑 大棗

證治大還

醫學近編 却按法

九

貞白堂

熱服取微汗

葛根龍胆湯 治風溫脈浮身汗而重

葛根 石膏 麻黃 升麻 桂枝 麴仁 大

青 芍藥 龍胆艸 甘艸 生薑 大棗

柴胡桂蘆湯 治溫瘧但寒不熱或寒多熱少

柴胡 黃芩 桂枝 乾姜 牡蠣 括葉根

甘艸 生薑

活命丹 治疫

大黃 四兩 殭蚕 二兩 白芷 一兩

姜汁爲丸雄黃

硃砂各五錢爲衣每凉水化一九汗出愈 一方

無白芷以飛麵姜汁糊丸兼治瘧痢諸症

治項腫大頭病

殭蚕 薑黃 蟬退 各二錢 姜汁丸重一錢蜜

湯下 一方用黑豆二合炒令香熟甘艸二寸炙

水煎徐徐嚥下

治時行頭痛壯熱 聖惠

用葛根三兩豆豉一合水三升煎升半分二服出

卽愈 心煩加梔仁甘枚

證治大還

醫學近編 却按法

十

貞白堂

陳氏治時疾發黃心狂煩悶熱渴以瓜蒌用新汲水

淘汁入蜜朴硝服之

時氣頭痛壯熱

用生葛汁一碗入豆豉山梔煎服

陽毒發狂奔走不定黃連寒水石等分濃煎甘艸湯

下四錢

陽毒結胸按之極痛蚯蚓四條洗淨研入姜水薄荷

少許蜜一匙片腦少許新汲水調服

溫熱病臑伏熱在胃也茅根葛根各二兩水煎服

傷風五

陽浮陰弱。或浮而緩。浮而大。皆感冒風邪。

傷風屬肺者。多以肺主皮毛故也。咳嗽噴嚏。鼻塞聲

重。或身熱頭痛。惡風自汗。此感冒之輕者。宜金沸

草散。去麻黃。加防風。杏仁。若頭痛項強。肢節煩

疼。目痛鼻乾。肌熱惡風自汗。用桂枝湯。門咳嗽

聲啞。無汗寒包熱也。用細辛。蘇葉。防風。咳嗽聲

啞自汗。熱壅肺也。用天門冬。麥門冬。山梔。地骨皮。

枳殼。鼻塞流清涕。風寒鬱熱而熱上炎。薰肺也。

證治大還

醫學近編 傷風 卷之二 真白堂

用防風。蘇葉。杏仁。枳殼。若汗出憎寒。項強。桂枝

葛根湯。葛根 黃芍 麻陳無擇云。風邪在經。流注經絡。循

經傳變。與傷寒無別。但在太陽經。則有傷風傷寒

之分。至陽明少陽及三陰經。則風與寒皆變而為

熱矣。無復有二者之別。而施治亦同矣。然諸家以

風本外邪。例用發散之劑。豈知受病之源。亦有不

同者。如飲食過傷。又兼傷風。必用枳實。青皮。陳皮。

麴蘖。白朮。消導其裡。兼用川芎。羌活。防風。乾葛。紫

蘇。以解其表。如起居不時。房勞之後。而致傷風。

者。宜參朮芎歸。以補其虛。佐入羌防葛根。微解其

表。如表虛。腠理疎豁。易於感冒者。宜用參芪。以

實表虛。少佐防風。蘇葉。以去表邪。如挾痰熱。其

氣怫鬱。腠理常疎。易於感冒。或火鬱之甚。畏見風

寒。遇見寒便發者。宜用清肺化痰湯。門治其內熱。

佐以柴胡。葛根。防風。荆芥。解其外邪。若表虛受

風。及內有鬱熱。肌腠常疎。不時感冒。專用發表之

劑。非徒無益。抑且愈虛其表。愈耗其液。火愈甚而

傷愈易矣。

證治大還

醫學近編 傷風 卷之二 真白堂

加減參蘇飲。和劑治感冒風寒。胸膈痞悶。憎寒發

熱。氣急。

紫蘇 葛根 前胡 杏仁 桔梗 枳殼

皮 橘紅 茯苓 半夏 甘艸 生薑 天寒

惡寒無汗。咳嗽氣促。加麻黃。金沸艸。胸膈有痰。加

瓜蒌仁。氣促。咳嗽不止。加知母貝母。肺寒咳

嗽。加五味子。乾姜。肺熱咳嗽。加片苓。心下痞悶

或胸中煩熱。加黃連。枳實。

香蘇飲 治四時感冒風邪。頭疼發熱。

紫蘇	香附 <small>炒各三錢</small>	陳皮 <small>去白一錢三分</small>	甘艸 <small>七分</small>
桂枝湯	治太陽經傷風自汗惡風鼻鳴乾嘔自痛		
桂枝	<small>二錢五分</small>	芍藥 <small>一錢五分</small>	甘艸 <small>二錢</small>
大棗			
金沸艸散	<small>和劑</small>	治肺經受風頭目昏痛咳嗽聲重	
涕唾稠粘眩運			
旋覆花	前胡 荆芥 半夏 赤芍 甘艸		
生薑	麻黃		
消風百解散	<small>和劑</small>	治頭痛發熱咳嗽鼻塞聲重惡	
風無汗			
證治大選	醫學近編 傷風 主 貞白堂		
荆芥	白芷 麻黃 蒼朮 甘艸 陳皮		
葱白	生姜		
辛芎清上散	治諸風上攻頭目昏痛鼻塞聲重		
薄荷	荆芥 川芎 白芷 羌活 細辛 甘		
菊	酒芩 防風 連翹 甘艸 每二錢食後		
茶調下			
柴胡升麻湯	治頭痛壯熱惡風體痛鼻塞咽乾痰		
盛涕唾稠粘咳嗽			
柴胡	前胡 黃芩 荆芥 石羔 升麻		

乾葛	桑皮 豆豉 赤芍藥		
清肺化痰湯	治風熱痰涎咳嗽		
桔梗	枳殼 半夏 橘紅 前胡 細辛		
黃芩	甘艸 茯苓 生姜		
杏子湯	治風邪入足陽明經發熱自汗眼眶痛		
人參	半夏 茯苓 芍藥 杏仁 細辛		
紫蘇	前胡 陳皮 甘艸		
大青膏	發散風邪		
天麻	<small>錢白附子一錢五分</small> 蝎尾 <small>五分</small> 烏蛇肉 <small>五分</small>		
證治大選	醫學近編 傷風 主 貞白堂		
硃砂	青黛 天竹黃 麝香 <small>各二錢五分</small>		
生蜜和成膏丸	艾實大服一丸		
大黃丸	治風邪入裡有下症者		
大黃	黃芩 <small>各等分</small> 水滴為丸		
傷風之症宜溫肺有汗惡風桂枝芍藥甘艸生姜湯			
無汗惡寒麻黃杏仁桂枝芍藥甘艸湯有汗惡寒			
桂枝湯少加麻黃大桂枝湯症宜用桂枝湯而加			
麻黃者假其發也傷風無汗冲和湯首痛麻黃杏			
仁芍藥甘艸湯加訶子			

暑證 六

脈虛身熱脈浮自汗或浮大而散或洪大或弦細芤
遲或隱弱虛遲無力中得洪緩皆暑症也暑傷氣
氣傷則脈見虛弱若弦而帶微緊此因暑傷寒涼
之邪也

賈元良云暑者相火行令也人感之自口齒而入傷
心包絡之經其脈虛外症頭痛口乾面垢自汗倦
怠少氣甚則昏迷不醒或為霍亂吐利或為腹痛
瀉痢下血發黃生斑痰涎壅逆皆傷暑之症也

證治大選

醫學近編

暑症

主

貞白堂

薛立齋云暑症因避暑於深堂大廈靜而得之為中
暑脈沈實此陰症也當發散調中益氣湯加附子
或大順散勞役於日中而得此天熱外傷元氣也
為中熱脈洪大富清利輕則五苓散黃連香茹飲
重則清暑益氣湯

此事難知云傷暑有二動而傷暑此心火太盛肺氣
全虧故身熱脈洪大動而火勝熱傷氣也辛苦之
人多得之白虎加人參湯參石知州靜而傷暑火勝金
位肺氣出表故惡寒脈沈疾靜而濕勝者身體重

也安樂之人多得之白虎加蒼朮湯石羔知母蒼朮

陳三農云暑有冒有傷有中若腹痛瀉水者胃與大

腸受之惡心者胃口有痰此二者冒暑也用黃連

香薷飲本門若身熱頭疼躁亂不寧或身如針刺

者此為暑傷肉分也當解表用白虎湯溫病門加柴

胡氣虛加人參若汗大泄脈虛無力倦怠少氣

頭痛口乾背惡寒齒乾燥面垢昏冒此為暑傷元

氣也清暑益氣湯本門此二者為傷暑若咳嗽發熱

自汗不止脈數者此熱在肺經火乘金也此中之

證治大選

醫學近編

暑症

主

貞白堂

輕者宜清肺湯柴胡天水散俱本門若面垢悶倒

昏不知人冷汗自出手足微冷或吐或瀉此中之

重者參苓益氣湯本門惡寒自汗加熟附此二者為

中暑若因大熱避暑於深堂大廈過受陰寒以

傷其外或過食寒涼以傷其內使周身陽氣為陰

寒所遏而不得伸越令人頭痛惡寒無汗身形拘

急肢節煩疼身熱心煩此非傷暑人乃因暑而自

致其病也治宜溫中解表雙解散本門或因暑渴飲

啖冷物致發熱畏食惡心咽酸胸膈痞滿或脈沈

實此內傷生冷也宜加味平胃散蒼陳甘朴赤芍連或因暑熱露臥為冷氣所乘自汗怯風寒身疼頭痛去衣則凜着衣則煩身熱脉弦微緊此陰寒過其暑熱也宜二香散六和湯俱本加紫蘇或因冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐宜大順散門本或因暑熱飲水過多水冷逼火行於皮中致身熱重痛脉微而弱白虎湯石知加紫葛白芷蒼朮或因暑熱飲水過多致暑毒閉結心胸精神昏憤語言謬治大還醫學近編卷之二 貞白堂

不出香茹飲連化蘇合丸類中後再調理或因暑熱入水濕熱相搏自汗發熱身重小便不利五苓散白朮赤茯苓水寒鬱熱無汗發熱小便不利身黃者五苓散加茵陳滑石山梔冒暑飲酒酒熱與暑相併發熱大渴小便不利下如血色四苓散加滑石黃連香茹暑入腸胃腹內刺痛小便不利五苓散加滑石木通黃連香茹暑氣內攻心煩口乾身熱虛腫辰砂五苓散砂朮赤茯苓或黃連香茹飲門本暑瀉發熱四苓散澤猪加黃連

葛根暑瀉發熱四苓散加柴胡黃芩香茹傷暑汗出不止甚則真元耗散宜急收斂參苓益氣湯或祛暑建中湯俱本傷暑候發汗惡寒甚者以暑已傷氣復汗多亡陽陽氣虛故也祛暑建中湯加熟附子傷暑候用溫針發熱者以火濟火也香茹解毒飲傷暑數下之淋其者以下多亡陰陰虛而暑熱結於下焦也四物湯加生地山梔黃柏木通滑石香茹傷暑心下痞悶是暑氣動其痰也不可謂暑毒攻心宜清暑化痰湯傷暑治大還醫學近編卷之二 貞白堂

鼻流清涕或鼻中熱氣時出者因暑冒風也六和湯門本加羌活川芎伏暑煩渴而多熱痰者二陳湯加黃連香茹傷暑內外發熱煩躁大渴自汗者人參白虎湯參石知甘傷暑煩渴脉虛者竹葉石膏湯竹葉石膏黃連知母傷暑自汗手足時時摘掇名曰暑風香茹飲連加羌活暑毒客於上焦胸膈痞塞湯藥不入上氣喘急六和湯浸冷入麝香少許暑濕勝陰甚則傳腎肝為痿厥清暑益氣湯門本暑毒入深熱結在裡譫妄煩

渴不欲近衣被。大傷秘結三黃石膏湯。芩連柏玄

解暑湯。本傷暑發斑白虎湯加犀角黃連生地

傷暑脈洪實而渴黃連解毒湯

暑風

夏月昏迷卒倒或四肢搐搦不省人事其脈虛浮名

曰暑風。同君相二火與暑熱之氣相合鼓激痰涎

塞得心竅或火熱制金不能平木風火相扇故也

不可用冷水及純寒之劑壯實者宜吐俟醒後以

證治大還醫學近編九貞白堂

導痰湯牛南橘紅枳實合黃連香茹飲加竹瀝姜

汁虛弱者導痰湯加參苓麥門冬黃連香茹竹瀝

姜汁凡中暑悶倒急用生薑或葱蒜搗汁和水

灌之俟甦與白虎竹葉石膏等湯隨虛實調治

注夏

夏月困乏無力食少體倦身熱脈大俗名注夏蜀陰

虛元氣不足用生脈散本加生地炒黃柏香茹或

加參芪歸芍白朮甘艸不用黃柏

傷暑元氣暴脫宜溫補論

薛立齋云經曰寒傷形暑傷氣惟傷氣而不傷形故

氣消而脈虛弱故先哲立法夏月宜補也凡中暑

暴亡者皆因元氣虛弱而暑熱乘之以致泄瀉陽

氣暴脫實為陰寒之症宜急補其陽緩則不救若

執為暑熱快投寒劑鮮不為害宜用回陽固本之

藥

夏月陽氣盡散於表伏陰在內則運化稍遲如遇傷

食等症必然痰凝氣滯宜二陳湯加砂仁白芍隨

所傷加消導藥身熱加葛根或二陳合五苓散

證治大還醫學近編傷暑暴脫三貞白堂

夏月用滋陰藥必用燥藥調理用燥藥必用滋陰藥

調理

陳無擇云暑熱喜歸心入心則噎悶昏不知人入脾

則眩運頑痺入胃則昏睡不覺入肺則喘滿痰涎

入腎則消渴

醫按

夏夫人年已八旬憂思不已偶因暑浴遂患發熱頭

痛醫者以為傷寒禁其食而肆行解散越三日氣

高而喘汗出如洗昏冒發厥診其脈大而無力乃

爲之辨曰。外感發熱。手背爲甚。內傷發熱。手心爲甚。外感頭痛。常痛不休。內傷頭痛。時作時止。今頭痛無休。而手背不熱。是爲虛也。遂用參芪各五錢。白朮半夏各二錢。橘紅一錢。甘艸六分。一劑減半。後倍參朮而痊。

滑伯仁治一人。暑月病自汗如雨。而赤身熱。干燥心煩。自以至虛亡陽。且帷幕周密。服朮附藥數劑。脈虛而洪。數舌上白胎。曰。經言必先歲氣。毋伐天和。朮附之藥。可輕用。以犯時令耶。夫脈虛身熱。得之

證治大還

醫學近編 傷暑暴脫 圭 貞白堂

傷暑。暑症本多汗。加以剛劑。故脈洪數。而汗益甚。

遂令撒幔開窓。頓覺清爽。以黃連白虎湯。三進而

汗止大半。諸症亦減。繼以既濟湯。伯五味羌系草三進而

愈。黃竹葉 燈心 湯用凉水調益元散。七日而愈。

丹溪治一人。夏大發熱。謔語。肢體莫舉。喜冷飲。脈洪

大而數。以黃芪茯苓。濃煎如膏。凉水調飲三四次。

昏臥如死。氣息如常。次日而愈。

又治一人。夏月發熱。大汗惡寒。戰慄煩渴。脈虛微

而數。因素勞而虛。以人參湯調辰砂四苓散。八劑

而安

張紹甫治一人。暑月患頭痛身熱。昏睡大渴。引飲衆以感冒治不效。公診之。脈大而虛。曰。此暑症也。即令撒幔開窓。前後左右。各置凉水。頓覺清爽。仍令二童食以西瓜。取其便。連飲四五鍾。即愈。

黃連香薷飲 局方

黃連 香薷 扁豆 茯苓 厚朴 甘艸

柴胡天水散 要訣

柴胡 黃芩 人參 甘艸 滑石 竹葉

證治大還

醫學近編 傷暑暴脫 圭 貞白堂

二香散 統旨 治夏月一切外感

香薷 藿香 紫蘇 白芷 蒼朮 桔梗

厚朴 陳皮 半夏 黃連 扁豆 茯苓

甘艸 大腹皮 生姜

雙解散 要訣 治因暑熱內傷生冷。外受陰寒。致惡

寒拘急。痞悶。發熱吐瀉。

羌活 蘇葉 蒼朮 厚朴 陳皮 乾姜 砂

仁 人參 白朮 茯苓 枳實 甘艸 生姜

香苓湯 治暑瀉或小便秘

猪苓 茯苓 澤瀉 白朮 滑石 香茹

厚朴 扁豆

桂苓甘露飲 子和 治伏暑發渴。脈虛用此溫散淡

滲解利。

桂心 人參 藿香 甘艸 各五錢 茯苓 白朮

葛根 寒水石 澤瀉 石膏 各一兩 滑石 二兩

木香 一錢 白湯調服三錢

十味香茹飲 下 治伏暑身體倦怠神惡昏迷頭

重吐逆煩心。

證治大還

醫學近編 傷暑暴脫 卷之二 頁白堂 三五

香茹 二錢 扁豆 人參 白朮 黃芪 茯苓

木瓜 厚朴 陳皮 甘艸 各一錢

清暑益氣湯 東垣 治長夏濕熱蒸人。人感之四肢

困倦精神減少。懶於動作。胸滿氣促。肢節沉重。氣

高而喘身熱而煩。小便赤黃。大便澹泄。或痢或渴

自汗不食。

人參 黃芪 白朮 當歸 黃柏 五味子

麥門冬 神麴 葛根 蒼朮 升麻 澤瀉

青皮 陳皮 甘艸

參苓益氣湯 統有 治傷暑發熱汗大泄。無氣以動。

四肢困倦。背惡寒。脈虛細而遲。

人參 黃芪 白朮 茯苓 麥門冬 五味子

白芍 香茹 陳皮 甘艸

驅暑建中湯 統有

人參 黃芪 白朮 茯苓 當歸 白芍藥

扁豆 香茹 木瓜 桂枝 陳皮 甘艸

大棗

生脈散 真人

證治大還

醫學近編 傷暑暴脫 卷之二 頁白堂 三五

人參 麥門冬 五味子 各三錢

六和湯 東垣 治心脾不調。飲食不進。嘔吐泄瀉。胸

膈痞滿。痰嗽便赤。

砂仁 半夏 杏仁 人參 赤茯苓 扁豆

香茹 木瓜 藿香 厚朴 甘艸 生薑

香茹解毒湯 玉机 治中暑危篤。及下鮮血。脈洪實

而渴。

香茹 二錢 扁豆 厚朴 黃芩 黃連 黃柏

山梔 俱炒各一錢

生津甘露飲

河間

治暑毒煩渴

黃連

石羔各一兩

葛根

扁豆

烏梅

知母

生地

麥門冬各五錢

白豆蔻

人參各二錢

新汲水調下三錢

清肺湯

統旨

地骨皮

知母

桑白皮

麥門冬

馬兜鈴

杏仁

阿膠

柴胡

黃芩

甘艸

天順散

和劑

治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水

殺不分霍亂嘔吐臟腑不調

此藥不可治前如楊志泰也

證治大還

醫學近編

卷之二

傷暑暴脫

真白堂

三三

乾薑

炒肉桂

杏仁

炒去皮尖

甘艸

炒八兩

每二錢水一鍾煎服

碧倍散

治中暑昏迷不省人事

枯礬

甘艸各一兩

烏梅

五倍子

各五錢

飛麴

三兩

每三錢新汲水調灌

半夏丸

本事

治一切暑毒欲死者服之即甦

半夏

四兩醋一升半

赤茯苓

二兩

白茯苓

甘艸

各一兩

桂心

五錢

姜汁糊爲丸梧子大熱湯下五十

九

治中暑忽倒

用大蒜及道上熟土研以新汲水冲澄灌即甦

治傷暑霍亂

用絲瓜葉一片白霜梅肉一枚并核中仁同研極

爛新汲水調服立痊

又方用粟米連殼搗碎煎湯溫服神效

又方取扁豆葉搗汁一碗飲之立愈

又方以砂仁一兩炒研鹽一撮沸湯調冷定服

刺愈傷冷物者加吳茱萸四錢

證治大還

醫學近編

卷之二

傷暑暴脫

美

真白堂

三三

又方用青蒿嫩葉手揉如豆大并水吞下數枚立

愈

治中暑大小便不通

用田螺三枚搗爛入青鹽五分攤成膏貼臍下一

寸即下

斑疹

陳三農曰發斑之症。斑點隱於皮膚。而不高起者。冬寒傷于外。不謹于內。至春變為溫症。至夏變為熱病。蘊毒既久。積熱益深。以內虛之人。難于發越。而成斑症。故達達稱爲難治。然陽斑猶可治也。陰斑則當慎之矣。

有色點而無顆粒者曰斑。春夏多此。皆冬月不謹邪乘虛入。至春變為溫病。至夏變為熱病。毒留一胃中。自然發斑。名曰溫毒發斑。

證治大還

醫學近編 斑疹 卷之二

貞白堂

疫氣傳染多發斑。大抵汗後熱不淨。煩躁脉伏便是發斑之候。初見紅影兼身痛者。升麻葛根湯加羌活防風再表而出之。已出而熱盛脉數者。小柴去半夏。加花粉。連赤芍。連翹。薄荷等。辛涼藥。嘔者。大半夏湯加減。心下迷悶。氣口緊滑。又兼惡心。必是宿食。消導為主。兼清涼藥。瀉者。柴苓湯加減。斑症或吐或瀉者。古謂毒氣上下俱出也。舌乾口渴。煩躁是毒聚于胃也。化斑湯或陽毒梔子湯。斑症舌躁黃胎。即是陽毒發斑。不問

日數。便投白虎合解毒柴胡一二味。心下脹悶而裏証見者。大柴承氣看微甚而下之。發斑兼咽痛。玄參升麻湯。勢盛者。陽毒升麻湯。大抵胃熱極則發斑。故升麻犀角。乃陽明經升散藥。古方往往用之。勢盛須兼解毒以降之。

內傷斑 內傷元氣不足之病。候作外感虛火遊行于外。亦發斑。第脉虛大倦怠。懶于言動。有汗爲異耳。因氣血虛。亦身痛心煩作熱。若妄作外感。有餘治。立見傾危。速進補中益氣湯。熟眠熱止爲愈。

證治太還

醫學近編 斑疹 卷之二

貞白堂

丹溪曰。內傷發斑者。胃氣極虛。一身之火遊行于外。宜補以降之。大建中湯佳。夏月蚊跡類斑。謬者。候認爲斑。而用斑藥。殺人殊速。但先紅後黃者。蚊跡先淡後紅赤者。斑。又蚊跡多見于手足。發斑多見于胸腹。欲斑之脉。或隱或伏。多躁悶。

升麻葛根湯 治邪客陽明經。鼻塞眼痛不眠。脉微洪而長。斑症未出者。

升麻 葛根 甘州 赤芍

薑棗煎。煎服。頭痛加葱白。

陽毒升麻湯

治傷寒一二日間身發斑闌或吐下

後變成陽毒腰背脊痛面赤狂言或自利脉洪大咽痛

射干

犀角

人參

甘艸

黃芩

升麻

水煎服

化斑湯

治斑已淨多燥陽明症見者即入參白虎湯加玄參如無汗乾熱加蒼朮薑豉再解之

疫毒發透無表裏症但發熱無汗葱白豆豉煎湯熱服妙

證治大選

醫學近編

斑痧

三

貞白堂

玄參升麻湯

治發斑咽痛煩躁譫語

玄參

升麻

甘艸

陽毒內外煩熱百節痛發斑舌燥兼辛涼解散陽毒梔子湯主之

升麻

梔子仁

黃芩

芍藥

各一錢

石膏

知母

杏仁

柴胡

各一錢

甘艸

薑三片豉二百粒煎熱服

丙有伏陰或悞服涼藥逼其虛陽浮散于外而為陰斑脉雖洪大按之無力或手足逆冷過于肘膝者

先用炮薑理中湯以復其陽次隨症治仲景陰毒

升麻鱉甲湯專主陰斑用者宜審之若內傷生

冷食外感寒邪而發陰斑調中湯最捷

升麻鱉甲湯

升麻二錢

當歸

甘艸

各一錢

蜀椒

二十粒

鱉甲

雄黃

研四

水二鍾煎

一鍾調雄黃末服

調中湯

治內傷外感陰斑

蒼朮

一錢

陳皮

一錢

砂仁

藿香

芍藥

煨

甘艸

桔梗

去蘆

半夏

湯泡

七次羌活

枳殼

各七

證治大選

醫學近編

斑痧

貞白堂

川芎

五分

麻黃

桂枝

各三

白芷

七分

薑三片煎七分溫服

黑膏治溫毒發斑冬月大溫人受不正之氣至春發

斑如錦紋脉浮散屬陽沉伏屬陰用此以消疫毒

生地

半斤

香豉

一斗

二味細切以猪膏

二斤合

煎之

取濃如膏

用雄黃麝香如豆大內中攪勻每

服彈子大白湯化下

大建中湯

治中氣不足無根失守之火出于肌表

而為斑認的進此立愈須脉大無力倦怠懶于言

動乃可用。

人參 黃芪 當歸 芍藥 桂心 甘艸

半夏 黑附子 製 薑棗煎服

大青四物湯 治溫疫發斑

大青 四錢 阿膠 炒成 甘艸 炙各 一錢 香豉 一合 水煎服

疹

疹屬風熱。浮小有顆粒。隨出即沒。而又出一翻者是。

亦有痰熱在肺。不得散發于皮毛。而變此者。先須

微汗以散。次化痰清肺。與小兒痧同。遍身作痒。抓

證治大還

醫學近編 斑疹 卷之二 貞白堂

之即成大疙瘩。俗名冷飯疙瘩。屬血熱生風。消風

解熱為先。不可驟與寒涼。必先升散。

丹毒 俗名火丹。言皮色赤如丹是也。四肢上下俱

有。乃毒熱蓄于血分。隨經而變出于部分也。方書

言惡毒。蘊畜于命門。遇君相二火。合熱即發。恐未

盡病情。若果發于下部。命門之分。方可獨指此經。

大抵三陰受積熱。膏粱厚味。變此疾者多。若發于

上部。俗名赤遊風。久之變癰。無非風熱。毒之微甚

耳。防風通聖散加減。

三錫曰。一切風熱。痧疹疙瘩丹毒。已經升散。而內熱

盛者。涼膈散。倍大黃瀉之。大腑不秘。脉弦數。多火

宜涼血養血。四物生地玄參連翹酒芩連。

丹毒遇溫暖。炎天宜辛涼解散。寒月必兼辛散。丹毒

先四肢而後入腹者凶。

小兒丹毒屬胎毒。剪刀草搗汁。調原蚕沙傅之。愈

消風散。治風熱隱疹痒。

荆芥 防風 甘艸 陳皮 厚朴 蟬退

人參 茯苓 川芎 藿香 羌活 白殭蚕

證治大還

醫學近編 斑疹 卷之二 貞白堂

右為末。每服二錢。荆芥湯下。茶清亦可。

加味敗毒散 治瘟疫及癰疹。即敗毒散。加生地薄

荷蒼朮白朮芍藥荆防。大抵隨症出入為佳。

犀角消毒飲 治發斑癰疹。內熱盛者。

犀角 磨水 牛旁子 四分 荆芥 防風 各二錢

甘艸 一錢 水煎加犀角水服

解毒防風湯 治同上

防風 地骨皮 黃芪 芍藥 荆穗 枳殼

牛旁子 炒七分半 水煎服

丹毒害人極速雖有消毒升散等法無如砭之為上

其法用麻油塗患處以磁砭之毒血去即愈詳見外科心法

其法用細磁器擊碎取有鋒銛者以筋一根劈破一頭夾定兩指輕撮筋稍令鋒銛正對患處懸寸許再用筋一根頻擊筋頭令毒遇刺皆出却以神功散敷之毒入腹作喘者不治

切丹毒疹痒痛內熱小便澀者大連翹飲妙

大半夏湯見喉門

柴苓湯 大柴湯 大承氣湯

證治大連

醫學近編

斑疹

卷之二 七 貞白堂

俱見傷寒門

補中益氣湯

見內傷門

大連翹飲

治斑疹丹毒癢痒或作痛及大人小兒風熱癩痛作痒小便澀

連翹 瞿麥 荊芥 木通 芍藥 當歸

蟬蜋 甘艸 防風 柴胡 滑石 山梔炒

黃芩 俱各一錢

水煎服小兒為末服一二錢白湯下

煩躁門

仲景云煩屬肺躁屬腎火入于肺則煩入于腎則躁大抵煩躁皆心火為病火旺則金燥而水虧也惟火獨有故肺腎合而為煩躁又脾經絡于心中心經起于脾中二經相傳濕熱生煩夫煩者擾擾心

二 元欲吐怔忡不安

二 二

成無已曰煩為擾亂而煩躁為憤怒而躁合而言之煩躁為熱也析而言之煩陽也躁陰也煩為熱之輕者躁為熱之重者

證治太還

醫學近編

煩躁

卷之二 一 貞白堂

陳無擇曰內熱為煩外熱為躁又曰虛煩身不覺熱頭目昏疼口乾咽燥不渴清清不寐皆虛煩也妻英曰先賢治煩躁齊作有屬熱者有屬寒者獨煩而不躁者多屬熱惟悸而煩者為虛寒躁不煩者多屬寒惟火邪者為熱蓋煩者心中煩或胸中煩皆內熱也躁者身體手足躁擾或裸體不欲近衣或欲坐井中為外熱也內熱者有本之熱故多屬熱外熱者多是無根之火故屬寒也

陳三農曰仲景成無已二公所論煩躁皆為火熱是

證治大還

醫學近編 煩躁 二

貞白堂

祖內經。夫熱病皆傷寒之類也。乃傷寒家語言。其邪自外而入。至于煩躁皆為熱候。予謂躁有陰陽。煩有虛實。陶節菴曰。先煩而悸者為實。先悸而煩者為虛。又曰。煩漸生躁有陰陽虛實之別。心熱則煩。陽實陰虛。腎熱則躁。陰實陽虛。煩為熱。躁為寒。此亦傷寒家語也。雜症之煩躁。又各有虛實。寒熱之不同。須當分別而治。虛煩者。心中擾亂。精神不能任持。似脹不脹。悒悒悶悶。飲食不甘。美睡臥不安寧者是也。治以養心血。鎮心安神之劑。如安神丸之類。實煩者。或心火熾盛。或水飲痰涎停于胸膈。壅悶不安者是也。治以消痰逐飲散邪之劑。如梔子豉湯。蠲飲湯。五苓散之類。陽躁者。煩渴欲飲。憤激躁怒。二便不利。經云諸躁狂越皆屬于火者是也。治如丹溪用妙香丸之類。陰躁者。渴不欲飲。極其躁擾。或上熱下寒。此為陰盛格陽。為陽氣虛憊。不能復入。皇皇欲坐井中者是也。治以理中湯。四逆湯之類。天抵煩症多屬于虛。經曰。夏脉者心也。其不及令人煩心。又云肝腎脾虛皆令

證治大還

醫學近編 煩躁 三

貞白堂

人體重煩寃迹。是知煩多由于虛也。當尋傷寒法外之治。今錄治方于左。以備採用。

內外俱虛。身冷而汗出。微嘔而煩。擾手足厥逆。不得安靜者死。熱病七八日。其脉微細。小便不利。加禁口燥。脉代舌黑。焦乾者死。

保命集云。起臥不安。睡不穩。謂之煩。宜梔豉湯。竹葉石膏湯。

活人書云。但獨熱者。虛煩也。諸虛煩熱與傷寒相似。但不惡寒。身不疼痛。故知非傷寒也。不可發汗。頭不痛。脉不緊數。故知非裡實也。不可下。病此者。內外皆不可攻。攻之必遂煩渴。當與竹葉湯。若嘔者與陳皮湯一劑。不愈再與之。孫真人云。此法數用有效。

陳皮湯

陳皮一兩 甘草半 竹茹各五錢 人參半 每服七錢

薑三片 棗二枚 水煎服

淡竹茹湯 治心虛悶。頭疼短氣。內熱不解。心中悶亂。及產婦心虛驚悸。煩悶欲絕。

麥門冬去心 小麥各一兩半 甘草炙一兩 人參 茯苓各一兩半

半夏湯洗 每服四錢薑七片棗二枚淡竹茹一

瓊水煎服

東垣珠砂安神丸 治心亂熱怔忡心神顛倒元元

欲吐胸中氣亂而熱有似懊懣之狀皆膈上血中

伏熱蒸蒸不安宜用權法以鎮陰火之浮行以養

上焦之元氣用甘草之甘溫補之當歸生地又為

長生陰血之聖藥黃連去心煩除濕熱殊砂納浮

游而安神明方見怔忡門

證治大還 醫學近編 煩躁 四 貞白堂

遠志湯 治心虛煩熱夜臥不寧及病後虛煩

遠志去心 黃芪 當歸 麥冬 石斛 酸棗仁炒

一分 人參 茯神各七分 甘草五分 水煎服 煩甚

者加竹葉知母

竹葉湯 傷寒大病後及霍亂吐瀉後心虛煩悶內

熱不解

竹葉 麥冬 人參 茯苓 小麥 半夏各一兩

甘草五錢 每六錢薑五片水煎服

小草湯 虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草 黃芪 川歸 麥冬 石斛 酸棗仁各一兩

兩人參 甘草各五錢 每六錢薑五片水煎服

地仙散 傷寒後伏暑後煩熱不安及虛勞不安

地骨皮二兩 防風一兩 甘草五錢 每六錢薑五片水煎服

竹茹麥冬湯 大病後表裡俱虛內無津液煩渴心

躁及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼不

可汗下者

淡竹葉 麥門冬 等分 每八錢水煎服

酸棗仁湯 霍亂吐下後增劇虛勞煩擾奔氣在胸

證治大還 醫學近編 煩躁 五 貞白堂

中不得眠或發寒熱頭疼暈悶

酸棗仁一兩七錢五分 人參 桂心各二錢半 知母 茯苓各二錢

石膏五錢 每七錢薑棗煎服

人參竹茹湯 胃口有熱嘔吐欬逆虛煩不安

人參五錢 半夏一兩 分二帖加薑七片陳皮二錢半

竹茹一錢水煎服

竹茹石膏湯 大病後餘熱煩悶

溫胆湯 大病後虛煩不得眠及驚悸

五苓散 水停心下作驚悸煩悶

清心蓮子飲 方見癰閉門

梔子豉湯 治邪在上集

四逆湯

理中湯

醫學近編

頌噪

貞白堂

陳氏醫學近編 卷之三

雲間陳 治三農甫述 男

拭璣先 校 師柴羔愚

毘陵鄒言正仲衡甫參

門人 范 崧壽民 閩 王 顯贊皇

濕證

沈細微緩或澁或濡者濕兼浮為風濕虛瀉為寒濕
洪緩或滑數為濕熱洪而動濕熱為痛滑疾濕熱
發黃

證治大還

醫學近編 卷之三

濕證

一

貞白堂

經曰濕勝則濡泄又曰地之濕氣感則害人皮肉筋
脉陳無擇云脾虛多中濕按濕有自外人者有自
內致者有兼風兼寒兼熱者須審方宜分內外虛
實及所挾用藥在上宜微汗而解經曰濕上盛而
熱治以苦溫佐以甘辛以汗為效而止也在中下
宜利小便或用升提挾風在表宜解肌挾寒在半
表半裡宜溫散滲泄濕熱在裡者宜下裡虛者宜
分消實脾土又東南地下多陰雨卑濕凡受多從
外人多自下起故體腫脚氣者眾治當汗散久則

疎導滲泄之西北地高多食濕麵燠酥炙燂之物
熱氣一或怫鬱則停滯而生濕故病多由內致所
以痞滿腫脹瀉痢者多治宜理脾清熱利小便壯
實者畧與疎導虛弱者實脾土以運化之

證治要訣云傷濕為病發熱惡寒身重白汗關節疼

痛而煩小便不利大便多溏腰脚痺冷宜除濕湯

一身盡腫或無汗是濕流關節宜五苓散白朮赤

桂加蒼朮微汗之若自汗出多熱燥津液小便不

利切勿利之重損津液宜防風白朮甘艸湯若濕

證治大還

醫學近編 濕證

二 貞白堂

甚痞鬱胸腹脹滿大小便澀滯氣實者神佑丸

升車丸虛弱者五皮散本加木香人參葶藶傷

濕而兼風者則一身盡痛身重自汗脉浮虛而澀

惡風肢體煩疼不能轉側近則痛劇大便難小便

不利日晡熱極宜微解肌不可大發汗用除濕湯

本加桂枝芍藥或二陳湯加酒芩羌活蒼朮散風

行濕若止發汗則風去而濕存宜黃芪甘艸白朮

湯喘加麻黃已得汗而身熱不退敗毒散枯艸芍

姜獨加蒼朮防己傷濕而兼寒者皮膚不收肌

肉堅緊無汗慘慘煩疼小便自利清白大便泄瀉

內甚則腹痛瀉利用五苓散加蒼朮木瓜附子外

甚則四肢沉重而疼肌肉濡瀆而不仁用除濕湯

本加麻黃羌活身重腰冷如坐水中小便澀大便

澀溫中滲濕湯本傷濕而兼熱者則煩渴引飲

身痛發黃內甚則瀉痢腹脹宜橘皮湯本外甚則

腫痛沈重筋肉酸疼宜清熱滲濕湯本表裡兼甚

者則痿厥癱瘓不能行動踝膝俱腫宜清燥湯本

橘白朮澤五味麥冬參歸生下部濕熱腫痛及膀

證治大還

醫學近編

三 貞白堂

肱有火邪宜防己蒼朮龍膽芩柏知母遍身

濕熱腫痛當歸拈痛湯羌防葛升二朮茵澤猪

傷酒濕熱滯於經絡遍身骨節煩疼解醒湯前傷

加蒼朮羌活傷濕而感風寒則汗出惡風喘滿

骨節煩疼狀如歷節痛風臍下連脚冷痺不能屈

伸即風寒濕合而成痺是也宜五痺湯參苓芍歸

辛白朮防己黃芪湯本濕鬱用越鞠丸香附撫

子神加羌活防風

原病式云諸瘧強直積飲痞膈中滿霍亂吐下體重

附踵肉如泥按之不起皆屬於濕又濕性潤澤病濕而反大便結燥者因濕主於痞濕氣甚於腸胃之內以致腸胃佛鬱綴結故氣液不得宣通因成腸胃之燥也不可更用潤澤之劑以滋其濕宜辛苦之藥開其鬱結以辛能開鬱潤燥苦能下氣燥濕使津液流通而病自已輕則蒼柏丸急則溶川散_{本方}即羅謙甫所謂濕主痞濕勝則氣不得施化故大小便不通也宜牽牛滑石郁李仁之類秘結甚加硝黃

證治大還

醫學近編 濕證

四

貞白堂

卷之三

三〇五

陳三農云中濕積受在脾胃二經大便泄小便赤脉微緩者五苓散微利之若渾身強直四肢倦怠不舉法當疏利小便切不可輕易汗下宜羌活續斷湯中風濕兩寸脉俱浮傷風兼傷濕四肢不收身熱無汗頭痛喘急身重難以轉側切勿汗下汗之則譫語噪擾目眩無光小柴胡湯加桂枝仍復不解汗出屬熱知母葛根湯_{溫病門}加天花粉悞汗下小便不利五苓散主之身目黃加茵陳不黃加朮附身痛鼻塞小建中湯_{為桂枝艸}加黃芩凡濕熱

在上焦用茯神遠志能使濁氣下降凝滯中焦用茯神遠志能使清氣上升

按濕氣在上多頭重目矇鼻塞在下多脚氣脛腫痠疼在內多痞滿瀉痢發黃在外多痿痺肘腫肢痛滯於肺則喘急咳嗽流於腎則腰痛沉重鬱於脾則發黃肢腫流關節則遍體酸痛傷筋骨則痿弱拘攣滯氣則痠腫肉痛傷血如被杖而疼與風寒相合則為瘡為痺與熱相搏則為疽為腫為瘡瘍為自汗為痰火為倦怠為脹滿其變不可勝數正

證治大還

醫學近編 濕證

五

貞白堂

卷之三

三〇六

醫按

丹溪所謂濕熱為病十居八九也

丹溪治一人患濕氣背甚重以茯苓白朮乾姜桂心澤瀉猪苓木通羌活蒼朮服愈

又治一人患濕氣腰似折胯似冰以除濕湯加附子半夏厚朴木香牛膝杜仲酒芍猪苓澤瀉黃柏知母服之愈

治一人素耽於酒患遍身關節腫痛此愈彼劇胸膈不寬此酒濕痰飲在胃流注經絡即流飲症也

用二陳湯加酒芩蒼朮羌活威靈仙澤瀉倍葛根而愈。

除濕湯

治寒濕所傷身體重痛腰脚痠疼大

便澹泄小便或澀或利用此直拆

蒼朮 白朮 厚朴 陳皮 赤茯苓 半夏麴

藿香 甘艸

羌活勝濕湯

東垣

治濕勝遍身腫痛用風藥者以

風能勝濕也

羌活 獨活 防風 藁本 川芎 蔓荊子

證治大還

醫學近編

濕證

木 貞白堂

甘艸 身重沈沈寒濕也加附子防已

除風勝濕湯

東垣

治風濕相搏一身盡痛難以轉

側近則痛劇

羌活 防風 蒼朮 藁本 柴胡 升麻

麻黃白朮湯

仲景

治濕勝身煩熱通體疼痛無汗

用此解散

麻黃 白朮 蒼朮 桂枝 杏仁 薏苡仁

木瓜 甘艸

濕中滲濕湯

和劑

治寒濕所傷身重腰冷如坐水

中。小便或利或澀。大便澹泄。

蒼朮 白朮 乾姜 丁香 茯苓 陳皮

甘艸

清熱滲濕湯

宜底

治濕熱鬱結小便不利不思飲

食不能安臥或嘔吐而渴

黃柏 黃連 山梔 滑石 蒼朮 白朮

茯苓 澤瀉 甘艸

橘皮湯

治濕熱內攻小便不利大便澹泄小腹脹

滿

證治太還

醫學近編

濕證

七 貞白堂

茯苓 猪苓 澤瀉 滑石 白朮 木香

檳榔 橘皮 肉桂 甘艸

木香防已湯

治四肢浮腫沈重按之不起如泥用

此燥濕滲泄

蒼朮 白朮 防已 茯苓 猪苓 澤瀉

厚朴 陳皮 木瓜 木香 姜皮 甘艸

白虎蒼朮湯

宜底

治感冒濕熱之氣發熱汗出兩

脰逆冷冒昧狂言悞認外感汗之致危惟宜此方

石膏

四錢 知母

蒼朮 羌活 一錢 甘艸 各三錢

防已黃芪湯 全匯 治風濕脉浮身重汗出惡風或

痛。

防已 黃芪 白朮 甘草 生姜 大棗 喘

加麻黃 胃氣不和加芍藥 氣上冲加桂枝

下有寒加細辛 濕勝則身重陽微中風則自汗

惡風故用黃芪甘草以實表防已白朮以勝濕也

靈仙飲子 治中濕

威靈仙 桂枝 白芷 稍各四錢 水酒各一盞煎溫服

白朮飲 三因 治遍身中濕疼痛不能轉側着席

證治大還 醫學近編 濕證 八 貞白堂

白朮 一兩 酒二盞煎服

導滯通經湯 治脾濕有餘氣不宣通面目手足注

悶而腫痛

白朮 茯苓 澤瀉 木香 陳皮

滑川散 子和 治濕熱鬱結大便反燥宜此湯攻下

牽牛 二兩 大黃 郁李仁 各一兩 甘遂 五錢

芒硝 二錢 姜湯下五分

瓜蒂散 子和 治濕盛致痰涎留滯膈上肩背重痛

麻痺以此吐之

瓜蒂 為細末搐鼻內吐之

導水丸 儒門 治濕熱內鬱胸膈痞悶或大小便秘

寒

牽牛 二兩 滑石 二兩 大黃 黃芩 各一兩 滴水為丸

除濕丹 河間 治諸濕鬱滯於表裡腰膝重痛足脛

浮腫筋脉緊急便溺不利

牽牛 二兩 陳皮 大戟 炒各五錢 甘遂 威靈仙

檳榔 澤瀉 葶藶 各一兩 乳香 沒藥 各五錢

糊丸梧子大每服六七十九

證治大還 醫學近編 濕證 九 貞白堂

濕氣膏 貼濕氣痛

蒼朮 二兩 艾葉 一兩 水三碗煎一碗入葱汁姜汁

枯礬 白芥子 川烏 各三錢 五倍子 炒焦各五錢

為細末入膏內貼之外以火時時熨之

灸法 用姜汁調黃泥為餅半乾餅上著艾六七枚灸之痛甚則易

遍身走氣痛用木香一兩青木香三錢麻黃一兩

麝香入艸果七錢 心中有冷氣加良姜麝香各

一錢每五錢酒煎服

流注風 用甘草節赤芍歸芷 各一兩 蜈蚣五錢為末酒下一錢

燥證

緊而澀浮而弦花而虛皆燥症也

金雖體燥能令燥者火也原病式云火熱勝則金衰

而風生風能勝濕熱能耗液風熱勝於水濕則陽

實陰虛而成燥症經曰諸澀枯涸乾勁皺揭皆屬

於燥有熱燥風燥然燥症常為兼化者正由熱甚

則金衰而風生故也雖因風熱所成悉本於血虛

津液不足為病蓋陰血虛則不能滋潤百體津液

竭則無以榮養三焦由是熱邪怫鬱而燥變多端

證治大還

醫學近編 濕證 十 貞白堂

或為消渴或為煩滿或便秘或筋攣或咽乾鼻焦

或肌膚皺揭或骨節屈伸不利或皮毛枯燥乾黃

皆由津液衰少氣血不能通暢而然治者必辨虛

實用藥如風熱邪從外入或因七情火自內起

或因醇酒厚味助其火熱或因熱甚金衰風木橫

行此是濕熱怫鬱燥結有脈乃為實也實則宜瀉

滌腸胃開結軟堅疎風順氣如硝黃枳朴羌防秦

朮及潤腸之類如因久病陰虛陽竭年高將息

失宜產後去血過多汗下重亡津液多慾損其真

陰此是血液枯涸燥結無時乃為虛也虛則切禁

蕩滌風燥之藥宜滋陰養血使液生津潤而乾燥

自退也如四物從蓉紅花桃仁生地門冬及益陰

腎氣九地山更山藥茯苓澤歸生地五味之類若因風熱勝濕

善伸數欠筋脈拘急或筋惕而搐或煩滿便秘脉

浮弦數又宜疎風散熱補血生津以辛涼之劑調

之如大秦朮湯清涼潤燥湯之類俱本若因實

熱耗液面赤身熱腸胃脹滿口舌生瘡能食溺赤

時欲飲冷脉沈數有力又宜通幽導滯潤燥清涼

證治大還

醫學近編 濕證 十 貞白堂

如清涼飲子導滯通幽湯之類仲景云津液枯

耗而燥者以辛潤之有物而結者當下之若不究

其源一藥用巴豆牽牛之類下之損其津液則燥

結愈甚有復下復結極則以至引導於下而不能

逆遂成不救者有矣

大秦朮湯

治風熱太甚血耗陰虛不能養筋

筋燥而手足不能屈伸指爪乾燥

秦朮 防風 羌活 細辛 石羔 酒芩

生地 熟地 當歸 川芎 白朮 白芍

茯苓 甘草

潤燥養榮湯 治血虛風燥皮膚皸揭筋脈爪枯

當歸 生地 熟地 白芍 黃芩 秦艽

防風 甘草

清涼潤燥湯 治風燥熱燥血燥皮膚皸揭搔起白

骨

黃芩 黃連 連翹 當歸 生地 白芍

川芎 天麻 防風 羌活 荊芥 細辛

甘草

證治大還

醫學近編 濕證 主 貞白堂

元戎四物湯

治血虛臟燥秘結

當歸 熟地 川芎 芍藥 桃仁

大黃 畏

清涼飲子

治上焦積熱口舌咽喉乾燥

黃芩 黃連 玄參 薄荷 桔梗

當歸 芍藥 甘草

導滯通幽湯 東垣

治下焦燥熱大便燥結

當歸 生地 熟地 桃仁 紅花

大黃 升麻 甘草

臨服時入檳榔末服 一名當歸潤燥湯

麻仁丸

郁李仁 麻仁 各六兩 大黃 二兩 半生半炒

山藥 防風 枳殼 各七錢 炒

檳榔 羌活 木香 各五錢

煉蜜爲丸

證治大還

醫學近編 濕證 主 貞白堂

滋源大補丸

治虛火傷肺肺燥不能生水皮膚皸揭色焦傷腎

腎虛不能生肝筋燥爪枯及精血枯槁燥熱

黃柏 知母 俱鹽酒 地骨皮 酒炒

玄參 天門冬 麥門冬 生地

熟地 當歸 芍藥 枸杞子 茯苓

山茱萸 五味子 山藥 煉蜜爲丸

治冬月手足皸裂

用梳垢塗其皸中自愈

火證

浮大而虛爲虛。洪數實大而沈爲實。各以其部斷之。沈細者難治。火證脈反微細無力。此熱甚氣衰。壯火食氣之意。只宜養陰退陽。不可獨用降火大寒藥。

丹溪云。人具五行。各一其性。惟火也。心爲君火。又有相火。寄乎肝腎二臟之間。經所謂二火也。又有厥陽臟腑之火。根於五志之內。六欲七情。激之其火隨起。如大怒則火起於肝。醉飽則火起於胃。房勞

證治大還

醫學近編 火證 三

頁白堂

則火起於腎。悲哀慟中。則火起於肺。心爲君火。自焚則死矣。所謂五火也。河間云。五志過極。皆爲火也。火起於妄。變化莫測。無時不有。火旺則金燦水虧。惟火獨盛。煎熬真陰。陰虛則病。陰絕則死。凡氣有餘。便是火。從左邊者。肝火也。從臍下起入腹者。陰火也。從脚下起入腹者。虛之極也。凡動皆屬火化。火一妄行。元氣受傷。勢不兩立。偏勝則病。君火猶人火也。相火猶龍火也。君火之氣。經以暑與熱言。相火之氣。經以火言之。蓋表其暴悍酷烈。有甚

證治大還

醫學近編 火證 五

頁白堂

於君火。故曰相火者。元氣之賊也。治法實火可降。涼膈承氣解毒湯之類。虛火可補。四君四物六味丸之類。鬱火可發。升陽散火湯火鬱湯之類。陰虛火動者。補陰則火自降。四物加黃柏知母。益陰降氣丸之類。人火正治。龍火反治。又火盛者。不可遽用寒涼之藥。必須溫散。火急甚者。必緩之。生甘艸兼瀉兼緩。參朮亦可。正內經所謂微者逆之。甚者從之。治寒以熱。涼而行之。治熱以寒。溫而行之。之謂也。壯實氣盛火盛癲狂者。可用正治。硝黃水雪之類。虛火狂盛者。正治立死。以生薑湯與之。經曰逆者正治。從者反治。從少從多。觀其事也。火鬱湯升陽散火湯。升散之劑也。涼膈承氣解毒湯。折制之劑也。地骨皮散。梔子仁湯。陽毒升麻湯。升散折制之劑也。大補丸。六味丸。求屬以衰之劑也。至金丸。從治之劑也。珍珠散。清鎮之劑也。啟玄子云。人火遇艸而焰。得火而燄。可以溫伏。可以水折。龍火得濕而煩。遇水而熾。不知其性。而以水濕折之。適足以光焰諸天。物窮方止。惟從其性。而

以火逐之則燔灼自消焰火撲滅矣

明醫雜著云黃連瀉君火黃柏瀉相火黃芩瀉肺火
芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火知母瀉腎火木通瀉小
腸火條芩瀉大腸火石膏瀉胃火黃柏細辛瀉膀
胱火柴胡黃連瀉胆火醋炒青皮炒黑黃柏瀉冲
火青黛收五臟之鬱火玄參瀉無根之虛火山梔
瀉屈曲之火連翹瀉六經之火此皆苦寒之劑從
其性以瀉有餘之火也若夫飲食勞倦內傷元氣
為陽虛火動之病以甘寒之劑除之如參芪甘州

證治大還

醫學近編

火證

六

貞白堂

之屬若陰微陽強相火熾盛以乘陰位為血虛火
動之病以甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心
火亢極鬱熱內實為陽強之病以鹽冷之劑折之
如大黃芒硝之屬若腎經受傷真陰失守無根之
火為陰虛之病以壯水之劑制之如生地玄參之
屬若胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土為火鬱之
病以升散之劑發之如升麻葛根之屬此皆隨其
陰陽虛實以調治之也不明諸此難免實實虛虛
之禍

原病式云諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋便澀腹脹
大鼓之有聲癰疽瘡癰瘤氣結核霍亂脅鬱腫脹
鼻衄衄血血溢血泄淋閉身熱惡寒戰慄驚惑悲
笑譫妄血衄血汚皆少陰君火之火真心小腸之
氣所為也

諸病脊疼暴病暴死暴瘡暴昧躁擾狂越罵詈驚駭
氣逆冲上禁慄如喪神守噤嘔瘡斑喉閉耳鳴暴
聾嘔而噎氣不下暴注癰瘕跗腫痠疼皆少陽相
火之火心包絡三焦之氣所為也

證治大還

醫學近編

火證

七

貞白堂

醫按

薛立齋治一人熱起足心身如芒刺尺脉洪大餘脉
虛浮此因腎經虧損火不歸源也當壯水之主以
鎮陽光用補中益氣湯六味地黃丸料服之愈

陳三農治一人熱從脚起入腹觀其形體壯實作濕
鬱成熱之候治之以潛行散加牛膝防己丸服之
而愈

一士人素好滋補之劑久之致口舌乾燥腦後作痛
神思不爽飲食減少食肉則泄六脉實大予作實

火治以知柏連梔赤芍甘艸一劑而胸次爽豁痛
渴俱止再劑飲食倍加精神頓長諸症悉愈書此
以爲無病好補之戒

治一婦積勞病兩足如火燒即惡寒壯熱頭疼眩運
齒痛齒浮安臥片時少減日二三發此因氣血俱
虛虛火妄動所致以十全大補湯加五味子四劑
愈

黃芩湯 源流 瀉肺火

片芩 梔子 桑皮 桔梗 芍藥 麥門冬

證治大還 醫學近編 火證 卷之三 貞白堂

連翹 薄荷 地骨皮 甘艸 大便秘結加杏

仁大黃名瀉肺湯

黃連湯 源流 瀉心火

黃連 生地 犀角 木通 常歸 麥門冬

芍藥 薄荷 甘艸 燈心

柴胡湯 源流 瀉肝火

柴胡 芍藥 川芎 常歸 連翹 膽艸

梔子 青皮 甘艸

芍藥湯 源流 瀉脾火

芍藥 生地 梔子 石膏 黃連 甘艸

黃柏 知母 生地 玄參 丹皮 常歸

芍藥 甘艸

火鬱湯 東垣 治四肢煩熱五心伏熱或熱伏土中

或過食冷物抑遏陽氣或陰覆其陽火不得伸酒
酒惡寒志意不舒其脈弦數

羌活 葛根 升麻 各一錢 防風 五分 柴胡 六分

人參 一錢 芍藥 一錢 葱白 甘艸 四分 加獨活

證治大還 醫學近編 火證 卷之三 貞白堂

即升陽散火湯

涼膈散 河間 退六經火治上焦積熱煩躁多渴面

赤頭昏咽喉腫痛口瘡

連翹 梔子 黃芩 薄荷 桔梗 竹葉

甘艸 大黃 芒硝

加黃連名清心湯加川芎甘菊防風荆芥石膏滑

石當歸芍藥治風熱上壅頭目不清口舌生瘡之
神藥也

黃連解毒湯 余公 治三焦實火內外俱熱煩渴便

赤口舌生瘡狂躁煩心熱極之甚。

黃連 黃芩 黃柏 梔子 去梔子加大黃水

滴為丸名金花丸治寢汗咬牙睡語驚悸溺血淋
瀉欬血衄血中外俱熱加玄參知母石膏甘艸名

三黃石膏湯。

珍珠散 治積熱上攻心胸煩悶口乾舌燥精神恍
惚悶亂坐臥不安。

琥珀 珍珠 天花粉 鉄粉 硃砂 寒水石

牙硝 大黃 甘艸 竹葉湯下一錢

證治大還

醫學近編 火證 辛 貞白堂

麥門冬散 治蘊積邪熱心胸煩悶咽乾口燥坐臥
不安犬小便不利。

麥門冬 犀角 小草 黃連 升麻 黃芩

枳殼 大青 芒硝 甘艸

紫雪 治內外煩熱口舌生瘡煩狂妄語小兒驚風

黃芩 寒水石 磁石 石膏 滑石 水煎一日煮數次

甘草 木香 犀角 羚羊角 沉香 丁香

升麻 玄參 水煎一日煮數次二汁合收入硝石

朴硝 以砂拌攪厚入硃砂 射干 全白朮水 每服二錢水

癲狂癰門 此三症大旨已于醫旨緒
餘中詳言之矣當參看。

瑣溪曰靈樞云癲癰瘕癰不知所苦兩蹠之下男陽

女陰後人以癲癰為一門者迹此也又曰暴癰癰眩足不任身取

天柱後人言風癰者迹此也

明癲症

書云多喜為癲多怒為狂難經謂重陰者癲重陽者
狂

素問厥論篇曰陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得
臥面赤而熱妄見而妄言長刺節論篇曰病之初

證治大還

醫學近編 癲狂癰 一 貞白堂

也歲一發不治月一發不治月四五發名曰癲病
又通評虛實論篇曰癲疾厥狂久逆之所生也脉
搏大滑久自已小堅急死不治虛可治實則死

靈樞癲狂篇曰癲疾始生先不樂頭重痛視舉目赤

甚則極已而煩心啼呼喘悸先反僵因而脊痛又

有骨癰筋癰脉癰嘔多沫沫氣下泄者不治又曰

癲疾者疾發如狂者死不治據此言疾發如狂者死不治可見癲疾非

一病也

玉機微義曰按內經言癲而不言癰古方以癲癰或

併言。或言風癲。或言風癲。或言癲狂。所指不一。蓋癲病歸于五臟。癲病屬之于心。故今以風癲另立一門。而癲狂合為一門也。

辰砂散 治風痰諸癲狂言妄走精神恍惚思慮迷亂乍歌乍笑飲食失常痰發仆地吐沫戴目魂魄不守醫藥無驗。

辰砂 光明有墻壁者一兩 酸棗仁 微炒半兩 乳香 半兩 各為末。右量

患人能飲酒幾何。先令恣飲。但勿令吐。至靜室中以前藥都作一帖。溫酒調下。作一盞調之。令頓飲。

證治大還

醫學近編 癲癇 卷之三 貞白堂

如飲酒素少者。但隨量取醉。服藥訖。便安置床枕。令臥。病淺者半日至一日。病深者二三日。令家人伺之。鼻息勻調。但勿喚覺。亦不可驚觸。使覺。須待其自醒。則神魄定矣。萬一驚寤。不可復治。正肅吳公少時心病。服此二劑。五日方癒。遂瘥。

濟世方 治失心

鬱金 七兩須四川 明礬 二兩為末 薄荷為丸。桐子大。每六十丸。湯水任下。昔有婦人癲狂。數年不愈。後遇至人授此方。初服覺心中有物脫去。神洒然。再

服頓愈。至人云。此疾憂驚得之。痰聚心竅。此藥能去鬱疾。

明狂症

靈樞癲狂篇曰。狂之始生也。先自悲也。喜忘善怒。善恐得之憂。饑及狂之發。少臥不饑。自高賢也。自辨習也。自貴倨也。善罵詈。日夜不休。狂言驚善笑。好歌樂。妄行不休者。得之大恐。目妄見耳妄聞。善呼多食。善見鬼神。善笑而不發于外者。得之有所大喜。

證治大還

醫學近編 癲癇 卷之三 貞白堂

林億公曰。狂為痰火盛實。癲為心血不足。狂病宜大吐。

陳三農曰。據此言。心血不足者。乃醫治攻剋太過。以致中氣餒弱。而神志不定。非癲癇一起。初便有此不足症也。

丹溪曰。神不守舍。狂言妄作。經年不愈。如心經蓄熱。當清心除熱。如痰逆心竅。當去痰寧心。大率多因痰結于心胸間。治當鎮心神。開痰結。亦有中邪而成此疾者。大概是熱。又曰。狂病宜大吐。下則除之。

素問云陽厥強怒飲以鐵落狂怒出于肝肝屬木鐵落命也以金制木之意

予曾用數次果效考本草能治鬼打鬼注安心神治驚邪主癲癇鎮心熱狂走除胸膈中熱氣痰瀉

王海藏治許氏病陽厥狂怒罵詈親疎或哭或歌六

脈舉按無力身表如冰石發則叫呼聲高內經云

奪其食即已因不與之食乃以大承氣湯下之得

臟腑積穢數升狂稍寧數日復發下如此五七次

行大便數斗疾瘥身溫脈生良愈此內經奪食法

也

保命當歸承氣湯

證治大還

醫學近編 癲狂癇 卷之三 四 貞白堂

當歸 大黃各一兩 芒硝七錢 甘草五錢

右每二兩水一大碗薑五片棗十枚煎至一半溫

服若陽狂奔走罵詈不知親疎此陽有餘陰不足

大黃芒硝去胃中實熱當歸補血益陰甘草緩中

加薑棗者胃屬土此引入胃也經所謂微者逆之

甚者從之此之謂也以大利為度微緩以瓜蒂散

入防風末藜蘆末吐之其病立安後用調心散施

心散涼膈散解毒湯等調之安

明癇症

貞子曰癲痰火所致前人有稱為風癲者劉河間謂
由熱甚而風燥為其兼化涎溢胸而痰痰昏胃傷
仆也

東垣曰病癲者涎沫出于口冷汗出于身清涕出于

鼻皆陽踰陰踰督衝四脈之邪上行腎不任煎熬

沸騰上行為之也此奇邪為病不係五行陰陽十

二經所拘當從督衝二蹻四穴奇邪之法治之

綱目曰癲癇即頭眩痰在膈間則眩微不仆痰溢膈

上則眩甚仆地而不知人名之曰癲癇徐嗣伯云

證治大還

醫學近編 癲狂癇 卷之三 五 貞白堂

大人曰癲小兒曰癇其實一疾也然與中風中寒

中暑尸厥等仆倒不同凡癲癇仆時口中作聲將

省時吐涎沫省後又復發時止時作而不休息中

風中寒中暑尸厥之類則仆時無聲省時無涎沫

後不復發間有發者亦非如癲癇常發狀也

丹溪曰癲屬驚與痰不必分五等大率行痰為主黃

連黃芩瓜蒌半夏南星隨痰火多少治之無有不

愈有熱以涼藥清其心此症必用吐吐後用

平肝之藥青代柴胡川芎之類

素問大奇論篇云。心脉滿。癰瘕筋攣。肝脉小急。癰

瘕筋攣。

治癰之劑

始治多用攻痰法。繼以養心壯神補劑收功。

礬丹丸

治五癰五癰。無拘陰陽冷熱。

礬丹

晉礬

各一兩

用磚鑿一窠。可容二兩許。先

安丹在下。次安礬在上。以炭五斤。煨令炭盡。取出

研細。以不經水猪心血爲丸。如菉豆大。每服十九

至二十九。橘皮湯下。

元戎二白丸

治癰與癰

證治大還

醫學近編 癰狂癰 卷之三

六

貞白堂

白礬一兩。以濕麵包。蒸熟去麵。入輕粉三五分量。

虛實加減。丸如桐子大。每服二十九。生薑湯下。

小兒丸小些。

鷓鴣頭丸

皂角

五條 酥炙

鷓鴣頭

一枚 燒存性

礬丹

五錢 研細

共末糯米糊

爲丸。菉豆大。每服十五丸。加至二十九。米飲下。

神應丸

治風癰。久服其痰隨糞而下。

生明礬

一兩 兩

鵝茶

五錢

共末蜜丸。桐子大。每服三十

九。鵝茶下。

茯苓丸 常服治心疾良驗。

人參 石菖蒲 遠志 茯神 茯苓 辰砂

南星 半夏 麝香 真鐵粉

右末薑汁打糊丸。桐子大。另用辰砂爲衣。每服十

九。加至三十九。夜臥薑湯下。

養心湯 治心虛血少。驚惕癰癥。

黃芪 茯苓 茯神 半夏 川歸 川芎

酸棗仁 柏子仁 五味子 人參 遠志

桂心 甘草 加薑棗水煎服。加赤茯苓

證治大還

醫學近編 癰狂癰 卷之三

七

貞白堂

橫櫛治停水怔忡。

慈珠丸 治心恙及邪祟。

猪心血 硃砂 乾青龍花 先將猪心血同

龍花研勻。入硃砂末。和丸。桐子大。每二十九。茶酒

任下。甚者不過三服。

治癰癰經驗方 一宗四方 先服此一劑伐邪。

竹茹 半夏 枳實 橘紅 甘草 山梔

炒黑 玄明粉 燈草 加薑棗水煎服

第二次服。方可服三劑。又服前方一劑。又再服此方。

三劑

人參一錢半 黃芪五錢 歸身一百二錢 酸棗仁生三錢

酸棗仁熟四分 貝母 小阜各一錢 麥門冬五分 白芍藥

吳茱萸炒過八分 甘草稍三分 茯神 酒紅花各二分 薑三片

棗二枚水煎服。

第三方。服前二方半月。覺神氣稍完。繼服此藥。

紫河車一具洗淨。砂鍋煮爛。入鹽少許。與服後半

月。勿服藥。覺又服前方一劑。第二方三劑。又再服

下項丸藥。仍將前藥間服。

證治大還

醫學近編 癲狂病 八 頁白堂 卷之三

九藥方

牛膽南星八錢 真牛黃四錢 辰砂三錢 真麝香三分 甘草

膏為丸 芡實大 金箔為衣 薄荷湯下五丸。

清神湯 治痰迷包絡心熱癲癇。

茯神 黃連各二錢 酸棗仁炒 石菖蒲 柏子仁肉

遠志各一錢 甘草五分 水煎服 痰甚者加南星半夏

橘紅瓜葉竹瀝薑汁

治狂之劑

瀉心湯 治心受熱積滯諸症。吐瀉上屋。

大黃 黃芩 黃連 每四錢水煎服。瀉數行。然

後用安神藥調理。

苦參丸 治狂發無時。披髮大叫殺人。不避水火。

苦參為末。蜜丸。梧子大。每服十五丸。薄荷湯下。

調胃承氣湯 治狂 方在火熱門。

抱胆丸 治癲狂不定。非輕劑所能愈者。

水銀二兩 黑鉛一兩 辰砂 乳香各一兩

右將鉛入銚內熔化。離火畧冷。入水銀攪硬。研碎

入辰砂乳香。乘熱用柳木搗。搗勻。丸如芡實大。每

證治大還 醫學近編 癲狂病 九 頁白堂 卷之三

服一丸。燈心湯下。病者得睡。切莫驚動。覺來即安。

再進一丸。又方以猪心血為丸。井水吞下。用治

狂言妄語。

牛黃瀉心湯 治心經邪熱。狂言妄語。心神不安。

牛黃一錢 水片 硃砂各一錢 大黃生一兩

右末。每服三錢。生薑蜜水調下。

婦人熱入血室。發狂不認人。以保命集牛黃膏炒。

牛黃二錢 硃砂 鬱金 丹皮各三錢 甘草一錢

水片一錢 右末。煉蜜丸。棗子大。新汲水化下。

本事方寧志膏 治狂不睡

人參 酸棗仁 各一兩 辰砂 五錢 乳香 二錢

右末煉蜜九彈子大每丸一丸薄荷湯化下 予族

弟緣兵火失心與此方服二十九丸良愈親舊多傳

去服之皆驗

治癰之劑

碧霞丹 治五種癰疾時作摘掣痰涎壅塞牙關緊

急心神迷悶目睛上視

石礪 研九度 附子尖 七枚 烏頭尖 七枚 蝎梢 七枚 共末

證治大還 醫學近編 癰疽編 十 貞白堂

麵糊丸 芡實大每用薄荷湯化下一丸更以酒半

合溫服之須臾吐出痰涎然後隨症治之口噤者

幹開灌之

仲景風引湯 除熱治癰癰又治大人風引少小驚

癰瘰癧日數十發醫所不療又治腳風

大黃 龍骨 乾薑 各四兩 桂枝 三兩 甘草 二兩 牡蠣

二寒水石 赤石脂 白石脂 滑石 石膏

紫石英 各六兩 右粗末以韋囊盛之取三指撮井花

水三升煮三沸溫服一升 治風熱癰瘰食後量多少呷之無不効不用湯

犀角丸 治風癰癰發作有時揚手擲足口吐痰涎

不省人事暗倒屈伸

犀角末 五錢 赤石脂 三兩 朴硝 二兩 白僵蚕 一兩 薄荷葉 一兩

右末麵糊丸桐子大每服二十九至三十九溫水

下日三服不拘時如覺痰多即減數丸忌油膩傳

灸

丹溪金凡丸 治諸癰

明礬 鬱金 防風 牙皂角 各一兩 川芎 二兩 蜈蚣

一條 右末蒸餅糊丸梧子大空心茶下十五丸 日除根

證治大還 醫學近編 癰疽編 十 貞白堂

錢氏五色丸 治五癰

辰砂 五錢 水銀 二錢 雄黃 飛 珍珠 一兩 鉛 三兩 同水

右末蜜丸麻子大每四五丸金銀薄荷湯下

三因六珍丹 治風癰失性顛倒欲死或作五畜等

聲掣縱吐沫久而方甦

丹砂 五錢 水銀 一兩 鉛 二兩 雄黃 一兩 雌黃 一兩

珍珠 一兩 右細末煉蜜丸梧子大每服三五丸薑棗

湯下此藥須要搗二三萬杵不然難丸

本事人參散 治諸癰并慢脾風神昏痰盛

人參五錢 南星一兩切片以生薑汁餅藥水浸發過性晒乾為末

右每服一錢薑三片加冬瓜仁少許水煎服

蛇黃丹 治諸癰及小兒急驚風

蛇黃四錢 白附子一錢 南星各五錢

辰砂五錢 麝香五錢 右末糯米糊丸桐子大每服

量大小或一二九或三五九溫酒米湯任下

補胃燥痰丸 治陰癰服涼藥太過損傷脾胃

白朮錢 蒼朮 陳皮 半夏 南星 茯苓各半錢

木香錢 藿香錢 甘草分七 甚者加附子五分薑五片

證治大還 醫學近編 癰疽類 卷之三 貞白堂

水煎服

蜜陀僧 治暗風癰癰以開痰迷心竅

蜜陀僧成塊者纏以鉄線又用鉄線挂火中服紅

用酒醋一升淬盡出火毒為極細末每服一錢麝

香調下

跋

予之適閩者再又遍歷滇黔兩粵之間多崇巖峻嶺大澤洪波而苦於烟瘴之氣所謂崇山瘴癘不堪聞也蓋因位主離方無肅殺之氣發洩恒多而收藏恒少以故鬱蒸成瘴在人不可見而陰受其毒有不可勝言者又曾從總制石大司馬巡邊道經高雷廉瓊及粵西柳太交界處見輿人負擔之夫中其毒者頃刻仆地呻吟困苦之狀幾不能生余偶以所攜玉樞丹服之即愈後僅止一丹而救活者數人是豈玉樞之神妙若是乎蓋其藥皆消瘴之味也故屢試屢驗

證治大還 癰疽編跋 一 貞白堂

每思其地患瘴而天札者不少烏得良法以盡起之猥以風塵鹿鹿有志未遑吾里山農陳子以奇術走四方濟人為念其初建育嬰堂于姑蘇活人數千今復舉於羊城未幾而百計矣自此生生不窮曷克有既見其搜羅諸書編輯大還全部中著瘴癘一條治法用藥鑿鑿切近自古及今發前人所未發不覺躍然自喜深有合于余之所目擊而欲救之者亦即余之所欲立法而未能者也因想古昔鑄鼎象物可使知神奸不達不吝是編出而人不罹于瘴癘以隕越者其功不亦偉歟

同里弟朱 綱拜題

兩粵瘴癘論

人有剛實虛柔之不同。地有南炎北朔之迥別。北方地土敦厚。飲食膏粱。肥膩濃郁。肌膚腠密。精血強壯。染病不易。南方卑濕。人民柔弱。飲食甘鮮。精神淡薄。肌膚腠脆。感染易入。治法各種。已詳諸證。治近及傷寒。近二編矣。茲不冗載。惟是兩粵及閩。瘴癘一疾。初則猝然感冒。解散即安。其由漸而來。乘虛而入。調養失宜。積久而變者。內傷恒多。感冒恒少。非親履其地。未患其病。未治其原。所可臆見而

證治大還

醫學近編 瘴癘

一 貞白堂

立論者也。余曩時游於閩中。其地有江。即仙霞嶺。障於北。瀕海。炎威烈日之麗於南。每當夏秋之交。晴雨不時。濕熱用事。山嵐瘴氣。蒸然蘊隆。人感之者。初則氣滯腹脹。繼而頭暈壯熱。惡風嘔吐。痰涎。余治之。皆用節菴法。按六經而解散。亦皆瘴疔。其不現六經證。而瘴氣之疾。有似霍亂。脹悶頭疼。寒熱者。用平胃九味羌活湯。敗毒正氣諸方治之。隨手而應矣。茲來粵地。見有庾嶺丹霞。從然高峙。倍於閩中。屏蔽其西北。高爽之氣。凝集其中。南炎

燥之威。陽氣鬱蓄。無從發洩。加之以崇山峻嶺。萬

丈巍峩。當其長夏暑氣之時。蠻烟毒霧。蘊結上蒸。

令人喘急眩暈。脹悶痰升。竅閉不舒。四肢酸楚。或

寒熱間作。或有汗如雨。或腹痛神昏。苟不亟為調

治。變端百出。有莫可言其名狀者。時以前法治活

多人。雖索藥紛集。再四回思。炎陬蘊熱成疾。靡不

因北方山高嶺峻。屏障天地之氣。否塞不舒。血肉

之體。夫是乃病。猶之夏令全居其室。無北牖者。人

多病熱。苟得疏通其氣。必然患害弭消。故一交秋

證治大還

醫學近編 瘴癘

二 貞白堂

令涼颼颼然。氣爽神清。可以悟矣。雖然。此僅可論其致病之理。而治病之道。未易言也。初得山嵐瘴氣。氣升脹悶。人多用檳榔降墮其氣。偶爾無恙。感之輕者。亦即相安。感之重者。胸腹脹悶。頭暈惡心。惡寒發熱。其瘴氣不消。而飲食停滯。須以正氣散平胃散。霍香陳皮蒼朮厚朴半夏蘇葉檳榔加所傷之物之藥。各種消導。如頭疼惡風發熱。用九味湯。太陽經加羌活川芎。陽明經加白芷乾葛。少陽經加柴胡。夏暑盛而熱甚。口渴汗多。加石膏白虎

湯大便結發狂譫語用大黃枳實承氣湯當考傷寒近後集條治至於變症殊途錯綜不一近於濕熱從濕熱治近於溫症者當從瘴瘧治尤為所重者須先分內傷外感就急就緩內外已定緩急已明再審虛實虛實既明方可用補瀉發表和解之法以冀得心應手不致悞人也

諸瘴見聞錄

瘴者障也天地自然之氣為崇山峻嶺障蔽不舒而然也再加以春夏之交萬物發生之際垂足鬱

證治大還

醫學近編 瘴癘 三 貞白堂

邊人多染患是以道路行役者恒多而安閒居室者恒少也閩之仙霞粵之庾嶺陽關於陰陽瘴已詳載矣或曰粵西之北無峻險阻絕而患瘴尤多何耶曰誠哉予之問不可少也粵西近高雷廉者粵東之餘氣證亦相似其慶遠柳州太平近於交趾諸郡千山萬壑屏障於南反阻塞其陽威之氣為山之陰陰閉於陽陰障亦令人病故染患多陰陰濕蘊毒所以陰為重而陽為輕也予不見粵西冬令天冷獨有冰雪陰濕冷冽偏多瘴癘等一

證而東西兩粵迥別治之者當參悟焉

尋常瘴

春夏之交乍寒乍熱其氣忽然蒼鬱忽然發洩更衣不時感冒不一本地人患者不知醫者無書可考客寓者每曰此水土不服亦不過發表消導而已治之有不愈而變重者則曰此亦委之以致而已其症似風寒頭痛寒熱而又惡心脹悶似痢非痢似瘧非瘧者是也與羌活湯加減平胃散蒼香正氣散二陳湯而安此證粵中無時無之無人覺之虛弱之體感而即發敦厚之人感不驟發積久而感渾渾漠漠脉症茫然未嘗不欲細心極慮救人於患難中惜不能考其致病之由爾余今拈出此條以俟後世高賢明理之士補其治病求原一編則兩粵無患瘴之憂矣

暑濕瘴

閩粵皆有之夏秋之時久雨陰濕忽然暑熱山嵐之氣自下蒸上人在氣交之中有一種脹悶不可當之勢此即瘴癘時也人能知覺者即以玉樞丹水

證治大還

醫學近編 瘴癘 四 貞白堂

磨服之立解。平胃散加檳榔亦佳。時有制幕朱彥則徐彭年從制臺巡邊帶玉樞丹救活軍士役人甚多。故仁者恒以濟活。

毒水瘴

粵西與雲貴接壤處有水能毒人。其山產五金皆有毒。況產五色信石者乎。山塢熬信水流下溪。人不知誤吞。則腹脹絞腸而不救矣。此余於粵東曾治甚師周西侯之弟亦類是也。初感而輕用玉樞丹紫金錠行軍散平胃正氣散亦有得生者。

證治大還

醫學近編 瘴癘 五 貞白堂
卷之三

黃茅瘴

三四月草深偃俯。久雨濕爛。而時令蒸鬱。其性上炎。一種鬱勃之氣入虛人口鼻。即患瘴悶。輕者用平胃散香正氣散。重者蘇合丸七香丸諸葛行軍散而即愈。廣東高雷廉及廣西左右兩江皆有之。

孔雀瘴

五六月雨水泛溢。有孔雀處。其屎積於木葉草間。隨澗水流下。人誤吞之。於炊爨間必患腹脹而痛。悶輕者正氣平胃散調玉樞丹而愈。重者行軍散

七香散紫金錠可治之。最重者非藥可解。此廣西慶遠思恩太平近交趾處居多。鎮遠泗城州柳州亦有之。

桂花瘴

全州桂林梧州平樂皆有之。八九月間香氣如桂。此瘴最急。觸人口鼻即倒仆。此為中瘴。必須同行及作善者。就其鼻傍掘一穴。通地氣。亦有得生。但腹痛飽脹頭暈惡心。重者立危。輕者平胃正氣散下玉樞丹而活。有善避者。見有黑氣如霧。其香必至。

證治大還

醫學近編 瘴癘 六 貞白堂
卷之三

即刺一地穴。以身俯地上。口鼻向土潭穴中。勿使香氣入穴。即解矣。其氣不及一餉即散。故此地人枵腹行路。必用大蒜燒酒亦避之之意。或先以行軍散搗鼻更妙。按思恩思恩太平鎮遠諸處近雲南交趾有糯米飴香。即病而絕。俗名江水瘴亦可類治。

蚯蚓瘴

三三四月泥水汎爛。人犯之。腹脹疼楚。如蚯蚓狀。青筋蟠現於肚腹。與起痕高。輕則以蒜搗汁。及土

漿敷腹亦用玉樞丹紫金錠薑汁灌入次進蘇合七香以通之此廣西慶遠柳州太平皆有粵東間有之。

蚺蛇瘴

廣西太平慶遠柳州思明南寧皆有之三四五六七月蚺蛇交媾穢濁之氣順水流下人或犯之則患其毒口鼻有腥氣胸腹脹痛異常輕則紫金錠玉樞丹行軍散蘇合丸用之亦有得生重者一二日亦死。

瘴治大還

醫學近編

瘴

七

貞白堂

瘴脉

初感洪數虛者大而扎實者弦而滑久則變遷數滑實者飲食停滯弦滑數者痰食兼凝浮數無力為虛邪弦數無力為痰飲。

瘴病治驗考

制府王姓感冒瘴氣寒熱胸膈飽悶頭疼眩暈惡心脉數而洪用藿香正氣散加厚朴檳榔羌活防風蘇葉一劑而寒熱退頭不疼減去羌蘇防風加草豆蔻半夏枳殼惡心脹悶皆愈。

梧州方姓脉弦而數頭疼身痛惡心飽悶發熱用羌活防風川芎蘇葉藿香陳皮蒼朮厚朴半夏甘草檳榔二服而減因飽脹未全退加草豆蔻草果方愈此頭疼惡心飽脹所以異於感冒乃瘴氣也。

端州李別駕鑲藍旗人年四十餘能騎射署雷州府時善搏虎不避風雨寒暑涉溪陟嶺染瘴已深其所感風寒暑濕不一而足矣且久客半載甫歸本署未暇休息閱二日遂往省謝謁上臺可謂勞於公事忘於已躬其如積邪所感猝然皆發醫者紛

瘴治大還

醫學近編

瘴

八

貞白堂

脊據云畧為解散已進補劑而邪氣大作寒熱神昏謔語脉空數無根神氣散亂補瀉兼施而議論紛然矣矧予往視診脉已如水上莢刻刻欲脫寒熱間作蓋受病既深精氣兩虛邪氣正熾難以措手擬用五積散加附子人參去麻黃而易羌活已言明不治之症不忍坐視勉盡愚誠之意矧予立方有難色不欲下藥之語遂置之不用越一宿復拉往視脉症殆甚因見案頭余藥尚存遂堅辭而出後聞以陰瘧陽虛而用金匱腎氣湯加參者有

以爲虛症似瘥常用補中湯而倍加參附者三劑而神昏氣喘虛汗如雨足冷而脫矣不知此症初實受瘴氣屢感屢深今則乘虛而發有云傷寒偏死腎虛人况瘴氣而風寒暑濕備感者乎

總制石公子年甫十齡丁丑六月患感冒風暑寒熱頭疼幼科已用葛根加羌防解表矣後復寒熱不減氣喘腹脹醫者用消導加小柴胡湯不應神昏喘急寒熱間作時或泄瀉似痢腹痛不知名爲何疾也時招余往見已遷延二十餘日矣脈數無力

證治大還

醫學近編 卷之三

瘴癘

九

貞白堂

神氣昏亂舉家驚惶按其腹時痛時脹觀其神時靜時躁手足或冷或熱虛汗不已此外邪初感者爲藥而解久積者未會清理加之以飲食失調元氣欲脫故虛象顯露細思外邪內陷變病之證元氣已虧兩因之症本元虧者救本爲急且扶住元神再籌治病之策因用理中湯加桂附腹痛稍緩洩瀉頓減手足亦煖然發熱不退小便赤濁不利因用金匱腎氣湯二服小便方利寒熱愈加此元氣漸回病證乍現風寒暑濕食積種種不清若欲

返本還元正爾變症不一仍朝用六君子湯加柴胡乾葛神麴乾薑夜用六味湯加參桂旬日後寒冷拘攣眼目翻白咬牙呻吟舉家驚恐慟哭以爲無救矣余力言於制臺曰此名寒戰正氣將回積邪欲出從此一變反有復生之機自未至酉皆以余言爲謬未幾而大汗如雨手足軟怠不語熟睡人情雖少定而錯愕未安也天明方能言語然虛症日變潮熱汗多則用補中湯合建中加附子不能安寢則用歸脾湯元氣弱則用十全大補湯腹痛滑瀉則用理中六君湯如是調攝三閱月方得

證治大還

醫學近編 卷之三

瘴癘

十

貞白堂

返本還元而奏功也

按此症與江浙楚豫北方各省所患外感內傷迥異總之瘴氣爲得病之根變症便爾不同醫家治之當別具手眼靜心揣摩參以各論庶幾有得

正紅旗孫兄粵東轉運使高公令親也高札云舍親孫某患不起之疾非某不治亦作善之一端時因余創育嬰局於廣省故云然也往診其脉空豁恍惚不定重按無根神昏譫語寒熱大作加之咳嗽痰喘轉側不能晝夜惟有倚靠伏几呻吟而已且

胸膈飽悶足冷惡寒詢知夏秋積勞暑者受一
月以前初感頭疼身痛憎寒惡熱咳嗽為苦醫者
不一遂用桔梗杏仁乾葛羌蘇汗而不解復用桑
皮前胡蘇子半夏貝母知母黃芩亦不應矣因寒
熱更甚有用小柴胡加梔子元參薄荷認為熱症
清痰退熱而咳嗽更甚不知此症夏秋暑濕風寒
兼感而發尚未得汗何能解散遂用五積散二劑
而得汗如淋咳嗽亦減可以伏枕惟寒熱未退積
久病深元氣已虧氣上喘小便如油短數其火從
證治大還 醫學近編 瘴癘 廿 貞白堂
下而上上盛下虛腎氣虛憊因用金匱腎氣加沈
香二服而氣平便順然潮熱如故時有囈語人亦
忘識乃知精神耗散不攝亟宜大補因午後用參
附六君湯朝與腎氣丸次序並進經月飲食方思
囈語亦退虛汗亦止神氣始安方識平日交往之
人凡用人參附子共勛許精神稍復然面目黎赤
肌血不華服還少丹加河車桂附鹿膠又月計十
全大補湯二十餘日元氣日長而飲食如常矣此
與李別駕等一病形脈雖少異一以信藥而生一

以不信藥而殞噫藥可不信手醫可漫然乎
戊寅十一月高燧使公子患似痢非痢紅多白少身
惡寒微熱脈滑而數詢知自夏秋以來由川北隨
任之粵久積暑濕感冒而發用平胃加羌防紫蘇
藿香一劑而寒熱退再劑加檳榔木香而瘳或曰
痢疾所忌燥藥今用蒼朮而症愈何也曰常人痢
疾因暑令火熱之氣而得燥藥乃天時之忌是以
不可擅用今以積濕之病發於隆冬外感乃得力
治病之藥也所謂治病而搜其原者片七可瘳故
證治大還 醫學近編 瘴癘 廿 貞白堂
醫無執方病無執藥云
梁溪基師周西侯之弟開銅山於英德其山下有水
人浣其衣則膩垢皆去皆以為奇蓮之物也以其
近便炊爨皆用之未幾人皆黃胖身軟腹脹而無
力飲食倍進寒熱間作善噉雞豕諸肉則胃腹稍
安在厥同事斃者不一因來省會求救於予用平
胃正氣治其病後以益氣六君補其受毒水剋削
之愆而安此即粵西太平柳州南寧毒水瘴之一
斑也

一時聞山同病而返省數人有似瘧非瘧如驛官之
戚陳某者醫以瘧視不及月餘而疾篤因勢急方
問疾於予脉已細緊而數飲食不進余曰若欲治
之何不於一月以前雖病篤而元氣尚在今病已
深精神殆盡矣雖有婆心無藥可施奈之何哉

閱一載驛官復有甥陳姓亦以開山病歸皆犯毒
水所得似痢非痢寒熱間作醫以香連朴硝大黃
行藥消導日劇危瀕因易一醫曰可以進補乃用

證治大還

醫學近編

瘧痢、主

貞白堂

三

白朮五分陳皮二分茯苓四分病雖不甚勢亦不
減復問於予強曰飲食尚可料不致有大變余視
其脉恍然不定重按已絕人將謝世而飲食猶能
此所謂行死之疾邪火浮載真精告竭矣辭之閱
二日而逝以上毒水瘧三則
兼似瘧似痢症

新安程聖林之長郎年十六精血充足飲食倍進丁

丑春從父到廣州者年餘患似痢非痢足腫便赤
此受暑濕瘴熱之病半年前曾視其脉數逾六至
每言之於其父叔云此有積疾非壽徵也即欲急
治已屬難能人皆以余言為謬未幾而發此疾醫

者無所不極其至寒如大黃黃連朴硝黃芩黃柏
消導如枳實厚朴檳榔山查草寇補者如參芪人
珍燕者如燕附薑朮寒熱溫涼備進尅伐補益兼
投時余適奉制府之招留滯端州兩月歸時往視
已不堪問矣嗚呼頭痛救頭脚痛救脚蓋以此為
鑒諸

瘧分陰陽水火五行而治論

證治大還

醫學近編

瘧痢、主

貞白堂

三

人生火嘗有餘水嘗不足陰虛則陽亢陽虛則陰寒
此夫人而知之也腎陰虛損六味湯滋陰丸壯水
補腎丸使腎陰足則火自平謂之冰升火降是即
無陰者陽不能以自化之道也其真陽虛者十全
大補丸八味理中回陽救急參附之類使陽不衰
德陰不虛寒真陽回而腎陰生是即無陽者陰不
能以獨生之道也此亦夫人而知之寒症用熱藥
熱症用寒劑頭痛救頭脚痛救脚之謂也此即舉
業之正而題易得而側取為難性理道學為尤難
猶之醫道之內真寒外假熱外有餘而內不足內
實而外閉內真熱而外假寒陽症似陰陰症似陽

此中精微深奧之道。差之毫釐。謬於千里。非細心力仁之士。烏能知之乎。蓋瘧患雖從山川地氣。隨時令而得。然必乘人本虛。方乃受病。其陽虛火衰者。一時受瘧。因輕而不覺。瘧症變為本病。必虛寒而腹脹滿。大便泄瀉。惡寒手足冷者是也。陰虛火旺者。瘧輕而不覺。瘧後現為本病。必頭暈口渴。發熱腹脹。惡心便赤者是也。其餘五臟六腑。各有素常偏患。衰弱實壯之分。皆當以此類推可也。凡治此症。須消息其夏秋勞逸。行役陰晴。暑濕起居所證治大還

證治大還

醫學近編 瘧癘 五 貞白堂

復。庶幾有得。不可視為泄泄也。

瘧癘備方

平胃散

蒼朮 五錢 厚朴 三錢 陳皮 三錢 甘草 二錢

加生薑三片。棗二枚。煎服。瘧初加檳榔砂仁。草

蔻木香。頭疼加白芷。川芎。蘇葉。惡心加藿香

半夏

九味羌活湯

白芷 一錢 防風 一錢 黃芩 一錢 羌活 一錢 細辛 一錢

蒼朮 一錢 炙甘草 六分 升麻 一錢 川芎 一錢

加葱頭三根。生薑三片。煎服

養香正氣散

藿香 二錢 炙甘草 五分 半夏 一錢 白茯苓 一錢

陳皮 一錢 蒼朮 一錢 白朮 一錢 厚朴 一錢 紫蘇 一錢

大腹皮 一錢 桔梗 一錢

加薑三片。棗二枚。煎八分服。頭痛加白芷。川芎

各五分。惡心痰多加半夏一錢

五積散 製就每劑分用一兩

證治大還

醫學近編 瘧癘 五 貞白堂

乾薑 四兩 蒼朮 米泔浸去粗皮二十四兩 炙甘草 二兩 半夏 二兩

肉桂 二兩 厚朴 四兩 川芎 二兩 白芍 二兩 麻黃 六兩

陳皮 六兩 當歸 二兩 枳殼 六兩 白芷 二兩 桔梗 二兩

白茯苓 二兩 加薑三片。葱頭三個。煎八分服

五積邪氣未平。用此如泄瀉去當歸。加肉果補骨

脂澤。瀉有汗身痛者。去麻黃。加羌活

香蘇散

藿香 二錢 蘇葉 一錢 檳榔 五分 厚朴 一錢 木香 一錢

砂仁 一錢 白豆蔻 一錢 陳皮 一錢 甘草 八分 枳殼 九分

加臣兒茶一撮生薑三片蔥頭三個煎八分服

頭疼加川芎白芷身痛加羌活防風蒼朮

二陳湯

陳皮五錢 半夏二錢五分 茯苓二錢五分 甘草一錢

加薑三片煎八分服

十全大補湯

白朮一錢 人參一錢 白茯苓一錢 炙甘草一錢

白芍一錢 川芎八分 熟地黃一錢 當歸一錢 肉桂七分

黃芪一錢 加薑三片棗二枚煎八分服

證治大選

醫學近編 蘇濟 七 貞白堂

外邪已解元氣大虧用此如足冷加附子腹痛加

炮薑吳茱萸瀉泄法歸地加蒼朮肉果

補中益氣湯

黃芪一錢五分 人參一錢 甘草五分 歸身一錢 陳皮五分

白朮五分 柴胡三分 升麻三分

加薑三片大棗二枚煎八分服

理中湯

人參 炙甘草 白朮 乾薑各二錢

加薑三片煎八分服

八珍湯

當歸一錢 熟地一錢五分 川芎八分 白朮一錢 白芍一錢

人參一錢 白茯苓一錢 炙甘草八分

水煎八分服

蘇合丸

沉香一兩 木香一兩 丁香一兩 白檀香一兩 麝香一兩

香附 白朮 藿香 安息香酒熬

訶子肉 草撥 硃砂水飛 烏犀角一兩

乳香 冰片 蘇合香油入安息內酒熬各五錢

證治大選

醫學近編 蘇濟 太 貞白堂

煉白蜜爲丸如龍眼核大蠟殼封合白湯送下

丸

諸葛行軍散

白皮硝一兩 雄黃六錢 明礬三錢 麝香二錢 薄荷子

冰片三錢 辰砂六錢 草撥三分

先研皮硝雄黃辰砂明礬以無聲爲度後入麝香

冰片再研遇有瘴氣腹痛嘔吐水瀉脹悶惡心瘟

疫等症用簪腳潤口津側少許點入眼竅中男點

左眼女點右眼卽愈

建中湯

黃芪 二錢 肉桂 一錢 白芍 二錢 甘草 一錢

加生薑三片棗二枚入稠飴三匙煎八分服

六君子湯

人參 一錢 白朮 一錢 茯苓 一錢 炙甘草 八分 陳皮 一錢 半夏 一錢

加生薑三片大棗二枚煎八分服

回陽返本湯

熟附子 五分 乾薑 五分 甘草 三分 人參 五分

麥冬 一錢 五味 九粒 臘茶 三分 陳皮 七分

諸治大選

卷之三 醫學近編 章肅 元 貞白堂

加葱七根黃連少許煎七分服

金匱腎氣湯

熟地 一錢 山藥 一錢 山萸肉 一錢 白茯苓 八分 澤瀉 八分

丹皮 一錢 牛膝 八分 車前 八分 肉桂 五分 附子 五分

水煎八分空心服

七香丸

丁香 一兩 香附 一兩 甘草 一兩 蓬朮 二錢

砂仁 二錢 甘松 八錢 益智仁 六錢

唐末飯湯爲丸如菜豆大每服三十九白湯下

紫金錠

紅芽大戟 去心一兩 千金子 去殼油 用嫩者

處州山慈菰 一兩 雄黃 八錢 麝香 二錢

硃砂 飛淨 五錢 冰片 五分 天竺黃 八錢

共爲末陳米湯糊成錠晒乾凡遇瘴氣他悶腹痛

吐瀉併小兒驚風水磨服腫毒蛇虫咬水磨塗之

辟瘴丸

蟾酥 三錢 燒明礬 三錢 雄黃 二錢 藿香 二錢

麝香 一錢 草撥 一錢 硃砂 二錢 冰片 一錢

諸治大選

卷之三 醫學近編 章肅 子 貞白堂

研極細搗生薑汁和飯湯端午日度製如菜子大

每服三九令口內津化下服後不可見風宜靜坐

一飯時

玉樞丹

紅芽大戟 去心一兩 千金子 二兩 去殼油 山慈菰 一兩

雄黃 八錢 麝香 二錢 冰片 五分 南星 一兩 薑汁 一兩

共爲末陳米糊爲丸錠晒乾遇有瘴氣即以直湯

調服五分至二錢止并治飽悶腹痛頭暈惡心

小兒諸疾功同紫金錠

○○○頭痛

陳三農曰。頭痛惡寒發熱者。風寒外邪所開。從外感風寒治。茲外有痰有火。有濕熱有氣虛。血虛有食鬱。瘡毒當分明以治之。

傷寒。脈浮而緊。身形拘急。惡寒脊強。身大熱。傷寒頭痛也。冬用麻黃湯。餘月羌活沖和湯。

傷風。脈緩而浮。或左脈微急。症兼鼻塞。眼脹。白汗。傷風頭痛也。宜解肌。冬月桂枝湯。餘月十味芎蘇飲。

火。兩寸脈洪而大。症兼口渴。日赤等火症者。上焦實證治大還。醫學近編 頭痛 一 頁白堂 卷之四 三七

火也。宜清散兼降。川芎茶調散之類。加酒苓連梔子石膏。勢盛而脈實者。用熟大黃以瀉火也。丹溪

法。用酒大黃。半兩茶煎服。

食鬱。右關寸脈滑而實。症兼嘔吐惡心。心下痞悶。或痛或寒熱如瘧。乃食鬱頭痛也。治宜消導。二陳。山

查厚朴枳實神麴從傷食治。

婁全善曰。病在胃而頭痛者。必下之方愈也。如孫兆以利膈藥下。張學士傷食頭痛。郭茂恂以黑錫丹下。其嫂產後汚血頭痛。皆下咽即安也。內經曰。寸

口脈中指短者。頭痛也。

脈經曰。陽弦則頭痛。又曰。寸口脈浮。傷風發熱頭痛也。脈緊傷寒。脈訣云。頭痛短澁。應須死。浮滑風痰必易除。

痰厥。兩寸脈滑而弦。或惡心吐清水昏重。乃痰厥頭痛也。半夏白朮天麻湯。

濕熱。脈數而濡。或兩寸脈沉伏而數。身重肢節重。或四肢面目浮腫。乃濕熱頭痛也。此多見於酒客。宜

散濕解熱。二陳二朮酒苓羌獨防風之類。不已用證治大還。醫學近編 頭痛 二 頁白堂 卷之四 三七

喘鼻法。濕家一身盡痛。發熱面黃而喘。鼻塞心煩。頭痛者。濕在上也。灰蒂散內鼻中吐之。

氣虛。右脈大而無力。或按之不數。或弱或弦。或兩尺洪盛。四肢怠墮。無力飲食不思。口淡無味。乃氣虛

頭痛也。四君子湯加黃耆蔓荊子。重者加細辛。

血虛。左脈大而無力。或濡細而數。白魚尾上攻於頭。是血虛頭痛也。四物倍川芎加酒苓。眉尖後近髮際曰魚尾

脚氣。脈細而緩。或濡。肢節痛大便秘。或吐逆。脚膝軟弱而頭痛者。屬脚氣。當從脚氣治。

子和曰頭痛不止三陽經受病也三經各有部分區別以治

額痛及眼或兼鼻塞脉浮而長陽明受病也升麻葛根葱白白芷主之

自汗脉洪口渴渴屬陽明裏症也白虎解毒承氣選用眉稜痛眉稜骨痛連兩角脉弦細往來寒熱少陽受病也小柴胡主之

眼瞋痛有二症皆屬肝有肝虛而痛繼見光明則眼瞋骨痛甚宜生熟地黃丸如痛久不止久則喪

證治大還

醫學近編

頭痛

三

真白堂

目胸間必有宿痰先以茶調散吐之吐訖再用川芎薄荷清上藥

三農曰三陰脉至頸胸而還不循於頭惟厥陰循喉嚨之後上連目係頂顛故有頭痛症多嘔吐涎沫四肢厥冷脉多沉伏吳茱萸湯主之

脉沉而細足寒氣逆或身微熱而頭痛者屬裏虛受寒乃太陽脉似少陰也麻黃附子細辛湯主之以

附子溫中麻黃散寒加細辛是汗刺之重者

頭久痛非火非風隔上有痰也濃煎茶一碗取吐苦

水出乃止不損人待渴自止

平人頭痛屬火與痰者多

肥人頭痛多是濕痰二陳蒼朮

瘦人頭痛多是血虛與火酒芩連荆防薄荷芎歸

風熱在上脉浮洪而痛者宜天麻荆子台芎酒芩

黃蘗痛加桑本酒炒升麻

頭風偏頭風在右屬痰熱痰用蒼朮半夏熟川酒

炒黃芩不應滾痰丸最捷在左屬風熱與血虛亦

云形瘦色弊而頭痛者屬血虛風熱用荆芥薄荷

證治大還

醫學近編

頭痛

四

真白堂

川芎酒芩玄參血虛用四物酒炒黃柏知母諸家不分所屬故多不效

少陽偏頭痛便秘者或可下之

偏正頭痛不可忍者玄胡索七枚青黛二錢牙皂二

個去皮子為末水丸杏仁大每以一九水化灌入

鼻內隨左右咬銅錢一個當有涎出隨愈

東垣一粒金用華撥以猪胆拌勻入胆內陰乾玄胡

索青黛白芷川芎各一兩為細末無根水丸化開

搖鼻中外以銅錢咬出涎

一人素病黃，忽苦頭痛不已，發散降火，歷試無效，診得脉大而緩，且一身盡痛，又兼鼻塞，乃濕家頭痛也。投瓜蒂散，一七內鼻中黃水去大盃而愈。

亦毒脉弦數，曾病梅毒而痛不止，或咽中痛，或臂膊有一塊痛，屬瘡毒，愈毒湯多服自止。

張三錫，屢見頭苦痛，百法不應，詢之曾生過梅毒，用土茯苓四兩，白鮮皮苦參金銀花各三錢，黃柏一錢，皂角子三十粒，蔥白木通防風各二錢，氣虛加參芪血虛加四物，大獲奇驗，身痛亦效。

證治大還

醫學近編

頭痛

五

真白堂

一人頭痛脉滑而數，乃痰火上攻也。二陳荆芥羌活酒芩，不應加石膏，二劑稍可，終未盡除，前方加熟大黃三錢，食遠煎服，病去如脫。

一人苦頭痛，眾作外感治，診得右手寸口脉大四倍於左，兩尺洪盛，乃內傷氣虛頭痛也。外兼自汗倦怠，以補中益氣湯加炒黃柏一劑，知二劑已。

一人頭痛而面色紫黑，身體羸瘦，左寸關俱不應，指兩尺獨洪盛，因作陰虛治，用滋陰四物加黃柏知母玄參二服，減半十日全。

一婦苦頭痛，候為外感治，發散三黃白虎稍黃愈，後愈甚，診之氣口急大而數，按之即濡，右脉亦虛大。

詢之，先不熱，服藥後始熱，余曰：風寒必先發熱，在

一二日間，豈有先不熱而後熱者？此氣虛頭痛也。視其氣短不足以息，餘皆可知，今發散過度，耗

其氣，又復下之，復損其血，氣血兩傷，宜乎虛火獨

熾而身反熱也。非大補拒能挽回，遂以補中益氣

湯大劑加熟附子一片為嚮導，服下即熱厥覺而

痛止。第人事不清，復加筋惕肉瞤，振振不寧，彼歸

證治大還

醫學近編

頭痛

六

真白堂

告于補劑。余曰：虛極所致，復更一劑，用柴胡表藥致一身之火遊行於外，變為斑爛，彼益信為傷寒矣。化班承氣日進，卒致氣絕而已。

一人頭痛，身形拘急，惡寒便秘，惡心作食，鬱治不應，診得氣口脉平和，獨尺數而細，且行步艱難，乃脾氣欲動也。從腳氣治而愈。

一人頭痛作外感治不應，左脉平和，氣口獨盛，症兼飽悶惡心，乃食鬱也。消導而愈。

一人牙與頭角互痛，乃少陽陽明二經火盛，一

胃散對小柴胡去半夏人參加薄荷石膏二劑瘳
一老嫗頭痛連額發散降火備用不効而上背出小
紅泡有微水不甚潰一月後痛悉移於右左眼胞
上紅腫且懶於言動飲食不甜用辛涼愈投愈甚
六脉濡弱如珠絲初按稍弦因作氣虛治六君倍
黃耆加蔓荊子三服後漸安心跳不眠愈急乃以
調中益氣湯加茯神玄參酸棗仁柏子仁連進數
服頓愈

川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏痛鼻塞聲重

證治大選

醫學近編 頭痛 卷之四 七

貞白堂

川芎 荆芥 各二兩 防風 白芷 各一兩

薄荷 四兩 羌活 一兩 細辛 五錢

右爲末每服二錢食遠茶湯調下

加味調中益氣湯 治氣血俱虛頭痛

陳皮 黃柏 酒炒各 升麻 柴胡 去蘆各 蒼朮

人參 炙甘草 各六分 黃耆 一錢 川芎 六分 細辛 二分

蔓荊子 三分 更加當歸 白水煎服

吳茱萸湯 治厥陰頭痛連顙頂吐涎沫厥冷脉沉

後

吳茱萸 生薑 各半 人參 二錢五分 取一枚煎服

半夏白朮天麻湯 治痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩

悶氣喘上促無力以動心神顛倒日不敢開若在
風雲中頭痛如裂身重如山四肢厥冷不得安臥

黃柏 錢一 乾薑 三分 澤瀉 天麻 黃耆 人參

蒼朮 各五分 神麴 白朮 各五分 麥蘖 半夏 橘紅

各七分 白茯苓 五分

右薑三片稍熱服此頭若痛甚謂之痰厥頭痛非

證治大選

醫學近編 頭痛 卷之四 八

貞白堂

半夏不能除眼黑生花風虛內作非天麻不能已

黃耆甘溫瀉火補元氣實表止汗人參甘溫瀉火

補中益氣二朮俱苦甘溫除濕補土澤瀉茯苓淡

滲利小便濕因而導去橘皮苦溫益氣調中神麴

消食蕩胃中滯氣麥蘖寬中助脾乾薑辛熱以瀝

中寒黃柏苦辛以療冬天小火在泉發躁也

羌活湯 治風熱上壅上攻頭目昏眩作痛

炙甘草 分中 澤瀉 二分 酒黃連 酒洗花粉

川芎 三分 川黃柏 各四分 柴胡 五分 防風 酒炙

羌活各六分 臨睡服

玉壺丸 治風熱頭痛亦治痰厥

雄黃一錢 兩星煨裂 半夏七地 天麻 白芷各二錢

右爲細末薑汁炊餅丸紫豆大每服一錢食遠白

湯下

白芷散 治諸熱頭痛

鬱金一錢 白芷 石膏各二錢 雄黃 芒硝 薄荷

各三錢 右爲細末含水鼻內吹之

清上瀉火湯 昔人於氣海三里穴迴灸至老若熱

證治大還 醫學近編 頭痛 九 貞白堂

厥頭痛雖冬月內猶喜風寒吹之卽卽愈稍暖或

見烟火卽作服此遂已

酒紅花 荆穗 川芎 荆子 當歸 蒼朮

細辛 酒連 生地 柴胡 桑本各四分 生甘艸

升麻 防風 酒黃柏 炙甘草 黃芪各五分

酒芩 酒知母 羌活各八分 白水煎服

安神湯 治頭痛頭旋眼黑

二甘艸各二分 防風二分 升麻 柴胡 生地黃酒洗

知母酒洗各五分 黃柏酒洗 羌活各一錢 黃芪一錢

將燕再加蔓荆子五分川芎三分再煎至一盞臨睡熱服

大法曰高顛之上惟風可到一切痰火氣血爲病須

加風藥如荆芥川芎薄荷羌活白芷藥本之類卽

前各加引經藥是也

引稜骨痛風熱與痰酒芩白芷等分爲末茶調散妙

不應選奇湯不已滾痰丸

選奇湯 治眉稜骨痛不可忍神效

羌活 防風各二錢 甘艸一錢 夏酒頭芩冬不用有

證治大還 醫學近編 頭痛 十 貞白堂

川 水煎服

又方酒炒片黃芩白芷等分爲末每二錢茶下

三聖治廣農女子頭風連年三服卽愈

白茯苓一錢 忍冬花四錢 防風一錢 蔓荆子一錢

半兩五分 製天麻一錢 玄參一錢 川芎五分

木賊一錢 黑豆三十粒 陳細茶二錢 燈心三十

用土茯苓六兩洗淨搗爛大砂鍋先熬濃湯二大

碗去渣入藥煎一瓷熬服盡爰取汗茯苓渣又煎

湯如前煎服此方後治偏正頭風皆愈

清空膏 治偏正額痛年深日久不愈。○兼治心煩頭痛病在腦中。

川芎五錢 柴胡七錢 黃連酒炒 防風 羌活各一 炙甘草半兩 片苓三兩 一牛酒浸切片炒一牛生

右爲細末每服二錢熱薑內入茶清少許湯調如膏臨睡沫口內少用白湯送下若頭痛每服加細

辛二分如太陰脈沒有者發厥頭痛減羌活防風川芎甘艸加半夏細一兩五錢如偏正頭痛服

之不愈減羌活防風川芎一兩加柴胡一倍如發熱惡熱而渴者屬陽明只服白虎湯加白芷良

頭痒風屑髮黃酒炒黑大黃末茶調二錢妙血虛有火弱人門物用生地加玄參牡丹皮。

一方山豆根浸油搽妙甚若以湯洗候髮半乾藥末蘆末緊縛一夜卽止。

產後頭痛古方用芎歸湯然亦須分剖明白果血虛宜此氣虛自汗須益氣養心下須消導惡露不

淨小腹痛兼去惡露。

雷頭風

頭痛腫起核塊或作赤腫或作寒熱拘急皆風熱火炎上所致雷屬相火故名古方用升麻蒼朮加荷葉各升麻湯莫若荆防敗毒散爲便。

子和曰雷頭風可用茶調散吐之次服神芎丸下之後乃以烏荊丸及愈風餅之類輕者可用涼膈散

消風散疔瘡不消只用排針刺去毒血。

神芎丸 實熱熱鬱于上者宜之方見火門

愈風餅子 川烏炮兩 川芎 甘菊 白芷 防風 細辛

治大還 卷之四 頭痛 主 貞白堂

甘草炙 天麻 羌活 荆芥 薄荷以上各一兩

右爲末炊餅爲丸捏作餅子每服三五餅細嚼茶下。

頭重

東垣曰頭重如山濕氣在頭也紅豆散搐鼻妙。

羌活 根燒 連翹各三錢 紅豆半分 共爲末搐鼻病

在上若用服藥則誅伐無過也故於鼻內取之猶物在高巔之上必射而取之。

頭搖屬風屬火高年病後辛苦人多屬虛因氣血虛

而火犯上鼓動也。即內經狗蒙招尤目瞋耳聾。上實下虛之義。狗疾也。目不明曰蒙。招為掉搖不定。尤為甚。

頭痛顛疾。下虛上實。名腎厥。頭痛戴復。菴用來復丹。并黑錫丹等。如不應。茸硃丹。

茸硃丹

好硃丹 草烏 瞿麥 黃藥子 各一兩

右為鐵末。磁碗一個。以薑汁塗炙數次。入硃砂在內。上鋪諸藥。復以碗蓋了。煅一小坑。安藥碗在內。

證治大還

醫學近編 頭痛 圭 貞白堂

用熟炭五斤。煅令烟盡。吹去草藥灰。將砂末研細。

每服一錢半。淡薑湯下。或加鹿茸炙去毛。為末。九人參湯下。

人參湯下

面痛

三農曰。面痛屬陽明胃家積熱。以腸胃為市。飲食之毒聚於中而發於外也。王損菴方。用犀角升麻湯。

犀角解毒升麻黃芩入胃。陽明經脈環唇挾齒起。

於鼻交頤中。循頰車上耳前。過客主人。循髮際出。

頭顙。陽明有熱。則諸處俱痛也。

一老人過勞與饑。則面痛。用補中益氣湯加連翹。黍粘玄參。苓梔而愈。

一人因鬱悒。用越鞠貝母連翹。橘紅而愈。

頸項痛

邪客三陽。則痛。寒搏則筋急。風搏則筋弛。左屬血。右

多屬痰。丹溪治一人。項強痛不可忍。以回顧作痰。

客太陽。經治之用二陳湯。加酒芩羌活。紅花。服後

二日愈。

若人多有挫閃及失枕。而項強痛者。皆由腎虛不能

證治大還

醫學近編 頭痛 圭 貞白堂

榮筋也。六味地黃丸佳。

麻黃湯

升麻葛根湯

麻黃附子細辛湯

羌活中和湯

白虎湯

桂枝湯

解毒湯

小柴胡湯

芍藥飲

俱見傷寒門

黑錫丹

見嘔吐門

滾痰丸

見痰門

補中益氣湯

見內傷門

〇〇面門

靈樞經曰而熱者足陽明病十二經脉三百六十五絡其血氣皆上于面而走空竅其精陽氣上走于目而為睛其別氣走于耳而為聽其宗氣上出鼻而為臭其濁出於胃走唇舌而為味其氣之津液皆上薰於面而皮又厚其肉堅故天熱甚寒不能勝之也

青紅黃白黑五色以應五臟是以外候驗內症也

東垣曰飲食不節則胃病病則氣短精神少而生

證治大還

醫學近編 面門 一 貞白堂 卷之四

大熱有時而火上獨燎其面

丹溪曰而熱因胃熱有鬱火而寒因胃虛

三農曰咳逆停息不得臥面熱如醉此為胃熱上冲

薰其面以茯苓桂枝甘草五味湯加大黃利之

羅氏治楊郎中之內五十一歲身體肥盛已酉春患

頭目昏悶面赤熱多服清上藥不效請治診其脉

洪大而有內經云面熱者足陽明病脉經云陽

明經氣盛有餘則身已前皆熱況其人素膏粱積

熱於胃陽明經多血多氣本實則風熱上行諸陽

皆會於頭目故面熱之病生矣先以調胃承氣湯七錢加黃連三錢犀角一錢疎下三兩行微其本熱次以升麻加黃連湯去經絡中風熱上行如此則標本之邪俱退矣

升麻加黃連湯

升麻 葛根 各一 白芷 七分 甘草 炙 白芍 各五分

酒黃連 四分 生犀角 生 川芎 荆芥穗 薄荷 各

分 用水半盞先浸川芎荆芥穗薄荷外都作一

服水二盞煎一盞入先浸三味同煎至七分食後

證治大還

醫學近編 面門 二 貞白堂 卷之四

溫服數服愈 忌酒麵五辛物

面寒尼長老六十歲體瘦弱十月間病頭面惡寒不

敢當風行諸治不效脉短細而微且年高向素食

日惟茶果而已陽明之經本虛脉經云氣不足則

身已前皆寒慄又加看誦損氣由此胃氣虛經絡

之氣亦虛不能上榮頭故惡風寒先以附子理中

丸溫其中氣次以升麻湯加附子主之

升麻 葛根 白芷 黃芪 附子 炮各 七分 甘草 炙 人參 草豆蔻 各五分 益智仁 三分 水一鍾半連

發頭二莖煎一鍾溫服數服良愈

升麻湯辨 或曰升麻加黃連湯治而熱升麻加附子湯治而寒有何依據答曰出自仲景雲岐子註傷寒論中辨葛根湯云尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脉夾鼻絡于目故身熱目疼鼻乾不得眠此陽明經受病也始于鼻交頤中從頭至足行身之前為表之裡陽明經標熱本實從標脉浮而長從本脉沈而實陽明為病蒸蒸而熱不惡寒身熱為標病陽明本實者胃中燥鼻乾目痛證治大還

醫學近編 面門 三 貞白堂

為本病陽明為肌肉之本禁不可發汗在本者不禁下發之則變黃症太陽主表營衛是也營衛之下肌肉屬陽明二陽并病葛根湯主之衛者桂枝營者麻黃營衛之中桂枝麻黃各半湯主之營衛之下肌肉之分者葛根湯主之又名解肌湯故陽明為肌肉之本非專于發汗止汗之治桂枝麻黃兩方互併為一方加葛根者便作葛根湯故營衛肌肉之次也桂枝芍藥生薑甘草大棗止汗有麻黃桂枝甘草發汗葛根味薄獨加一味者非發汗

止汗也從葛根以解肌故名葛根湯錢仲陽制升

麻湯治傷寒瘟疫風熱壯熱頭痛肢體痛瘡疹已發未發用葛根為君升麻為佐甘草芍藥安其中氣朱奉議作活人書將升麻列作陽明經解藥予診楊氏婦陽明經標本俱實先攻其裡後瀉經絡中風熱故用升麻湯加黃連以寒治熱也尼長老陽明經標本俱虛先實其裡次行經絡故用升麻湯加附子以熱治寒也仲景乃群方之祖信哉

面上有熱毒治以柏連散 胡粉 黃柏 黃連 各等分 證治大還 醫學近編 面門 四 貞白堂

分 為細末面脂調敷猪脂亦好

面上肺風瘡 以無灰酒濃磨鹿角尖敷之

指爪爬破面皮 以生薑自然汁調輕粉敷破處更無痕迹

玉容散 面上黑點雀斑

甘松 三奈 茅香 各五錢 白芷 白殭蚕 白芨

白薇 白附子 天花粉 各一兩 防風 藁本 各三錢

零陵香 三錢 肥皂 二錢 菜豆粉 一兩 為細末每

洗面用之

秘方 面上雀斑

櫻桃枝 紫背浮萍 白梅肉 猪牙皂角各等分

焙乾爲末每洗面時用之七八日後其斑皆沒神

效 一方加鷹屎少許尤效服藥在後

防風通聖散 風熱上攻面熱

胃風湯 虛風症能食麻木牙關急搐目瞶動胃中

有風熱攻面故面獨腫

白芷一錢二分 升麻一錢五分 葛根 蒼朮各八分

甘草三分 柴胡 藥本 羌活 黃柏各五分

證治大還

醫學近編 面門 貞白堂

草豆蔻五分 蔓荊子二分 麻黃八分 白蠶蚕三分

川歸一錢五分 水二鍾煎八分食遠服

丹溪治一婦人面頰兩腮熱腫膈塞之病也

乾葛 桔梗一錢半 升麻一錢 蘇葉一錢半 薄荷一錢

甘草七分 薑一片水煎食後服

一人登廁被臭氣薰觸隱忍良久明日滿面皆黑色

月餘不散相士斷云不出月外必死至期無恙拉

孫召先生治教以沈檀香各一兩剉碎安爐中燒

薰帳內以被蓋定令病者瞑目端坐候香盡方可

出帳明日引鑑照之面上黑色漸散矣

頰車病

黃溪陳氏因驚後常用手指甲掐住兩頰遂兩頰

破損心懊懷不安脈數而實諸藥不愈用活幼口

義牛黃清心涼膈丸數服如失

凡欠伸頰車蹉但開不能合以酒飲之令大醉睡中

吹皂角末搗其鼻嚏透即自止

東垣云咽痛頰腫脈洪大面赤者羌活勝濕湯加黃

芩桔梗甘草各五分如耳鳴目黃頰頰腫頭肩痛

證治大還

醫學近編 面門 貞白堂

肘臂外後腋痛面赤脈洪大者以羌活防風甘草

藥本通其經血加黃連黃芩消其腫以人參黃芪

益其元氣而瀉其火邪

丹溪治兩腮腫用細辛草烏等分爲末入蚌粉以猪

脂調敷口含白梅置腮邊良久腫退出涎患立消

矣消時腫必先向下

濟世方 治疔腮

車前草 柏子仁 竹葉 杵碎熱敷患處

腮腫 用赤小豆醋調敷之

千金方 卒中風頭面腫杵杏仁如膏敷之

又方 非腮如神

鷄子清調赤豆末及喉下諸般腫痛用蝸牛飛麝研勻貼腫處

證治大還

醫學近編 卷之四 門 七

貞白堂

〇〇耳鳴 耳聾

三農曰耳者腎之象也腎主藏精者也故精脫者則耳聾以腎藏精而氣通于耳耳者宗脈之所聚也保命集云以竅言之水也以聲音言之金也以經言之手足少陽俱會其中也有從內不能聽者主也 有從外不能入者經也腎和則能聞五音矣羅謙甫以精脫耳聾之候為顴頰黑色也耳聾少氣陰乾者肺虛也東垣曰頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也腸胃不足故氣弱不充傷寒及大病之證治大還 醫學近編 耳鳴 一 貞白堂 卷之四 後多有此症以補中益氣治之耳聾多恐者肝虛也經云肝虛則目眈眈無所見耳無所聞善恐治法用四物湯加防風羌活柴胡黃芩茯苓神等分煎湯服二十餘帖然後却以杜壬姜蠟散開之本草云肝虛則生姜補之是也 丹溪曰大病後耳聾須用補陰降火有陰虛火動而聾者宜四物湯加黃柏之類 三農曰大病後則氣血俱虛然必診兩手之脈孰勝而為之斯無弊矣若脈大而無力或右手細小沉

弱者皆陽氣大虛也。正宜甘溫之劑，倣陽生陰長之義，少加血藥佐之可也。若純視爲陰虛而用滋陰降火之劑，則陽氣愈弱而犯東垣伐生生之戒。非惟耳聾不痊，而反增惡心、胸滿泄瀉之症。若獨以陰虛火動而用滋陰降火者，此正治法也。予又何敢言。

氣逆耳聾有三：肝與手太陽少陽也。經云：肝氣逆則頭痛耳聾不聰，顏腫。又云：太陽所謂浮爲聾者，皆在氣也。

證治大綱

醫學近編 耳鳴

二

貞白堂

羅謙甫云：手太陽氣厥而耳聾者，其候聾而耳內氣滿也。手少陽氣厥而耳聾者，其候耳內渾渾焯焯。此皆氣逆而聾也。治法宜四物湯吞龍會丸降火及復元通氣散調氣散是也。

丹溪治法：痰火風熱者，滾痰丸通聖散之類。聾病必用四物龍會養陰，亦有濕熱痰者，檳榔神芎丸耳中悶然亦是陰虛。凡臟氣逆而爲厥聾，必有眩昏之症。風聾必有頭痛之症。勞役傷其氣血，淫慾耗其精元，昏昏瞶瞶是謂勞聾，必有虛損之

症。其聲嘈嘈，眼見黑花，此虛聾也。

劉宗厚曰：凡耳鳴症，或如蟬噪之聲，或如鍾鼓之响，或是閉塞，此見痰火上升，鬱于耳中而爲鳴。鬱甚則壅閉矣。治宜清痰降火。又有因大怒而得，宜順氣聰耳湯。有因於風而得，其鳴如輪車闐然，或氣揖眩，宜祛風芎芷散。熱則加酒芩連翹，有腎虛鳴者，其鳴不甚，宜滋腎丸、虎潛丸、大補陰丸。八物湯加黃柏知母。肝火動者，當歸龍會丸。飲酒人宜木香檳榔丸。

證治大綱

醫學近編 耳鳴

三

貞白堂

素問金匱真言論：南方赤色入通于心，開竅于耳。藏精于心，此又耳爲心之竅也。

素問脉解篇曰：陽氣萬物盛上而躍，故耳鳴也。

益氣聰耳湯：饑飽勞役，脾胃不足，得耳聾之患。

柴胡 升麻 蔓荊子 葛根 各一錢 人參 各五分

黃芪 甘艸 各二錢 黃柏 芍藥 水二鍾煎八分

食遠服

清神散：頭目不清，耳常重聽。

甘菊花 白殭蚕 各五錢 羌活 荆芥穗 木通

<p>川芎<small>各四錢</small> 木香 防風<small>各三錢</small> 石菖蒲<small>四錢</small> 甘艸<small>二錢</small></p> <p>爲末每服三錢茶清調下</p>	<p>通氣散 治氣閉耳聾</p> <p>木通 木香 枳壳 菖蒲<small>各五錢</small> 川芎 柴胡</p> <p>陳皮<small>各二錢</small> 白芷 羌活 姜蚕<small>炒</small> 全蝎 蟬退<small>各二錢</small></p> <p>甘艸<small>一錢</small> 川山甲<small>炮三錢</small></p> <p>爲末每服三錢酒調下</p>	<p>荊芥散 風熱上壅耳閉或耳鳴及出膿</p> <p>防風 荊芥 升麻 甘菊 木通 黃芩<small>炒</small></p>	<p>證治大還 <small>醫學近編 耳鳴 四 貞白堂</small></p> <p>羌活 甘艸 蔓荊子 水煎服</p>	<p>寶鑑姜蝎散 耳聾因腎虛所致十年內一服愈</p> <p>乾蝎<small>自十九個去蟻</small> 生薑<small>切片如蝎大四</small></p> <p>二味銀石器內炒至乾爲末向晚勿食夜臥至二更時以酒調服徐徐服盡盡量飲至五更時耳中聞百擗竿响便自此有聞</p> <p>一法五更濃煎葱白湯一盞服光三日服黑錫丹效</p> <p>又蝎先用糯米半升同炒又用姜四十九片放蝎上同炒去蝎姜不用只用米</p>
--	--	--	---	---

<p>寶鑑犀角湯 治風毒壅熱胸心痰滯兩耳虛聾頭重目眩神效</p> <p>犀角屑 甘菊花 前胡 枳壳<small>炒</small> 菖蒲 羌活</p> <p>澤瀉 木通 生地<small>各五錢</small> 麥冬<small>二兩</small> 炙甘艸<small>一錢</small></p> <p>爲末每服三錢水煎食後溫服</p>	<p>茯神散 治上焦風熱耳或聾或鳴四肢滿急昏悶不利</p> <p>茯神<small>一兩</small> 羌活 柴胡 蔓荊子 薏苡仁</p>	<p>證治大還 <small>醫學近編 耳鳴 五 貞白堂</small></p> <p>薄荷<small>各三錢</small> 爲末每服三錢入生薑三片煎至五分食後溫服</p>	<p>地黃湯 因瘡毒後腎經熱右耳聽事不真每心中拂意則轉覺重虛鳴疼痛</p> <p>生地<small>一兩</small> 枳壳 羌活 桑白皮<small>一兩</small> 甘艸</p>	<p>防風 黃芩 木通<small>各五錢</small> 磁石<small>煅碎水淘二三</small></p> <p>爲粗末每服四錢用水煎去渣日三服不拘時候</p>	<p>寶鑑蠟彈丸 治耳虛聾</p>
--	--	--	--	--	-------------------

白茯苓 二兩 山藥 炒三兩 杏仁 少一兩半 去皮尖

三味研末和勻用黃蠟十兩熔化爲丸如彈子大鹽湯嚼下有人止以黃蠟細嚼點好建茶湯下亦效山藥茯苓杏仁皆屬于太陽山藥大補陰氣惟杏仁利氣乃補中有通也少氣盛乾者門冬五味人參湯嚼下

多飲酒人耳鳴木香枳榔丸加桔壳柴胡大黃甘草南星桔梗青皮荆芥不愈四物湯

耳鳴必用當歸龍會丸氣實者神芎丸加枳榔一兩證治大還 醫學近編 耳鳴 六 貞白堂 卷之四 下之

耳濕腫痛涼膈散加酒炒大黃半兩酒浸黃芩防風荆芥羌活外以桑螵蛸一個炙存性射香二分枯凡胭脂俱爲末搽之

耳腫痛

丹溪治耳腫痛黃水出而臭

桔梗 麻黃 羌活 大黃 酒炒 三錢 木通 甘草

茯苓 一錢 半 分三帖熱服

寶鑑解熱飲子 氣虛熱壅耳內聾閉微痛膿血

赤芍 白芍 各五錢 川歸 甘草 炙 大黃 蒸 木鼈子

每服四五錢水一鍾煎七分食後臥時服 詳此方乃清涼引子加木鼈子

濟世方 聾耳膿不止

用陳皮燈上燒灰爲末射香少許二味和勻每用少許先用綿拭耳中膿淨卻上藥

又方 杏仁泥治耳中病及有出水杏仁炒令黑爲末慈涎搜和如棗核大綿包塞耳

復元通氣散 諸氣滯耳聾腹癰便癰瘡疽無頭止

證治大還 醫學近編 耳鳴 七 貞白堂 卷之四 痛消腫

青皮 陳皮 去白 四兩 甘草 三寸 炙 連翹 一兩

爲末熱酒調下

治耳作痛不可忍者 用磨刀鉄漿滴入耳中卽愈屢用屢驗

三農口治耳聾之症多不獲捷效者其故有三皆人自不攝養也不禁慾不戒性不戒酒及醇炙厚味以故服藥同效也慾傷精精脆則耳聾怒則氣逆逆則厥厥氣相搏故爲氣壅酒性太熱助火消陰

燂灸厚味皆助火生痰痰火上壅清竅閉塞鬱而爲熱熱久則潰而爲膿亦有燥火旺不作膿而成乾膜盯瞤之類職皆由于人之自索予故書于方末庶病者知有所警焉

證治大還

醫學近編 耳鳴

八

貞白堂

鼻

陳三農曰西方白色通於肺開竅於鼻凡風寒暑濕勞役飢飽耗其生發之氣不能上升壅塞孔道故不聞香臭也又曰心肺有熱則口鼻不利故善治者外邪解散之後養胃氣以實營氣升陽氣以扶宗氣使心肺氣得以交則鼻利而香臭聞矣潔古云清涼而視聽明溫煖而香臭辨是之謂歟

酒客膏粱辛熱炙燂太過火邪炎上孔竅壅塞則爲

鼻淵鼻中濁涕如湧泉漸變鼻膿血息肉鼻

證治大還

醫學近編 鼻

一

貞白堂

痔等症卽素問所謂膽移熱于腦之義

鼻塞時值寒月必加麻黃細辛于升麻葛根湯中佐以枯苓蘇葉多加甘桔爲舟楫庶易成功已經發散未得全開脉洪有力口乾鼻燥者君以辛涼清之酒苓梔子薄荷之屬仍佐荊防升芷不可驟用寒涼法也

氣虛之人氣弱不能上升則鼻塞滯所謂九竅不利腸胃之所生是也多服補中益氣湯自通乃屢驗者

戴復菴曰平人多涕或黃或白或帶血如膿狀皆腎虛所生不可過用涼劑亦有痰用南星散兩寸脉浮洪而數為鼻衄鼻鼾右寸脉浮緩為傷風鼻塞清涕

丹溪曰鼻為肺竅肺家有病而鼻不利也有寒有熱暴起為寒久鬱成熱寒傷皮毛氣不利而壅塞熱壅清道氣不宣通先須表散後以酒芩連梔子清之

久患鼻膿極臭者冷水調百草霜末服

證治大還

醫學近編 鼻

二

貞白堂

腦漏氣弱色白人右氣口虛丸補中益氣湯加川芎

防風細辛白芷辛荳蔻半飽服

酒鐵鼻乃熱血入面為寒所拂熱血得寒汚濁凝滯而然服前藥外用梧桐子取油入黃連以天吊藤燒油熱傳之

又方用山硫黃入蘿蔔內煨乳香輕粉烏頭尖酥調傅或用膽礬傅之

面鼻紫黑面為陽中之陽鼻居面之中一身之血運到面鼻者為至清至精之血多酒之人酒氣薰蒸

面鼻得酒血為極熱熱血得寒汚濁凝滯而不行故色紫黑治宜化滯血生新血四物加酒片芩紅花酒浸陳皮茯苓甘草生薑煎調五靈脂末服氣弱者加黃芪酒浸

上焦火盛酒客膏粱脉洪數有力而面生酒刺及糟鼻山梔仁酒浸微炒為末蜜丸彈子大臨臥嚼一丸白湯下或加連翹仁更佳

鼻淵濁涕如淵內經謂膽移熱于腦則入額鼻淵要皆陽明伏火所致防風通聖散一兩加薄荷黃連

證治大還

醫學近編 鼻

三

貞白堂

各二錢半水煎服一法本方硝黃滑石石膏減半倍加辛荳

鼻中息肉塞久氣不通用枯礬為末面脂綿裹塞耳中數日自消乃屢驗者又法用木通細辛附子炮蜜和綿裹塞鼻中又用防風通聖散加荆三稜山茱萸肉海藻并用酒炒為末每服錢半酒調下

宣明防風散 治鼻淵濁涕不止久而不已必成衄黃芩 人參 甘草 川芎 麥門冬 去心各一兩

防風半兩 共為末每二錢沸湯調食後服日三

寒月鼻塞不聞香臭晨起者麗澤通氣散。

黃芪八分 蒼朮八分 羌活獨活 防風升麻

葛根各六分 甘草各四分 麻黃嚴寒加 川椒白芷各二分

薑三片棗二枚蔥白三寸水二鍾煎一鍾溫服忌

一切冷物及風涼處坐臥

鼻中流臭黃水腦亦痛名控腦沙有蟲食腦中用絲

瓜藤近根三五尺許燒存性為細末酒調服即愈

不已灸法妙額會在鼻心上入髮際二寸再容豆

證治大還醫學近編 鼻 卷之四 四 貞白堂

是穴灸七壯隨臭左右灸常見灸後去臭肉一塊

從鼻中出臭不可言而愈

塞鼻藥

通草散 治鼻癰氣不通不聞香臭

木通細辛 附子各等分 共為末蜜和綿裹少許

納鼻中

薑蒲散 治同上

薑蒲 皂角各等分 共為末綿裹塞鼻中

痰火鬱結于上焦胸中盲瘻之上上竅不通則玄門

閉密而鼻不聞香口不知味或耳聾目昏良由大

氣弱不能上衝濁氣得以擅權是虛為本而痰火

為標也當補中益氣加升柴諸風藥引上行兼用

清上化痰開竅丸藥戒性慎口久之自全此實屢

驗者

鼻淵

火鬱上焦氣不通抑遏成涕內經所謂肺熱則出涕

是也方書謂腦滲為涕恐非

防風湯 治同上

證治大還醫學近編 鼻 卷之四 五 貞白堂

防風兩半 黃連 人參 甘草 炙川芎 麥冬去心

各三 共為細末每一錢沸湯點服日三

丹溪治一中年人右鼻管流濁且臭脈弦小右寸滑

左寸濇灸上星三里合谷次以酒荅二兩蒼朮半

夏各一兩辛荑川芎白芷石膏人參葛根各半兩

分七貼服之全愈乃痰鬱火熱之症也

防風通聖散去硝黃減石膏滑石一半加辛荑先服

三五貼再用此為丸早晚白湯下半斤愈

蒼耳散 治鼻流濁涕不止

辛荑 半兩 蒼耳子 炒二錢半 香白芷 一兩 薄荷葉 五分

共爲末葱茶湯臨睡下

辛荑散 冬月勢盛者佳

辛荑 細辛 藁本 升麻 川芎 白芷

木通 防風 甘草 共爲末每服一錢食後茶

清送下

鼻鼈 謂流涕也

丹溪曰肥人鼻流清涕乃飲食痰積也要亦濁液挾

火壅塞而然

證治大還

醫學近編 鼻

六

貞白堂

蒼朮 片苓 南星 川芎 白芷 辛荑

甘草 或末或丸白湯下世傳鼻流臭膿百草霜

研細冷水下三錢效

塞鼻藥 治鼻鼈

通草 辛荑 各五 細辛 甘遂 桂心 芎藭

附子 各一 共爲末蜜九麻子大綿裹塞鼻中

又方辛荑膏 治同上

細辛 川椒 乾薑 川芎 吳茱萸 辛荑

附子 各三 皂角屑 半兩 桂心 一兩 猪脂 六兩

右煎猪脂成膏先一宿以苦酒浸前八味入油煎附子黃色止以綿裹少許塞鼻中

息肉

羊肺散 治肺虛濕熱壅塞鼻生息肉不聞香臭

羊肺 一具 白朮 四兩 茯苓 木通 乾薑 川芎

各一 共爲細末水調 羊肺中煮熟焙乾細研爲

末食後未飲下此從治法也

三錫曰息肉必由上焦積熱鬱塞已久而生然有諸

中然後形諸外必內服清火利膈藥二陳涼膈加

證治大還

醫學近編 鼻

七

貞白堂

減須斷酒薄味

韓氏醫通曰由露地生菌息之像也

一中貴鼻中肉贅莫不可言痛不可搖束手待斃以

白礬末加礬砂少許吹上化水而消內服勝濕湯

加瀉白散

又一方 息肉因胃中有食積熱痰流注治本爲佳

蝴蝶礬 一錢 細辛 一錢 白芷 五分 共爲末綿裹塞

鼻孔頻換 又方蝴蝶礬二分號丹一分細辛一

錢如上塞之三因方枯礬一味爲末綿裹塞鼻中

數日息與藥俱落

辛荑膏 治息肉時作痛

辛荑 二兩 細辛 木通 木香 白芷 杏仁 湯

去皮尖 各半兩 用猪脂隨猪脂二兩和藥于石器內慢

火熬成膏放冷加龍腦麝香合一錢為丸綿裹塞

鼻中數日內脫落

有人卒食物從鼻中縮入腦中介介痛不得出以牛

脂或羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸入須臾脂消

物逐脂出也

證治大還

醫學近編 鼻

八

真自堂

輕黃散 治同上

輕粉 杏仁 湯河去皮尖 雙仁各一錢 雄黃 半兩 麝 少許

右四味用淨乳鉢先研杏仁如泥後入雄黃麝香

同研極細磁盒蓋定每有患者不拘遠近夜臥用

筋點米大在息上半月效

消鼻痔方

瓜蒂 炒 甘遂 各四錢 白礬 枯 螺青 炒 章烏 尖 各五分

共為末用真麻油搜和令硬此不可爛旋丸如鼻

孔大用藥入鼻內令達痔肉上其痔化為水日一

次妙甚

又方 苦丁香 即瓜蒂 赤小豆 丁香 各四

為末入腦少許口中先含水次將小竹管吹藥入

鼻中如半鍾茶時覺頭痛時取下

酒齏鼻

鉛紅散 治風熱上攻陽明經絡面鼻紫赤刺癢疹

俗呼肺風以肺主皮毛也

硫磺 白礬灰 各五錢 共為細末入黃丹少許藥與

病人面色同每上五分津液和塗之臨臥洗漱罷

證治大還

醫學近編 鼻

九

真自堂

行之

赤鼻須內服升麻湯下柳青丸以治其本

又方 枇杷葉 一兩去毛陰乾新者佳 梔子 苦參 蒼朮 米

浸各等分 共為末每服三錢空心服先退左紅臨睡

服先去右邊

一方用硫磺一兩白果燒灰一錢琥珀三分輕粉五

分白礬五分各為末燒酒一碗入酒浸藥封固重

湯頓一二時放冷日用燒酒塗夜用沉底藥塗妙

檳榔散 治鼻赤

硫磺 檳榔各等分 片腦少許 共爲細末用粗絹

帛包時時于鼻上擦磨妙。又加草麻子肉爲末。油調臨睡擦。

一法硫磺入大菜頭內煨礮塗之。或以白礬研末。洗時置掌中酒滴擦患處數日卽白鹽亦可。

烏犀丸

烏犀角鎊 羚羊角鎊 牛黃研 柴胡淨各一兩 丹砂研

天門冬焙 貝母 胡黃連 人參各半兩 麥冬去心

知母各七錢 黃芩 炙甘草各二錢五分 共爲末煉

證治大還

醫學近編 鼻 十 貞白堂

蜜九桐子大每服二十九空心溫酒下。

椿根湯

椿根一升 葱白半升 豆豉半升 鹽半合 川椒去目

日者妙出 共一處醋及清泔各三碗煎一花分汁一合

三次服有惡物下卽効。小兒量大小加減。

烏香散

草烏燒灰 麝香研各等分 研極細以少許貼瘡上。

人參順氣散

治感風頭痛鼻塞聲重一切上焦風熱先用此疏通氣道卽理中湯加乾葛苦梗川芎

厚朴陳皮白芷麻黃薑棗煎服或加葱白

葫蘆酒 治鼻塞眼昏頭疼腦悶

右取苦葫蘆子搗碎酒浸春三夏一秋五冬七日少少注鼻中一方用童便浸。

黃藥苦參檳榔爲末猪脂調傅。

鼻痛風火鬱于上則痛初宜升麻葛根白芷散之有氣道壅而痛人參順氣散。

鼻諸內服烏犀丸 甘露飲 黃連

外治地黃煎辛萸膏 杏仁青黛

證治大還

醫學近編 鼻 十 貞白堂

鼻疳蝕 椿皮湯 烏香散

鼻塞眼昏疼痛濕在上也苦菊

齒痛

齒痛悉屬胃火熱極生風則齲腫痛風熱鬱久亦或生蟲未知如方士所取之大蟲也不知熱勝則肉腐非蛀也暮年齒動疎豁屬腎衰其或相火上炎亦令人痛兩尺必洪大而虛宜培腎陰齒縫脹亦屬陰虛六味九佳右寸關脈洪弦屬腸中風熱作有餘治。

上下牙痛不可忍牽引入腦或喜寒惡熱脈洪數有力者涼膈散倍酒蒸大黃瀉之稍緩乃以清胃散

證治大還

醫學近編 齒痛 卷之四

一

貞白堂

加減胃火清自止

牙根腫痛延及兩腮先以辛涼發散後用涼膈散解之

胃中實熱太甚口臭不可近牙根疳蝕脫落血出乃恣食肥甘美酒肉食所致古方用禹功丸余以為不若清胃散加茵陳香薷少佐白豆蔻妙先須用熟大黃瀉一二次妙陽明之濕熱去則牙床清寧而齒自安固矣。

胃熱齒痛口臭用黃荊條大者煮瀝入薑汁少許時

時嚙嗽

丹溪曰牙大痛必用胡椒華撥能散其中浮熱兼以升麻寒水石佐以辛涼薄荷荊芥細辛之類。

牙痛用清涼藥轉痛者從治之。

華撥 川椒 薄荷 荊芥 細辛 樟腦

青鹽 共為末擦牙上

潔古方 治牙痛不止。

露蜂房 川椒 去目 為粗末煎漱禁言語。

牙痛百藥不効 用荔枝殼包青鹽燒灰存性擦牙。

證治大還

醫學近編 齒痛 卷之四

二

貞白堂

痛處累驗 一云荔枝核亦可。

丹溪方 用茱萸煎酒含之佳。

東垣臧鬼散 治牙痛常吸風涼乃止屬胃中濕熱

用黃連梔桐淚之苦寒薄荷荊穗之辛涼四味相

合作風寒之氣治其濕熱升麻引入陽明經齒為

骨之餘以羊脛骨灰補之為佐麝香入肉為引共

細末擦牙神効外以調胃承氣湯去硝加黃連以

瀉腸胃中濕熱行三二次更屏厚味永不再舉梔

桐淚清涼太妙第難得耳。

出山

清胃散 治厚味炙博酒麵過度積毒上攻或過服

補味暖藥致牙痛用此清之甚者加大黃石膏

生地黄 二分 升麻 一錢 牡丹皮 五分 歸身 三分

黃連 六分 夏 水煎服

一方齒斷宜露而痛生地黄一兩木臼內搗入鹽二

合和之外用白麵裹可厚二寸煨于煆火中以烟

斷為度去麵加麝香一分研末用少許貼牙床上

一方 用香附炒黑三分炒鹽一分指齒妙

青龍散 治同清胃散

醫治大選

醫學近編 齒痛 三

貞白堂

大黃 香附 各燒灰存性入青鹽搗勻擦牙

擦牙方

青鹽 四兩

歌石膏 半升

白芷

香附末

各三錢

右為細末早晚擦牙

又方 骨碎補大黃各四兩燒灰存性青鹽二兩石

膏四兩為末擦亦佳更能烏髮

一方用蒲公英燒灰香附末白芷青鹽為末擦

升麻 當歸龍膽散 治寒熱牙痛

升麻

麻黃 各一錢

生地

白芷

羊脰骨灰

各五分

磨草 黃連 各一錢 歸稍 五分 草豆蔻 一錢

右為末擦牙

蟲牙蛀空作痛 用黃蜂巢一個以川椒填滿其窠

更以白鹽一錢封口燒存性入香白芷羊脰骨灰

各一錢同研為細末先以茶清漱口淨後以此藥

擦之及傳蛀處

牙痛用絳雪碧雪擦是治標也內必瀉胃火或花椒

雄黃白芷為末擦一錢

疳風散 治諸牙痛

醫治大選

醫學近編 齒痛 四

貞白堂

貫衆 鶴虱 荊芥 各等分

每用二錢川椒五十

粒水煎漱口吐去極効

蒼耳子煎湯含漱亦妙

牙牙散 去風冷 齲宣露之症甚効

槐枝 柳枝 各長四寸

皂角 不蛀者 鹽 五錢

入磁罐中鹽泥固濟糖火燒一夜候冷取出研細

早晚擦牙

甘露飲子 治男婦胃中客熱口臭齒根腫悶宜露

心中煩饑不欲食咽中有瘡並治

黃芩 天門冬 麥門冬 枇杷葉 甘艸

枳殼 生地 茵陳 石斛 熟地 煎服先漱

腎水弱。火盛膏粱積熱。釀毒于中。毒隨經血入于齒

中則痛。先須瀉火以治其標。久之必培腎陰。慎口

絕慾。使水升火降。自無齒病。方中用升麻白芷杜

丹皮者。引陽明經也。用細辛獨活羌活荊防草寇

華撥者。散浮熱鬱火也。用川椒鶴虱蜂房雄黃貫

衆者。殺蟲解蝕也。石膏大黃木律木黃連生地薄

荷者。降火清胃也。用青鹽滋腎。羊脛補骨。至如早

證治大選

醫學近編 齒痛 五 貞白堂

蓮沒石故紙首烏。固齒兼烏鬚也。或服。或擦。或漱。

或含。無非辛散苦降殺蟲固本。神而明之。存乎人。

味者執一法欲兼治。恐難取效。一法用蟾酥銀珠

摻和黍米大塞痛處。引濃涎數口愈。又法用川烏

末點痛處。與蟾酥意同。不過取一時麻住不痛耳。

一切齒病。久之必培陰水補腎氣。則火自降。六味地

黃丸加減最妙。

一法牙動。謠蒺藜燒灰一味摻妙。

青鹽固齒。滋水也。食鹽亦妙。

齒齒悉屬濕熱。惟分虛實耳。一法用郁李根煎湯漱之。冷即易。

猪牙皂角。及生薑。西國升麻熟地黃。木律旱蓮槐角

子。細辛。荷葉。要相當。青鹽等分。同燒燬。研細。將來

用最良。指齒。半牙。髮黑。誰知世上有仙方。

按西國。即沒石子。

蛀牙 用新燒石灰蜜丸。塞蛀孔中。痛立止。

齒縫中。出血不止。用燒鹽竈穴煤二物。研勻。擦牙

妙。鹽勝血。血見黑。則止。

證治大選

醫學近編 齒痛 六 貞白堂

牙疳方 用五倍子炒焦。銅青明礬各二兩。麝少許。

研末。鹽湯醋洗淨。搽之。

土地散 治牙痛不牢

地骨皮 白芷 升麻 防風 細辛 川芎

槐花 當歸 藁本 甘艸 煎湯熱漱。冷吐

去亦可服。

血竭散 治牙疳并惡瘡。久不瘥。如神。

寒水石 燒熱四兩 龍骨一兩 蒲黃二兩 血竭五錢 枯白礬一兩

共爲末。用少許。搽之以紙封。

一方 治走馬牙疳

黃柏 藜蘆 石膏 銅青 膽星 麝香 少許

龍骨 病急多加 共為末每五分搽

男子八歲腎氣實而齒更三八其牙生五八則齒稍

八八而齒去矣女子亦然以七為數蓋腎主骨齒

乃骨之餘隨之所養也故隨天癸之盛衰也足陽

明之支者入于上齒手陽明之支者入于下齒若

骨髓不足陽明脉虛則齒之諸病生矣何以言之

陽明金也齒屬腎水也陽明之支入齒間此乃母

證治大選

醫學近編

齒痛

七

貞白堂

氣榮衛其子也故陽明實則齒堅牢陽明虛則齒

浮動所以齒痛者乃陽明經有風冷濕熱之邪乘

虛而入聚而為液為涎與齒間之氣血相搏擊而

痛也若熱邪壅盛則腫而痛也熱不盛則齒斷微

腫而根浮也有蟲牙痛者由濕熱生蟲蝕其根而

作痛也有齒間血出者由陽明之支有風熱之邪

入齒斷搏于血故血出也有齒齲者亦以陽明入

風熱之邪搏齒斷氣血腐化為膿出臭汗謂之齒

齲亦曰風齲有齒齲者是蟲蝕齒至斷膿爛汁臭

也。有齒挺者由氣熱傳入脉至齒斷間液沫為膿

氣血竭肉斷消故齒根露而挺出也有齒動搖者

陽明脉虛氣血不榮故齒動搖也有齒歷盡者由

骨髓氣血不能榮盛故令牙齒黯黑謂之歷齒其

齒黃黑者亦然以此而言豈非諸齒病皆因陽明

之所致哉

薛新甫曰濕熱甚而痛者承氣湯下之輕者清胃散

大腸熱而齲腫痛者清胃散重則加大黃六鬱而

痛者越鞠丸中氣虛而痛者補中益氣湯思慮傷

證治大選

醫學近編

齒痛

入

貞白堂

脾而痛者歸脾湯腎經虛熱而痛者六味丸補之

經虛寒迫火上炎而痛者還少丹重則八味丸

其屬風熱者獨活散不愈齒陳散大寒入腦者菴

活附子湯病原非一因時制宜可也風雨寒濕

之氣犯腦項筋急齒痛菴活散冬月犯寒腦痛齒

亦痛麻黃湯或加細辛白芷不可用涼藥

獨活散 治風毒牙痛或牙齲腫痛

獨活 羌活 川芎 防風 各五分 細辛 荆芥

薄荷 生地黃 各二錢 每服三五錢水煎漱嚥妙

茵陳散 治牙齒腫痛及骨膈風熱

茵陳 連翹 半夏 荊穗 麻黃 升麻

黃芩 麝香 二活 牡丹皮 大黃 薄荷

蠶絲 各二錢 細辛 五錢 牽牛 一兩 爲末每服三錢水一

盞先煎熟下藥攪勻急瀉出食後連滓服

麻黃散

麻黃根 羊脰骨灰 龍膽草 酒炒 生地 各二錢

羌活 一錢 草豆蔻 當歸身 藥本 升麻

熟地黃 黃連 防風 各六錢 細辛 少許 共爲末擦牙

證治大還 醫學近編 齒痛 九 貞白堂

羌活附子湯 治冬月太寒犯腦令人腦齒連痛名

曰腦風爲害甚速非此莫救

麻黃 黑附子 炮各三分 羌活 蒼朮 防風

黃芪 一分 甘草 三分 升麻 白蠶蚕 炒各五分

黃蘗 白芷 各五分 咳嗽加佛耳草

水煎服

越鞠丸 見鬱門 補中益氣湯 見內傷門

歸脾湯 見癲狂門 六味丸 見虛損門

還少丹 見虛損門

口病

陳三農曰手足陽明之脈挾於口交於承漿人中太

陰開竅於口藏精于脾又少陽胆經之脈合缺

盆貫膈中凡脾胃有傷則口苦無味心事不決則

胆經受病而口苦故外受寒邪內傷飲食而口苦

邪氣實者表散而清解之久病體虛相火上炎飲

食無味而口苦者古人投寒涼不效用理中湯而

立驗蓋中氣虛極不制游行之火不得不遵從治

之法也甚則加附子肉桂焉

證治大還 醫學近編 口病 一 貞白堂

寸洪數心熱口苦寸浮數肺熱口辛弦數而虛膈虛

口苦洪數而實肝熱口酸關沉實脾胃有實熱口

甜兼洪數者口瘡或爲重舌木舌脈虛者中氣不

足

丹溪曰脾熱口甘三黃丸效此指實火而言若脾弦

滑兼膈雜屬痰火滾痰丸妙

口瘡多涎屬脾熱

平人口甜或渴或小便亦滑而濁俱屬津液不足陽

盛陰虛久之必發癰疽須斷厚味氣惱酒麵每日

服八味丸可保無虞

膽熱口苦謀慮不決所致小柴胡加麥冬酸棗仁地
有皮遠志隨症加減河間益膽湯治謀慮不決肝
膽氣上溢而口苦者神效用人參炙甘草黃芩各
一錢茯苓神苦參各七分遠志一錢官桂半分乃從
治虛火法也

寶火口瘡舌裂涼膈散妙脉數實有力者是

西口水亦妙無則燒瓜皮灰傳之

肝膽有實熱口酸苦小柴胡加甘草青皮之類甚者

證治大還

醫學近編

口病

二

貞白堂

當歸龍薈丸

謀慮不決肝膽虛而口苦小柴胡人參遠志茯苓甘

艸為君胡膽艸為佐甚者錢氏地黃丸乃虛則

補其母也

口淡屬脾熱亦有虛實病後自是胃虛參朮為主

勝熱移熱于小腸腸腸不便上為口糜生瘡潰爛

壅熱水穀不化此條出素問東垣有柴胡地骨

皮湯云治此大便實者加硝黃世未知用姑伏來

者飲酒多此易老用五苓導亦相合服之

胡氏方 用好墨研螻蛄極細傳之立效按此治勝
熱移熱于小腸之正治也螻蛄專走水道有餘者
宜虛人戒之

口瘡甚者含焰硝礬砂勿開口外用南星末醋調貼
足心湧泉穴以引熱下行

又方 用五倍子一兩黃柏蜜炙滑石各半兩銅絲
半兩麝香為末搽之 一法五倍子煎湯漱或加

白礬膽礬

治唇緊裂生瘡用青皮燒灰傳之立愈 又方以皮

證治大還

醫學近編

口病

三

貞白堂

紙紙擦于刀上蘸取瀝傳妙口糜破野薔薇根

煎漱之

口瘡不愈枯礬 黃丹妙 鹽霜梅燒存性各一錢

人中白錢半麝少許研極細搽之甚者加礬砂半

錢片腦一分

赴筵散 治赤白口瘡神效

黃柏 青黛 蜜陀僧 各等 共為末乾貼瘡上

黑參丸 治久口瘡

黑玄參 天門冬 麥門冬 俱去心各 共為末

蜜丸彈子大每服一九線裏噙口中嚥津液

既濟丹 治暴起口瘡

乾薑 黃連各等分 共爲末搽之流涎即愈

升麻散 治上焦壅毒口舌生瘡咽喉腫痛服涼藥

不效宜升散之

升麻 人參 礪砂 焰硝 生甘艸 共研極

細末傅之喉痛用吹

赤口瘡

白礬 沒藥 乳香 銅錄 爲末搽之

證治大還

醫學近編 口病 四 貞白堂 卷之四

白口瘡

雄黃 沒藥 乳香各一錢 輕粉一錢

一方有巴霜一錢用者當酌之如上法

小兒口瘡不下食以礬湯浸足更以黃柏蜜製蠶蚕

炒爲末傅之

柳花散 治口舌生瘡

玄胡索一兩 黃柏 黃連各半兩 蜜陀僧 青黛錢

共末搽瘡上有涎吐去

口疳臭爛當清胃火外用橄欖燒灰存性爲末先用

米泔水洗淨後搽上藥

口瘡有實火有虛火膏梁厚味釀毒上攻心火上炎

脉數實有力者實火也涼膈加減或三補元金花

丸傳線袍散蜜藥散外用細辛黃柏末傅之胡氏

以好墨研蟬蛻極細傅之力峻氣猛惟實火則可

勞碌費心食少不眠虛火上炎氣口脉大而虛虛火

也理中湯參朮甘艸補中氣薑附散虛火接引下

行且助補劑成功又有下焦元陽虛冷迫火炎上

成口瘡者用巴戟白芷高良薑末猪腰子煨服有

證治大還

醫學近編 口病 五 貞白堂 卷之四

用丁香松脂胡椒細辛末蘇木湯調塗瘡上及不

任食者有用當歸附子白蜜含嚥者有用生附塗

脚心者有用吳萸末醋熬膏入生地龍末塗足心

者皆是治龍火按陽虛不能上騰下焦虛火泛上

故用熱劑或散或降接引下行也方書虛寒迫火

上攻似太鑒

薛新甫曰口瘡屬上焦實火中焦虛寒下焦陰火各

隨傳變所致如發熱作渴喜冷脉數實實熱也瀉

膈加減倦息食少勞役人脉虛大中空虛也輕

則補中益氣湯重則用六君子湯。飲食少思大
便不實人參理中湯。手足逆冷肚腹作痛中氣
虛寒也附子理中湯。肺熱內熱不時而熱血虛也
八物加丹皮五味麥冬發熱作渴唾痰小便頻數
腎水虧也加減八味丸食少便滑面黃肢冷火衰
土虛也八味丸日晡發熱或從腹起陰虛也四物
參朮五味麥冬不應加減八味丸若熱來復去晝
見夜伏不時而動或無定處或從脚起乃無根之
火也亦用前丸及十全大補加麥冬五味更以附
子末唾津調搽湧泉穴若緊用涼劑損傷真氣為
害非輕

口臭

年高水弱奉養太過厚味及服食補陽藥口糜臭不
可近甘露飲妙及濃煎香薷汁含之徐徐嚥下口
中如膠而臭知母地骨皮桑白皮山梔麥冬甘艸
鹽煎湯噙下起早汲第一汲水含漱吐廁中心氣
不足益智子加甘草為末煎湯壯盛人涼膈散一
二服佳痰壅氣濁而臭宜鹽湯探吐

證治大還

醫學近編

口病

六

貞白堂

證治大還

醫學近編

口病

七

貞白堂

繭唇

謂唇腫如繭也

上唇俠口屬手陽明大腸經下唇俠口屬足陽明胃
經燥則乾熱則裂風則潤寒則揭若唇腫起白皮
皸裂如繭繭名曰繭唇有唇腫重出如繭者有本
細末大如繭如瘤者或因七情動火傷血或因心
火傳脾經或因厚味積熱傷脾大要審本證察兼
證補脾氣生脾血則燥自潤火自除風自息腫自
消若患者忽略治者不察妄用清熱消毒之藥或
用藥線結去反為翻花敗症矣唇虛繭時出血
水內熱口乾吐痰體瘦宜濟陰地黃丸肝經怒
火風熱傳脾唇腫裂或患繭唇宜柴胡清肝散或
加芍藥川芎柴胡可治脾胃肝膽經熱風熱傳脾
唇口皸或頭目眩四肢浮腫如風狀宜羌活散
風熱客于脾唇燥裂無色宜瀉黃散子中氣傷損
唇口生瘡惡寒發熱肢體倦怠宜補中益氣湯思
慮傷脾血耗唇皸宜歸脾湯意思過度蘊熱于
脾瀉裂無色唇燥口乾生瘡年久不愈內服五福

化毒丹外用橄欖燒灰末。豬脂調塗。或用核中仁細研傳之。又硫黃白礬灰。朱砂水銀麝香黃蘗爲末。和水銀磁器中。臘月豬脂和如泥。光淨拭唇。卻以膏塗之。又八月藍葉絞汁洗。不過二日瘡。又訶子肉五倍子等分爲末。乾貼。又黃連一分。乾薑半分。炮爲細末。傳之。又大銅錢四文。石上磨。以豬脂磨取汁塗。又蛇蛻灰。晚蠶蛾末。油調敷。又以甌滴下汗傳之。白荷花辦貼之。皆効。

瀉黃飲子 治風熱在于脾經。唇燥裂無色。

諸治大還

醫學近編 口病 八 貞白堂 卷之四

白芷 升麻 枳殼 黃芩 防風 各一錢

半夏 薑湯炮七 石斛 一錢 甘草 七分

水二鍾薑三片煎八分食後服

五福化毒丹 治上焦熱毒唇舌生瘡腫破煩渴。

玄參 桔梗 各二 人參 半兩 茯苓 兩半 馬牙硝

青黛 麝香 三分 甘草 七錢半

右爲極細末。研勻煉蜜丸。皂子大。金箔四十張爲衣。每一丸。或二丸。薄荷湯下。

舌

陳三農曰。舌乃心之苗。開竅於舌也。故心家有熱。火盛。舌乾而腫。破黃連瀉心湯。只治少壯。脉洪大有。力者。餘則加減用之。

右脉虛大。四肢倦怠。而舌瘡破不愈。屬勞役過度。虛火炎上爲患。補中益氣湯主之。

酒客膏粱。積熱內盛。上焦痰實。舌腫脹。防風通聖散。或涼膈散瀉之。須脉實有力。氣壯乃可。

舌強腫如猪胞。以針刺舌兩邊大脉。血卽消。勿刺中。

諸治大還

醫學近編 舌病 九 貞白堂 卷之四

中央人血不止。乃以火燒銅筋烙之。或以雜草燒。

銅綉醋調傳舌上下。脫去。再傳。須臾卽消。此病人。

多不識。失治則死。凡舌腫。舌下必有如蟲形。有頭。

有尾。頭小白。可燒釘烙頭卽消。

喉舌之病。藥不能達。惟針刺出血爲上。急刺則可。

上焦痰熱壅遏。勢挾相火。則病速而危。毒氣結于舌。

下。復生一小舌。名子舌。但腫大而強。無小舌者。

名木舌。二者方書皆禁之。咽喉十八風。全拈于。

此大都痰火爲患耳。緩之用辛涼利氣化痰藥重。

者無如針刺。勞神不睡。口舌破者。自當安神養心。作心虛治。

經驗方 治舌腫大。塞口不能飲食。用真蒲黃一味。頻刷舌上。若能吃藥。即以黃連一味。煎濃汁呷之。以瀉心火。

舌上有竅出血不止。炒槐花末搽之。

熱病極者。多舌出。有病愈而不止者。冰片搽舌。即上。舌暴腫大出外。龜麻子油。蘸紙作捲。燒烟薰之。即消。牛舌病亦可。

醫治大還

醫學近編 舌病

十

真白堂

七情所鬱。則舌腫滿不得息。宜舒鬱清上焦。外烏星

薑末。貼于足心。心熱則裂而瘡。木舌重舌。宜三

黃丸。真蒲黃。擦之。或升麻湯。加苦參。桔梗。玄參。黃

芩。又白礬。大黃。朴硝。擦漱。又醋調五靈脂末。烏賊

骨。真蒲黃。末塗之。爛熱。則滑而胎。脾閉。則白胎

如雪。宜薄荷汁。白蜜。薑片。楷之。肝壅熱。則血上湧

宜蒲黃。或槐花末。搽之。服清肝藥。薛新甫曰。如

口舌腫痛。或狀如無皮。或發熱作渴。為中氣虛熱。

宜清熱補氣湯。若眼如薰鰻。體倦少食。或午後

益甚。為陰血虛。清熱補血湯。若咽痛。舌乾。口乾。足

熱。日晡益甚。為腎經虛火。六味丸。若四肢逆冷。

惡寒飲食。或痰甚。眼赤。為命門火衰。宜八味丸。

若發熱作渴。飲冷便秘。為腸胃實火。宜涼膈散。

若惡寒口乾。喜湯食少。體倦。為脾經虛熱。宜加味

歸脾湯。若舌本強。腮頰腫痛。為心脾壅熱。宜玄

參升麻湯。痰盛作渴。口舌腫痛。為上焦有熱。宜

清熱化痰湯。若思慮過度。口舌生瘡。咽喉不利。

為脾經血傷火動。宜加味歸脾湯。若悲怒過度。

口苦舌腫。為肝經血傷火動。宜小柴胡加丹皮山

梔虛者。八珍加柴胡丹皮。甚者加炮薑。

舌出不收

心經熱甚。及傷寒熱毒攻心。及傷寒後不調。擬往往

有之。宜珍珠末。冰片等分。傅之。或用巴豆去油。取

霜。用紙卷之內鼻中。舌自收。婦人產後舌不收。

以硃砂末。傅其舌。乃令作產子狀。以二女掖之。乃

于壁外。累盆盎。置危處。墮地作聲。聲聞而舌上矣。

開口角涎不止。牛黃清心丸。佳。有喜睡者。二水

醫治大還

醫學近編 舌病

十一

真白堂

二陳苓連梔柏加竹瀝薑汁妙。病後喜睡、胃口寒也。六君子加益智或理中湯。

清熱補氣湯 治中氣虛、虛火泛上、口舌無故皮破或發熱作渴、或勞神不睡、有此四君子加五味麥冬、玄參歸芍升麻水煎服。甚則加炮薑不應加附子。右寸脉必虛大。

清熱補血湯 治口舌生瘡、體倦食少、日晡益甚、或日瀝熱、脉細數、四物加黃柏知母玄參五味子牡丹皮柴胡麥冬水煎服。如不應、補中益氣湯加五

證治大還

醫學近編

舌病

士

貞白堂

味子

玄參升麻湯 治心脾壅熱、舌上生瘡、木舌舌腫、或連頰兩項腫痛。

玄參 升麻 犀角 赤芍 桔梗 貫眾 黃芩 甘草 各等分水煎食遠服

清熱化痰湯 治上焦有熱、痰盛作渴、舌腫痛。

目母 花粉 枳實 桔梗 黃芩 黃連 各錢二分 玄參 升麻 各七分 甘草 五分 水煎服

六味九 八味九俱見虛損門。涼膈散見火。加味歸脾湯原方加當歸山梔丹皮。

陳氏醫學近編 卷之五

雲間陳 治三農甫述 男

杙幾先 師柴羔愚 恭

長白石文煊南明甫定 門人

范 崧壽民 王 顯贊皇 校

霍亂

微而澁代而散隱而伏、大而虛右關滑者霍亂氣口弦滑為食積、痰弦為腹痛、沉細遲為寒、實大數為實、脇痛、脉弦為肝乘脾、浮洪者易治、微遲氣少不

證治大還

醫學近編

霍亂

一

貞白堂

妨

霍亂者謂揮霍之間忽致撩亂也。其症心腹絞痛吐瀉暴作、煩渴轉筋、入腹則悶絕是也。蓋邪在上焦則吐而不瀉、邪在下焦則瀉而不吐、邪在中焦則吐瀉並作。皆由食後或飲冷水、或冒風寒致熱邪內鬱胃氣不行故清濁不分、亂於腸胃、乃為霍亂也。治宜溫中須分寒熱更詳所因用藥因風則惡風自汗、遍體轉筋、因寒則無汗惡寒、唇青肢冷、因

暑則煩熱溺瀉氣粗口燥因濕則倦怠重着骨節

煩疼因食則腹滿填脹痛不可按因氣則痞悶噎

塞氣不能舒大抵手足逆冷寒多不飲水者香砂

理中湯門本手足煩熱熱多欲飲水者加味五苓散

門本風寒外束則頭疼身熱體痛怕寒藿香正氣

散藿蘇芷蒼桔陳暑濕相搏則先吐

後瀉煩熱昏沉二香散門本氣聚痰涎者二陳加

香附青皮柴蘇木香厚朴食傷胃氣者平胃散

蒼陳加砂仁麴藥半夏生薑青皮邪氣散而榮衛

證治大還 醫學近編 霍亂 二 貞白堂

調和其轉筋煩渴自然止矣若霍亂後吐不止

者由吐利過多胃虛氣上逆也宜參朮半夏橘皮

竹茹生薑利不止者由吐利後脾虛氣下陷也

補中益氣湯參朮芪州吐利已止而煩渴不已

者津脫而虛煩也參苓竹葉麥門冬五味子吐

利已愈而轉筋悶絕者暑邪未散而血熱也木瓜

煎加黃連扁豆門本吐利已止而胸滿不快者宿

食未盡也溫中湯加砂仁藿香吐利已止而身

痛不休者表邪未解也參蘇飲蘇葛前杏桔穀桑

加羌活吐利已止而肚腹疼痛手足逆冷飲食

不入者因吐瀉而陽氣暴脫變為陰寒之症也理

中湯參朮乾加附子以回陽切忌寒涼之劑

王遜菴云霍亂由風濕噤三氣合而為邪蓋濕土為

風木所尅鬱則熱乃發發則心火炎上故嘔吐嘔

吐者噤也脾濕下注故泄瀉泄瀉者濕也風急甚

則轉筋轉筋者風也以脾胃之濕為本諸邪感動

為病之由吐瀉之后甚則轉筋此兼風也手足厥

冷氣少唇青此兼寒也身熱煩渴氣粗口燥此兼

證治大還 醫學近編 霍亂 三 貞白堂

暑也四肢重着骨節煩疼此兼濕也治法濕勝中

滿霍亂吐下宜五苓散白朮赤茯苓猪桂體痛怕寒吐瀉

厥逆理中湯參朮乾土虛風勝霍亂發泄轉筋急

痛桔苓白朮散門本熱勝身熱吐下煩渴香茹飲

甘暑熱相搏煩渴悶亂二香散門本

陳三農云霍亂吐多消痰為主瀉多和中為主腹痛

溫中為主吐瀉水食並下完穀不化屬于寒宜理

中丸煩燥作渴出黃如糜吐中有痰瀉出甚臭屬

于熱燒針丸硃砂黃丹各一兩枯礬五錢共研

性元米乾霍亂用鹽湯探吐切勿飲米湯反助其邪致立斃也。飲薑湯立斃者由寒熱相搏故也

霍亂轉筋

按霍亂轉筋呂氏論暴吐暴下津液頓亡宗筋失養劉氏論寒熱不調陰陽相搏筋失所榮一公之論皆非也此症俗屬肝經風火燥筋所致蓋吐瀉亡其津液則暑熱入于血分血得熱則筋急況脾胃虛則肝木自盛風火相燥則筋急而攣痛此勢之必然也但初起即便轉筋者由血中素有火熱被證治大還

醫學近編 霍亂 四 貞白堂 卷之五 三〇五

風寒外束榮中之熱內鬱故筋爲之轉急也宜藿香正氣散霍蘇正蒼桔亮陳皮朴腹皮半州姜加柴胡吐瀉後轉筋者宜木瓜煎門本加柴胡黃芩古人云霍亂轉筋男子以手挽其陽女子以手牽其乳陽爲宗筋所聚乳乃厥陰所經其屬肝經之症也明其矣霍亂轉筋用木香末一錢木瓜汁一盞熱酒調服

霍亂煩渴

上吐下瀉津液頓亡內有鬱熱故煩渴也欲飲水者宜二香散門本及香薷飲或茯苓澤瀉湯門本辛散甘

緩近見飲熱薑湯及吳茱萸湯頓亡者由其辛熱助火故也內有宿食濕熱作渴平胃散加麴蘗砂仁半夏滑石澤瀉

丹溪云霍亂內有物所積外有邪所感清陽不升濁陰不降乖隔而成非因鬼邪皆飲食所致治須引清氣上升濁氣下降散風行濕兼分寒熱無有不安病作之時切不可與穀氣雖米湯飲之立死必待腹痛止吐瀉定方可與穀食

陳三農云吐利不止元氣耗散病勢危篤水粒不入

證治大還 醫學近編 霍亂 五 貞白堂 卷之五 三〇六

或口渴喜冷或惡寒戰掉手足逆冷或發熱煩躁欲去衣被此蓋由內虛陰盛却不可以其喜冷欲去衣被爲熱宜理中湯參朮乾姜附子甚則加附子不應四逆湯參朮乾姜附子金須冷服

醫按

薛立齋治一人冒暑霍亂足指足跟俱轉筋甚惡用香薷飲一劑下咽即安

王宇泰治一老人暑月霍亂昏冒不知人脉七八至洪大無力頭熱如火足寒如冰半身不遂牙關緊

急此年高氣弱不任暑氣陽不維陰即瀉陰不維陽即吐陰陽不相維則既吐且瀉也正值暑氣極盛之時非甘辛大寒之劑不能泄其暑熱陰其陽煩而安神明遂以甘露飲甘辛大寒瀉熱補氣加茯苓以分陰陽冰水調灌漸愈。

治一婦患吐瀉十餘日水粒不入發熱煩躁欲去衣被六脉浮洪重按全無用六君子加藿香砂仁附子冷服諸症悉愈。

加減霍亂湯。治內傷飲食外感風寒吐瀉轉筋。

證治大還

醫學近編 霍亂 卷之五

六

貞白堂

紫蘇 蒼朮 白芷 藿香 半夏 陳皮

厚朴 白朮 茯苓 猪苓 澤瀉 肉桂

砂仁 甘艸 青皮 大腹皮 生薑 腹病加

吳茱萸 轉筋加木瓜 食滯加山楂 藳陳香附

心下痞加枳實 冒暑加香薷 陰虛壯熱

加柴胡 葛根 煩熱加門冬 竹葉 頻頻登廁而

不通利加枳殼。

二香散。治濕熱相搏霍亂轉筋煩渴悶亂。

藿香 香薷 半夏 陳皮 大腹皮 桔梗

茯苓 白朮 紫蘇 白芷 黃連 厚朴

扁豆 甘艸 生薑 葱白

加味五苓散 治手足煩熱渴喜冷水

猪苓 茯苓 澤瀉 白朮 肉桂 滑石

麥門冬 甘艸

桂苓白朮散 治風濕相搏霍亂轉筋急痛腹滿痛

悶。

桂枝 葛根 人參 茯苓 白芍 甘艸

石膏 滑石 木香 寒水石 藿香 澤瀉

證治大還

醫學近編 霍亂 卷之五

七

貞白堂

白湯或新汲水調服三錢

香砂理中湯 治四肢逆冷寒多不喜飲冷

人參 白朮 乾薑 甘艸 藿香 陳皮

半夏 茯苓 砂仁 洞泄清水通身冷汗脈弱

不能言吐逆不止加附子肉桂

桂苓甘露飲

子和

肉桂 藿香 人參 木香 茯苓 白朮

甘艸 澤瀉 葛根 石膏 滑石 寒水石

為細末白湯下三錢

香茹飲 治人 治暑月霍亂吐利。心腹撮痛。大渴煩

躁。四肢逆冷。冷汗自出。轉筋急痛。

香茹 四兩 厚朴 姜炒各二兩 甘草 五錢 每四錢水煎

頓井中極冷服。

木瓜煎 治吐瀉已止。但暑熱入血分。轉筋不已。

木瓜 三錢 生地 二錢 當歸 黃連 扁豆 生薑

加香茹更妙。

加減四物湯 治吐瀉已止。血熱轉筋。

川芎 當歸 白芍 生地 木瓜 紅花

證治大還 醫學近編 霍亂 卷之五 八 貞白堂

酒苓 荊芥

麥門冬湯 治吐瀉已止。煩渴不已。

麥門冬 竹葉 人參 茯苓 烏梅 甘草

小麥

三聖散 治吐瀉立止。

丁香 五分 肉果 七分 白朮 錢 薑湯調下

燒針丸 治吐瀉作渴。

硃砂 黃丹 各一兩 枯礬 錢五 共研棗肉丸如圓

眼大用針插定燈上。燒存性。元米湯調下。

三神丹 治吐瀉。

白芷 乾薑 等分 爲末。置臍中。油紙蓋之。熱鞋

底熨。

茯苓澤瀉湯 三因 治霍亂煩渴飲水。

茯苓 八兩 澤瀉 四兩 白朮 三兩 甘草 炙 桂心 各二兩

每四錢薑三片煎。

三因七氣湯 治七情鬱結致臟氣刑尅。陰陽反戾。

致生吐瀉寒熱痞悶咽塞。

半夏 厚朴 紫蘇 茯苓 白芍 橘皮

證治大還 醫學近編 霍亂 卷之五 九 貞白堂

桂心 人參 生薑 大棗

人參散 治脾胃虛寒吐瀉。心煩腹痛飲食不入。

人參 厚朴 橘紅 各一錢 當歸 乾薑 各八分

甘草 炙八分 棗水煎。

人參白朮散 治脾胃虛弱吐瀉作渴不食。

人參 白朮 茯苓 甘草 木香 藿香

葛根 各等分 水煎入薑汁服。

訶子散 治心脾冷痛吐瀉不止。

訶子 厚朴 乾薑 草果 良薑 茯苓

神麴 麥芽 甘草 食鹽

治轉筋 以扁豆葉搗汁入醋或梅醬少許飲之或用梔子燒末湯下。

急救治霍亂嘔吐不止諸藥不納用新汲水半碗入沸湯半碗和勻服之。

灸法 霍亂吐瀉不止灸下四穴。

天樞 二穴在臍兩旁各開二寸 中脘 一穴在臍

氣海 一穴在臍下一寸半

霍亂已死胸中尚有暖氣鹽填臍中灸百壯自甦。

證治大還 醫學近編 霍亂 十 貞白堂 卷之五

霍亂 用桑葉濃煎湯飲之。

乾霍亂 十九

乾霍亂者忽然心腹痛甚欲吐利而不得吐利俗名絞腸痧是也皆由食後感寒飲冷以致寒濕太甚脾被縛而不能動氣因鬱而不能行關格陰陽壅閉正氣升降不通故心腹絞痛悶亂煩冤也丹溪云內有物所傷外有邪所遏死在須臾最難治療宜用宜吐吐中即有發散之意當用薑三錢鹽五錢同炒煎湯入童便服之少頃探吐吐後用厚朴

湯 頭痛惡寒加川芎蒼朮防風白芷惡心痛悶

加砂仁藿香炒麴青皮或以委中及十指頭出血

亦有痰鬱其熱者劉宗厚云濕勝飲鬱則吐利熱

勝痰鬱則悶亂亦用鹽湯探吐吐後以二陳加白

芥子撫芎香附薑汁薑炒黃連枳實。

王宇泰云乾霍亂由脾土鬱極而不得發以致火熱

內鬱陰陽不交故也治法不可過于攻過則脾氣

愈虛不可過于熱過則內火愈熾不可過于寒過

則火必悍格須反佐以治然後鬱可升食可出火

證治大還 醫學近編 霍亂 十一 貞白堂 卷之五

可散也惟炒鹽童便溫服此是良法。

醫按

治一婦暑月方飯後即飲水而睡睡中心腹痛極厥

冷上過肘腋欲吐利而不得吐利絞痛垂死六脉

俱伏此水寒鬱熱氣不得升降故也用鹽五六錢

炒紅入薑五錢搗碎同炒煎湯吐之一吐減半再

吐而安

厚朴湯 隱居 治寒濕鬱熱心腹絞痛

厚朴 一兩 薑 汁炒 桂心 枳實 少 蒼朮 炒各一錢半

炒薑二錢 炒鹽三錢 水煎服

溫中湯 治乾霍亂。心腹脹滿。絞痛不得吐利。脉沉欲絕。

厚朴姜炒 砂仁 乾薑 吳茱萸 肉桂 木香 香附 藿香 陳皮 枳殼 炙甘草 生薑

頭痛惡寒。加防風白芷川芎。

附子理中湯 治乾霍亂。厥逆脉脫。用此回陽。

人參 白朮 乾薑 附子炮 甘草炙

神效絞腸痧散

證治大還 醫學近編 霍亂 主 貞白堂

硃砂 雄黃 明礬 鎗銷各二錢 射香二錢 冰片二錢

華蔞三錢 金箔十二張。為細末。盛磁餅內。點睛明。穴眼潭內。男左女右。立愈。不可開口。合藥要誠。心。五月五日午時。不許婦人雞犬見。又名諸葛散。可治山嵐瘴毒。中惡等症。

海上方 治絞腸沙。腹痛甚。栗梗一握。打碎。煎湯。連飲三四盞。痛即止。 柳柳州 治乾霍亂。以鹽四錢。炒黃和童便。溫服之。得吐利。妙。 霍亂轉筋 用皂莢樹下泥。調水飲之。妙。 霍亂吐利。腹痛嘔甚。俱用高良薑。煎服即止。

脾胃 二十

緩而敦實者為正脉。右關弦肝乘脾。洪大心乘胃。浮澀肺乘脾。沉細腎乘脾。右尺微細。右關微弱。火衰不能生土。

東垣云。胃為十二經之海。主經管其氣。十二經皆稟其氣血。滋養一身。脾受胃之約。行其血氣。澆灌四旁。飲食不節。則胃病。胃病則氣短精神少。而生大熱。有時而顯火上行。獨燎其面。胃既病。則脾無所稟。受脾為死陰。不主時。故亦從而病焉。形體勞

證治大還 醫學近編 脾胃 主 貞白堂

役。則脾病。脾病則怠惰嗜臥。四肢不收。大便泄瀉。脾既病。則不能與胃行其津液。故亦從而病焉。脾胃既病。則陽氣不能生長。是春夏之令不行。五臟之氣不生。脾病則下流乘脾土。尅水則骨乏無力。是為骨蝕。令人骨髓空虛。足不履地。是陰氣重疊。此陰盛陽虛之候也。宜用辛甘之藥。助陽滋陰。兼用升浮之劑。使生長之氣旺。則病自愈。蓋脾胃虛弱。乃陽氣不足。陰氣有餘。當從六氣不足。升浮。浮沉。隨症用藥。以脾胃虛弱。不同餘臟。無定體。故

也。假如不能食而肌肉削本病也。右關脈緩而

弱本脈也。宜用參芪苓朮甘艸之類。如本部本症

脈中兼見弦脈。或見四肢滿悶。便難轉筋。淋瀝。一

二症。此肝之脾胃病也。當於本經藥中加風藥以

瀉之。若胸脇痛。口苦舌乾。往來寒熱。嘔吐多怒

腹中急痛。妄見妄聞。起妄心。夜夢亡人。便難。轉筋

等症。皆肝木太盛而為邪也。用柴胡防風羌活獨

活川芎細辛升麻芍藥肉桂甘草茯苓澤瀉滑石

黃柏知母以瀉之。若本部本症脈中兼見洪大

證治大還

醫學近編

脾胃

古

貞白堂

或肌熱煩熱面赤不能食肌肉消。一二症。此心之

脾胃病也。當於本經藥中加瀉心火之藥。若脾

胃脈中見浮大而弦。或病煩躁悶亂。或四肢發熱

或口苦舌乾。乃心與小腸火熱乘其土位。濕熱相

搏。故煩躁悶亂。脾主四肢而火熱乘之。故發熱。脾

胃虛乃血所生病。故口苦舌乾。宜苓連知柏生地

石膏芍藥甘艸以瀉之。或于心分補土之原。使土

生于火。兼于脾胃中瀉火之亢甚。先治其標。後治

其本。用參朮黃芪甘艸芍藥桑皮黃連之類。然心

火旺能令母實。肝木旺則扶火勢。無所畏懼而妄

行。脾胃受之。或為身體沉重。走注疼痛。因濕熱相

合。風熱鬱而不伸。附着于有形也。或多怒。或中風

或生癢。或生厥。或生瘡。或作腎癢。或為上熱下寒

皆風熱不得升長。木火過于有形中也。但宜用升

陽發越之劑。若本部本症脈中兼見浮澁。或見

氣短。上氣喘咳。痰盛皮澁。一二症。此肺之脾胃傷

也。當于本經藥中兼瀉肺之體及補氣之藥。若咳

嗽氣短。上氣。皮毛不能禦寒。精神少。而用酒漸寒

證治大還

醫學近編

脾胃

古

貞白堂

熱情慘不樂。此脾胃虛。土不能生金。陽氣不足。陰

氣有餘。體有餘而用不足也。宜于脾土中補肺之

源。兼于肺分以除其客氣。宜參朮芍藥橘皮青皮

桑皮桔梗桂枝甘草木香檳榔五味子之類。若

怠惰嗜臥。四肢不收。體重節痛。口苦舌乾。飲食無

味。大便不調。小便頻數。不嗜食。食不消。兼見肺病

洒淅惡寒。慘慘不樂。面色惡而不和。乃陽氣不伸

也。宜升陽益胃。宜參芪苓朮芍藥防風羌活獨活

柴胡橘皮甘草黃連澤瀉之類。若本部本症。脈

中兼見沉細。或見善惡欠之症。此腎之脾胃病也。當于本經藥中。加瀉腎水之浮。又瀉陰火伏藏之藥。若脾胃虛所勝妄行。水反侮土。作涎及清涕。唾多。溺多。而惡寒。土火復之。及三脉為邪。足不任身。足下痛不能踐地。骨乏無力。喜睡。兩九冷。腹陰陰而痛。妄見妄聞。腰脊背脾皆痛。宜乾薑附子肉桂烏頭蒼朮白朮澤瀉猪苓之類。若脉緩怠惰四肢不收。兼見大便泄瀉。此濕勝也。用平胃散加白朮茯苓。若胸膈痞滿。食難運化。不時作瀉。或食證治大還。醫學近編 脾胃 夫 貞白堂 卷之五 三百六

後倒飽吞酸。此脾胃虛寒也。香砂養胃湯。門 若食入則昏胃欲睡。得臥則食在一邊。氣暫得舒。足升發之氣不行也。升陽益胃湯。門 飲食雖食但食後則痞滿難化。此胃能納而脾不能磨也。化食養脾湯。門 或多食而肥。雖肥而四肢不舉。此脾實而邪盛也。和中丸。善食而瘦者。胃伏火邪。于氣分也。三黃丸。大黃 連芩 易飢易飽。大便燥難。此脾虛血燥也。四君子湯加當歸生熟地。大便滯隔一二日不去。致食少。食不下。此血少。血中伏火而不得潤。

也。用歸身生地麻仁桃仁條芩。或大便後有白膿。或只白膿。此勞役氣虛傷大腸也。黃芪人參湯。門 裏急頻見血虛也。加當歸。若飲入于胃遽覺至臍下。即欲小便者。由精氣不舒于脾。不歸于肺也。補中益氣湯。

陳三農云。凡病起于脾胃者。十有八九。脾傷則四肢不能用。倦怠無力。口不知味。身如火熱。冷汗自出。俱宜四君子湯。參朮 保元湯。參朮 草 陳東 加附子。澹泄自汗。嘔吐。脉微細無力。仍加乾薑半夏煨薑。急理證治大還。醫學近編 脾胃 七 貞白堂 卷之五 三百六

脾。雖雖症百出。亦不必治諸病。有吐瀉症。見莫忘脾胃。有雜症。以末治之。凡病見症雖多。有吐只宜止。吐有瀉只宜止瀉。吐後須用六君子。參朮 陳 調理瀉止。須用參苓白朮散。參朮 苓 蓮肉 白扁豆 薏仁 山藥 砂仁 結。調理。凡病一七後。或日久。陽虛無疑。因胃失生發之氣。即用保元湯。參朮 陳 乃甘溫退熱之聖藥。舍此亂投寒涼。妄滋陰降火。皆死無救。雖大便燥結。亦不可下下之。必發躁熱。胃主生發之氣。七情亦欲致傷。胃氣不思飲食。則生發之氣不行。脾胃

一傷四臟皆無生氣。而百病蠱起矣。故凡病症。多端。有似十二經俱病者。只從脾土上調理。為妙。凡用寒藥。甚不可多。熱藥。亦不可久。邪從虛至。溫補自除。病月餘。痰火不退。不必理痰。惟于脾胃上着力。為妙。身熱。不必清熱。只宜保元生脈。補中益氣。仍加桂附。辛溫除大熱。此乃先聖之格言。不特內傷為然。凡病皆宜理脾胃。調元氣。此係緊關。肯綮處。凡遇脾胃虛弱。當歸切忌。恐潤腸泄瀉。胃有火邪。宜養。不宜燥。胃無火邪。宜燥。不宜養。脾胃不足。常背其無陽。亦有陽亢熱不退。自汗怕寒。四肢倦怠。乏力。中虛表實。或潮熱自汗。皆不可離補中。正方表熱。加羌活。腹脹。附子和中散。加青皮。神效。調理。八珍湯。氣血兩虛。十全大補湯。陰虛火動。脈洪大而不作渴。六味九。加入參。洪大無力。加桂。惡寒。八味九。腹痛。理中丸。虛損。虎潛丸。倘病顛倒。難明。只從脾胃。調理為上。

醫按

治一貴婦咳嗽泄瀉。咳嗽甚。則泄瀉少愈。泄甚則咳。

嗽畧可。午前微寒。午後微熱。此皆脾胃虛弱。痰涎隨虛火上潮。則嗽甚。而泄止。痰涎隨虛熱而下注。則泄甚。而咳止。不必治其諸症。但補養脾胃。自愈。用保元湯。加炒松花。乾薑。五味子。破故紙。八劑而咳嗽寒熱皆除。又入劑而泄止。

飽吞酸。食不化。

人參 白朮 茯苓 砂仁 藿香 甘艸

半夏 陳皮 乾姜

證治大還 醫學近編 脾胃 卷之五 貞白堂

化食養脾湯 治脾虛不能運化。食物停滯。痞悶不快。

人參 白朮 茯苓 砂仁 神麴 麥芽

山楂 陳皮 半夏 甘艸

香砂和中湯 治食滯脾胃。嘔吐。胸滿。噯氣。腹脹。

藿香 砂仁 蒼朮 厚朴 枳實 半夏

陳皮 青皮 茯苓 甘草

升陽益胃湯 治脾胃虛。怠惰嗜臥。兼見肺病。酒漸惡寒。慘慘不樂。四肢不收。面色惡而不和。乃陽氣

不伸也。

人參 白朮 黃芪 甘草 芍藥 防風

羌活 獨活 柴胡 半夏 橘皮 茯苓

澤瀉 黃連

調中益氣湯 治脾胃虛弱臥無力四肢倦怠身體

沉重肢節煩疼難以屈伸或上飲下瀉或大便秘

滯或口失滋味腹難轉伸不思飲食。

人參 黃芪 甘艸 蒼朮 柴胡 升麻

橘皮 木香

證治大還

醫學近編 脾胃

三

貞白堂

參朮調中湯

治內傷自利脘腹脹痛肢體倦不喜飲

食食即嘔足腫冷

人參 白朮 黃芪 當歸 益智 厚朴

草豆蔻 木香 神麴 麥芽 陳皮 甘艸

醒脾湯

治脾氣不醒食物隨食隨厭

生半夏

煨薑 各三錢 陳皮 二錢 人參 一錢

甘草節

吳茱萸 五分 水煎空心服

十珍散

開胃養氣溫脾進食。

人參 白朮 黃芪 山藥 白茯苓 粟米

藿香 白扁豆 砂仁 甘艸 生薑 大棗

治胃中有痰欲吐不出。

廣橘紅 爪萸仁 各四兩 薑汁竹瀝和九梧子大

食後服。

啟脾丸 楊氏

治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心

腹膨脹泄瀉不思飲食。

人參 白朮 砂仁 青皮 神麴 麥蘖

陳皮 乾薑 厚朴 甘草 蜜為丸

資生丸

健脾開胃消食止瀉調和臟腑滋養榮衛

證治大還

醫學近編 脾胃

圭

貞白堂

人參 人乳浸透飯上

白朮 米泔水浸用山黃

白茯苓 人乳拌飯

橘紅 山查 蒸神曲 炒各一

麥芽曲 炒山藥 各一兩

藿香 白豆蔻 黃連 各一兩

澤瀉 桔梗 甘草 各五錢

白扁豆 蓮肉 去心各一兩

薏仁 二兩 茯苓 一兩

蜜丸彈子大細嚼一丸

香蔻和中丸 治飲食不化胸膈不寬痰熱噎氣吞

酸 茯苓 半夏 枳殼 陳皮 神麴 炒各一兩 連翹

白朮 山查 各二兩 蘿蔔子 生薑 各五錢 白豆蔻

木香各二錢 神麴糊丸

破故紙丸 治脾胃虛弱多食易傷易瀉或濕熱

下陷乘腎時或泄瀉

破故紙十兩 芡實肉四兩 金銀五兩 酒打麴糊

爲丸

香蔻和中湯 治脾胃虛寒飲食難運化致吞酸體

雜胸膈痞滿氣滯不貪飲食

厚朴姜汁拌炒四兩 蒼朮米泔水浸炒四兩 陳皮鹽湯泡洗四兩

甘草兩 木香兩 白朮炒三兩 草果炒去皮三兩

證治大還 醫學近編 脾胃 三 真白中

白豆蔻兩 蘿蔔子炒三兩 神麴糊爲丸

補脾丸 此方專補脾陰不足

山藥 茯苓各一兩 熟地黃二兩 當歸酒洗 白芍酒洗

柏子仁 人參各一兩 紫河車具一 黃柏淡鹽水炒三錢

煉蜜爲丸

黃病有積神方

蒼朮厚朴姜汁炒 橘紅 甘草 山查 白茯苓

麥芽各二兩 檳榔一兩 綠礬火煨研細二兩五錢 爲末棗肉

丸如梧子大每服一錢白湯下日三服忌食葷

陳氏醫學近編 卷之五

雲間陳 治三農甫述 男 枳璣先校

毘陵鄒言正仲衡甫參 門人 范 崧壽民 閱

王 頤贊皇

內傷

氣口大於人迎二倍三倍此內傷飲食之脉也右關

損弱甚則隱而不見或脾脉獨大而數數中顯緩

時一代此飲食失節寒溫失所之脉也氣口急大

證治大還 醫學近編 內傷 一 貞白堂

而數時一代而澹澹乃肺之本脉代乃元氣不相

接續大數者心脉刑肺急者肝木挾心火而侮肺

金此勞役過傷飲食失節元氣太虛之脉也

內外傷辨

東垣云人迎大於氣口爲外傷氣口大於人迎爲內

傷外傷寒熱齊作而不間內傷寒熱間作而不齊

外傷惡寒雖近烈火而不除內傷惡寒得就溫暖

而即解外傷症顯在鼻故鼻氣不利而鼻中壅塞

內傷症顯在口故口不知味而腹中不和外傷則

遍體骨痛內傷惟腰腿酸疼外傷邪氣有餘故發
言壯厲先輕而後重內傷元氣不足故出言懶散
先重而後輕外傷手背熱而手心不熱內傷手心
熱而手背不熱內外俱傷者視其顯內症多則是
內傷重而外感輕顯外症多則是內傷輕而外感
重輕重之間其補瀉之別也

王安道云內傷有飲食傷有勞役傷有饑餓傷有房
勞傷不因勞傷但飲食自信運化不及而停滯為
病者此物暫滯而元氣不受傷也直須攻其食在
證治大還

醫學近編

內傷

二

貞白堂

上吐之在下洩之在中則消化之若先勞力而後
傷於飲食或先傷飲食而後犯以房勞此則不足
之中氣乎有餘惟不足故宜補益惟有餘故宜消
導所以宜補而消之用化食養脾湯之類本右勞
役房勞饑餓等傷此則純是不足之症故病則怠
惰嗜臥四肢不收語言怯弱其初起亦氣高而喘
身熱而煩脉洪大而頭痛皮膚不任風寒而生寒
熱者由陰火上冲故頭痛氣喘煩熱脉洪大也脾
胃之氣下陷則穀氣不得升發無陽以護榮衛故

皮膚不任風寒而生寒熱也此則宜大補脾胃養
元氣為主勞役者補中益氣湯本方饑餓傷者四君
子加山藥陳米或黃芪建中湯本方房勞者人參養
榮湯本方十全大補湯本方八珍本方氣虛甚者俱加附
子

陳謙溪云氣虛則實實則痰凝氣滯中氣實則空
空則上通下達虛中有實正虛便生實邪實中有
虛實邪皆因虛致實以瀉為補虛以補為瀉凡傷
寒發表汗透即愈惟內傷汗而又熱熱而又汗或
證治大還

醫學近編

內傷

三

貞白堂

微汗至頸或至臍而還寒熱間作不齊左手脉沈
細右手脉浮大數或大而無力口不知味或兼泄
瀉或頭痛發熱或自語煩燥不思飲食俱宜用補
中益氣湯遍身骨節痛加羌活泄瀉而熱不退加
附子頭痛加川芎蔓荊子或無汗而熱不退亦用
補中或咳嗽而痰中帶血亦用補中止除陰虛潮
熱不宜誤投參芪耳蓋內傷乃裡虛不足之症雖
類傷寒實非傷寒若妄投麻黃羌活等藥大發其
汗見熱不退又以大寒涼之劑燥其真陰陷其清

氣使濁氣上升。食下腹滿。又大下之。使中氣愈虧。汗多亡陽。下多亡陰。實虛虛損不足而益有餘。不死而何。凡治病。必擇一味為師。然後隨症用佐。引。治上必達下。下病必升降。使邪尋路出。邪自不容耳。治病無法。所以牽延為害。但邪勝宜攻邪。攻邪而不散者。因正氣不能勝於邪也。必要扶正氣為主。正氣足。則邪自尋出路。因其性而順導之。以補中益氣湯。加羌防。頭痛。加蔓荊子。邪從汗散矣。若有汗表虛。邪從虛入。補中湯。正方無加。緩治最

治大還

醫學近編

四

真白堂

內傷發斑

傷發斑。因胃氣極虛。虛火遊行於外。宜補而降之。用補中益氣湯。去升麻。柴胡。加芍藥。麥門冬。玄參。

在上焦。加麥門冬。乾葛。倘熱不退。是未達也。以五苓散。二苓澤水桂表之。用肉桂者。以暑濕之藥。能行表裡。熱飲則通表。水調則達下也。

妙。或補中。或保元。俱加桂枝芍藥。若正氣未虛。邪氣獨盛。邪在於表。當祛邪而從正。方作傷寒治之。病久則不可。寒熱。小柴胡湯。柴參半草內熱見渴。病

五味子

內傷燥渴

內傷煩躁。因血少不能潤理者。宜養陰血。用四物。入竹葉。麥門冬。五味子。人參。知母。時顯躁熱。是下元陰火蒸蒸而發也。加炒黃柏。生地。丹皮。因津液枯燥。心中擾亂鬱鬱不寧而虛煩。八珍湯。四君合四物。加酸棗仁。麥門冬。竹葉。五味子。因氣血兩虛。思寒發熱。煩躁作渴者。十全大補湯。八珍加熟地。甚者。急加桂附。因血脫發熱煩躁者。當歸補血湯。證治大還。醫學近編。內傷。五。真白堂。卷之五。木。心虛蘊熱而煩渴者。清心蓮子飲。右蓮白茯苓。麥冬。車前地。胃皮甘草。胃氣虛弱而煩渴。或氣血兩虛。胃火盛而作渴者。竹葉黃芪湯。本。肝腎陰虛。火炎。煩渴者。益陰腎氣丸。生熟地。丹皮。澤瀉。山藥。山萸。五味子。歸芪。虛煩短氣悶亂者。人參當歸湯。本。煩而睡不寧者。溫膽湯。半夏。枳實。竹茹。陳皮。甘草。姜。加酸棗仁。人參。茯神。煩躁不得眠者。六一散。加牛黃。煩躁不已。汗後復熱。脈細數。五六日不睡。補中益氣湯。倍人參。加麥門冬。五味子。知母。竹葉。甚者。加附子。似傷寒五七日。

汗後煩躁飲水者補中益氣湯加附子 似傷寒

三戰後勞乏煩躁昏倦者四君子湯參朮加黃芪

當歸知母麥門冬五味子甚者三更飲水至曉此

元氣極虛也加竹葉大劑服之若舌黑乾燥大便

滑泄煩躁夜臥不安此食在腸胃也防風當歸飲

子防柴大黃芩中氣虛弱津液短少口乾作渴

七味白朮散參朮茯苓草內傷病退後煩渴不

已此餘熱在肺也用參苓甘草煎少加姜汁冷服

若氣虛不能生津液者獨參湯或生脈散參麥冬

證治大還醫學近編 內傷 六 貞白堂

經曰心脉不及則令人煩心又曰肝虛腎虛脾虛皆

令人體重煩冤是知煩多生於虛也

仲景云火入于肺則煩入腎則躁成無已云煩乃熱

之輕躁乃熱之重煩則心中煩悶起臥不安躁則

身體手足躁擾或裸體不欲近衣或欲坐泥水中

然有有本之熱有無根之火但有煩而不躁者有

躁而不煩者各宜分治煩躁相兼者多屬心火為

病蓋心者君火也火旺則金燥水虧惟火獨盛故

肺腎合而煩躁也諸虛煩熱宜梔子豉湯俱本竹

葉石膏湯淡竹茹湯 心神煩亂怔忡欲吐或血

中伏火蒸蒸不安硃砂安神丸怔忡 大病後虛

不得眠溫膽湯不寐 虛勞虛煩不得眠酸棗仁

湯參仁知母 熱在心肺煩熱怔忡竹葉石膏湯

本起臥不安睡臥不穩梔子豉湯本 榮血不

足陽勝陰微而煩生脉散參麥冬 加生地白芍知

母地骨皮竹茹 大汗後虛煩不安麥門冬當歸

黃芪甘草五味子不寢更加棗仁淡竹葉

陳三農云內傷身熱口渴渴用補中益氣湯本 加葛根

證治大還醫學近編 內傷 七 貞白堂

三四錢不渴但大熱不退加附子若身熱口乾不

渴見白虎則死宜黃芪當歸湯草 或飲水而致脇

下痛用薑桂溫而不散用補中益氣湯加附子其

痛立止如兩手脉浮大渾身脹痛十全大補湯參

中益氣湯加附子內傷服涼藥過多愈後復發此

血滯於胸也過六日用藕汁一碗麻油姜汁各一

盞和勻頓服血從大便出須臾以稀粥補之後以

補中湯調理

又云內傷用參芪朮必加升麻而熱可退此初起十數日之治法久則不可熱甚加附子有寒加桂用白朮薑附治裡虛必用茯苓利其濕熱

又云內傷大便秘補中湯加蘇梗杏仁小便不利加牛膝汗多去升麻加芍藥非此加減必牽連難

愈若大便秘結脉大一熱一汗而日日不退六味

丸熟黃芪藥丹澤加麥門冬肉桂麻仁二三大劑自愈

又云內傷熱久不退氣短促者保元湯本門加桂附煩躁加麥門冬五味子當歸芍藥

證治大還

醫學近編 內傷 人 貞白堂 卷之五

又云內傷中有吐瀉咳嗽痰涕者四君子合和中散無有不愈久瀉用補中益氣湯不可加蒼朮以行氣太重而補中無功也

又云內傷日久不愈熱盛便結脉洪大有力用熟地山藥各一錢山黃丹皮茯苓澤瀉各五分桂三分小便不利加牛膝三劑必愈

又云內傷惡寒發熱是氣血相虛作外感有餘治是速其死也凡內傷有表症俱屬裡虛凡內傷調理脾胃必先用羌活以散其邪此為正治

又云內傷久而不愈潮熱微汗咳嗽不食以補中益氣湯加乾薑五味子其病自愈不必治痰治嗽正氣復而痰嗽自除

又云內傷潮熱不退腹滿噯氣不思飲食保元湯加附子

又云潮熱不退初病可用補中益氣湯久則不可宜用熟地則腎納氣而潮熱自退然納氣之法有用和而令氣納者甘草和之陳皮利之益智溫之

是也有用溫而令氣納者如肝之脾胃虛氣不歸

證治大還

醫學近編 內傷 人 貞白堂 卷之五

源用八味丸去附子是也有用涼而令氣納者如心之脾胃虛氣不歸源用黃連五錢生薑一兩同搗末服肺之脾胃氣不歸源用人參山藥茯苓熟地腎之脾胃氣不歸源用生地一兩生薑七錢同搗煎服

又云內傷身無大熱頭不甚疼胸膈飽脹庸醫屢下致氣竭遍身作痛不能轉動腹脹內有積血雖神清氣爽亦不治若氣虛作脹宜補中湯合和中散脉有力者死

又云。內傷無燥屎。久不大便。切不可下。雖月餘不大便。不妨。但了而不了。屬血虛。四物加瑣陽。欲去不去。或着力而不出。屬氣虛。或勞役則裡急後重。屬清氣下陷。俱宜補中湯。裡急後重。初起屬熱。久則作虛治。亦宜補中湯。

又云。凡用補中益氣湯。汗少。肺氣不開。重用黃芪。汗多。裡氣不守。重用人參。熱不退。重用甘草。膈下無汗。加黃柏三分。渾身拘急作脹。係風寒。加羌防。不拘急。但作疼。加附子。補中益氣湯。內傷至要藥。

證治大還

醫學近編

內傷

十

貞白堂

也。若中氣虛寒。覺腹中痛。宜理中湯。參朮乾薑中氣

不調。鬱鬱不暢。或微脹。滯氣宜調中益氣湯。參芪

柴升橘心神不安。恍惚汗出。宜歸脾湯。參芪朮歸

木香草元。此皆內傷調理之要藥也。凡用補中益氣

湯。下部痿軟者。或虛弱者。禁用四君子。用木香。以

滯氣在胸中也。四物湯用沈香。以動氣在臍下也。

氣虛不用木香。用黃芪。血虛不用沈香。用肉桂。

凡表虛多用黃芪。裡虛多用人參。上焦血虛。多用

當歸。肉桂。白朮少用。中焦白朮多用。血燥與當歸

並用。下焦熟地三分。肉桂二分。湧泉火起。加黃柏一分。

表裡不清。俱宜補中益氣。病久不愈。俱宜十全八

珍。附子必大熱可用。薑桂必大寒可用。血凝氣滯。

肌表乾熱。并陽散火湯。羌獨葛升防柴芍中虛調

理無過參苓白朮散。參苓朮蓮肉白扁豆薏火症

調理最宜八珍。補中湯加附子。合和中散。內傷盡

矣。八珍加黃芪肉桂。合二陳。脾胃盡矣。用十全大

補。必用虎潛丸。見虛損門納氣歸腎。用補中益氣湯。必

證治大還

醫學近編

內傷

十一

貞白堂

用歸脾湯。健忘引血歸脾。用歸脾湯。必用參苓白

朮散。使氣下達。

凡內傷泄瀉。或瘧痢等症。但見發熱惡寒頭痛一

二症。此太陽經病也。於正藥內加羌防。散其表邪。

後專治其本病。口渴燥熱陽明。寒熱往來口苦少

陽。腹滿自利。太陰。舌乾口燥少陰。舌捲囊縮厥陰。

倘不隨其見症而藥之。病何能愈。雖有痰不必加

痰藥。正氣一復。其痰自消。

一諸病後。俱宜參苓白朮散調理。不失中正之道。

腹痛加木香。飽悶加砂仁。燥加當歸。膈雜加陳皮。
黃連。腸痛加桂。酒炒芍藥。或有餘熱不退。或兼泄
瀉。俱宜補中益氣湯。或似瘧非瘧。保元湯加茯苓。
柴胡。半夏。黃芩。當歸。骨蒸加知母。前宜清涼後不
可過恐傷胃。不可救。病後腹脹切不可下。宜四君
子。加乾姜。肉桂。吳茱萸。極妙。若內有蓄血。見溫暖
即行。病以火為主。火乃養命之源。思之思之。
凡病二。三。七。候不愈者。皆因氣血不足。故扶元氣。
養脾胃。庶不枉人天命也。

證治大還

醫學近編

內傷

三

貞白堂

又云。內傷表症已解。而濕熱留於上焦者。於調理
元氣。加茯苓。半夏。清痰利濕。留於中焦者。用參苓
白朮散。加木香。砂仁。導濕實脾。

醫按

東垣治一人。憂思不已。飲食失節。傷脾。面色黧黑。環
口尤甚。心懸如飢。又不飲食。呼吸短促。曰。此脾氣
受傷也。憂思不已。則脾氣結而不行。飲食失節。則
脾氣耗而不足。陰氣上入陽中。則面色黧黑。土衰
水侮。故唇口尤甚。此陰陽相反。病之逆也。經曰。陽

明脉衰。面始焦。故知陽明之氣不足也。遂以參芪
白朮。升麻。葛根。芍藥。蒼朮。甘草。姜。棗。助陽明生發
之氣而愈。

丹溪治一人。飢寒作勞。發熱頭痛。醫以小柴胡湯。白
汗神昏。脉大應指。似有力。與人參黃芪熟附炙甘
草大劑服之。一服汗小。再服熱退。能視聽。後加蒼
朮。得汗熱除。乃去蒼朮。作小劑服之。漸安。

又治一人。因勞倦發熱。服小柴胡湯八貼。二手脉
洪數而實。觀其形色。脉本不實。因服涼藥所致。理
宜溫補。遂以黃芪附子湯。冷服至三劑。睡中微汗
而解。繼以黃芪白朮湯。脉漸小而安。

又治一人。因感寒倦怠。不食半月。後大發熱惡寒。
遍身痛。脉浮大。按之豁然。此極虛受寒。以人參為
君。黃芪歸芍為臣。蒼朮陳皮通草為使。大劑服五
劑。大汗而愈。

又治一人。因勞倦發熱。醫以小柴胡湯。黃連解毒
湯。芍連。白虎湯等劑。反加痰氣上壅。狂言目不識
人。目赤上視。身如烈火。六脉洪數。七八至。按之豁

證治大還

醫學近編

內傷

三

貞白堂

然左暑茲而孔此因中氣不足內傷寒涼之物致
內發熱又與苦寒藥太多為陰盛格陽之症與補
中益氣湯加姜附大棗二劑而愈

三農治一老人患頭痛惡寒骨節疼痛無汗諸語自
服參蘇飲方見傷風門取汗脈洪數而左甚此胃虛作
勞陽明雖受寒氣不可攻擊當大補其虛俟胃氣
充足必自汗而解以參芪歸朮陳皮炙甘草加熟
附子四五劑諸症雖減但口乾熱未退遂去附子
加芍藥漸思食汗出而安

證治大還

醫學近編

內傷

齒

貞白堂

龔雲林治一人勞役太過憎寒發熱頭痛身疼口渴
嘔惡心煩醫作傷寒治遂至心神恍惚晝夜不眠
湯水不入聞藥即嘔六脈洪數氣口緊盛此內傷
元氣也以補中益氣湯加遠志酸棗仁麥門冬竹
茹一服即熟睡而安

補中益氣湯

東垣

治勞役傷脾元氣不足頭疼身

熱自汗氣短喘促倦怠不食

人參 黃芪 少

白朮 少

甘草 各一

錢半

當歸 一

柴胡 升麻 各三

分

薑 棗

陳皮

錢

錢

東垣云脾胃病則肺氣先絕用黃芪以益皮毛而
閉腠理勿令自汗也元氣不足喘促氣短以人參
補之心火乘脾炙甘草之甘溫以瀉之白朮補脾
除濕當歸使氣血各有所歸升麻柴胡升提胃中
清氣又引參芪甘草甘溫之氣上升以補脾胃之
散解而實其表也薛立齋云人身以脾胃為本脾

胃氣實則肺得其所養肺氣既盛水自生焉水升
則火降水火既濟交泰自成故曰補腎不如補脾
也故東垣先生著脾胃論而詳諄以固脾胃為本

證治大還

醫學近編

內傷

圭

貞白堂

而補中益氣湯又諸方之首也

咽乾加枳椇 精神短少加麥門冬五味子 頭

痛加川芎 頂顛痛加藁本細辛 痰加半夏

胸中氣滯加砂仁蒼朮木香 腹脹去白朮加厚

朴 心下痞加芍藥黃連 腹痛加芍藥 煩熱

加生地 陰火上炎加炒黃柏 腳軟乏力加牛

膝黃柏

升陽益胃湯

東垣

治脾胃虛則怠惰嗜臥四肢不

收時值秋燥令行濕熱稍退體重節痛口乾舌燥

飲食無味、大便不調、小便頻數、食不消化、兼見肺病、酒漸惡寒、慘慘不樂、面色惡而不和、乃陽氣不伸故也、當升陽益胃、

羌活 獨活 防風 各五錢 秋旺 故以辛溫瀉之 柴胡

白朮 茯苓 澤瀉 各二錢 黃芪 二兩 人參

半夏 甘草 各一兩 白芍藥 陳皮 各五錢

黃連 一錢

東垣云、秋旺仍用參朮芍藥之類者、以脾胃虛則脾氣先絕、易於受邪、故因時而補、易為力也、如服

證治大還

醫學近編 卷之五 內

去 貞白堂

藥後、小便罷而病加劇、是不宜利小便、當去茯苓

澤瀉、若喜食、初二日、不可過飽、恐再傷胃、以藥

力尚少、胃氣不得轉運升發也、須美食助其藥力、

益升浮之氣、而滋其胃氣、慎勿淡食以損力、助邪

氣之降、沈也、宜小役形體、使胃與藥氣得轉運升

發、又勿太勞役、復傷胃氣也、

升陽順氣湯 東垣

治飲食不節、勞役所傷、腹脹滿

悶、短氣、遇春口無味、遇夏雖熱猶寒、飢常如飽、不喜冷食、

升麻 柴胡 陳皮 神麴 當歸 各一錢

草豆蔻 二錢 人參 半夏 各三錢 黃芪 一兩

甘草 炙 黃柏 炒各五分

東垣云、脾胃之症、用升麻柴胡苦平味之薄者、陰中之陽、引脾胃中清氣行於陽道、及諸經生發陰陽之氣、以滋春氣之和、又引參芪甘草甘溫之氣、味上行充實腠理、使陽氣得衛外而為固也、所以治脾胃之藥、多升陽補氣名也、

保元湯

證治大還

醫學近編 卷之五 內

去 貞白堂

人參 白朮 各一錢 甘草 炙 陳皮 各五分

大棗 生姜

餘熱不退、兼泄瀉煩躁、左脉沈細虛、右脉浮大數、服補中湯五六劑不愈、服此藥、正氣足而邪自退、若身熱喜近衣被、或身大熱、睡臥不得、衣被不可近、喜食熱飲食、俱屬陽虛假熱之症、加附子、餘熱不去、口乾不渴、黃芪當歸湯有汗、黃芪蜜炙、胃虛米泔水炒、表虛酒炒、嘈雜乳炒、表虛多、裡虛參多、瀉火生甘草多、健脾炙甘草多、熱盛、茂草多、無

汎加羌活防風柴葛升麻。血虛加當歸脾虛倍白朮。渴加麥門冬五味子。虛煩加竹葉不眠加酸棗仁。小便不利加牛膝茯苓。心神不安加茯神遠志。虛而火動少加黃柏。腰痛加乾姜炒杜仲。惡寒加桂。惡心加乾姜。虛寒自汗加附子。欲熱退多用參芪。內傷熱不退只用補中湯加附子。倍芪草。此甘溫除大熱之義也。腹脹恐成中滿。補中湯加附子乾姜吳茱萸青皮麥芽神麴。隨元氣虛實加減。手虛浮加羌防以風能勝濕也。

證治大還

醫學近編 內傷 卷之五 大 貞白堂

黃芪建中湯 治飢困傷脾

黃芪 白芍藥 甘草 肉桂 飴糖

太棗

人參養榮湯 治房勞傷腎積勞傷脾四肢倦怠肌

肉消瘦面少顏色短氣不足飲食無味

人參 黃芪 白朮 茯苓 當歸 熟地黃

白芍 遠志 陳皮 肉桂 炙甘草 大棗

生薑

化食養脾湯 治脾虛不能運化飲食食物因而停

滯宜補而消之。

人參 白朮 茯苓 甘草 砂仁 神麴

麥芽 陳皮 半夏 山楂

人參當歸湯 治思慮勞苦傷損精神氣短煩熱心

虛驚悸眩暈

人參 當歸 麥門冬 酸棗仁 白芍

五味子 生地 茯神 桂心 竹葉

粳米 大棗

黃歸補血湯 東垣

治飢困勞役以致脉虛血虛肌

證治大還

醫學近編 內傷 卷之五 元 貞白堂

熱躁熱煩渴引飲晝夜不息脉洪大而虛重按全

無此血虛發熱症似白虎惟脉不長實爲異候用

白虎湯必死

黃芪 當歸 各一兩

竹葉石膏湯

竹葉 石膏 麥門冬 半夏 人參 粳米

甘草

竹葉黃芪湯 治氣血兩虛胃火盛作渴

人參 黃芪 麥門冬 生地黃 白芍 川芎

當歸 石膏 黃芩 竹葉 甘草

竹葉歸芪湯 治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲者

竹葉 當歸 黃芪 白朮 人參 麥門冬

甘草

淡竹茹湯

麥門冬 小麥 甘草 白茯苓 人參

半夏 竹茹 薑 棗

蓮志湯 治心虛煩熱夜臥不安病後虛煩

遠志 黑豆甘草同煮 人參 黃芪 石斛 茯神

證治大還 醫學近編 內傷 手 貞白堂

當歸 麥門冬 酸棗仁 知母 竹葉

甘草

梔子豉湯

梔子 二錢 豆豉 一合 水煎飲

傷食

氣口緊盛或浮滑而疾或右關沉滑為宿食不消上
部有脈下部無脈為食塞胸中宜吐寸口洪大按
之反澀尺亦微而澀或寸口緊如轉索左右無常
或滑數者宜下

傷食必惡食氣口脈必緊盛胸中必痞塞或噎氣吞

酸或惡心嘔吐或昏迷多睡或身熱足冷或惡聞

食氣或胃口作痛不可重按此皆停食之候亦有

睡臥不寧者以胃不和則臥不寧也亦有遍身冷

汗者以胃中有濕食能令自汗也亦有頭痛發熱

者但身不痛耳治須分所傷輕重虛實用藥大抵

食宜溫化輕者壯實者直攻其食用平胃散加荷

子草果砂仁麴蘖之類重者用承氣湯大黃厚加

肉桂或和中丸如食在胸膈上痞滿頭痛惡心欲

證治大還 醫學近編 內傷 三 貞白堂

吐者吐之食在腸胃間肚腹膨脹遠勝疼痛者便

秘者下之虛弱及脾虛不能運化者宜補而消之

如化食養脾湯參朮茯苓砂神曲麥芽山查陳半草及香砂和中湯

參朮蒼厚實半陳青茯苓之類若直攻其食則脾胃愈虛食愈

難化矣又須審問所傷何物如肉滯用山楂阿魏

米麴用麴蘖香附油膩用芽茶皂莢梨果用官桂

麝香雞魚用紫蘇橄欖狗肉用半夏杏仁瓜果用

食鹽元米雞子用硝石皂莢糯米物用白酒麴之

類或以原物燒灰導化若因氣滯食鬱者又須開

提其氣蓋食在氣上氣升則食自下矣若停食而復感寒則氣口人迎俱大頭疼身熱惡寒拘急中脘痞悶或痛宜藷香正氣散藷蘇芷蒼桔陳厚腹皮半草十味芎蘇散芎蘇葛柴桔殼半陳茯苓薤白先解外邪後治其食若先攻其食致傷胃氣反使外邪乘虛內陷矣

丹溪云惡食者胸中有物宜導痰運脾二陳加蒼白朮川芎聞食氣即嘔二陳加青皮砂仁食疫死六畜中毒酒調黃柏末服食死牛肉中毒牛皮膠酒煎服

證治大還

醫學近編 內傷 卷之五

五

真白堂

醫按

抱一翁治一人啖馬肉過多腹脹服大黃巴豆甚甚寸口脈促而尺將垂絕曰胸有新邪故脈促宜引之上達今反奪之悞矣以涌劑頃吐宿食而愈丹溪治一婦上腹大痛連及兩脇以香附末湯調探吐而安

薛立齋云一人食粽煩悶熱渴大便欲去不去用消導藥不應以白酒麴炒為末溫酒調服二錢俄頃腹鳴棕下而安一人食水晶團子過多肚腹脹痛

亦治以此方而愈

又治一人食魚鮮患痢諸藥不效用陳皮白朮等分為末陳米湯下數服而愈

治一人每食餅即腹痛泄瀉用紫蘇濃煎湯一服而安

調中化滯湯 治傷食腹滿噎氣吞酸嘔惡腹痛脹滿惡食

蒼朮 厚朴 陳皮 青皮 半夏 香附

砂仁 神麴 麥芽 山楂 枳實 草果

證治大還

醫學近編 內傷 卷之五

五

真白堂

荀子 生薑 去厚朴陳皮枳實用大皂莢白礬煎湯打神麴糊為丸治諸般食物傷效

除濕化滯散 治傷馬乳及牛羊駱或小兒停乳

神麴炒一兩 半夏 丁香 乾生薑 牽牛各二錢半

赤茯苓五錢 澤瀉三錢 每二三錢白礬湯調

下

香砂枳朮丸東垣 消食健脾

砂仁 香附 神麴 麥芽 半夏麴 蘿蔔子

枳實各一兩 白朮二兩 荷葉飯為丸用白朮煮

取其健胃勿令再傷也。

白朮丸 東垣 治傷豆粉濕麪油膩等物

白朮 半夏 神麪 枳實 各一兩 橘皮

黃芩 枯礬 各五錢 炊餅爲丸

大和中丸 源流 治傷諸般食物停滯不拘油膩生

冷濕熟等物

三稜 醋煮 莪朮 煨 檳榔 山茵陳 牙皂 各

兩 大黃 三兩 牽牛 頭末 大皂莢煎湯打神

麪糊冷丸梧子大姜汁下三錢

證治大還 醫學近編 內傷 卷之五 黃白堂

枳朮導滯丸 治傷濕熱之物胸滿痞悶

大黃 三兩 黃連 黃芩 茯苓 白朮 各三錢

枳實 神麪 各五錢 澤瀉 二錢 炊餅爲丸

備急丸 東垣 治傷寒涼之物及療心腹卒暴百病

下更必結

大黃 乾薑 巴豆 去油等分 蜜丸豆大每服一丸

紅丸子 消宿食去膨脹

蓬朮 三稜 陳皮 青皮 胡椒 乾姜

阿魏 礬紅 醋糊丸姜湯下五六十九

香橘餅 治小兒脾胃不和嘔吐泄瀉常傷飲食

木香 青皮 陳皮 白朮 炒 肉豆蔻 煨

益智 砂仁 各五錢 山藥 薏苡仁 麥芽

神麪 山查 丁皮 各一兩 厚朴 姜汁炒 神麪

糊爲餅

消滯丸 消食消積消氣消血消腫消脹消痞

牽牛 炒二兩 香附 五靈脂 各一兩 醋糊丸薑湯

下

聖愈 治食果多腹脹桂心末飯丸塩湯下一二

證治大還 醫學近編 內傷 卷之五 黃白堂

十九

食魚鱸生肉成瘕周觀草搗汁飲之即消

傷黃泚用藉菜煎湯飲即消

傷酒

浮而滑病若傷寒者宿酒短疾而滑酒病浮而細滑

傷飲

東垣云凡傷酒不可便用峻藥下之蓋酒性大熱有

毒其濕熱之氣內傷脾胃止宜發汗利小便上下

分消其濕若遽用牽牛大黃下之是無形元氣受

傷以傷有形陰血。垂忤殆甚。酒性大熱。已傷元氣。更復瀉之。又傷真陰。陰血一傷。陽毒愈旺。且反增陰火。而虛損之病成矣。金匱要畧云。酒疸下之。久為黑疸。則其傷腎水真陰也。可見故欲用峻劑者。必是酒積日深。汗之泄之。不能去。方可隨輕重而消導之也。

王字泰云。酒之為物。氣熱而質濕。飲之而昏醉狂易熱也。宜以汗去之。醒則熱去而濕留。止宜利小便而已。

證治大還

醫學近編

內陽

美

貞白堂

卷之五

戴復菴云。傷酒惡心嘔逆。吐出宿酒。昏冒眩暈頭痛。如破。宜二陳加黃連葛根滑石。或五苓散葛根湯調下。久困於酒。傷酒成積。一飲則腹痛泄瀉。宜連葛解醒湯。多飲酒。結成酒癖。隨氣上下。宜參蘇飲加黃連蓬朮。酒停胸膈為痰飲。用枳實半夏麴藥生薑。素統於酒。忽爾怕飲者。此脾胃受傷也。急宜調養。

薛立齋云。飲酒便泄。此腸胃虛。不能當其濕熱也。宜六君子湯加麴藥。

陳三農云。傷酒發不甚重。只解酒足矣。以後續有病重者。並作內傷調治。於正藥外。加解醒藥一二味。傷酒而腸風下血。川烏五錢。荊芥三兩。醋糊丸服。

酒多傷風咳嗽。細茶三錢。蘇葉七錢。糯稻一把。水煎熱服。老年酒多。臟毒不收。只解醒湯合補中益氣湯服。

解醒湯。東垣。治傷酒嘔吐惡心眩暈。用此上下分消其濕。

葛花

白豆蔻

錢各一

青皮

六分

白朮

澤瀉

證治大還

醫學近編

卷之五

美

貞白堂

卷之五

神麴

猪苓

茯苓

陳皮

人參

各五

砂仁

錢一

木香

一分

熱服

取微汗

連葛解醒湯

治酒積腹痛泄瀉

黃連

酒炒

葛根

滑石

山梔

炒

神麴

青皮

木香

加茵陳澤瀉猪苓肉桂分利濕熱

尤妙

二麴散

世治

治酒積兼治酒積下血

神麴

一兩

白酒藥

二九

為細末水拌成餅炙

黃白湯調服二錢

經驗方

治飲酒過度欲至穿腸以驢蹄硬處削下以水濃煮汁飲之。

千金治酒病豆豉葱白各一兩水二升煎一升頓服。

生葛汁茅根汁水萍汁用神麴曬收為丸鹽湯送下能解酒毒。

斷酒方自死蟻蠟乾末和酒與飲或鷓鴣屎燒灰水服俱永斷腐尿燒灰下亦可。

證治大還

醫學近編 內傷

天

貞白堂

飲酒令無酒氣乾蔓青根二七枚蒸三遍為末每

二錢水調酒後服。

痺症

陳三農曰諸痺今名痛風即古之痺症也內經靈樞云痺症有臟腑營衛筋脉皮骨及俞舍刺法論包廣甚微後世知有痛風不明痺症相沿而治未為確當丹溪擬名痛風論治從內經寒氣多者為痛痺論得其一也其有不痛及臟腑俞舍等症未及詳載意其以風寒濕三氣為病寓於別症之下乎胞痺寓淋腸痺寓飧泄心痺寓噫氣肺痺寓喘滿之類皆是然則痺之不名久矣豈無認為痿證為

證治大還

醫學近編 痺症

一

貞白堂

風症為脚氣而同治歟今列痛風復痛痺以昭中古諸賢症治之一且此證有血虛血滯有陰火痰涎有痺有不痛不止以痛風二字盡之也故援內經一則以存考焉。

黃帝問曰痺之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至合而為痺也風氣勝者為行痺行而不定注於骨節寒氣勝者為痛痺痛者苦楚之甚也濕氣勝者為著痺著而不移麻木不仁或痛或不痛始終不移也。

劉宗厚曰人之感三氣而為痺者以其形虛血虛耳

但有在肌皮血脉淺深之異故入臟者死緣痺之
爲症有筋掣不伸肌肉不仁者與風症絕相似故
世俗類于風痺痺症通治此千古之弊也大抵因
當分其所因風則陽受之痺感風寒濕之氣則陰
受之爲病多重痛沉着患者難易得去如錢仲陽
爲宋之一代明醫自患周痺止能移于手足爲之
偏廢不能盡去可見其爲難治也況今世俗多類
于風症通治宜乎不能得其病情也

證治大遺

醫學近編 痺症 卷之六

二

貞白堂

經旨曰風痺者遊行上下隨其虛邪與血氣相搏聚
于關節筋脉弛縱而不收也宜防風湯

寒痺者四肢攣痛關節浮腫宜五積散

濕痺者留而不移汗多四肢緩弱皮膚不仁精神昏

寒者宜茯苓川芎湯

熱痺者臟腑移熱復遇外邪客搏經絡留而不行陽
遭其陰故痺痺燠然而悶肌肉熱極體上如鼠走
之狀唇口反裂皮膚色變宜升麻湯

三氣合而爲痺則皮膚頑厚或肌肉痠痛此爲邪中
周身搏于血脉積年不已則成癰疹風瘡搔之不

痛頭髮脫落治宜疎風涼血

腸痺者數飲而小便不通中氣喘爭時作發泄宜五

苓散加桑白皮木通麥門冬或吳茱萸木香九

胞痺者少腹膀胱按之內痛若沃以湯瀉于小便上

爲清涕宜腎着湯腎瀝湯方見淋閉門

血痺者邪入于陰血之分其狀體常如被風所以骨

弱勞瘵汗出臥則不能搖動也宜當歸湯

周痺者在血脉之中上下遊行周身俱痛宜獨活湯

大豆蘆湯

證治大遺

醫學近編 痺症 卷之六

三

貞白堂

支飲者手足麻痺臂痛不舉多睡眩冒忍尿不便膝

冷成痺也宜茯苓湯

東垣云身體沉重走注疼痛濕熱相搏而風熱鬱不

得伸附着于有形也宜蒼朮黃柏之類

行痺治劑 卽走注疼痛

仲景桂枝芍藥知母湯 治諸肢節疼痛身體羸

腳腫如脫頭眩短氣兀兀欲吐痛風神効

桂枝 知母 防風各四兩 芍藥 甘草 麻黃

附子炮各二兩 生薑 白朮各五兩 水七升煮取二升

溫服一日三服

烏頭湯 歷節風不可屈伸疼痛

麻黃 芍藥

黃芪各三兩 甘草炙 川烏五枚 咬咀 以蜜二升

煎取一升 即去烏頭 水三升煎一升去查納蜜再煎七合

不時盡服之

河間防風湯 治行痺走注無定 痛風神効

防風 當歸

赤茯苓 杏仁去皮尖炒 甘草

桂各五分 黃芩

秦艽 葛根各二錢 去節 麻黃五分

水酒各二盞聚三枚薑五片煎一盞去查溫服

證治大還

醫學近編 彈症 四 貞白堂 卷之六 三〇五

本事方薏苡仁散 治濕傷腎腎不能生肝肝自生

風遂成風濕流注四肢筋骨或入左肩頤肌肉疼

痛漸入左指

薏苡仁一兩 當歸

芍藥 乾薑 甘草 官桂

川烏 防風

白朮 茵芋即山藥 麻黃 獨活各五錢

右末每服二錢空心臨臥酒調下一日三服

麝香丸 治白虎歷節風疼痛遊走無定狀如虫螫

晝靜夜劇及一切足疼痛

川烏

大者三個 生用 全蝎二斤一 黑豆二十一粒 生用 地龍五錢

爲末入麝香半字同研勻糯米糊爲丸菜豆大每

服七丸甚者十九夜臥令膈空溫酒下微出冷汗

一身便瘥予得此方凡是歷節及不測疼痛一二

服便瘥在歙州日有一貴家婦女遍身走注疼痛

至夜則發如虫螫其肌多作鬼邪治予曰此正歷

節風病也三服愈

丹溪龍虎丹 治走注疼痛或麻木不遂半身疼痛

蒼朮 草烏

白芷各一兩 爲末水拌待發熱過再

入乳香二錢當歸牛膝各半兩酒糊爲丸彈子大

證治大還

醫學近編 彈症 五 貞白堂 卷之六 三〇五

酒化下

無擇附子八物湯 治歷節風四肢疼痛如錐鋸不

可忍

附子炮去皮 乾薑

芍藥 茯苓 半夏 桂心

白朮四兩 人參

三兩 每服五六錢水煎

加味二妙散 痛風走注疼痛

黃柏

酒炒 蒼朮酒炒 水煎調酒洗威靈仙末於

羊角灰

臣 蒼朮佐 白芥子使 生薑一片入藥一錢

搗碎以前藥再溫服

東垣和血散痛湯 治兩手十指一指痛了一指疼

疼後又腫骨頭裡痛膝痛左膝痛了右膝痛發時

多則五日少則三日晝輕夜重痛時覺熱行則痛

輕腫卻重註云先血後氣乃先痛後腫形傷氣也

羌活 升麻 麻黃 去節各一錢半 桃仁 十個 柴胡 一錢

防風 黃柏 知母 酒炒各一錢 黃連 酒炒 防已 各六分

猪苓 獨活 各五分 當歸 一分 甘草 炙二分 紅花 一分

分二服水煎食前熱服

羅大無治真定府張太素好嗜酒五月間病手指節

證治大還 醫學近編 痺症 六 貞白堂

腫痛屈伸不利膝脹亦然心下痞滿身體沉重不

欲飲食食即欲吐面色痿黃精神減少至六月間

求予治之診其脈沉而緩緩者陽也內經云諸濕

腫滿皆屬脾土仲景云濕流關節肢體煩痛此之

謂也宜以大羌活湯主之

羌活 升麻 各一錢 獨活 七分 蒼朮 防風 甘草

葳靈仙 茯苓 當歸 澤瀉 各二分 分二帖水煎

食前一服食後一服忌酒麵生冷硬物

牛旁子湯 治風熱或歷節手指赤腫麻木甚則攻

肩背兩膝遇暑熱或大便閉

牛旁子 新豆豉 炒羌活 各三兩 生地 二兩 黃芪 一兩

半為末湯調二錢空心食前日三服 此病胸膈

生痰久則赤腫附着肢節久久不退遂成厲風此

孫真人預戒也宜早治之

河間大豆孽散 治周痺走注五臟留滯胃中結聚

益氣出毒潤澤皮毛補腎

大豆孽 一升炒香 每服五分溫酒調下空心服加

至一錢日三服 本草云大豆消瘀血破婦人惡

證治大還 醫學近編 痺症 七 貞白堂

血治熱痺筋攣膝痛古人多用酒沃豆孽取汗蓋

表藥也

犀角湯 治熱毒流入四肢歷節腫痛

犀角 二兩 羚羊角 一兩 黃芩 梔子 射干

大黃 升麻 各四錢 豉 一升 每七八錢水二鍾煎服

張子和治一稅官風寒濕痺腰脚沉重浮腫夜則痛

甚兩足惡寒經五六月間猶綿纏靴足膝皮膚少

有趾露則冷氣襲之流入經絡其病轉劇走注上

下往來無定其痛極處便攣急而腫起肉色不變

膝理如重行。每遇風冷。病必轉增。食減肌瘦。羸乏

起。須人扶。所服者烏附姜桂。種種燥熱。燔針着艾

莫知其數。前後三年不愈。一日予脉之。其兩手皆

沉滑有力。先以導水丸通經散。各一服。是夜瀉三

十餘行。痛減半。漸服赤茯苓湯。川芎湯。防風湯。此

三方。在宣明論中。治痺方是也。日三服。煎七八錢

藥。然汗出。尋愈。有以玲瓏竈法薰蒸。血熱反增

極。諸汗法。古方中多有之。惟以吐法。世罕知之

丹溪控涎散。治身及脇走痛。痰挾死血。加桃仁泥

九。治走注疼痛。
醫學近編 痺症 八 貞白堂

葳靈仙 梔子炒 蒼朮 當歸各一錢 川芎七分

肉桂一分 桃仁七個 甘草五分 生薑五片 水二盞

煎半乾。入童便半盞。竹瀝半盞。熱服。忌肉鷄麵

定痛方 治一切風濕痺痛

乳香 沒藥 地龍 木鼈子肉 金星石 五靈

脂各等分 蜜九彈子大。每一丸。臨臥酒下

升麻湯 治熱痺肌肉熱。極體上如鼠走。唇口反綻

皮毛黑。兼治諸風

升麻三兩 茯神 人參 防風 犀角鎊 羚羊角

羌活各一兩 官桂五錢 每服五六錢。生薑一塊。搗碎

竹瀝少許。同煎至一盞。溫服

八珍丸 治痛風走注。腳氣頭風。

乳香 沒藥 代赭石 穿山甲生用各三錢 羌活

草烏生用各五錢 全蝎二十一箇 川烏生用不去皮尖一兩

右末醋糊丸。梧子大。每服十一丸

四妙散 治痛風走注

葳靈仙酒浸五錢 白芥子一錢 蒼耳子一錢五分 又云

治大還 醫學近編 痺症 九 貞白堂

羊角灰二錢 為末。每服一錢。薑一大片。搗汁入湯

調服。二妙散同調尤妙

濟生羌活湯 治白虎歷節風毒攻注。骨節疼痛。發

作不定

羌活二兩 附子炮去皮臍 秦艽 桂心 甘草炙 木香

牛膝酒浸 桃仁 骨碎補 川芎 當歸 防風

各一盞五片 每服五六錢。水煎

痛痺也。丹溪編為痛風門。今改之以復舊從經旨

丹溪痛風論曰。痛風者。四肢骨節走痛也。他方謂之

證治大還

醫學近編 痺症 十

貞白堂

白虎歷節風。夫氣行脉外，血行脉內，晝行陽二十五度，夜行陰二十五度。此平人之造化也。得寒則行遲而不及，得熱則行速而太過。內傷于七情，外傷于六氣，則氣之運或遲或速而疾作矣。彼痛風者，大率因血受熱，已自沸騰，或再涉冷受濕，取涼或坐臥當風，熱血得寒，污濁凝澁，何以作痛？夜痛甚者，行于陰也。治當以辛熱之劑，流散寒濕，開發腠理，則行血氣和而愈。然亦有數種，治法不能無少異也。因濕痰濁血流注為病，以其在下焦道路，遠非烏附氣壯者不能行，故用為引經，若以為主治，非為無益而有殺人之勢。此病必行氣流濕，舒風導滯，血補新血，降陽升陰，治有先後，須明腫與不腫可也。不可食肉，肉屬火，大能動火，素有火盛者，小水不能制，若食肉厚味，下有遺溺不已，上有痞悶之甚，雖魚麵醬醋酒皆斷之。先以二陳湯加酒浸白芍藥，少佐以黃連降心火，看作何應而為之區處。

遂常曰：按丹溪不以痺分門，而以痛風分門，謂血先

證治大還

醫學近編 痺症 十一

貞白堂

受熱而後受冷濕，乃所以為痛夜痛甚，行于陰也。及戒人不可徒以烏附為主，斯言不惟補前人之餘蘊，而猶有深意存焉者。實懲時俗與腳氣痿症混治之誤，而另立痿門，腳氣門分治之，而又另分麻木為一門者，此尤有見也。麻木固亦有濕有痰所致者，而氣血不足居多，分而治之，良有特識。設一概而作風寒濕治，則虛虛之禍，無有窮已。不獨麻木為然，而行痛着三痺，其中未能無虛。虛者或久作風寒濕治，用疎風剛燥之劑太過，而氣血為之暗損，或氣血先虛而後受邪，經曰邪之所湊，其氣必虛。此皆不可以不慎也。陳無擇謂有支飲作痺，此均有補于經文者。誠以今之患痛痺者，歷之每每如丹溪無擇所論，治驗數條，猶其精工，故畢錄之以為法。

大法用蒼朮、南星、川芎、白芷、當歸、黃芩。在上者加羌

活、桂枝、桔梗、威靈仙。在下者加牛膝、防己、木通、黃

柏。治痛風取薄桂者，以其味淡，獨此能橫行手臂，領南星、蒼朮等藥至痛處。

方四物湯加桃仁、牛膝、陳皮、茯苓、甘草、白芷、龍膽

草在上屬風在下屬濕加藥同俱倍之桂等分無
桔梗氣虛者加蒼朮龜板痰加南星血虛加芎歸
佐以桃仁紅花。

因痰者二陳湯加酒炒黃芩羌活蒼朮

因濕者蒼朮白朮之類佐以竹瀝及行氣藥或日有濕鬱而走痛

周身者或關節痛遇陰寒即發當作濕鬱治

因于風者不續命湯極驗。

因血虛者芎歸之類佐以桃仁紅花。

肥人多是濕與痰飲流注經絡。

證治大遺

醫學近編 痺症 卷之六 十三

瘦人多是血虛與熱。

下部有濕腫痛防已龍膽草黃柏知母同是祛藥。

若肥人病此宜蒼朮白朮南星黃芩茯苓之類。

瘦人宜當歸紅花桃仁牛膝續命等同用。

上中下痛風

黃柏 酒炒 蒼朮 米泔浸 南星 各二 神麴 炒 台芎 各

兩 龍胆草 五分 白芷 二錢 桃仁 各五 威靈仙 錢

酒洗 羌活 各三 紅花 酒洗 錢五分 共為末麴糊

丸食前下百九 痛風風濕勿用

肢節腫痛痛屬火腫屬濕兼受風寒而發動于經絡
之中濕熱流注肢節之間而無已也。

麻黃 節 赤芍藥 錢 防風 荆芥 羌活

獨活 白芷 蒼朮 威靈仙 片苓 枳實

桔梗 乾葛 川芎 各五 甘草 歸尾 升麻 各

分 下俟加酒炒黃柏婦人加酒炒紅花腫多加槓

榔大腹皮澤瀉更加沒藥一錢定痛尤妙。一云

脈濡數者有瘀血宜桃仁紅花芎歸及大黃微利

氣血兩虛有瘀濁陰火痛。

證治太遺

醫學近編 痺症 卷之六 十五

人參 山藥 海石 南星 各一 白朮 熟地

黃柏 炒黑 龜板 酒炙 各 乾薑 炭 瑣陽 各五

右為末酒糊丸

二妙散 治筋骨疼痛因濕熱者有氣加氣藥血虛

加血藥痛甚者加生薑汁熱辣服之。

黃柏 炒 蒼朮 米泔 共為末沸湯入薑汁調服。二

物皆有雄壯之氣表實者加酒少許佐之。若痰

帶熱者先以舟車丸或導水丸神功丸下伐後以

趁痛散服之。一法二妙為君加甘草羌活各二

錢陳皮芍藥各一錢酒炒威靈仙半錢服之作
趁痛散

乳香 沒藥 桃仁 紅花 當歸 羌活 地

龍 酒炒牛膝 酒洗甘草 五靈脂 酒炒香附 童便

右爲末每服二錢酒調或加酒炒芍柏。

潛行散

用黃柏浸酒爲末入湯藥調服。

治酒濕痰痛

黃柏 酒炒威靈仙 酒炒各五錢 蒼朮 羌活 甘草 各三錢

證治大還

卷之六 醫學近編 痺症 十四 貞白堂

錢陳皮 芍藥 共爲末每服一錢或二錢沸湯

入薑汁調服

治氣實表實骨節痛方

滑石 飛六錢 甘草 一錢 香附 片苓 各三錢 共爲末

薑汁糊丸梧子大每服五七十丸白湯吞下

治食積肩腿痛

龜板 酒浸炙 酒柏葉 香附 五錢 辣芥子 凌霄

花 一錢 共末酒糊爲丸梧子大煎四物湯加陳

皮甘草湯下

二人年踰六十性急作勞患兩腿痛動作則痛甚視
之曰此兼虛症當補血則自安遂與四物加桃仁
陳皮牛膝生甘草煎入薑汁研潛行散熱飲三四
十帖而安。

何縣長年四十餘形瘦性急因作勞背痛臂疼骨節
疼足心發熱可與四物湯帶熱下大補丸保和丸
共六十粒食前服。

一婦人腳疼怕冷夜劇日輕

生地 白芍 歸尾 各五錢 黃柏 炒 黃芩 白朮

證治大還 卷之六 醫學近編 痺症 十五 貞白堂

右分四帖水煎帶熱服

一婦人腳叉骨痛

蒼朮 白朮 陳皮 芍藥 各三錢 木通 二錢 甘草 五錢

分二服送大補丸五十粒 右丹溪治痛風法主

于血熱血虛血汚或挾痰皆不離四物潛行牛膝

甘草桃仁陳皮蒼朮薑汁而隨症加減發前人之

餘蘊醫世俗之所不能醫其有功于後人也大矣

東垣蒼朮復煎散 治寒濕相合腦戶痛惡寒項脊

強肩背脚卵痛膝膕痛無力行步能食身沉重其

脉沉緩洪上急。

蒼朮

四兩水二碗煎至一大碗去渣入下藥

羌活

升麻

柴胡

藥本

澤瀉

白朮

各五分

黃柏

三分

紅花

一分

右用蒼朮二錢煎至一大碗空心服微汗為效忌

酒麵。

羅太無活血應痛九

治風濕客于腎經血脉凝滯

腰背腫痛不能轉側皮膚不仁遍身麻木上攻頭

目虛腫耳日常鳴下注膝重痛少力行履艱難項

背拘急不得舒暢常服和血脉壯筋骨使氣脉通

證治大還

醫學通編

痺症

太

貞白堂

三子

金毛狗脊

去毛

蒼朮

米泔浸

香附

炒

陳皮

九兩

沒藥

二錢

草烏

炮二兩

威靈仙

三兩

共為末酒

糊丸桐子大每服十五丸不拘時溫酒或熱湯下

忌食桃李雀鴿諸血物

烏靈九

治久患痛風及麻木行步艱難

五靈脂

二兩

川烏

一兩炮

去皮

共末酒糊為丸桐子大

每服十丸加至五十丸空心溫酒下忌冷物

史丞相遇仙方

治諸般痛風手足艱難筋骨疼痛

口眼喎斜言語蹇澀

附子

炮去

皮

川烏

製

當歸

川芎

肉蓯蓉

杜仲

鹽

羌活

黃芪

人參

白朮

白茯苓

狗脊

炒去

牛膝

酒浸

防風

天麻

白茯苓

狗脊

炒去

毛

草薢

續斷

獨活

肉桂

赤芍

各一兩

虎脰骨

酥炙二兩

右以生絹袋盛之用無灰酒浸密封瓶口

春三日月夏二日秋七日冬十日取出晒焙乾為末

酒糊丸桐子大用浸藥酒一盞空心送下五十九

忌生冷油膩豆腐麵食發風物

丹溪治環跳痛不已防生附骨疽方以蒼朮佐黃柏

證治大還

醫學通編

痺症

七

貞白堂

三子

之辛行以青皮冬加桂枝夏加黃芩體虛加杜仲

牛膝以甘草為使大料煎入酒深者恐朮柏桂枝

十文帖發不動以少黃連一二帖又不動者恐毒

將成瘰癧地成坑火煨紅沃以小便赤體坐其上以

被席圍包下體使熱蒸腠理開血氣暢而愈

仲景治婦人六十二種風及腹中血氣刺痛以紅藍

花酒主之紅花一味以酒一大碗煎減半頓服一

半頃之再服

虎骨九 治經絡凝滯骨節疼痛筋脉攣急遇陰寒

愈痛

乳香

沒藥各另研 赤芍藥 熟地 虎脰骨酥炙

當歸

血竭五錢 右末用木瓜一枚切破去核入

乳香末在內以麻線纏定勿令透氣好酒六升煮

酒盡取木瓜去皮研如泥更入熟蜜少許杵和為

九桐子大每服五十九看病上下服

麒麟散 治寒濕傳于經絡疼痛不可忍

血竭

乳香 沒藥 白芍 當歸各六錢 水蛭杵碎

煙盡

麝香各三錢 虎脰骨酥炙 右為末和勻每服

證治大還

醫學近編 痺症 卷之六 貞白堂

二三錢食前溫酒下

嚴氏獨神湯 治身體煩痛四肢項背拘急或疼或

重痛舉動艱難手足冷痺腰腿沉重筋脉無力

常歸

芍藥 黃芪 羌活 片子姜黃各一兩

甘草

炙五錢 每服六七錢薑棗煎服

腳跟痛有血熱有痰血熱者四物湯加黃柏知母牛

膝之類痰用二陳加南星黃柏防已

肩背痛不可回顧者此太陽氣鬱而不行或脊痛項

強腰似折項似拔者此足太陽經不通二者俱宜

通氣防風湯有因濕熱肩背沉重而痛者當歸拈

痛湯有因汗出小便數而欠者風熱乘脾脾氣鬱

而肩背痛也當瀉風熱則愈宜升麻柴胡湯有痰

飲流注肩背作痛宜星香散或導痰湯有腎氣不

循故道氣逆挾背而上致肩背作痛宜和氣飲加

鹽炒小茴香少許有勞力或看書着棋久坐而致

脊背疼者補中益氣湯或八物湯加黃芪背者胸

之腑肺主氣居胸中肺氣滯則血脉泣肺氣虛則

證治大還

醫學近編 痺症 卷之六 貞白堂

不能運行陽道肺中有痰流注肩背皆能作脹疼

肩背痛乃肺分野之病經云西風生于秋病在肺命

在肩背按秋氣者病在肩背大過為病在外則令

人逆氣背痛溫溫然也

臂痛 臂為風寒濕所搏或痰流氣滯或因提挈重

物皆致臂痛有腫者有不腫者因于風寒宜五積

散加羌活因于濕蠲痺湯多加蒼朮因于痰導痰

湯因于氣烏藥順氣散因提重傷筋用刮勞散或

和氣飲加姜黃蓋姜黃能入臂故也有人坐臥為

風濕所襲但寒外有寒邪所侵即痛宜羌活散有
飲酒太過濕痰流注者用二陳加南星蒼朮枳梗
枳殼桂枝酒芩有血不榮筋者用四物加姜黃秦
芫羌活有氣血凝滯經絡不行所致者舒筋湯
控涎散 治肩背臂痛如神 方見行痺
控涎丹加去油木鱉子一兩桂七錢治臂痛每服二
十丸加至三十九丸

丹溪治臂痛

南星 半夏 白朮 香附 酒芩 各一錢 蒼朮 二錢

證治大選

醫學近編 痺症 主 白朮 錢 卷之六

陳皮 茯苓 各五錢 威靈仙 三分 甘草 少許

花麴散 治臂痛

紅花 神麴 炒 爲末酒調下

薑黃散 治臂痛非風非痰

薑黃 甘草 羌活 各一兩 白朮 二兩 腰以下痛者

加海桐皮當歸芍藥

東垣治臂痛分六道經絡看痛在何經絡之間以行

本經藥通其氣血血氣通則愈矣若表上諸痛若

便擬下之則不可當詳細辨之

右東垣云認經絡用藥蓋以兩手伸直其臂貼身
垂下大指居前小指居後而定之則其臂膊之前
廉痛者屬陽明經以升麻白芷乾葛行之後廉痛
者屬太陽經以藁本羌活行之外廉痛者屬少陽
以柴胡行之內前廉痛者屬太陰以升麻白芷葱
白行之內後廉痛者屬少陰以細辛獨活行之并
用灸法視其何經而取之也

通氣防風湯 肩背痛不可回顧者此太陽氣鬱而

不行以風藥散之脊痛項強腰似折項似拔者此

證治大選

醫學近編 痺症 主 白朮 錢 卷之六

足太陽經不通也

羌活 獨活 各一錢 藁本 防風 甘草 各五錢 川芎

蔓荊子 各三錢 水煎服

當歸拈痛湯 濕熱爲病肢節煩痛肩背沉重胸膈

不利及遍身體痛下注于足脛痛腫不可忍 方脚氣門

加減當歸飲子 治肩背忽痛

當歸 防風 柴胡 生地 大黃 各一兩 芍藥

黃芩 人參 各一兩 黃連 五錢 滑石 六兩 甘草 一兩

每服六七錢水煎

人參益肺散 治肩背痛汗出小便數而少者風熱

乘勝肺氣鬱甚也當瀉風熱則愈

升麻 柴胡 黃芪 錢各一 防風 羌活 人參

甘草 陳皮 各五分 藁本 三分 青皮 黃芩 白豆

蔻 各三分 水煎服如面色白脫色氣短者勿服

舒筋湯 臂痛不能舉有人常左臂痛或以爲飲以

爲風以爲濕諸藥悉試繼以針艾俱不效得此方

服之而愈蓋是氣血凝經絡不行所致非風非飲

非濕腰以下食前服腰以上食後服又名通氣飲

證治大還 醫學近編 痺症 主 貞白堂

片子姜黃 四兩如無用 嫩義或代之甘草 羌活 各一 赤芍藥

海桐皮 去外 白朮 當歸 各二 每服五錢薑三片

水煎臨服入磨沉香少許

着痺治劑 麻木同

經謂濕氣勝者爲着痺河間曰着者留着其處而不

去或四肢麻木拘攣也經又曰其不痛不仁者病

久入深營衛之行澁經絡時疎故不痛皮膚不榮

故爲不仁夫所謂不仁者或周身或四肢滯滯然

不知痛痒如繩扎縛初解之狀古方名爲麻痺者

是也靈樞曰衛氣不行則爲麻木丹溪曰麻是氣

虛木是濕痰死血然則曰麻曰木者以不仁中分

而爲二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦

有虛而感濕麻木兼作者又有因虛而感風寒濕

三氣乘之故周身掣痛麻木併作者古方謂之周

痺治汗宜先汗而後補也當以類而推治

丹溪云十指麻木乃胃中有濕痰死血宜二陳湯加

蒼朮白朮桃仁紅花附子

脈法 脈沉而濡屬氣虛關前得之麻在上體關後

證治大還 醫學近編 痺症 主 貞白堂

得之麻在下體也 脈浮而緩者屬濕爲麻痺脈

緊而緩屬寒爲痛痺脈瀦而孔屬死血爲木不知

痛痒

東垣神效黃芪湯 治渾身麻木不仁或左或右半

身麻木或面或頭或手臂或脚腿麻木不仁金皆

治之 又治兩目緊急縮小羞明畏日隱濇難開

或視物無力睛痛昏花手不得近或目少睛光或

目熱如火服五六帖神効

黃芪 蔓荊子 各二 人參 甘草 白芍藥 各一

陳皮 五錢 每服五六錢 如小便淋瀝加澤瀉 五錢

如有大熱症加黃柏 三錢酒炒 如麻木不仁雖有

熱不加黃柏再加黃芪 兩 如眼縮小去芍藥

忌酒醋濕麵葱韭蒜大料等物及淡滲生冷硬物

麻木重甚者加芍藥一兩木通一兩

芍藥補氣湯 治皮膚間有麻木此肺氣不行也

黃芪 橘紅 甘草 各一兩 白芍藥 一兩 澤瀉 五錢

每服一兩水煎 如肌肉麻木待瀉營氣而愈

如濕熱相合四肢沉痛當濕熱此潔古立効神方

證治大要 醫學近編 痺症 黃芪 白芍藥

人參益氣湯 治五六月間兩手麻木四肢倦怠情

嗜臥乃濕熱傷元氣也

黃芪 八錢 人參 甘草 生各五錢 芍藥 升麻 各三錢

柴胡 二錢 五味子 一百粒 甘草 炙二錢 每六七錢水

煎空心服服後令少睡于麻痺處按摩屈伸少時

午飯前一服日二

第二次藥前服 黃芪 八錢 紅花 五錢 陳皮 一錢 澤瀉 一錢

第三次服藥 黃芪 六錢 黃柏 一錢 橘紅 三錢 白芍藥 五錢

升麻 澤瀉 各二錢 黃芩 八錢 五味子 百粒 甘草 生四分

分四帖煎服如前 秋涼去五味子 夏月去黃芩効

除濕補氣湯 治左腿麻木沉重

黃芪 八錢 甘草 稍六錢 升麻 稍 柴胡 當歸 澤瀉

各二錢 五味子 百粒 紅花 二錢 青皮 四錢 陳皮 一錢

分四帖水煎溫服

治李夫人六脉俱弦洪緩風熱下陷入陰中身重有

痰麻木閉目則重開眼即退用補氣升陽和中湯

而愈

補氣升陽和中湯

證治大要 醫學近編 痺症 黃芪 白芍藥

黃芪 五錢 人參 白芍 各三錢 甘草 炙 佛耳草 各四錢

陳皮 白朮 歸身 各二錢 甘草 生去 黃柏 酒浸除

白茯苓 除濕 澤瀉 同上 升麻 行陽 柴胡 草豆蔻 益

溫經除濕湯 李夫人冬寒霜時病作四肢無力乃

痿厥濕熱在下焦也醋心者是濁氣不降欲滿也

合眼麻木者陽道不行也開眼不麻木者目開助

陽道故陰寒之氣少退也頭眩眩暈者風氣下陷

血分不伸越而作也

羌活 <small>分七</small> 獨活 當歸 麻黃 <small>去節</small> 黃柏 <small>各二分</small> 白芍 <small>各二分</small>	柴胡 黃連 黃芪 草豆蔻 神麴 木香 <small>各二分</small>	分陳皮 蒼朮 <small>各二分</small> 人參 甘草 <small>炙</small> 白朮 術苓	澤瀉 <small>各一分</small> 升麻 <small>五分</small> 二帖水煎服 治肢節沉	重疼痛無力之聖藥也	濕氣風症不退眩運麻木不已除風濕羌活湯主之	羌活 防風 <small>各一分</small> 柴胡 獨活 甘草 <small>炙各五分</small> 藜本	陳皮 黃柏 川芎 <small>各三分</small> 蒼朮 黃芪 <small>各一分</small> 術苓	澤瀉 <small>各二分</small> 茯苓 <small>二分</small> 黃連 <small>一分</small> 升麻 每服五六錢水	證治大還 <small>醫學近編 痺症 卷之六 頁白堂 三五三</small>	煎熱服 量虛實用如不盡症候加減法用之	濟世茯苓湯 治停飲支飲手足麻痺多睡眩暈	赤茯苓 半夏 陳皮 <small>各一分</small> 枳實 <small>炒</small> 桔梗 甘草	炙各 每服五六錢薑三片水煎	宣明茯苓川芎湯 治着痺濕地水氣甚重着而不	去多汗而濡者着痺留注不去四肢麻木拘攣 <small>掌浮腫</small>	赤茯苓 防風 川芎 麻黃 芍藥 桑白皮	甘草 <small>炙</small> 官桂 當歸 <small>各五分</small> 棗三枚水煎服如欲出	汗以粥投之
---	---------------------------------------	--	---	-----------	----------------------	--	---	---	---	--------------------	---------------------	--	---------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	--	-------

五痺湯 風寒濕之氣客留肌體手足緩弱 <small>麻痺不仁</small>	片子姜黃 <small>一兩</small> 羌活 白朮 防已 <small>各二分</small> 甘草 <small>炙五分</small>	錢 每五六錢薑三片水煎服	續斷九 <small>本事方</small> 治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺	川續斷 <small>一兩</small> 當歸 草薢 天麻 防風 大附子	各一兩 川芎 <small>七錢</small> 乳香 沒藥 <small>各五分</small> 煉蜜九梧子大	每四十丸溫酒米飲任下	又增減續斷九 治寒濕之氣痺滯關節麻木疼痛	人參 防風 鹿角膠 白朮 <small>炒各七分</small> 黃芪 續斷	證治大還 <small>醫學近編 痺症 卷之六 頁白堂 三五三</small>	薏苡仁 山芋 牡丹皮 麥門冬 山茱萸	地黃 桂心 白茯苓 石斛 <small>各二分</small> 蜜九桐子大	每服六七十丸空心酒下	三痺湯 治血氣凝滯手足拘攣風痺等疾	川續斷 杜仲 <small>姜汁炒</small> 防風 桂心 人參 當歸	白茯苓 白芍藥 甘草 黃芪 牛膝 細辛	各一兩 獨活 川芎 秦艽 生地 <small>各五分</small>	每服六七錢薑三片棗一枚水煎	宣明防風天麻散 治風麻痺走注肢節疼痛中風
---------------------------------------	--	--------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	------------	----------------------	--	---	--------------------	---------------------------------------	------------	-------------------	---------------------------------------	---------------------	------------------------------------	---------------	----------------------

偏枯或暴瘳難語內外風熱壅塞

天麻 甘草 羌活 防風 白芷 川芎

歸尾 草烏頭 白附子 荆芥穗 各五錢 滑石 二兩

右末熱酒化蜜少許調半錢加至一錢覺藥力運

行微麻為度煉蜜九彈子大熱酒化下半九或一

九細嚼白湯下

衍義方 治風冷氣血閉手足體疼痛冷麻

五靈脂 二兩 沒藥 一兩 川烏頭 一兩半 乳香 五錢 共末水

九彈子大每丸生薑酒磨服

證治大還 醫學近編 痺症 卷之六 天 貞白堂

河間散 治榮虛衛實肌肉不仁致令痺重 名曰肉

前胡 白芷 細辛 官桂 白朮 川芎 各三兩

附子 炮 吳茱萸 當歸 川椒 去子并閉口者 生用各二兩

以茶酒三升拌勻同管一宿以煉成猪脂膏五斤

入藥煎候白芷黃紫色濾其渣成膏在處摩之

凡癰疽瘡瘍皆治併去諸風瘡痒癢傷折墜損凡

摩皆可用之

和味五痺湯 治五臟痺症

人參 茯苓 當歸 白芍 川芎 各一錢 肝心腎痺倍之

五味子 十五粒 細辛 七分 白朮 一錢 肥 甘草 五錢 薑一片

水煎食遠服 肝痺加酸棗仁柴胡 心痺加

志茯苓麥冬犀角 脾痺加厚朴枳實砂仁神麴

肺痺加半夏紫苑杏仁麻黃 腎痺加獨活官桂

杜仲牛膝黃芪草薢

活絡丹 治足手攣拳筋脉不舒皆風邪濕毒留滯

經絡渾身走注疼痛

南星 川芎 草烏 地龍 各六兩 乳香 沒藥 各

為末酒糊九桐子大每服一二十九臨臥酒下

證治大還 醫學近編 痺症 卷之六 天 貞白堂

清涼潤燥湯 治風熱血燥麻木

當歸 生地 各一錢半 黃連 黃芩 芍藥 川芎 各

錢 天麻 防風 羌活 荆芥 各八分 細辛 六分

甘草 五分 水煎服 麻甚者加川烏 炮過 三分 以行經絡

止麻清痰飲 治口舌麻木延及口角頭面者

黃連 一錢 貝母 瓜蒌仁 黃芩 茯苓 桔梗

枳殼 橘紅 南星 用白礬皂角生薑 同煮透各一錢 天麻

甘草 細辛 各五分 血虛加當歸一錢水煎入薑

汁一匙竹瀝三四匙食遠服

經驗三妙九 治濕熱下流兩脚麻木如火熱

蒼朮六兩 黃柏四兩 川牛膝酒浸 麴糊九桐子大每

服五七十九空心淡鹽湯下

仲景治血痺桂枝五物湯 血痺陰陽俱微外症身

體不仁如風痺狀

黃芪 桂枝 芍藥各三兩 生薑六兩 大棗十枚 水六

升煮取二升溫服七合日三服

木香九 腸痺腹朽痛時發食泄氣不消化小便便秘

木香 白朮 官桂 蕪荑 良姜 訶子皮各

證治六還 醫學近編 痺症 卷之六 韋 貞白堂

附子 炮厚朴 肉豆蔻各二兩 乾薑三錢 甘草五錢

為末麴麵糊九桐子大每服二十九空心薑湯吞

鶴膝風

羅太無蛭螭九

蛭螭用頭尾全 桃仁生 白附子 阿魏 桂心

安息桃仁 白芷各一兩 乳香 沒藥已上童便酒浸

北漏蘆 當歸 白芍 牛膝 羌活 地骨皮

葦靈仙各一兩 蜜為丸彈子大空心酒化下一丸昔

有人病風痺手足指節皆如桃李痛不可忍服之

悉愈宜明方安息用 胡桃懷同研

丹溪治一人年七十患膝腫痛此血虛而挾濕熱也

生地 當歸頭 白芍 蒼朮 黃柏炒各三錢 附子

桂二錢 木通一錢 分四帖水煎熱服

接骨丹 治諸風鶴膝風

防風 牛膝 當歸 虎骨酥炙各一兩 枸杞子二兩

羌活 獨活 龜板 秦艽 草薢 松節

二蚕沙各一兩 茄根二兩 蒼朮四兩 酒糊丸空心服

脚筋急痛 淡酒煮木瓜令爛煮粥樣用裹痛處冷

證治六還 醫學近編 痺症 卷之六 韋 貞白堂

則易一宿三五度便瘥

學

經云肝氣熱則筋膜乾筋膜乾則筋急而攣又曰濕

熱不攘大筋纒短小筋弛長纒短為拘弛為痿

丹溪曰大筋纒短者熱傷血也不能養筋故為拘攣

小筋弛長者濕傷筋不能束骨故為痿弱攣皆屬

于肝肝主筋故也

丹溪治王秀濕熱大作脚痛後手筋拘攣足乏力

生地 當歸 川芎 白朮各二錢 蒼朮一錢 木通

甘草炙三煎湯下大補丸三十九其大補丸炒煨

薏苡仁散 治筋脉拘攣久風濕痺

薏苡仁 一斗 搗散以水二升取末數匙作粥空心

食之 衍義云筋急拘攣有兩等內經大筋受熱

則縮而短故攣急不伸則可用薏苡仁若因寒筋

急則不可用也

有寒攣 經曰寒多則筋攣骨痛

治筋極養血地黃丸 春夏服之

熟地 蔓荊子 各一錢 山茱萸 五錢 地膚子

證治大還 醫學近編 卷之六 圭 貞白堂

白朮 乾漆 蟾蜍炒 天雄 車前子 各三分 草薢

山芋 即山藥 澤瀉 牛膝 各一兩 爲末煉蜜丸桐子大

每服七十九酒下

治筋痺肢節束痛羚羊湯 秋服之

羚羊角 肉桂 附子 獨活 各一兩 白芍藥

防風 芍藥 各一兩 每服五七錢水煎薑三片一日

三服

千金薏苡湯 治筋攣不可屈伸

薏苡仁 白欬 芍藥 桂心 乾薑 酸棗仁

甘草 牛膝 各一兩 附子 三枚 醇酒二斗漬一宿微火

煎三沸每一升日三服扶持起行不耐酒服五合

活血通經湯 董監軍臆雪初癢因事到真定忽覺

風氣暴作六脉俱弦甚按之洪實有力其症手攣

急大便閉澀此風寒始加于身也四肢者脾也風

寒傷之則攣痺乃風淫末疾而寒在外也內經云

寒則筋攣正謂此也平素多酒實熱乘于腸胃之

間內則手足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒

之邪用桂枝甘草以卻其寒邪而緩其急搗用黃

證治大還 醫學近編 卷之六 圭 貞白堂

柏之苦寒以瀉實熱而潤燥急救腎水用升麻乾

葛以升陽氣行手足陽明之經不令遏絕更以桂

枝辛熱入于陽明之經爲引用潤燥復以芍藥甘

草專補脾氣便不受風寒之邪而退木邪專益肺

金也加人參以補元氣爲之輔佐加當歸身去裡

急而和血潤燥名之曰活血通經湯

升麻 葛根 當歸 人參 甘草 炙各一錢 桂枝

黃柏 酒炒各二錢 白芍藥 五分 水煎熟服令暖房中近火

摩搓其手乃愈

虛學 經所謂虛邪搏于筋則為筋攣又云脉弗榮

則筋急 仲景云血虛則筋急此皆血脉弗榮于

筋而筋攣成故丹溪治攣用四物加減本事方治

筋急極用養血地黃丸蓋本乎此也

丹溪治一村夫背偃僂而足攣已成廢人脉之兩手

皆沉弦而澀遂以蠶人煨腎散與之上吐下瀉過

月餘久吐瀉交作如此凡三帖然後平復

煨腎散 甘遂末三錢獺猪腰子細批開鹽椒淹透

參藥末在內荷葉包煨火內燒熟溫酒嚼下

證治大還

醫學近編 癰疽 卷之六

真白堂

蒼耳湯 治風濕痺四肢拘攣

蒼耳子 兩 搗末水一升半煎七合服 木瓜粥裏

筋攣處佳 方見鶴膝

一身盡痛

綱目云一身盡痛其病暴傷寒屬濕痺金見傷寒丸

陽症門其留連難已者于此求之寒而一身痛者

甘草附子湯熱而痛者當歸拈痛湯

甘草附子湯 治風濕相搏骨節煩疼痺痛不能屈

伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡不欲去衣

或發微腫者

甘草 白朮 各一 桂枝 兩 附子 炮 一分 四帖水煎

服 活人書云身腫者加防風一兩悸氣小便不

利者加白茯苓一兩半

東垣當歸拈痛湯 治濕熱相搏肩背沉重疼痛上

熱胸膈不利及遍身疼痛 方見脚氣門

東垣麻黃桂枝升麻湯 李夫人患渾身麻木睡覺

則少減開目久則已開目則麻復至此症用藥已

全去又因家事不和心中煩惱遍身骨節疼身體

愈為之冠

醫學近編 癰疽 卷之六 真白堂

沉重飲食減少腹中氣不轉運

麻黃 人參 升麻 黃芪 各五 桂枝 甘草 各

白朮 茯苓 澤瀉 各三 陳皮 半夏 草豆蔻

厚朴 黃柏 附子 各三 木香 生薑 各一分

本事方 治遍身皆痛如勞者若傷寒身體痛者不

可服但少年虛損冷德老人諸疾皆治之

人參 黃芪 附子 炮 甘草 木香 羌活

知母 芍藥 川芎 前胡 枳殼 桔梗

白朮 當歸 茯苓 半夏 各五 柴胡 鱉甲 醋

各一酸棗仁 桂心各三分 杏仁炒五分 每服二錢姜
三片烏梅三個葱白三寸同煎空心服

產後身痛

雄白趁痛散 產後氣弱血滯遍身疼痛身熱頭疼

當歸 牛膝 桂心 白朮 黃芪 獨活 生

薑各五錢 甘草 薤白各三錢五分 每服五六錢水煎

五積散加酒煎 治感寒頭疼身痛方見傷寒門

與四物湯各半服之治一身痛甚穩加桃仁治腰

痛逐敗血去風濕

證治大還 醫學近編 痼症 產後身痛 真白堂

大生牛膝散 產後遍身青腫疼痛及眾疾

牛膝 大麥芽 爲細末以新瓦礮子中填一層

麥芽一層牛膝如此填滿用鹽泥固濟火煨赤放

冷研末但是產後諸疾熱酒調下二錢

金棗丹 治一切風疾等症

川烏生用去皮 兩頭尖 防風 白芷 獨活 蔓

荊子 荊芥各四兩 白朮 羌活 細辛各五錢 全蝎

蠶蚕 天麻 葳靈仙 雄黃 木香 乳香各一兩

蒼朮 八兩 川芎 五兩 何首烏 一兩 沒藥 草烏各一兩

藥本二兩 當歸三兩 右末糯米糊丸棗樣大金箔爲
衣每服一錠傷風流涕好酒化下 中風不語生
薑湯下 左癱右瘓好酒調下 破傷風昏倒在

地牙關緊急好酒調服仍磨敷患處 雷頭風并

乾癬麻痺溫酒調服洗頭風酒服 偏正頭風及

夾腦風研末吹鼻中吐涎再用生薑汁調藥塗兩

太陽穴仍用茶清調服 風狗咬傷噙水洗淨敷

之 蜈蚣傷噙水洗過敷之 蛇傷入白礬少許

敷患處就以津唾調擦亦可 蝎咬唾調擦 痔

證治大還 醫學近編 痼症 產後身痛 真白堂

爛口嗽漿水洗過敷之 多年惡瘡不合口者口

嗽鹽水洗過敷之徐收 喘嗽桑白皮湯調服

紅絲魚眼襖脚腦疽發背疔瘡裡外膿然用白己

小便洗過并水調敷薄紙貼上再用裡外擦之

丹瘤并花水調藥鴨毛掃二三次不發灸瘡噙水

洗過貼上二三次起發方止

麻木

榮衛滯而不行則麻木。如坐久壓住一處麻木不能舉理可見矣。屬痰屬虛。木則全屬濕痰死血。一塊不知痛癢。若木然是也。

脈沉滑體厚人屬痰。與溼二朮二陳或少佐風藥。羌獨桂枝一二味兼參芪補氣。

婦人及素有鬱悒者當舒鬱。

脈微弱或弦大無力。病久體羸者屬氣虛。補中益氣或加製附子半片。夏月對生脈散。

證治大還

醫學近編

卷之六

麻木

頁白堂

一塊不知痛癢陰寒益甚。或日輕夜重。脈澀而花。或弦屬痰。挾死血宜活血。行氣。芎歸桃仁泥紅花牛膝二陳之類。加韭汁。大便見黑而便閉者桃仁承氣下之。

丹溪曰。干指麻木屬胃中溼痰死血。宜二朮二陳桃仁紅花少加附子行經。

補氣和中升陽湯

一婦人病六脈俱中得弦。洪緩相合。按之無力。弦在上是風熱。下陷入陰中陽道不行。其診閉目則

渾身麻木。晝減而夜甚。覺而開目則麻木漸退。久則絕止。常開眼則此症不作。是以不敢合眼。致不得臥。身體皆重。時有痰嗽。覺胸中不利。煩躁氣短。喘促。肌膚充盛。飲食不減。二便如常。此非風邪。乃氣不行也。治宜補益肺氣自愈。如經脈中陰火乘其陽氣動。為麻木者。當兼去其火則安矣。

補中益氣湯加蒼朮 草豆蔻 澤瀉 茯苓

黃柏 佛耳草 生甘草 白芍 氣不運加木

香 隨病加減

證治大還

醫學近編

卷之六

麻木

頁白堂

三妙丸 治濕熱下流。兩腳麻木。或如火燎之狀。

黃柏 去皮酒拌 蒼朮 六兩米泔 牛膝 去蘆 炒四兩 浸炒 二兩

桐九 桐子大。每服七八十九。空心鹽湯下。忌魚腥。

蒼朮煎炒

人參益氣湯 治兩手指麻木。四肢困倦。怠惰嗜臥。

熱傷元氣也。

黃芪 三錢 甘草 升麻 各半錢 五味子 三十粒 柴胡 六錢

甘草 生人參 各一錢 白芍 七分 白水煎稍熱服

大理卿韓珠泉。遍身麻木。不能舉動。求損菴公治。公

以神効黃芪湯加減授之用芪一兩二錢參芍各六錢他稱是一服減半彼欲速効遂併二服爲一服服之旬日病如失論以元氣未復宜靜養完固而後可出渠不能從盛夏遽出見朝謁客勞頓累日忽馬上欲墜仆從者扶歸邀公視公辭不治數日沒嗚呼行百里者半於九十可不戒哉。

桃仁承氣湯

生豚散

見若門

醫學近編 卷之七

真白堂

陳氏醫學近編 卷之七

雲間陳 治三農甫述 男

栻璣先 師崇羔愚 叅

長白石文煊南明甫定

門人 范 崧壽民 王 顯贊皇 校

痢症

脈滑按之虛絕者痢寸浮數尺濇者必下青膿血沉弦爲下重浮大爲虛浮弦爲風滑數爲實大者未止遲滑微小身涼脈緩者易治浮洪數大唇紅身

證治大還

醫學近編 痢症 一 真白堂

熱者難治

痢古名滯下者以積滯下行也濕熱傷氣則爲白痢濕熱傷血則爲赤痢黃者食積王宇泰云痢由脾胃之濕熱淫於大小腸也脾胃者十二經之海也胃中有濕熱則氣拂鬱而不化大腸受之則氣凝注而成白痢小腸受之則血凝注而成赤痢大小腸俱受病則成赤白並下也初起元氣未虛必推蕩之此通因通用也然亦有虛有實如腹痛惡心喜手按腹飲食不食四肢微冷脈虛細無力此

因脾胃虛寒。運化轉難而成也。宜四君子湯。參朮

加炒芍藥神麴砂仁。溫補以消之。如腹痛後重。怕

手按腹。煩渴溺赤。脈來洪數有力。此為濕熱積滯。

閉結。用承氣湯。枳實硝加炒乾薑大黃之寒。其性

善走。佐以厚朴乾薑之辛溫。善行滯氣。緩以甘

之甘。蕩滌腸胃。積行則止。若初起失下。痢至五六

日後。則腸胃虛弱。難勝下藥。白痢。用平胃散。蒼陳

加薑炒芩連滑石神麴山查檳榔木香枳殼芍藥

當歸炮薑和中調氣。久而不愈。宜補脾胃。升提為

證治大還

醫學近編 痢症 二 貞白堂

主用香參散。本門加升麻當歸五味子烏梅砂仁。滑

脫不禁。加肉豆蔻訶子炮薑。或力倦氣少惡食。此

脾胃元氣俱虛也。用補中益氣湯。參芪朮虛回

而痢自止。若數至圍而不能便。或少有白膿。或血

此脾土虛不能生肺與大腸。故氣傷而下墜也。用

黃芪人參湯。芪參朮血痢。用芍藥湯。加滑石桃

仁青皮枳殼蒼朮。行血調氣。久而不愈。阿膠丸。本門

或芍藥清榮散。加參朮五味子炮薑升麻防風。若

中氣虛不能攝血者。補中益氣湯。加芍藥烏梅訶

子。若食少倦怠。膿血稀薄。痢如荳汁。此元氣虛也。

香參散。本門加當歸粟殼。其或氣行血和。積少但虛

坐努。此為無血。四物倍歸身。以生地桃仁佐之。

陳皮和之。血生自安。赤白雜下。香檳導滯湯。本門

隨虛實加減。久而不愈。氣血俱虛。十全大補湯。本門

門加炮姜肉果訶子烏梅升麻。若久痢變為泄瀉。

清水。此陽氣下陷。變為虛寒也。參苓白朮散。參苓

肉白扁豆薏仁。山藥加炮薑砂仁肉果升麻。

凡痢。脾家濕也。若裏急後重。而身不熱。飲食如常。此

證治大還

醫學近編 痢症 三 貞白堂

其痢也。為脾家有餘。宜却邪以從正。先通利而後

用黃芩芍藥調理。若飲食不進。精神短少。四肢倦

怠。此似痢非痢也。為脾氣不足。宜養正以除邪。當

先補脾陰不足。兼之以升發胃氣。補中益氣湯。或

調中益氣湯。瘴後變痢。中氣虛也。補中益氣湯。瘴

痢交作。小柴胡清表而痢自除。如痢胸腹飽悶。溫

肺湯。如痢不肚痛。補中益氣湯。

徐彥純云。溲便膿血。血之滯也。故河間云。行血則自

愈。奔迫後重。氣之實也。故河間云。調氣則自除。膿

血赤白有氣病血病之分後重裏急有氣血虛實之異須兼察之

陳三農云痢疾必先通之為妙腹脹裏急後重宜利

若先瀉後痢此脾傳腎宜黃芩芍藥湯門本合四苓

散白朮赤茯苓澤猪并饋雜內虛加芍歸白芍木香初起加

吳茱萸一七後加炒黑乾薑或八物湯加木香腹

痛不止加乳香沒藥後用參苓白朮散加減調理

若仍瀉不止發熱不退用保元湯參朮多炒陳姜棗十全

大補湯參朮茯苓歸芍熟地芪桂但脉見豁大短數無至數

證治大還醫學近編痢症四貞白堂

者死

下利純血

痢下純血脉弦者由風邪下陷傷肝肝主血故也宜

升提之防風蒼朮芍藥湯下利清血腹不痛脉沉

細者此濕傷血也升陽除濕湯升防柴蒼朮麥芽澤猪陳州姜棗

加黃連地榆久下不止宜升陽益胃湯升防獨柴木茯苓

參半加芍歸生地阿膠炒黑乾薑痢下黑血或如

茶脚或如靛色名曰虫痢用側柏葉焙乾為末黃連等分煎飲

寒痢

痢如凍膠或如鼻涕此為寒痢由飲啖生冷過多傷

脾氣凝而滯下生也宜溫中湯門本加山查神麴日

久不愈理中湯參朮乾姜脉沉身靜腹痛嘔逆飲食

不入體重四肢不舉身冷自汗小便自利此臟腑

虛寒也急用薑附參朮甘州

痢如豆汁

痢如豆汁或赤黑相雜此濕勝也蓋脾胃為水穀之

海常兼四臟故有五色之相雜當先通利此迎而

證治大還醫學近編痢症五貞白堂

奪之之意如虛者胃苓湯二朮二苓澤陳桂州朴薛立齋

云久痢或黃中兼青乃肝木刑脾土宜補脾平肝

用四君子參朮加白芍黃而兼白乃子能令母虛

須補脾胃用益黃散陳青下河神黃而兼黑乃腎水侮

土宜補土制水用六君子參朮加薑桂肝脾濕

熱用升陽除濕湯升防柴蒼朮麥芽澤猪陳州姜棗肝脾風熱用

加味逍遙散歸芍茯苓朮肝經風熱防風黃芩丸

風入腸胃胃風湯桂芍白朮脾胃氣虛白朮散參

草果桂麥芽陳脾氣下陷補中益氣湯參芪朮升

噤口痢

噤口痢有虛有實若脾胃脈不虛或有頭痛五心煩

熱等症此因濕熱之毒薰蒸清道以致胃口熱極

閉結也用薑炒黃連梔子石膏蜜炙枇杷葉橘紅

半夏沈香反佐以炮薑寒因熱用以除胃口之邪

熱或用黃連乾薑等分苦參減半水煎乘熱時時

嚥之若候服熱毒之藥或脾胃素有實熱毒氣

上冲心肺而嘔者敗毒散枯甘草散前柴加陳米

薑專名余若服滋熱之藥太早閉結邪氣於胃

證治大還

醫學近編 痢症 卷之七

六 貞白堂

口者香積導滯湯本門加沈香薑汁或以蘿蔔莖汁

蜜調溫服外搗田螺入麝香填臍中以引熱下行

若脾肺脈虛弱或胸腹虛痞手足厥冷初病不

嘔痢久胃氣虛膈氣逆而作嘔吐或用涼藥過多

傷胃而嘔者六君子加竹茹丁香藿香山藥胃

虛不納穀者六君子加石葛蒲陳倉米薑汁不應

用參朮炮薑丸服

噤口痢係濕熱之毒用平胃散加薑炒黃連石葛

蒲牛膝薑汁乘熱時時咽之無有不愈

陳三農云噤口痢必用人參石蓮石葛蒲須加牛膝

以開其關或用黑牽牛燒存性火酒下

休息痢

此症痢後用葷太早及房事不禁勞役而然不可不知各因其得病之源以治之

其得病之源以治之

休息痢因兜澁太早積未盡除故致時作時止也宜

再投蕩積之劑後調脾胃如虛者以調養之中微

加消導藥仲景云下利已瘥至半月日時復發者

以積未盡也當下之休息痢先用補中益氣湯

加羌防服二三貼後用保元湯加當歸炒黑乾薑

證治大還

醫學近編 痢症 卷之七

七 貞白堂

調理虛弱者以人參黃連各一錢俱用薑汁拌炒

水煎服

疫痢

時疫作痢傳染相似當椎明氣運以施治時行痢

疾白朮平胃散紅多黃芩芍藥湯胸膈飽悶加枳

殼檳榔小腹痛加吳茱萸

下痢腹痛

李自材云下痢多因內氣鬱結不行所致然亦有挾

寒者痛則綿綿不已喜熱手按摸宜溫中湯本門

挾熱者痛則消。海唇紅。瀉赤。黃芩芍藥湯。本食

積者痛即欲痢。痢則痛減。木香檳榔丸。氣或香檳

導滯湯。本血虛者腹中隱隱而痛。喜手重按。四

物炒芍藥炒黑乾薑。死血者痛有常所。下墜異

常。痢中有紫黑色。腹痛尤甚。桃仁承氣湯。大黃桃

艸附加乳香沒藥木香丸服。氣滯者痛無常所

腹中攻刺。痢如蟹渤。拘急獨甚。木香調氣散。香附

蒼朮烏藥鼓陳貝朴蘇葉連梔枳桔梗木香加炒黃連枳殼。凡腹痛

諸方皆宜佐以姜桂等藥。古人治痢多佐以辛溫

證治大還醫學近編 痢症 八 貞白堂

之劑者。非為病寒設也。以氣滯不行。則為痛為積

為痢。為裏急諸症。假此辛溫開鬱行滯。俾氣血宣

通。其痛自愈矣。

世治云。痢不分赤白。新久。但腹中大痛。其脉弦急。或

澁或浮大。按之空虛。或舉按皆無力。宜小建中湯

芍桂枝

陳三農云。凡痢疾腹痛。下之不愈。溫之不愈。日久不

止。腹痛異常。此藥傷氣血。死血瘀滯。而然。用乳沒

各三錢。研細。酒調服。

裏急後重

統旨云。裏急後重者。積與氣墜下之故。然亦有虛有

實。如痢久積少。後重不去。縱便後而窘迫不減。氣

覺下墜。喜手按托。脉細弱無力。此脾胃虛寒。其氣

下陷也。宜溫補升提。如腹痛後重。怕手按腹起

即窘迫。便後畧減。是積滯壅盛。而物結墜也。宜推

蕩。如肛門焦痛。煩渴溺赤。身熱脉洪。是火燥大

腸也。宜黃芩芍藥湯。加生地枳殼槐花。本如腹

中攻刺拘急不寬。此大腸經氣滯而不宣通也。宜

證治大還醫學近編 痢症 九 貞白堂

木香調氣散。加枳殼。如積滯已少。但虛坐努固

而大便不行者。此血虛而氣下陷也。四物加參朮

炮薑升麻。如痢色紫黑。腹痛甚而下墜異常。此

為死血。桃仁承氣湯。大黃桃仁桂枝芒硝加滑石檳榔。

綱目云。後重逼迫而得大便。此有物也。宜推蕩虛

坐努固而不得大便。此為血虛。宜歸身生地芍藥

桃仁陳皮。用推蕩藥後。仍重。乃陽不升也。宜升陽

數語即上意。

大孔痛。痢初起肛門痛。乃濕熱積滯下流。自通利之。久則宜固元氣。而從以升提元氣。

固而不下陷則
肝門之痛自除。

集成云大孔痛因熱流於下也然亦有虛有實暴病
身熱脉洪此濕熱下流也宜芩連檳榔枳殼大黃
等清之。如久病身冷自汗脉沈小此因脾胃虛
寒迫熱下行也理中湯參朮乾薑加升麻柴胡溫之
虛寒滑脫加附子外以葱和花椒搗塞大孔中或
用黃蠟訶子燒薰之。

久痢不禁大孔開如竹筒宜用溫補以瀉去脫而
除其滑之法宜四君子加蜜炒御米殼肉豆蔻訶

證治大還

醫學近編 痢症 十

貞白堂

子炮薑白芍烏梅五倍子。

痢兼發熱

痢而發熱惡寒身首俱痛此為表症宜微汗和解用

藿香正氣散加減藿蘇芷蒼桔陳朴若身不疼

不惡寒止發熱煩渴自汗此屬濕熱積滯蒸發所

致宜推蕩之。若而垢嘔逆煩渴引飲腹中攻刺

小便色赤血痢頻頻此傷暑作痢也黃連香茹飲

連茹扁豆合五苓散赤茯苓澤瀉若久痢

發熱作渴午後尤甚此屬陰虛四物加參朮五味

子烏梅麥門冬黃芩若兼飲食不食身體倦怠此

又氣血兩虛脾胃虧損必用溫補升提宜十全大

補湯參朮苓朮黃桂加五味子升麻一切寒涼皆

在所禁也。周慎齋云痢而發熱口乾小便不利

香茹厚朴芩連枳殼澤瀉瀉猪苓腹痛加木香芍藥

痢而發熱脉浮者屬外感即宜解散用人參敗毒散

見表症須兼表治身熱太陽經參蘇飲解散表邪

熱退後方治痢寒熱少陽經小柴胡湯脾胃強健

熱結在裡方可用大承氣湯。

證治大還

醫學近編 痢症 十一

貞白堂

痢後痰逆

丹溪云痢久多見痰逆以久痢則陰虛火動故自下

逆上而作聲也宜四物加參朮炒黑黃柏竹茹半

夏陳皮或參朮湯下大補陰丸虛損若飲食不食

四肢微冷此胃弱脾寒之敗症也急用四君子參朮

加熟附炮薑

痢兼嘔吐

劉彥純云痢而嘔因胃氣不和者薑橘白朮湯木

因火逆冲上而嘔者橘皮竹茹湯參橘茹加薑炒

芩連 胃氣虛隔氣逆而嘔者六君子。參朮苓加

薑汁竹茹。積滯毒氣上冲而嘔者香櫞導滯湯

本加姜汁橘皮。陰虛火逆上冲而嘔者四物加

參朮白朮炒黑黃柏。

痢不能食。凡痢一飲食即便去一二次此脾虛不能運化脾弱不能統攝也宜參苓

白朮散濕脾為主

丹溪云痢而能食知胃未病也痢不能食是邪實正

虛也。惟宜調補切忌攻擊。久痢偶思何物即當與食益胃病則不思

食胃醒則思食投其所好痢自止矣。

證治大還 醫學近編 痢症 主 貞白堂

痢後浮腫。凡痢身腫者邪氣發於外也易治腹中脹滿者邪氣攻裡也難治肚腹通

身浮腫者脾虛也補中益氣湯合和中散

痢後浮腫此脾肺氣虛而虛氣行也切不可用泄氣

分利之劑。宜四君子。參朮苓加薏仁砂仁陳皮炮薑

土炒白朮車前子甚則補中益氣湯。參朮苓加歸柴升

熟附。若手足面目悉腫四肢逆冷此真陽脫而脾

胃敗也不治急用薑附參朮茯苓甘艸。

勞傷脾肺氣虛下陷痢白膿或血不可作痢論

東垣云飲食不節起居不時損其胃氣上升精華之

氣及下流腎肝而成瀉痢。或裡急後重或數至圓

而不能便或有白膿或血。慎勿利之利之必致重

病反鬱結不通矣。法宜填補中氣升之舉之。道舉

其陽而陰氣自降矣。

不治症

下痢純血者。如塵腐色者。如屋漏水者。大孔如竹筒

者。唇如朱紅者。身熱脉大者。四肢腫冷者。皆不治。

醫按

丹溪治一人久痢脉急促沉弦細滑。右為甚。下清涕。

證治大還 醫學近編 痢症 主 貞白堂

中有紫黑血絲。此瘀血也。以乳沒桃仁歸尾滑石

大黃檳榔木香丸。服下穢物。二三升而愈。

薛立齋治一人痢後嘔噦脉洪大。按之虛細。作渴引

飲。諸藥到口不納。作脾胃虛寒。不能司納。以參朮

炮薑等分飯丸。米飲不時送下。服至三兩。開藥不

嘔。以六君子加炮薑調理而安。

又治一人久痢後兩足浮腫小便短少。用分利藥。通

身腫兼氣喘。曰兩足浮腫脾氣下陷也。胸腹脹滿

脾虛作痞也。小便短少。肺虛不能生腎也。身腫氣

喘脾虛不能生肺也用補中益氣湯加附子愈

又治一人患痢下降或用疎導之藥兩足浮腫食少體倦煩熱作渴脉洪數按之微細以六君子加薑桂茱萸五味子冷服二劑而愈此假熱治以假寒也

王巖如治一人痢如豇汁日夜百餘次群公投以清涼下墜之藥愈危六脉沉弱此脾虛受濕也以補中益氣湯加羌防蒼朮二三劑愈

王又逸治一人痢後脚軟難行日久痢傷氣下多亡

證治大還

醫學近編

痢症

古

貞白堂

陰氣血俱虛不能榮養其筋骨也用八珍湯加牛膝杜仲木瓜薏仁而愈

陳三農治一婦患痢所服皆清涼剋伐之藥致脾胃虛弱血無所統日下數升遇有所觸其下益甚欲補血恐脾愈寒欲引歸經血去殆盡遂用陽生陰長之義以益氣湯溫養中氣而漸安

又治一士勤於舉業夏末患裡急泄白膿衆以痢治曰非也此積勞傷脾脾氣下陷即東垣所謂飲食不節起居不時上升精華之氣反下陷云云也用

補中益氣湯二劑而安凡勞役患痢俱治以上方或升陽除濕防風湯甚效

又治一士痢後腰腿攣痛不能俯仰此腎虛風寒濕所乘也用獨活寄生湯二劑愈

李自材治一士冒暑勞苦患血痢危甚用黃連當歸烏梅滑石各五錢香茹三錢甘艸一錢而愈

又治一士勞役患下利裡急及一產婦亦患是症俱治以升陽除濕防風湯去防風二劑而安

又治一人大便少而頻日七八十次常於兩股懸

證治大還

醫學近編

痢症

五

貞白堂

侯泄已數年矣人見而笑曰病既頻而少此欲通不得通也何不通遂通之以承氣湯一下而安

治噤口痢神效

綠色升麻醋炒一錢人參三錢蓮肉去心炒黃焦色三十枚

水一碗煎半碗飲之或蜜為丸每服四錢白湯下

噤口痢吐不納藥者

人參兩川連薑汁炒五錢石蓮子炒去心五錢

水二碗煎八分山查浸服之吐止痢亦止

治久痢紅中兼有青色白痰間發熱

川連	槐花 <small>錢各一</small>	白芍 <small>酒炒二錢</small>	廣陳皮 <small>二錢</small>
人參 <small>錢一</small>	蓮肉 <small>炒一十</small>	肉豆蔻 <small>八分</small>	炙甘草 <small>五錢</small>
山查 <small>錢二</small>	升麻 <small>醋炒五分</small>	砂仁 <small>炒一錢</small>	滑石末 <small>二錢五分</small>
調服			
治久痢	以花椒四十九粒小青一握陳酒煎服即止		
黃芩芍藥湯	治下痢膿血裏急後重行血則便自安調氣則後重自除		
黃芩	芍藥	大黃	黃連
當歸			
證治大還	<small>醫學近編 痢症 貞白堂 卷之七</small>		
檳榔	木香	肉桂	甘草
香薷導滯湯	治下痢膿血裏急後重腹痛窘迫日夜無度		
大黃	檳榔	枳殼	厚朴
木香			
乾薑	茵陳	滑石	黃連
芍藥			
當歸	甘草		
和中調氣飲	治下痢腹痛惡心欲吐		
白朮 <small>土炒</small>	茯苓	半夏	陳皮
厚朴			
香附	檳榔	枳實	青皮
當歸			

砂仁	乾薑	炒麴	蒼朮	木香
木通				
調中清氣散	治下痢腹痛甚利下無度			
黃連	枳殼 <small>各一兩</small>	槐花 <small>二兩三味水浸片時</small>		
乳香	沒藥 <small>各八分</small>	煎服		
芎歸和血飲	治血痢窘迫			
當歸	芍藥	川芎	生地	黃連
桃仁	滑石	木香	沒藥	痢久加
阿膠白朮烏梅五味子				
證治大還	<small>醫學近編 痢症 貞白堂 卷之七</small>			
調衛清榮散	治下痢赤白用導滯等湯不愈宜此			
蒼朮	白朮	白芍	當歸	生地
炒麴	厚朴	黃連	黃芩	滑石
防風	升麻	木香	五味子	甘草
薑茗飲	治多食油膩厚味之物成痢用此洗滌垢膩			
細茶	生薑 <small>各一兩</small>	山查 <small>五錢</small>	皂莢 <small>二錢</small>	
水三碗煎碗半分二服				
薑橘白朮湯	治下痢胃氣不和嘔吐			

橘皮	白朮 <small>各二錢半</small>	半夏	茯苓	竹茹 <small>各一錢</small>
溫中湯	治痢如凍膠及鼻涕飲食不食腹痛不已	厚朴	生薑	
蒼朮	厚朴 <small>各一錢</small>	乾薑 <small>炒</small>	砂仁	木香
神麴 <small>炒</small>	青皮 <small>炒</small>	芍藥 <small>炒</small>	生薑 <small>煨</small>	
香參散 <small>秘方</small>	治痢久積穢已盡腹中不痛或微痛不後重但滑溜不止			
人參	白朮	白茯苓	白扁豆	
陳皮	肉果	烏梅	木香	甘艸
證治大還	<small>醫學近編 痢症 卷之七</small>	木	貞白堂	
陳米 <small>炒</small>	滑溜加粟殼爲末沙糖湯下三錢			
人參散	治大腸風虛挾熱下痢膿血腹痛日久不止			
人參	樗根皮 <small>各一兩</small>	爲末酒下二錢		
參芪養正湯	治痢後感寒及虛寒兩足浮腫不能行動			
黃芪	白朮	茯苓	甘艸	
當歸	川芎	芍藥	熟地	杜仲
牛膝	薏仁	防風	獨活	防已

香連丸	治諸痢腹痛後重小便短赤	橘皮	青皮	厚朴	山查	神麴
麥芽	赤茯苓	青木香	黃連 <small>炒</small>	白朮		
滑石	沈香 <small>各一兩</small>	砂仁	人參	香附		
三稜	莪朮	檳榔 <small>各五錢</small>	白芍 <small>二錢</small>			
蜜丸彈子大薑湯化下二丸						
化氣丸	導積滯濕熱甚捷					
牽牛	<small>頭末六兩 黑白兼</small>	大黃 <small>酒洗</small>	滑石	黃連 <small>炒</small>	黃芩 <small>炒</small>	
證治大還	<small>醫學近編 痢症 卷之七</small>	木	貞白堂			
三稜	山茵陳	莪朮	檳榔 <small>各二兩</small>			
牙皂	木香 <small>各一兩</small>	皂莢煮汁打神麴糊冷丸				
此方最驗貞子以此施人活者無算						
地榆丸	治血痢					
地榆 <small>微炒</small>	當歸	黃連	訶子 <small>炒</small>	木香		
烏梅 <small>等分</small>	蜜爲丸					
仲淳效方						
白芍 <small>酒炒</small>	枳殼	槐花 <small>同炒去槐花五錢</small>	升麻 <small>醋炒七分</small>			
川黃連 <small>酒洗</small>	滑石末	三錢	乳香 <small>七分</small>	沒藥 <small>七分</small>		

山查肉 三錢 甘艸 五分

阿膠丸 治一切痢疾及血痢腹痛

黃連 四兩 白朮 當歸 各二兩 阿膠 一兩二錢

乾薑 炮五錢 醋化阿膠為丸和劑無白朮名駐車

九宣明有赤茯苓赤芍藥黃柏亦無白朮

椿根皮丸 治久痢腥臭滑泄無度

椿根皮 去粗皮泔水浸三兩 訶子肉 一兩 滑石 一錢

人參 一錢 末糊為丸沙糖湯下

一方用椿根皮黃連木通等分為末白痢淡薑湯

證治大還 卷之七 醫學近編 痢症 三 貞白堂

送下赤痢沙糖湯下三錢新久悉效

滑連飲 治痢有積滯者難勝下藥用此即愈神效

黃連 三錢 滑石 四錢 白 二錢 生甘艸 一錢

薑水煎服

蜀沙門治久痢 以訶黎勒三枚麴裹煨飯九米飲

下

劉禹錫治氣痢虛冷痢 以牛乳煎薑撥飲之

集驗治血痢 以乾薑燒存性米飲下一錢

千金治赤白痢 以雲母粉米飲調下

杜壬治氣痢 以黃連一兩乾薑五錢溫酒下二錢五分

勝金方 治婦人臨產痢用梔子燒灰熱水調服

千金治產後痢及小兒久痢 以沒石子燒灰為末酒下

久痢急藥 用五倍有輪角者牙茶等分枯礬少許

烏梅肉大蒜搗為丸服

治小兒瀉痢不必服藥 土水蠶半個母丁香四粒

麝香一分五釐為細末津調為丸如芡實大納臍

證治大還 卷之七 醫學近編 痢症 三 貞白堂

中外以膏藥貼之立愈

治濕熱腹痛 滑石一兩為末以丹皮汁煮之白芍

酒炒五錢炙甘艸二錢炒黑乾薑五分水煎調滑

石末服之

治小兒痢 芭豆草麻各二分杏仁桂心胡椒冰片

各七釐搗丸硃砂為衣納臍中外以膏藥貼之有

積則瀉無積則止

暑月吐瀉 滑石炒二兩藿香二錢半丁香五分為

末每服一二錢米泔水調服

一人暑月受勞。遂下痢純血。

用人參五錢。升麻七分。炙甘草一錢五分。烏梅二枚。紅麴一錢五分。川連三錢。白芍二錢。蓮肉四十粒。煎調滑石末五錢。二劑而愈。

證治大還

醫學近編

痢症

圭

貞白堂

瘧症 十五

瘧脈自弦。弦數多熱。弦遲多寒。弦緊宜汗。弦數宜清。弦遲宜溫。弦小緊宜下。浮大滑宜吐。微細為虛。宜補。虛微無力。為久病代散則死。

帝曰。夫瘧之始發也。先起於毫毛。伸欠乃作。寒慄鼓頷。腰脊俱痛。寒去則內外皆熱。頭痛如破。渴飲水。飲何氣使然。岐伯曰。陰陽上下交爭。虛實更作。陰陽相移也。陽并於陰。則陰實而陽虛。陽明虛則寒。慄鼓頷。巨陽虛則腰背頭項痛。三陽俱虛則陰氣勝。陰氣勝則骨寒而痛。寒生於內。故中外皆寒也。陰氣逆極則復出之。陽陽與陰復并於外。則陰虛而陽實。陽盛則外熱。陰虛則內熱。故渴而欲飲水也。此夏傷於暑。熱氣藏內。秋氣汗出。遇風遂閉。汗孔者。毒無從發泄。舍於皮膚之內。與衛氣并居。衛氣者。晝日行於陽。夜行於陰。此氣得陽而外出。得陰而內薄。內外相薄。是以日作。其間日發者。由氣舍深。內薄於陰。其道遠。其氣深。其行遲。不能與衛氣俱行。不得皆出。故間日而作也。

證治大還

醫學近編

瘧疾

一

貞白堂

證治大還

醫學近編

癰疽

貞白堂

丹溪云癰病因暑邪舍於榮衛之間致腠理不密復遇風寒鬱閉汗孔鬱汗成痰寒熱相薄故為癰也邪并於陽則熱邪并於陰則寒淺則日作深則間之在氣則早在血則遲渴者燥勝不渴者濕勝按有風癰寒癰暑癰濕癰痰癰食癰疫癰瘡癰瘰癧母治須分別陰分陽分有汗無汗新久虛實新發者可散可截虛弱及日久者宜補宜溫初發之時病勢正熾一二發間不可遽截只用柴葛疎邪飲門本柴胡和解散門本發散其邪寒多加厚朴草果溫散門本證治大還醫學近編癰疽貞白堂

熱多倍柴胡黃芩清解邪氣得出自然安也若感冒風寒之極熱極無汗者俟熱甚將解之際用散邪湯門本熱服乘其熱而發之若三四發後便應截住勿令發得氣虛病邪愈深而難治即以七聖散不二飲門本截之若用截藥不效此人不虛其胃中有痰飲也宜用常山甘草吐之不愈仍用截藥若氣虛者則不宜截截亦勿效愈截愈虛必成重疾常與參朮藥一二貼托住其氣勿令下陷日發用人參養胃湯門本久而不愈用大劑補中益氣湯

證治大還

醫學近編

癰疽

貞白堂

參芪朮歸 加煨薑或參芪參朮飲門本夜發用桂枝桃仁湯門本或疎肝飲門本日久不愈用人參養榮湯參朮苓芪歸芍熟地或何首烏散門本或補氣升陽遠志五味陳桂心藥癰而煩熱多汗此暑熱傷氣也人參白虎湯音知癰病肚腹脹滿此寒邪與飲食交結也交加飲子門本癰久虛弱寒熱不多或無寒而但微熱此邪氣已少虛熱使然宜人參養榮湯參芪朮歸熟地芍遠志陳桂姜棗久癰或作或止或亂發失期或發熱不止飲食減少名曰癰勞宜六君子證治大還醫學近編癰疽貞白堂

湯參朮苓加芍歸炒芍藥黨甲柴胡烏梅煨姜風癰惡風自汗脉浮桂枝羌活湯寒癰惡寒無汗脉緊麻黃羌活湯暑癰而垢口渴雖熱已退亦常自汗白虎湯濕癰小便不利骨節重痛而煩脈滿自汗滲濕湯加柴胡黃芩或胃苓湯二朮二苓澤痰癰痰涎潮壅二陳湯加常山枳實柴胡黃芩食癰惡食吞酸愛氣胸膈不寬平胃散加青皮草果砂仁神麴疫癰一歲之間長幼之病多相似藿香正氣散蘇白芷蒼朮陳朴大腹皮

原书缺页

原书缺页

足少陽之瘧令人身體懈憊寒不甚熱不甚惡見

人見人心惕然熱多汗出甚也解者懈急之極也胆主半表半裡

故寒熱不甚胆屬木木性喜靜故惡人煩擾胆虛故惕然惡懼也足陽明之瘧

令人先寒洒淅洒淅寒甚久乃熱熱去汗出喜見

日月光火氣乃快然者由病則陽氣不足故也陽

虛故喜日月光足太陰之瘧令人不樂好太息

不嗜食多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已乃衰脾主

暑邪相薄故不樂暑氣煩悶故好太息脾病故不

嗜食脾為陰中之至陰暑邪內薄故多寒熱病至

則嘔者邪客于經也足少陰之瘧令人嘔吐甚多寒熱熱

證治入選醫學近編瘧人貞白堂

多寒少欲閉戶牖而處其病難已肺脈貫肝膈入

吐腎為陰藏陰氣不足故熱多寒少陰虛故嘔

陰之瘧令人腰痛少腹滿小便不利如瘧狀數便

意恐懼氣不足腹中悒悒肝主疎泄小腹乃肝之

行故悒悒而滿也邪熱在于小腹故數肺瘧者令

便而腹中悒悒也惡懼者肝虛故也肺瘧者令

人心寒寒甚熱熱間善驚如有所見則寒寒甚則

復出之陽故熱甚心瘧者令人煩心甚欲得

清水反寒多不甚熱心為火暑熱相薄故令煩心

熱極似水也肝瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死

者其狀若死者肝病不能榮筋而懶于展轉也脾瘧者令人寒腹中

痛熱則腸鳴鳴已汗出胃瘧者令人且病也善

飢不能食食而支滿腹大有熱邪故不能食而腹

滿脹大也綱目云活人治瘧先熱後寒者小柴胡湯先寒後熱

者小柴胡加桂枝湯柴胡桂枝湯多熱但熱者白虎

加桂枝湯石枝艸多寒但寒者柴胡桂枝湯本此

以寒熱多少定法也然多寒而但寒者其脉濇實

或滑當作實熱治之不可便用薑桂多熱而但熱

證治入選醫學近編瘧九貞白堂

者其脉空虛或微弱當作虛寒治之不可便用白

虎丹溪治一婦病瘧三日一發食少經不行已三月脉

無時冬寒欲作虛寒治但見其梳洗言動如常始

悞經不行非無血乃為痰所碍脉無非氣血衰乃

積痰結伏其脉而不見耳以實熱治之與三花丸

旬日後食進脉出帶微弦謂胃氣既全當不藥而

愈令淡滋味果應

一人久瘧先問日後一日一來早晚不定此腎不納

子 49-170

氣故也。用人參、茯苓、半夏各一錢，丁香、五味子各五錢，益智、甘州各三分，薑水煎服。

又治一婦人，久痢，因哭子變癰。一日五六作，汗如雨不止，脈微數，疲甚。曰：痢後無陰，悲哀傷氣，陰虛陽散，故汗出如雨也。遂用參、朮各二兩，芍藥一兩，黃芪五錢，炙甘草二錢，濃煎，日服四五次而愈。

一人患瘧苦甚，往告仲淳。診之，憊極爲之疏三方。作五劑，一日夜飲盡，次早瘧止。先二劑清暑，用大劑竹葉石膏湯，加桂枝，以其渴而多汗也。次二劑健

證治大還

醫學近編 瘧

十一

貞白堂

脾去積滯，用橘紅、白豆蔻、白朮、茯苓、烏梅、白扁豆、山查、麥芽，後一劑人參一兩，薑皮一兩，水煎露一宿服効。

劉彥純治二婦病瘧。一者面光澤，作濕在氣分，非汗不解，兩發汗而愈。二者面赤黑，作暑傷血分，用四物湯加苦寒之劑，二日發瘧瘡而愈。

陳貞白治二人病瘧。一發於晝，一發於夜，晝發者乃陰中之陽，宜補氣解表，用小柴胡湯，倍人參、柴胡，加白朮、葛根、川芎、青皮。夜發者乃陰中之陰，宜補

血疎肝。用四物湯合小柴胡湯各三四服，大汗而愈。

王宇泰治蔣先生牝瘧。衆醫因身疼寒甚，欲用桂附。曰：溽暑未衰，明係邪熱，安可溫也。經曰：陽并於陰，則陰實而陽虛。陽明虛，則寒慄鼓額；巨陽虛，則腰背頭項疼；三陽俱虛，則陰氣勝。陰氣勝則骨寒而痛，寒生於內，則中外皆寒。此寒乃陰陽交爭，非真寒也。遂以柴胡、羌活、防風、升麻、葛根以升接三陽，以桃仁、紅花引入陰分，而取陽以出，還於陽分。以

證治大還

醫學近編 瘧

十二

貞白堂

猪苓分隔之，使不復下一服而愈。又治令尹劉患瘧，而洞泄不止，以交加飲子一劑而愈。

一人患三日瘧，久而不愈，飲食不食，口不知味，熱多寒少，用人參、黃芪、柴胡、半夏、茯苓、當歸各一錢，黃芩七分，甘州、青皮各五分，姜棗煎服。

又治一老嫗患瘧，因年高懼其再發，欲截曰：一劑而已，亦甚易。焉用截爲？遂以羌防、柴葛、升麻、升陽氣，使離於陰，知母、石羔、黃芩引陰氣下降，使離於陽。

原书缺页

原书缺页

何首烏二兩 白朮一兩 酒煎服 瘧久或脾胃虛寒加丁香一錢

停食發瘧 用礬紅和平胃散作末棗肉和丸白湯下三錢

交加飲子 治食癮或寒邪與飲食交結胸腹脹滿或泄瀉

肉豆蔻二枚一煨 草豆蔻二枚一煨 厚朴二錢半生一兩半 生薑一兩半

久瘧方

證治大還

人參五錢 常山一錢同酒拌一時煎炒去常山取人參煎服

驚甲丸 治瘧母

驚甲二兩 醋炙三稜 莪朮各一兩 海石二兩 香附二兩 醋化 醋糊為丸去香附加蝦蟇雄黃麝

香獨蒜為餅貼塊上

瘧母丸方

驚甲四兩 麝香一兩五錢 廣橘紅一兩 射干一兩 一青皮八錢 人參八錢 肉桂六錢 乾漆一兩 研細為細末用醋煮糯米粥和丸梧子大每四錢淡

薑湯下

截瘧丹

常山一兩酒 檳榔四兩 麵餵九如梧子大早晚各服三十九酒下

治胎瘧

人參三錢虛甚瘧久白芍三錢陳皮二錢 麥冬三錢青皮七分厚朴二錢 山查肉三錢 脾胃不佳加川連姜汁炒一錢五分 藿香五分 白豆蔻二分 姜皮五分 竹葉三十片 白茯苓二錢

證治大還

治三日瘧

常山丁香各三錢切片酒 檳榔二錢厚朴一錢丁香五分酒鹵一鍾半煎服即止止後宜大補元氣

外臺秘要治瘧勞 用牛膝一握水六碗煎三碗分

三服未發前服臨發時又服此方亦驗

截瘧方 白朮五錢陳皮二錢五分細丁香五粒母

丁香二粒當歸三錢烏梅一個水一碗浸一宿清

神秘聚 紫蘇二兩常山丁香各一兩全蝎三十頭

足全者

大棗百枚長流水六碗煮乾 大人食五六枚小兒三四枚

胃脘痛

陳三農曰真心痛者，僵仆捧心，手足青至節，旦發夕死，夕發旦死，邪傷其心主也。今言心痛，卽胃脘痛也。以其近於心部而言之，因心包脉絡于胃脘，或胸膈食傷，寒凝血滯，氣逆痰厥，或虫積，或鬱火，皆能致痛也。

初起大法，初痛宜辛散，久卽多火，須監涼藥。惡心者，先以鹽湯探吐，吐定用藥極妙。

寒痛脉沉遲，或伏，手足逆冷，忽然大痛者，屬寒，二陳證治大還

醫學近編 胃脘

一 貞白堂

炮薑蒼朮白豆蔻肉桂平胃之類。

痛，右寸關脉洪數而疾，口乾渴，時痛時止者，火也。

二陳湯加薑汁炒黃連，梔子香附撫芎主之。

大槩胃中有熱，而作痛者，非山梔子不可，須佐以薑汁，多以台芎開之。

痰積脉滑而實，症兼惡心，吐酸清水，胸中脹滿而痛。

痰也。大劑二陳，加香附蒼朮貝母膽星，一方濕

痰作痛，心下有塊，時作惡心，用螺螄壳煨服，一

方用蛤海粉佐香附末，用川芎山梔生薑汁煎辣。

湯調服爲佳。又法牡蠣煨粉酒下二錢，一法

明礬溶化就九鷄頭子大薑湯下一丸。

肥人中脘痰多作痛，小胃丹妙。

食積，右寸關沉滑有力，心下痛，手不可近，症兼嘔吐

食積，也就吐中以鵝翎探之，吐出宿物爲佳，如吐

不出，當用二陳加山查枳實厚朴蒼朮消導和中。

初必加辛散藥，香砂豆蔻炮薑之類，數日不止，反

加口燥渴火症者，減辛熱，佐以薑汁炒芩連，不惡

心加炒梔子，再不止，枳實導滯丸最佳，脉弦實七

證治大還

醫學近編 胃脘

二 貞白堂

八日不太便下之，亦可痛隨利減也。

左脉數熱，多瀉者，死。血右脉緊實痰多，弦大必是久

病。

死血脉濡而滑，或乳口中作血腥氣，日輕夜重者，死。

血也。越鞠加牡丹皮鬱金歸尾桃仁紅花，不已，桃

仁承氣湯並汁之類，一方用薑汁炒山梔煎湯

佳。或入越鞠內，以薑汁能清胃脘之血故耳。

氣鬱脉沉伏，或結，或弦，胸中脹痛者，氣鬱也。二陳加

製香附川芎木香青皮蓬朮之類，不減亦加炒。

原书缺页

原书缺页

一方用黃荊子炒焦爲末米湯調下二錢立止又治白帶

婦人心氣痛不可忍五靈脂淨好者蒲黃等分爲末每二錢醋半盞熬成膏水一盞煎七分熱服名失笑散

手拈散治心痛妙括曰草果玄胡索靈脂并沒藥酒調二三錢一似手拈卻

大抵中宮氣不清則痛有挾痰者有日久成積者有挾火者古方用陳皮香附甘草末爲君因所挾而

證治大還

醫學近編 胃脘

七

貞白堂

兼用藥挾痰加海粉挾火加梔子積則蓬朮醋炙死血加乾漆要在用之合宜耳

一婦苦胃脘痛每發輒大吐多方不應以鹽湯探吐

出積痰碗許痛良愈後常作惡心知胃中有痰也

以橘半枳朮加製香附撫芎白螺壳南星海粉神

麴打糊丸白湯下錢半未及一半病去如脫

一老嫗性急而痛已六日諸辛藥歷試無驗診得左

關弦急而右寸更甚其痛一來卽不可當少選稍

定口乾面時赤知肝氣有餘成火也乃以越鞠加

吳茱萸炒黃連薑汁梔子二劑頓愈

一婦痛幾一月右關寸俱弦而滑乃飲食不節所致投滾痰丸一服下痰及宿食三碗許節食數日調理一月而愈

一嫗痛久諸藥不應六脉微小按之痛稍定知中氣虛而火鬱爲患也投理中湯一服隨愈

一中年人因鬱悵心下作痛一塊不移日漸羸瘦予桃仁承氣湯一服下黑物并痰碗許永不再發

治寒之劑

證治大還

醫學近編 胃脘

八

貞白堂

全匱赤石脂丸心痛徹背背痛徹心此寒厥心痛

烏頭三錢附子五錢蜀椒乾薑赤石脂各二

石末蜜丸梧子大食後白湯下一丸日三服

一附湯寒厥暴痛脉微氣弱

甘草炙一兩白朮四兩附子一兩每三錢薑棗煎

立應散寒痛氣痛腹痛皆効

良薑香附各炒等分爲末白湯調下三錢

一薑散養脾溫胃去冷消痰治心脾痛寬胸下氣進飲食一切冷物所傷並皆治之

乾薑炮 良薑等分 爲末麪糊丸梧子大每服十五
九至二十九食後陳皮湯下。妊娠婦人不宜服此
皆溫中之藥也。

散寒之劑

麻黃桂枝湯 外因心痛惡寒發熱內攻五臟拘急
不得轉側。

麻黃 桂心 芍藥 細辛 乾薑 甘草炙各

五分 半夏 香附各五 每服五錢薑五片水煎食

前服大便秘入大黃量虛實加減。

證治大選

醫學近編 胃脘

丸

貞白堂

一人心痛諸藥不効服此而愈

檳榔 桂心 葛根 甘草減半 細辛 半夏

桔梗 枳殼 川芎 防風各等 水煎服

草豆蔻丸 客寒犯胃。

草豆蔻一錢 吳茱萸炮 益智仁 僵蚕炒 當歸身

青皮各六 神麴 姜黃各四 甘草三分 桃仁七個

半夏一錢 澤瀉一錢 麥芽錢半 炙甘草六分

柴胡四分 詳勝 人參 黃芪 陳皮

右除桃仁另研如泥外爲極細末同研勻湯浸蒸

餅爲丸梧子大每三十九執湯下。食遠服

治心痛 用荔枝核燒存性爲末醋湯下二錢

內傷飲食之劑

黃黃丸 治飲食過多心腹脹滿脇肋走氣痙痺刺

痛

雄黃一兩 巴豆五錢 去皮 入白麪二兩同研勻滴

水丸梧子大滾水煮十二丸以利爲度不必盡劑

藥本湯 治大實心痛大便已利宜以此微其痛也

藥本牛兩 蒼朮一兩 水煎溫服

證治大選

醫學近編 胃脘

十

貞白堂

飲食在膈上未入胃者宜吐之經曰在上者因而越

之如瓜蒂散之類。

氣痛之劑

正氣天香散但忍氣 七氣湯 蘇子降氣湯見氣門

治痰飲痛劑

丹溪方 痰飲停積胃脘作痛

螺螄殼上年久 滑石炒 蒼朮 山梔 香附

南星各二 枳殼 青皮 木香 半夏 砂仁各

錢 右末生薑汁浸蒸餅爲丸菜豆大每三四十

原书缺页

原书缺页

燥二便阻滯則內有鬱火矣。或原有舊病因感而發。延綿日久。見症如前者。俱用開鬱行氣降火潤燥之藥。川芎香附炒山梔黃連薑汁之類。甚者加芒硝。但治心腹久痛。須于溫散藥內加苦寒鹹寒之藥。溫治其標。寒治其本也。

胸滿胸痛胸痺

胸虛則胸痛引背脇。實則胸痛不能轉側。喜太息。仲景曰。肝中寒者。兩臂不舉。舌本燥。喜太息。胸中痛。不得轉側。則吐而出汗也。肝著其人常欲踏其胸。證治大還 醫學近編 胃脘 卷之八 五 貞白堂 上先未苦時。但欲飲熱旋覆花湯主之。

素問曰。陽明所謂胸痛短氣者。水氣在臟腑也。水者陰氣也。陰氣在內。故胸痛少氣也。

金匱行義 此症胸痛者。薤白酒方。胸不痛而氣結。

短氣者。用枳實薤白桂枝湯。

枳實 四枚 薤白 半升 桂枝 一兩 瓜蒌實 一枚

厚朴 四兩 水五升。先煮枳厚二升。內藥煮。

仲景治胸痺之病。喘息咳唾。胸背短氣。寸口脈沉而遲。關上緊數者。宜以瓜蒌薤白白酒湯主之。

大瓜蒌 一個 薤白 半斤 白酒 七升 三味同煮取二

升分溫再服。 此方仲景金匱元有半夏半升。

一婦人患胸中痞急。不得喘息。按之則痛。脈數且澀。此胸痺也。因與小陷胸湯。一劑而愈。

支飲胸滿者。枳朴大黃湯主之。

厚朴 一兩 大黃 六兩 枳實 一兩 水五升。煮二升分

溫再服。

斗門方 治胸腹壅滯。去痰開胃。

半夏泡淨焙乾為末。生薑自然汁和為餅。下用濕

證治大還 醫學近編 胃脘 卷之八 五 貞白堂 紙包于慢火中煨令香熟。水一盞用餅子一塊如

彈子大。入鹽半錢煎取一盞溫服。大能去胸膈壅

滯。大壓痰毒及治酒食所傷。其功效大矣。

一入年二十三歲。膈有一點相引痛。吸氣皮覺急。此

有汚血也。

滑石 一兩 桃仁 五錢 黃連 五錢 枳殼 一兩 甘草 炙

錢為末。每服一錢半。以蘿蔔自然汁煎熟飲之一

日五六服。

一人因服溫補藥。又妄自學吐納。以致氣亂血熱。嗽

血消瘦。脇間有一點氣梗痛。似有一條絲垂映在

腰與小腹皆痛。大率偏在左邊。此肝部有惡血也。

滑石 枳殼炒各一兩 黃丹炒三錢 黃連 柴胡各五錢

紅花 一錢 桃仁 二兩 甘草 二錢 爲極細末。每服

錢半。以蘿蔔汁煎。沸服之。有寒邪干于胸中。宜發

散之。如紫蘇前胡杏仁防風桂枝葛根之類。

茯苓杏仁甘草湯 治胸痺。胸中氣塞短氣。

茯苓 二兩 杏仁 五十 甘草 一兩 水一斗。煮五升。溫

服一升。一日三服。

證治大還 卷之八 胃脘 七 貞白堂

橘枳薑湯 治同上

陳皮 一斤 枳實 二兩 生薑 半斤 水五升。煮二升。分

溫再服

千金方 治胸痺。氣滿塞。心膈不利。

枳實 二兩 麩炒爲末。清米飲下二錢

仲景薤白附子湯 治胸痺緩急。

薤白 十五 大附子 十個 爲末。每服方寸七。日二服。

旋覆花湯 治胸中嘈雜。汪洋常覺冷涎泛上。元元

欲吐。飽悶。

旋覆花 橘紅 半夏 茯苓 甘草 厚朴

芍藥 細辛 薑三片。水煎服

虫痛

虫本濕熱所生。臟腑虛則侵蝕。

療寸白虫。錫灰燕羹。檳榔極佳。宜和中。一人每覺心

中多嘈雜。意欲作飲。又疑虫。漫依此方。翼日下長

虫二條。一長二尺五寸。頭扁尾濶。尖銳。每寸作二

節。斑如錦紋。一條皆寸斷矣。

千金方去勞則生熱。熱則生虫。心虫曰蛔。脾虫曰蛭。

證治大還 卷之八 胃脘 六 貞白堂

越鞠丸 見鬱結門

平胃散 見脾胃門

枳實導滯丸 見食門

二陳湯 見痰門

見食門

見食門

見食門

見食門

見食門

胃風

飲食訖乘風涼而致其症。脹滿。食飲不下。形瘦腹大。惡風。頭汗。隔塞不通。或頭面腫起。右關脉弦而緩帶浮。胃風湯主之。

胃風湯 治胃經受風。麻木。肌肉與目蠕動。面腫。或牙關緊急。

白芷一錢 升麻二錢 葛根一錢 蒼朮一錢 柴胡一錢 甘草一錢

錢五分 藥本 羌活 黃柏 草豆蔻 各三錢 麻黃半錢

不去節 夏月減 蔓荊子 分 歸身 錢 薑三片 棗三枚 煎八分

證治大還

醫學近編 胃風 一 貞白堂 卷之八

分熱服

胃風湯 治風冷入于腸胃。泄下鮮血。或腸胃淫毒。下如豆汁。或瘀血。

人參 茯苓 川芎 當歸 桂 白朮

白芍 各等分 加粟米百粒同煎。腹痛加木香。

腹痛

陳三農曰。腹痛多岐。審脉詳切。投劑有功。乃稱神絕。脉沉遲多寒。脉浮數多熱。脉散無力者虛。脉弦有力者實。脉滑者痰。脉弦者飲。脉沉弦而伏者積。脉伏而弦者聚。脉乍大宜小。而沉澁者虫。脉緊而澹或結而促者。死血也。

中脘痛屬太陰脾。當脘屬少陰腎。小腹屬厥陰肝。

有寒有火。有積滯。有食積。有死血。有虫。

證治大還

醫學近編 腹痛 一 貞白堂 卷之八

寒六脉沉遲。腹暴痛。綿綿無停止。面青色白。不渴。或

暴吐瀉者。寒也。香砂理中湯主之。嘔吐用香砂二

陳平胃。白豆蔻炮薑官桂之類。或日雖久。涼劑不

應。脉雖洪大。按之不鼓。亦屬伏陰。理中湯加熟附

子一片。浸冷服。

火脉數而疾。時痛時止。或瀉黃沫。症屬口乾惡心。頭

眩者。火也。恒見於酒客。二陳加薑製黃連木通蒼

朮川芎厚朴主之。不已。用熟大黃瀉之。金花丸最

妙。

氣脉沉結或伏痛引兩脇及肩背不得俛仰者氣滯也。二陳川芎木香青皮枳殼香附主之。恒見於婦人甚者加三稜蓬朮或先以香稜丸破滯氣。

痰右關脉沉滑或弦症兼嘔吐頭眩或嘔冷涎或下

白積小便不利而痛者痰也宜導痰解鬱二陳香

附蒼朮川芎枳殼主之。有火症者滾痰丸最佳。

食氣口緊盛或沉實痛有形在中脘痛甚即瀉瀉後

痛減食積也宜化積消導二陳查麴平胃越鞠炮

薑等不應雖瀉仍用化積丸推逐之乃通因通用

證治大還 醫學近編 腹痛 二 頁白堂

法也如手不可近嘔吐就吐中以鴉羽探之吐出

宿物為佳如吐不出當從食積治脉堅實不大便

下之亦可

血日輕夜重關脉沉澀或芤其痛有常處一塊不移

而痛者是死血有嗜熱飲辣湯或多怒或閃挫而

成宜韭汁桃仁歸尾牡丹皮鬱金香附之類當從

血鬱治大便燥結桃仁承氣下之。一方用韭汁

拌梔子炒每用一合煎湯極驗本草言韭汁開畜

血梔子能清胃腕之血信然。

虫脉乍大乍小面上白斑唇紅能食或偏嗜一物時

作時止而痛者虫也。二陳加苦練根煎服良。古方

取虫丸有雷丸錫灰史君子最效如吐虫脉細小

責之胃寒非虫也理中湯加花椒佳。

虛凡痛以手柱按而痛定者屬虛宜溫補參朮薑桂

之類重者加附子二三分為嚮導。

手不可近者屬實宜導滯清中枳實山查二陳之類

重則用硝黃。

肥人腹痛多是濕痰與氣虛。

證治大還 醫學近編 腹痛 三 頁白堂

瘦人腹痛多是積熱血虛大便多燥結。

當臍硬痛有形多燥尿已經攻伐不應用四物加桃

仁泥紅花升麻麻子仁熟大黃檳榔空心煎服潤

以導之痛隨利減。

小腹痛屬厥陰肝多屬肝氣鬱結宜青皮木香香附

歸尾酒白芍柴胡澤瀉主之。如小水不利宜分

滲加木通車前梔子及龍膽瀉肝湯加減。如小

水不利宜分滲大抵小腹痛中必有物小便利

者則是畜血之形小便不利則為溺塞之症宜分

兩途、小腹脹痛如覆碗為實其法有二氣壅塞於下、用吐法以提之、脉沉弦、小水不通者是血汚於下、桃仁之類破之。

如小腹痛引陰、或畢丸腫硬、暴痛不可忍、卽是疝宜從疝治。

燥屎滯於幽門、當臍悶痛、當用導滯通幽湯不已、潤腸丸、方見秘結門。

腹心卒然互痛不安、欲吐不吐、欲瀉不瀉、屬乾霍亂、乃飲食填塞所致、急以鹽湯探吐、得吐乃生、後隨

證治大還

醫學近編

腹痛

四

貞白堂

症治卽絞腸痧。

臍下或大痛、人中黑者多死。

治痛必兼溫散、以鬱結不行、阻氣不運故也。

大法、川芎、香附諸痛不可少、或以三味加白芷為末

入湯調服妙。

白芍藥止治血虛腹痛、以酸收故耳。

食積作痛、有火症、見不大便者、木香檳榔丸。

氣虛之人、傷食腹痛、宜補中調胃氣、兼消導、參朮山

查神麴麥芽枳朴木香砂仁之類。

腹中覺有如火作痛、此為積熱、宜調胃承氣下之、酒積同法、玄明粉亦可。

小腹痛、用青皮以行其氣。

小腹因寒而痛者、肉桂、吳茱萸。

因寒作痛、小建中湯、加乾薑、官桂、白芍、蒼朮、白芷、香

附、因熱而痛者、脉必數疾、二陳、炒芩、連翹、子、痛甚者、加炒乾薑從治之。

腹痛不禁下者、宜川芎、蒼朮、香附、白芷、茯苓、滑石、加薑煎服、痛瀉皆止。

證治大還

醫學近編

腹痛

一五

貞白堂

腹中窄狹

腹中窄狹、須用蒼朮。

若肥人自覺腹中窄狹、乃是濕痰流滯臟腑、氣不升

降、燥濕用蒼朮、行氣用香附。

瘦人自覺腹中窄狹、乃是濁氣與火、薰蒸臟腑、宜黃

連、蒼朮、大膽、燥加血藥。

平人腹饑則鳴、理可見矣、肥人漉漉有聲、須作痰治

二陳、二朮、人參、主之。

高良薑湯、因寒、心腹痛。

高良薑 厚朴 官桂 作一服水鍾半煎一鍾
去渣稍溫服

草豆蔻湯 治臍腹虛脹作痛

澤瀉 一錢 木香 三分 神麴 四分 半夏 枳實 麴炒

草果仁 黃芪 春夏益智仁 甘草 冬各一錢五分 青皮

陳皮 川歸 茯苓 七分 生薑三片水煎服

益胃散 治因服寒涼過多腹痛不止

人參 厚朴 甘草 白豆蔻 薑黃 乾薑

砂仁 澤瀉 各七 益智仁 六分 陳皮 七分 黃芪 七分

證治大還 醫學近編 腹痛 六 貞白堂

加薑水煎服

厚朴溫中湯 治胃虛冷脹滿痛悶用

厚朴 陳皮 各一錢 茯苓 草豆蔻 甘草 各半

本香 五分 乾薑 三分 加薑水煎服

六合散 治一切燥熱鬱結汗後餘熱宣轉不通併

治小腸氣心腹滿悶胸中痞結走注痛

大黃 酒拌蒸 白丑 黑丑 各五錢 檳榔 三錢

輕粉 錢一 為末每服一錢蜜水調下

沒藥散 治一切心腹疼痛不可忍者

沒藥 另研各一錢 穿山甲 五錢 木鱉子 四錢

右為細末每服五分或一錢酒大半盞煎三服

木香檳榔丸 治食鬱氣滯作痛

木香 三錢 檳榔 三錢 青皮 五錢 陳皮 五錢 枳實 六錢 白朮 五錢

厚朴 四錢 麥蘖麴 錢七 為細末湯浸蒸捲丸桐

子大每服五十九白湯送下

枳實導滯丸 治傷濕熱之物不得施化腹痛滿悶

不安 力見傷食門

瓜蒌散 治傷食填塞太陰悶亂大痛兀兀欲吐以

證治大還 醫學近編 腹痛 七 貞白堂

此吐之吐定用消導和中藥方見中風門

霹靂散 治腹痛身冷脉微欲絕因于寒者凡痛極

脉必伏當從溫散不可遽認為陰

附子 一枚取出以冷灰 以一味取五錢入真蠟

茶同研細為末分作一服水一盞煎七分入蜜一

匙稍涼服

酒煮當歸丸 治小腹寒痛及婦人白帶疝瘕大寒

暴痛等症

茴香 五錢 附子 炮 良薑 七錢 當歸 兩 四味細切以

無灰上好酒升半。煮至酒乾。焙乾入後藥。

炙甘草 苦練生用 丁香各五錢 木香 升麻各一錢

柴胡二錢 炒黃鹽 全蝎各三錢 玄胡索四錢

右與前四味。共為細末。酒煮麪糊為丸。桐子大。每服五七十丸。空心淡鹽湯下。

芍藥甘草湯 治四時腹痛。

白芍 甘草各等分 薑三片水煎溫服。

醫壘元戎曰。腹痛脉弦。傷氣。用本藥。脉洪傷金。加

黃芩。脉濇傷血。加當歸。脉緩傷水。加桂枝。

證治大還

醫學近編 腹痛 人 貞白堂 卷之八

脉遲傷寒。加乾薑。

加減小柴胡湯 治寒熱脉弦腹痛。本方去黃芩。加

白芍藥。

四物苦練湯 治臍下虛冷腹痛。

四物六錢 加玄胡索 苦練根各錢半 水二盞煎一

至一盞服。

苦練丸 治奔豚。小腹作痛。見痙門

一捏金散 治臍腹大痛。及奔豚小腸氣等症。

玄胡索 川練子 全蝎去毒 茴香各等分

右為細末。每服二錢。七溫酒調下。

丹溪曰。腹痛多是血脉凝澁不行。必用酒炒芍藥。惡

寒而痛。加桂。惡熱而痛。加黃柏。

因飲食太過而作痛者。必問因傷何物。如傷生冷硬物而作痛者。東垣木香見現丸。三棱消積丸之類。

如傷熱物而痛者。枳實導滯丸。三黃枳朮丸之類。看

強弱寒熱。用而下之。

因跌撲損傷腹中痛者。或日輕夜重。是瘀血。宜桃仁承氣湯下之。

證治大還

醫學近編 腹痛 九 貞白堂 卷之八

如跌撲後。腹中隱隱痛有處。是腹腸膜有損。宜活血

行氣。兼補養之。不可妄認為痰為火。用峻利破泄

藥。曾見一人。醉後踢門用力。遂小腹痛不止。湯藥

亂投。臨死小腹腫青。方悞矣。日受病之因也。

中宮有沉積。挾血結久。痛不止。乾漆二兩。搗碎。炒用

出烟。細研醋煮。麪糊丸。桐子大。酒下五九。至七九。

醋湯亦可。塊痛在中脘。諸藥不効。玉簪花根。洗

淨。搗濃汁。和好酒一半熱服。

一人中脘大痛。脉弦而滑。右為甚。乃食鬱也。二陳平

胃。加山查草豆蔻木香砂仁。一服頓愈。

一人痛當臍。綿綿不已。脉弦伏無力。因作狹陰治。理中湯加肉桂八分。附子三分。煎冷服。隨愈。

一人中脘至小腹。痛不可忍。已十三日。香燥歷試。月不得臥。臥則痛柱上。每痛急則脉不見。詢之。因入房後。過食肉食而致。遂以爲陰而投薑附。余思之。飲食自倍。中氣損矣。況在房勞之後。宜宿物之不能運化。又加燥劑太多。消耗津液。致成燥屎。鬱滯不通。所以不得臥而痛也。古云胃不和則臥不安。

證治大還

醫學近編

腹痛

十

貞白堂

卷之八

遂以枳實導滯丸三錢。去黑屎碗許。小腹痛減矣。

又與黃連枳實瓜蒌麥蘖厚朴山查萊菔子二服。痛復移于小腹。乃更與潤腸丸二服。更衣痛除。第軟倦不支。投補中益氣湯調理。半月而起。

一人痛引腰脇。不可俛仰。脉弦數有力。知肝火鬱結也。投龍薈丸五十粒。頓愈。

一人腹痛而瀉。口乾面時赤。乃食積也。與木香檳榔丸一服。去硬物愈。

一酒客每日腹痛瀉黃沫。知積熱也。投苓連厚朴炒

梔子木通澤瀉赤茯苓二劑稍可。復以酒蒸大黃爲丸。酒下二錢。凡三服。遂不再舉。

一婦小腹痛。醫作陰治。投熱劑不應。又作燥屎治者。硝黃潤腸丸等藥。屢用不減。余詢之。七日前作寒熱起。遂腹痛。左三部皆絕小無力。右寸關俱弦滑。必起於外感。內傷挾氣下早。故食滯不下。每痛則下黃水。止作無時。下傷津液。故作渴。遂以炒白芍白茯苓保脾木香青皮疏氣。炒山梔清塊中之火。當歸潤燥。陳皮甘草和中。小水不利。加澤瀉升麻車前。二劑黃水雖少。痛塊不減。隨用葱豉熨法。復投二劑。二便大去而安。

證治大還

醫學近編

腹痛

十一

貞白堂

卷之八

小腹痛不止。繞臍生瘡。小便數似淋。惡寒。身上皮膚甲錯。或自汗惡寒。屬腸癰。當從腸癰治。詳見外科心法。

腸鳴

內經曰。中氣不足。腸爲之苦鳴。晏全善曰。腸鳴多屬脾胃虛。一男子腸鳴食少。臍下有塊。耕動。若得下氣多。乃已。已則復鳴。屢用疎氣降火藥。半年不愈。

乃以理中湯為君。佐苓連枳實。一服腸鳴止。又每服吞厚朴紅豆蔻丸。其氣漸平。

東垣曰。胃寒腸鳴泄瀉。升陽除濕湯。加益智半夏薑棗妙。

丹溪曰。腹中水鳴。火擊動其水也。二陳加苓連枳。必脈滑數。胃氣強壯者乃可。

病後鳴。悉屬虛。

取五九。見五門

理中湯。見寒門

龍膽瀉肝湯。見脇痛門

香稜丸

證治大還

醫學近編 腹痛 主 貞白堂 卷之八

金花丸。見火門

深痰丸。見痰門

桃仁承氣湯。見傷寒門

調胃承氣湯。見傷寒門

脇痛

陳三農曰。脇痛風寒。

脈弦食積而飲。痰飲。脈沉弦而數。食積而飲。痰飲。脈沉弦而數。

死血。

脈澀緊。虛脈。弦而細數。沉而洪大。而結。大而無力。氣脈。細而洪大。

左右者。陰陽之道路。氣之終始也。肝木氣實則脇

痛。肝氣實則怒。實者邪氣而言。經曰。邪氣盛則實

是也。

脇痛有火。有痰。流注。有死血。有氣滯。

肝火痛在左。左關必弦。右脈亦然。屬肝木。有餘。宜平

肝清火。柴胡炒梔子歸尾醋製青皮橘紅酒芍藥

證治大還

醫學近編 脇痛 一 貞白堂 卷之八

主之。不已。加吳茱萸炒黃連。甚者加酒炒膽草。審

果木氣實。當歸龍薈丸。

痰飲在右。體厚。脈沉滑。屬濕痰流注。宜二陳蒼朮白

芥子酒芩膽星枳殼香附煎成。加木香水三茶匙。

不已。控涎丹。

因怒。氣大逆。肝氣鬱甚。謀慮不決。風中于肝。皆使木

氣太實。故火盛。肝氣急也。故痛。宜疎肝降火。

因痰下流。注于厥陰之經。亦能使脇痛。病則咳嗽氣

急。相引而痛。從痰治。嗽而脇痛者。當疎肝氣。脈弦

滑用二陳南星青皮香附青黛薑汁脉細澁屬陰虛四物加青皮。

左痛宜醋製青皮右加枳殼鬱金。

食積脇痛發寒熱痛引心下惡心惡食右手脉沉滑當作食積治先以鹽湯探吐吐定用二陳蒼朮枳

朴山查川芎柴胡紫蘇有表加表藥。

氣滯兩手脉沉伏或弦痛引肩背胸脇不得僂仰屬

氣滯也宜疎氣開鬱二陳加川芎枳殼蘇子萊菔

子烏藥青皮香附木香之類甚者加蓬朮。

證治大還

醫學近編 脇痛 二 貞白堂 卷之八

肝苦急急食辛以散之用撫芎蒼朮或用小柴胡湯

蓋本方原為脇痛發寒熱者必用之劑。

左痛以柴胡為主加佐使藥川芎青皮草龍膽之類

兩脇走痛因干痰者控涎丹佳以痰在脇下非白芥

子不能除也。

脇下一條扛起挾食積痛消導藥中加吳茱萸炒黃

連。

氣弱之人脇下痛脉細緊或弦多從勞役怒氣得之

八物湯加木香青皮或加桂心煎服。

去滯氣須用青皮乃肝膽經藥人多怒脇下有鬱

積者固宜以解貳經之實者若貳經氣血不足者

先當補血氣少佐青皮可也。

氣虛肥白人氣虛發熱而脇下痛用參耆補氣柴胡

黃芩退熱木香青皮調氣。

陰虛瘦弱人寒熱脇下痛多怒必有瘀血宜桃仁紅

花柴胡青皮大黃之類。

發寒熱脇痛似有塊痛必是飲食太飽勞力所致必

用龍薈丸治之。

證治大還

醫學近編 脇痛 三 貞白堂 卷之八

解痛治標貼琥珀膏妙又方芥菜子水研付又方以

吳茱萸水研傳又方以莖菜葉搗細炒熱貼而以

熨斗盛火熨之。

勞勞過傷腎虛羸怯之人胸膈脇肋多隱隱微痛乃

腎虛不能納氣氣虛不能生血之故氣血循水也

盛則流暢少則壅滯宜破故紙之類補腎四物之

類和血若作尋常脇痛治即殆矣。

推氣散 治右脇痛甚脹滿不食。

片薑黃

枳殼

桂心

甘草

各五錢 共為末每

服二錢薑湯調下，水煎亦可。

枳芎散 治石脇下痛不可忍。

枳實楚 川芎 甘草炙 共細末酒調下，或白湯

異香散 治腹脇膨脹痛且噎塞，辛以散之。

蓬朮醋 益智仁 甘草炙 荆三稜各一錢 青皮五分

陳皮五 厚朴製 薑蓮 肉各三 薑三片 棗一枚 白鹽少

許水煎服。

分氣紫蘇飲 治腹脇痛氣促喘急。

五味子 桔梗 蘇葉 桑白皮蜜炒 草薢仁

證治大還

醫學近編 脇痛 四 貞白堂

陳皮 大腹皮洗 茯苓 甘草炙 薑三片 白

鹽少許水煎服。

河間芎葛湯 治脇痛不可忍。

桂枝 川芎 細辛 乾葛 防風各八分 芍藥

枳殼 麻黃 人參 甘草各四分 皆散表之藥，必

冬月有表邪者乃可。

丹溪曰：凡脇痛多是肝木有餘也，宜小柴胡加青皮

川芎芍藥龍膽，甚者煎成正藥入青黛麝香。

痰流注。本方倍半夏加橘紅南星二朮茯苓川芎白

芥子之類氣實脈滑有力十棗湯最佳。

瘀血作痛者小柴胡合四物加桃仁紅花或乳香沒

藥煎服，痛甚元氣壯實者桃仁承氣湯下之。

性急多怒之人時常腹脇作痛者小柴胡加川芎芍

藥青皮之類煎服，甚者以前藥送下龍薈丸甚速

甚効。

婦女多鬱結兼舒氣。

當歸龍薈丸瀉肝火太甚之要藥，因內有濕熱兩脇

痛甚用以伐肝木之邪，必脈弦急而氣實者宜之。

證治大還

醫學近編 脇痛 五 貞白堂

當歸 龍膽 梔子仁 黃連 大黃文武火炒

木香二錢 蘆薈 青黛各五錢 麝香五分 共為細

末神麴糊丸桐子大，每服二十九，生薑湯下。

一方加柴胡五錢青皮一兩熱甚者烘熱服。

一方木氣實者用川芎蒼朮青皮芍藥柴胡甘草龍

膽各等分水煎服。

左金丸佐金平木之義瀉肝火行濕為熱甚之反佐

黃連六分 吳茱萸一分 共為細末湯浸蒸餅為丸，茶

豆大每服三五十丸淡薑湯下。

一方破血行氣治死血作痛之症。

桃仁去皮留紅花酒洗 川芎 青皮 香附童便浸各

等分 右細切水煎服

正傳治驗一人左寸尺弦數而臍關孔且數右三部

皆虛且靜明是血症因一年前墜馬次年遂痛用

抵當丸一服下黑血二升後以四物加減調理而

愈

又遇勞與餓則脇痛用八珍加牛膝木瓜山藥石斛

薏仁酸棗仁柏子仁桃仁數數服之頓愈

證治大遺 醫學近編 脇痛 六 貞白堂

又一人同此醫投平肝藥痛甚而殞謹錄之以爲世

戒

柴胡清肝散 治肝膽三焦熱瘡瘍或怒火憎寒發

熱或瘡毒結于兩耳前後或身外側至足等症有驗

柴胡 黃芩炒 人參各三分 山梔炒 川芎各五分 連翹

桔梗各四分 甘草三分 水煎服

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱兩脇腫痛或腹中疼痛

或小便澀滯等症

龍膽草酒拌 澤瀉各一錢 車前子炒 木通 生地酒

當歸酒拌 山梔炒 黃芩炒 甘草各五分 水煎服

小柴胡湯見傷寒門 桃仁承氣湯見傷寒門

八物湯見虛損門 琥珀膏見積聚門

十棗湯見痰飲門

證治大遺 編 脇痛 七 貞白堂

腰痛

陳三農曰腰痛本屬腎虛有閃挫及濕痰流注氣滯血凝亦有濕熱積風積寒

濕熱六脉數急而弦或沉濡而數小便黃腰痛不得俯仰遇天陰及久坐便痛屬濕熱宜滲濕清熱當歸拈痛湯出入有寒熱者當先發散

東垣曰身重腰沉沉然痛乃經絡中有濕也羌活勝濕湯加黃柏一錢附子五分蒼朮二錢

濕痰脉滑或沉伏動作便有痰或一塊作痛是濕痰

證治大選

醫學近編

腰痛

一

貞白堂

多見于肥盛之人宜快氣豁痰使痰隨氣運加味豁痰湯主之不應控涎丹徐徐取之方見痰門

捫捫脉浮而長或兩尺脉實忽然不可俯仰屬

宜先以乳沒研細冲酒飲之次用活血行氣藥復元通氣散主之不効必有瘀血五積加桃仁大黃蘇木各一錢當歸倍原數

瘀血脉澀滯或芤日輕夜重大便黑小便黃轉側如錐刺屬瘀血宜順氣活血元戎加味四物湯或加

桃仁紅花主之入壯氣實者桃仁承氣加紅花桂下之果因閃挫打撲瘀血為患乃可

腎虛脉大或兩尺洪盛痰之不已足腎虛宜滋腎四物加黃柏杜仲五味之類吞補腎丸或青娥丸或大補陰丸草薢丸

陰虛因辛苦勞碌而得者宜補養兼利肢節四物加杜仲牛膝羌活獨活少入肉桂為響導有火加知母甚者十補湯吞青娥丸

風傷腎而痛脉必帶浮或左或右痛無常處牽引兩

證治大選

醫學近編

腰痛

二

貞白堂

足宜五積散加防風半錢全蝎三個小續命湯獨活寄生湯選用仍吞三仙丹三因方用杜仲三錢炒煎酒服又牛膝酒治風毒攻腎刺痛傷濕腰痛如坐水中久坐濕地或為雨露所傷乘腎虛久客脉必帶緩遇天陰及久坐而發且滲濕湯不効腎著湯或生附散

感寒而痛腰間如冰其脉必緊見熱則減見寒則增宜五積散去桔加吳萸半錢或薑附湯加辣桂外用摩腰膏挾熱者脉必洪數而滑發渴便秘宜

甘豆湯加續斷天麻大便秘宜微利之

偶被風濕所鬱而作痛宜五積散加減須羌獨爲主。

諸腰痛甚者不可用補氣藥及寒涼藥初必加溫散和血快氣後必加補腎藥四物牛杜之類房勞辛苦之人悉宜補審氣血孰虛治各加製附子少許爲引下響導最妙。

腎着一病腰重若帶五千錢腰下冷如冰小便自利兼用溫藥三因腎着湯主之。

證治大還

醫學近編

腰痛

三

貞白堂

氣滯而痛脉必沉弦或伏結實人初起木香流氣飲日久宜理氣養血。

一人因太勞又過飲酒致濕熱乘虛入客于經作痛夜更甚不得俛仰脉濡而弱先與拈痛去參朮二帖稍愈遂改用四物加杜仲牛膝獨活肉桂頓愈。

一癰出膿大補消。

一人肥盛而肢節痛腰更甚脉沉濡而滑知濕痰也予二陳加南星二朮一活秦芫防風十劑愈。

一人體厚腰間常冷予腎着湯加星半蒼朮三服全愈。

一人因墮馬後痛不止日輕夜重瘀血諦矣與四物去地加肉桂桃仁泥紅花蘇木四服大便秘下黑而痊。

一人素有脚氣每發則引腰痛不可俛仰其人雄飲明是濕熱脉濡而數投拈痛湯八劑漸減遂以捉虎丹酒下二九空心凡三服腿腕出黑汗永不復發。

證治大還

醫學近編

腰痛

四

貞白堂

丹溪曰久腰痛必用官桂開之方止腹脇痛亦然橘香丸治腰痛經久不瘥亦用官桂開之之義也。

當歸拈痛湯治濕熱爲病肩痛沉重肢節腰脇疼痛胸膈不利。

白朮八分人參升麻苦參酒炒葛根各一錢蒼朮各一錢

知母澤瀉黃芩猪苓當歸各八分生地酒洗

茵陳酒炒炙甘草羌活各一錢防風食遠服

加味豁痰湯治痰流注腰痛。

半夏赤茯甘草陳皮南星蒼朮

羌活 枳殼 獨活 防風 薑煎服

元戎加味四物湯 治瘀血腰痛

本方加桃仁泥 酒洗紅花 肉桂少許 或加

蘇木

補腎丸

黃柏 龜板 杜仲 牛膝 陳皮各一兩 乾薑五錢

少加五味子 爲末薑打糊丸溫酒或白湯下

煨腎散 治腎虛腰痛

酒炒杜仲三錢炒斷絲一味爲末以猪腰子一枚

證治大還

醫學近編 卷之八

腰痛 五

貞白堂

批作五七片以椒鹽醃去腥水搽藥末在內以荷

葉包裹更加濕紙二三重微火中煨熟食無灰酒

下

三因青娥丸 治腎虛腰痛常服壯筋補虛

杜仲一斤 生薑十一兩 破故紙一斤 爲末用胡

桃一百二十個湯浸去皮研骨加蜜些少丸桐子

大每服五十九鹽湯下

五積散 治腎着腰冷痛

乾薑炮 茯苓各錢半 甘草炙五分 白朮二錢半 水煎服

捉虎丹

草烏頭 五靈脂 木鱉子一兩 白膠香一兩

地龍去泥土 京墨二錢 乳香 沒藥各七錢 當歸七錢

五麝香二錢 右爲細末糯米飯丸桐子大每服一

九或二九多至三五九空心溫酒下

按白膠香乃楓香樹脂藥肆無此皆松香之白者

殊非立法之初意如用必于夏月山中于楓樹上

流出者採用方妙今名芸香亦有真者白而不烈乃是

華解丸 治腎損骨痿不能起于床腰背腿皆痛

證治大還

醫學近編 卷之八

腰痛 六

貞白堂

華解 杜仲炒去絲 茯苓 兔絲子酒浸 各等分細

末猪腰子搗爛丸桐子大每服五十九至七十九

空心溫酒下

摩腰膏 治老人虛人腰痛並婦人白帶

附子尖 烏頭尖 南星各二錢 雄黃一錢 樟腦 丁

香 乾薑 吳茱萸各錢半 硃砂一錢 麝香五粒

右爲末蜜丸桐子大每服一半薑汁化開如粥厚

火上頓熱置掌中摩腰眼候藥盡粘腰上烘綿衣

包縛定隨即覺熱如火日易數次

補髓丹 補腎強筋骨

沒藥一兩 另研 杜仲去皮炒 十兩 鹿茸二兩 補骨脂 十兩 用脂

炒黑去麻 除沒藥另研外，共末和勻，入胡桃肉三十

個，去皮杵為膏，入麪少許，酒煮麵糊丸，桐子大，每

一百丸，溫酒鹽湯下。

龐元英談藪載：一少年新婚後，得腳軟病，甚眾作

腳氣，治不効。孫琳用杜仲一味，寸斷片，折，每以一

兩，用半酒水煎服，三日能行，又三日全愈。

大抵諸腰痛，皆起于腎虛，既挾邪氣，則當先去其邪。

證治大選 醫學近編 腰痛 七 貞白堂

若子和以甘遂、陳皮、當歸等分為末，服三錢酒下。

者，準繩用黑白丑炒末、五靈脂各三錢，狗脊微炒

半兩，華蘚炒三錢，沒藥二錢，胡桃肉五個，醋糊丸

甚者，加濕紙煨熟巴豆五粒，下五七次後，用煨腎

散，及無北山藥丸，是先瀉後補也。

腰痛足太陽經也。胯痛足少陽膽之所過也。若因

傷于寒濕，流注經絡，結滯骨節，氣血不和，而致腰

胯痛，宜除濕丹，或滲濕湯，加芍藥、青皮、蒼朮、檳榔

有痰滯經絡，導痰，加檳榔、青皮、芍藥，丹溪以為腎

肝伏熱，治用黃柏防已。

背痛

看書入坐對奕，而腰背痛者，屬虛，補中益氣為主。入

物湯。肥人多痰，年高必用人撻而痛快者，屬痰

屬虛，除濕化痰，兼補脾腎。醉飽後，多痛欲撻，是

脾不運，而濕熱作楚也。須節飲。瘦人，多是血少

陰虛，亦不禁酒及厚味，而然養血清火。四物酒苓

連牡丹皮。背痛須加羌活防風，引經。肥人少佐

附子。

證治大選 醫學近編 腰痛 八 貞白堂

有素虛人，及病後產後，經行後心痛，或牽引乳脇，或

走注肩背，此元氣上逆，當引使歸元，不可復下。疎

利，愈利愈痛。發汗人患此者，眾惟宜溫補。拘于痛

無補法之法，誤矣。汗者心之液，陽受氣于胸中，汗

過多，則心液耗，陽氣不足，故致痛也。

丹溪治一男子，忽患肩背胛縫一線疼，上脘至胸

前側脇而止，其痛晝夜不息，不可忍，其脉弦數重

取豁大，左大于右，夫脾，小腸經也，胸脇膽經也，此

必思慮傷心，臟未病而腑先病，故痛從背胛起，謀

愈不決。又歸之膽故痛至胸脇而止。乃小腸火來乘膽木子來乘母。是為實邪。謂之果。因謀慮不遂而病。以人參四錢。木通二錢。煎湯下。龍脊丸數服愈。

證治大還

醫學近編

腰痛

九

白口堂

陳氏醫學近編 卷之九

雲間陳 治三農甫述 男

栻璣先 叅 師柴羔愚

三韓張載齡弘度甫叅

門人 范 崧壽民 校 王 顯贊皇

驚悸 二十四

寸口脉動而弱。動為驚。弱為悸。肝脉動暴有所驚駭。驚脉止而復來。其人目睛不動。

驚悸者。事感於前。心驚惕而卒動也。屬心胆二經。症

證治大還

醫學近編 驚悸 一

白口堂

有實有虛。滑伯仁云。驚悸頭痛目眩。胸中煩熱。心

神恐畏。不能獨處。此胆氣虛寒也。宜茯神湯。門人

參散。驚悸不得睡。臥精神恍惚。寒熱泄瀉。怒而

勇敢。善太息。口苦。此胆氣實熱也。宜半夏湯。酸棗

仁丸。俱本 驚悸善悲。愁怒。衄血面黃。五心煩熱。

咽痛舌強。喜笑驚悸。此心氣虛熱也。茯苓補心湯。

定志丸。俱本 驚悸口乾煩渴。眠臥不安。精神恍惚。

惚。此心氣實熱也。茯苓散。門人安神丸。門人 驚悸

不寐。恍惚虛煩。此心血不足也。柏子養榮湯。門人

驚悸心神虛怯。恐畏多驚。此心氣不足也。參桂養

心湯本門 因事而驚。觸忤心神。氣與涎鬱。遂成驚

悸。溫胆湯本門 氣鬱為痰。驚悸加味四七湯本門

驚氣入胆。肝能令子虛者。溫胆湯加酸棗仁。柏子

仁人參。驚悸眠多異夢。隨卽驚覺者。辰砂妙香

散參芪茯神茯苓山藥
桔甘枳木香辰砂 琥珀養心丹。有每臥覺神

離體。驚悸多驚。通夕不寐。此肝經受邪。非心病也。

蓋肝藏魂。肝不受邪。則魂宿於肝。神靜而寐。今肝

虛邪襲魂。不歸舍。是以臥則揚揚若去也。宜珍珠

證治大還 醫學近編 驚悸 二 貞白堂
卷之九 三言十

母丸本門 東垣云。臥而多驚。邪在於少陽厥陰。用

羌活勝濕湯羌活獨活防風藁本
川芎蔓荊子甘草 加柴胡。

仲景云。飲停心下必悸。治見眩
通明 無擇云。因驚成

悸。病在心胆。濕痰驚悸。屬脾飲停中脘。令人驚

悸。治屬飲門。

醫按

子和治一婦。值盜受驚。後每聞聲響。卽驚倒。屢治以

定志鎮心之劑。罔效。曰。驚者。陽從外入。恐者。陰從

內出。驚爲自不知。恐則自知。今乃驚怕。胆傷也。命

二侍女執手坐。椅前置一几。令其視。几以木猛擊

几。斯須連擊。復令前後擊其門窓。徐徐驚定。夫驚

者。平之平者。常也。使之常見常聞。則不驚矣。驚者。

神上越也。從下擊。几使之下視。所以收神也。

黃溪治一人。因大怒。患心不自安。如人將捕之。夜臥

不寧耳。後火光炎上。食雖進而口不知味。口乾不

欲飲。以參朮歸身爲君。蜜炙黃柏玄參爲臣。鹽炒

陳皮爲佐。煎服漸愈。

薛立齋治一婦。驚悸怔忡不寐。自汗盜汗。飲食不甘。

證治大還 醫學近編 驚悸 三 貞白堂
卷之九 三言十

怠惰嗜臥。用歸脾湯漸愈。

汪石山治一人心悸。如若人捕欲避。無所擁護。

猶恐懼不寐。診之脉細弱而緩。此胆病也。治以溫

胆而安。

治一人覺自形如兩。坐臥不別真假。此离魂也。用殊

砂茯神人參濃煎服而安。本草加龍腦而安。

養心湯 治心血虛少。驚悸不寧。盜汗不寐。煩躁

黃芪 人參 茯苓 茯神 當歸 熟地

柏子仁 酸棗仁 菖蒲 桂心 五味子

甘草 薑棗

柏子養榮湯 治心血不足驚悸不寧

人參 生地 熟地 當歸 山藥 栢子仁

連心 酸棗仁 茯神 麥門冬 甘草 燈心

五味子

茯苓補心湯 治心氣不足善悲愁 衄血面黃五心

煩熱咽喉乾痛舌木強硬

茯苓四兩 桂心 甘草各三兩 麥門冬二兩 人參

紫石英二兩 大棗二十個 赤小豆四兩 水七升

證治大還

醫學近編 驚悸 四 貞白堂

煎二升半分三服

茯苓散 治心氣實熱口乾煩悶眠臥不寧心神恍惚

茯苓 麥門冬各一兩 通草 升麻各一兩 紫苑

桂心各七錢半 知母一兩 赤石脂一兩 竹茹二錢

大棗十枚 每服一兩

人參散 治胆虛常多恐畏不能獨臥如人將捕之狀

人參 枳殼 桂心 栢子仁 山茱萸 熟地

五味子 茯神 枸杞子 甘菊 酒下三錢

茯神湯 治胆氣虛冷頭痛目眩心神恐畏不能獨

處胸中煩悶

茯神 酸棗仁 栢子仁 黃芪 芍藥 五味

子 甘草俱炒 人參 熟地 桂心

半夏湯 治胆氣實熱精神恍惚寒熱泄瀉寢汗憎

風善太息

半夏 宿砂各錢半 酸棗仁炒三錢 生地二錢 黃芩

遠志各一錢 秫米一合

溫胆湯 治胆虛痰實驚悸不眠

半夏 枳實 竹茹 陳皮 甘草 生薑

證治大還

醫學近編 驚悸 五 貞白堂

加味四七湯 治氣鬱有痰驚悸

半夏 厚朴 茯苓 蘇葉 茯神 遠志

菖蒲 甘艸 生薑

茯苓丸 治因驚神出其舍舍空痰涎歸之痰塞其

竅神不得返驚悸

辰砂 菖蒲 茯苓 茯神 遠志 人參

鐵粉 半夏麴 胆星 薑汁 糊丸辰砂爲衣

薑湯下二十九

定志丸 治心神虛怯驚悸不寐語言失常神魂不

安心志恐怯

人參 茯神 茯苓 各二兩 菖蒲 遠志 各一兩 辰砂

錢五 蜜九加琥珀乳香即寧志膏 加龍腦即遠

志九

酸棗仁九 治胆氣實熱不得睡臥驚悸不安

茯神 酸棗仁 炒 遠志 柏子仁 炒 防風 各

枳殼 炒 生地 各五錢 竹茹 半 蜜九

珍珠母九 治胆虛受風邪臥則揚揚魂散不守狀

如驚悸

證治大還

醫學近編

驚悸

六

貞白堂

珠母 三錢 熟地 當歸 各一兩 酸棗仁 柏子仁

人參 犀角 茯神 沉香 龍腦 各五錢

虎睛 一對 麝香 一錢

蜜九辰砂為衣金銀薄荷煎湯送下

小兒氣怯

以參歸麥冬各二兩五味子五錢煎成膏白湯煎

服

恐懼 二十五

脉形如循絲、纍纍然、面脫色、此恐怖之脉也、跌陽脉微而浮、浮則胃氣虛、微則不能食、此恐懼之脉、憂迫所致也。

恐懼與驚悸不同、驚從外入、恐從內起、驚則聞響則驚悸、恐則無所聞、心常自怯、如人將捕是也、驚宜安神、恐宜定志、安其神則散亂之氣可斂、定其志則走失之精可固、若心搖不安、則陽氣散於外、志感不定、則陰精走於下矣、然恐懼屬肝胆心腎、四

證治大還

醫學近編

恐懼

七

貞白堂

經之症、經曰肝虛、則目眈眈無所見耳、無所聞、善恐、如將捕之、宜補肝散、送六味丸、胆病則善太息、口苦嘔宿汁、心下憺憺、恐人將捕之、人參散、驚悸、怵惕、思慮則傷神、神傷則恐懼自失、宜歸脾湯、參、芪、歸、棗、仁、木、香、甘、州、送定志丸、腎在志為恐、氣不足則善恐、心惕如人將捕之、宜加減八味丸、虛損、酸棗仁湯下。

多疑 二十六

月令廣義云、多疑者、胆不安也、蓋脾主意、智謀意、辨

脾之所司也。脾不安。故意不決耳。宜歸脾湯。

不寐 二十七

古今醫統云。不寐須分虛實而治。如體氣素盛。偶爾

不眠。為痰火所致。宜先用滾痰丸。痰火次用安神丸。

怔忡涼膈清心。火症之類。如體氣素弱。或因思慮

過度。或病後產後不眠者。此皆氣血虛。心脾二經

不足所致。雖有痰火。不可過於攻治。須當補養為

主。而畧佐以清痰清火。凡人勞心思慮太過。必致

血液耗亡。而痰火隨熾。所以神不守舍。煩做而不

證治大還

醫學近編 卷之九 不寐 八 貞白堂

寐也。宜六一散。加牛黃硃砂。用酸棗仁。竹葉知母

煎湯調服。或猪心煎湯調服。導痰清火。以治其標。

養血收神。靜定以治其本。

按不寐有痰在胆。經神不守舍。或痰涎沃胆者。宜溫

胆湯。半枳實竹茹 陳州生薑加胆星。酸棗仁。菖蒲。或茯苓。尤

驚悸有胆虛不寐。不能獨處。心神恐畏。胸膈煩

悶者。茯神湯。驚悸竹葉酸棗仁湯。本有心經實

熱。口乾煩渴。睡臥不安者。茯苓散。驚悸有胞經

實熱。恍惚煩悶。睡臥不寧者。酸棗仁丸。驚悸有

血不歸脾。睡臥不寧者。歸脾湯。健忘胃氣不和

者。四君子。加酸棗仁。遠志。心腎俱虛水火不濟

口乾煩躁不寐者。天王補心丹。虛損肝腎虛熱

者。六味丸。肝火不寧者。小柴胡。柴胡 參 牛 加山梔

振悸不得眠者。四君子。參 朮 苓 草 加酸棗仁生薑

因驚而致者。溫胆湯。半枳實竹茹 陳草生薑加金銀煎。因

年高。或病後不寐者。八珍湯。虛損加酸棗仁。黃芪

因病後煩躁不眠者。竹葉石膏湯。竹葉 石膏 連 知 花 粉 麥 冬 甘草

虛煩不眠者。牛黃六一散。加硃砂。竹葉燈心煎湯。

證治大還

醫學近編 卷之九 不寐 九 貞白堂

調服。邵康節云。人之神存於心。而發於目。寤則

棲心。寐則棲腎。將寐在脾。熟寐在腎。將寤在肝。正

寤在心。象天地之有晝夜也。

睡語醉語

睡語者。心熱神昏也。猶酒醉心熱而多言也。治宜清

心神。欽神氣。

治不眠

麥冬。錢五茯神 丹參 沙參。各三錢竹茹。二錢

炙草。一錢竹葉。六十片石斛。酒蒸 遠志 生地 各四錢

棗仁錢 五味子分 有痰者加竹瀝

醫按

滄公治一人不睡。睡則心悸神懾。如處孤壘。而四面受敵狀。達旦目眈眈無所視。耳無所聞。雖堅臥蜜室。駭未交也。左關脉虛浮。察其色。少陽之支溫於目外。此乃胆虛生風。諸醫獨治其心。而不祛其胆之風。故罔效。遂以烏梅湯送抱胆丸。癲狂日再服而安。

人吐血過多。虛煩不寐。用酸棗仁一兩。微炒牛黃

證治大還

醫學近編 卷之九 多疑不寐 十 貞白堂

三錢。硃砂五錢。六一散五錢。知母五錢。竹葉圓眼

燈心煎湯服三錢。再服而安。

竹葉酸棗湯 治胆虛不寐。

酸棗仁錢 人參錢 竹葉煎湯調服。

酸棗湯 治虛勞虛煩不得眠。

酸棗仁錢 知母 茯苓 川芎各二錢 甘草錢

多眠 二十八

肝虛有熱則多眠。胆熱則多眠。脾濕濕熱薰蒸則多眠。心熱則多眠。

健忘 二十九

健忘者。所遇之事。轉盼遺忘。皆因思慮過度。傷其心

脾。致精神短少。故遇事易忘。非生成頑愚也。經曰。

上氣不足。下氣有餘。腸胃熱而心肺虛。虛則榮衛

留於下。不以時上。故善忘也。補中益氣湯。參水芪

加柏子仁。遠志。茯神。思慮過度者。宜歸脾湯。本

證治大還

醫學近編 卷之九 多疑不寐 十 貞白堂

精神短少者。十全大補湯。虛損加遠志。菖蒲。益智。

或寧志膏。參茯神。茯苓。菖蒲。遠志。辰砂。琥珀。乳香。亦有痰迷心竅者。

宜導痰湯。牛黃。橘紅。枳實。蘇合。甘草。生薑。加菖蒲。益智。人參。黃連。

明神竹瀝薑汁。

歸脾湯 治思慮過度勞傷脾肺健忘。

人參 黃芪 白朮各一錢 當歸錢 棗仁錢

木香 甘草各五錢 圓眼肉 生薑 大棗 遠志

錢 加牡丹皮。山梔。名加味歸脾湯。

開心散

石菖蒲兩二 白茯苓 遠志 人參各一兩

每服錢半米飲下一方有地骨皮天門冬

補心丸 治心氣不足遇事易忘

遠志 菖蒲 柏子仁 人參 茯苓 當歸

黃芪 龜板 天門冬各一兩 桂心三錢 蜜丸

益智丸

遠志 菖蒲 地骨皮 兔絲子 天門冬

麥門冬 五味子 人參 山藥 肉蓯蓉

生地 川芎 薄糊為丸

證治大還 醫學近編 多眼德志 三 貞白堂

千金治好忘 久服聰明暖精氣益元陽

益智 遠志 龍骨等分 酒下二錢

千金方 開心孔填骨髓悅肌膚

人參三錢 猪肪一兩 酒拌和服服至百日效

癰症秘驗過神方 都門王端五言藥不効貞道人傳

事不可不以此提煉沉疴 凡星九藥陳香櫟一隻 木香三錢 真琥珀五錢 乾羚羊角三錢 人乳五錢 五靈芝

錢紫背天葵五錢 用揀淨勿油桐子肉八兩入白糖

四兩同煎藥用井河水各一大碗煮熱晒三日露

三夜每日五更嚼七枚 忌人參

自汗三十

大而虛浮而濡者在寸為自汗在尺為盜汗肺脈受

而散者當病灌汗肺脈緩甚為多汗熱傷故多汗

經曰汗乃心之膏脾之液血之異名也今發洩於肌

表而自出不止非喜怒驚恐嗜慾勞傷致氣虛不

能固腠理即風邪暑濕與衛氣相干俾開合失其

所司也經曰汗多則亡陽奪汗則無血是氣血悉

因汗以頓衰也可令其自出乎急須詳審因氣虛

自汗者以參芪為主少佐以桂枝或黃芪建中湯

證治大還 醫學近編 自汗 三 貞白堂

本 陽虛自汗不止惡寒倦怠者芪附湯本 上

氣喘急自汗氣短頭暈者參附湯本 濕勝自汗

者羌活勝濕湯羌活防葵 荊草 傷風腠理不固自汗

者桂枝湯桂芍 中風氣虛腠理不密自汗者防

風白朮牡蠣湯過服風藥自汗者白朮防風湯防

求 風濕相搏者防已黃芪湯已芪求 暑濕傷

氣者四君子加黃芪香茹麥冬五味子 火氣薰

蒸胃中之濕而作汗者涼膈散翅桅茶薄荷竹葉

痰飲滯氣氣不順而自汗者理氣降痰湯半枝紫

日坤杏仁瓜 嗜慾勞傷產辱氣血兩虛而自汗

者十全大補湯加棗仁五味子 醉後當風風邪

入客額上汗出名曰漏風黃芪六一湯黃芪滑加葛

根防風桂枝 若汗出髮潤汗出如油汗出如珠

皆不治也 動作汗出屬虛熱 東垣云真氣虧

竭胃中火盛則汗出不休 綱目云衛氣虛則汗

多榮氣虛則汗少衛氣者所以肥腠理司開合也

今衛虛則腠理疎開合失司故汗多也奪血無汗

奪汗無血今血少故無汗也

醫治大要

醫學近編

古

貞白堂

陳三農云自汗因衛為邪干惡風自汗冬月桂枝湯

桂芍 餘月用和湯防芍正不止建中湯芍桂丁陽

求附湯表虛四君子湯加求附裡實承氣湯大黃

久病不愈自汗熱不退補中湯加附子又不愈保

元湯參朮草加歸芍麥門冬五味子或歸脾湯健

門 冷汗自出黃芪建中湯木內熱薰蒸出汗不止

六黃湯生地芩便燥自汗熱不退屬陰虛六味

丸合生脉散參麥冬脉豁大無力保元湯自汗如

心神恍惚汗由於心也歸脾湯恐懼汗出由於腎

也六味丸

戴復菴云汗多服止汗固表之藥勿效宜理心血蓋

汗乃心之液心無所養不能攝血故溢而為汗也

宜大補黃芪湯本加棗仁有微熱加石斛

心汗

別處無汗獨心孔一片有汗思慮多則汗亦多病在

心宜養心血柏子養榮湯驚悸或單用茯苓末三

錢烏梅艾葉煎湯調服

頭汗

醫治大要

醫學近編

圭

貞白堂

遍身無汗止頭面汗出睡中尤甚此濕熱鬱於胃中

也小便不利必發黃用茵陳五苓散茵蒼羌蘇桑

桂加蒼朮山梔神麴滑石小便清白自利渴而飲

水此瘀血也桃仁承氣湯大黃桃仁桂隨處實加

減頭汗而喘二便赤澀手足汗四肢熱而譫語此

內有燥屎也承氣湯大黃枳

陳霞山云頭汗至頸至臍而還乃陽不發越陽氣上

騰津液上壅也禪虛不可汗內潤不宜下宜參苓

白朮散八珍湯參朮苓草意苡仁扁豆

飲食汗出

東垣云。飲食汗出日久。心虛風虛邪入。令人半身不遂。偏風痿痺之疾。先除其汗。標悍之氣。按而收之。宜安胃湯。門本 飲食汗出。屬胃中濕熱。濕熱盛。故飲食相助。則汗出也。

醫按

滑伯仁治一人。暑月病身冷自汗。口乾煩躁。坐臥欲於泥水中。脉浮而數。按之豁然虛散。曰。脉至而從按之不鼓。諸陽皆然。此為陰盛格陽。得之飲食生證。治大還。醫學近編 自汗 卷之九 六 貞白堂 冷。坐臥當風所致。以真武湯。附子 茯苓 白朮 芍藥 冷飲。一進汗出。再進躁去。三飲而安。

陳三農治一人。感寒用麻黃發汗。汗遂不止。用建中湯。汗出愈多。痰喘有聲。此傷寒損血。兼用藥之過。陰虛而陽無所附。遂用川芎三分。白芍生地各二錢。當歸一錢。玄胡索香附各三分。再服而愈。

又治一少年人。汗出三年不愈。用棉花子炒黑。入湯一滾服。四五日。腳腿能立。後以歸脾補中等湯。而安 黃芪建中湯。治陽虛自汗。挾外邪者。

黃芪蜜炙 三錢

芍藥煨 三錢

甘草炙 各一錢

肉桂各一錢

大棗枚

臨服入飴糖半酒盞

大補黃芪湯 治陽氣虛弱。心血不足。時常汗出。

人參 黃芪 白朮 當歸 熟地 川芎

山茱萸 肉蓯蓉 茯苓 甘艸 五味子

肉桂 防風 大棗

參附湯 治陽虛自汗。惡寒或手足逆冷。或大便自

人參兩

附子炮 五錢

生薑 大棗

去人參加黃芪 各名 附湯

玉屏風散 一名白朮 防風湯

治自汗不止及服表藥多而

證治大還

醫學近編 卷之九

自汗

七 貞白堂

自汗者

防風 黃芪蜜炙

白朮各三錢

二小北

牡蠣散 治諸虛不足。津液不固。汗出

黃芪

麻黃根

牡蠣煨

知母

小麥等分

水煎服

安胃湯

黃連

五味子

烏梅

生甘草

炙甘草

升

麻梢

牡蠣煨 三錢

防風

白朮

各兩半

每服一錢 溫水調服

麻黃根湯 治虛汗不止

當歸

黃芪炒

麻黃根

牡蠣煨

人參

甘草

一方加地骨皮龍骨亦治盜汗 一方加柏子仁五味子

獨神散 治小兒自汗盜汗

白朮一兩 浮麥一合水煮乾去麥 黃芪 麻黃根

煎湯調服

撲汗法

牡蠣 麻黃根 麩皮 白芷 藁本 防風
元米粉共為極細末撲之

自汗用酒醱人參煎服峻補衛氣以固腠理者

證治大選

醫學近編 自汗 六 貞白堂

盜汗 三十一

平人脉大而虛浮而濇在尺為盜汗陽脉動為盜汗

平人脉虛弱輕微者善盜汗經曰陰虛陽必盜之

而為盜汗丹溪云盜汗屬陰虛有火是盜汗乃陰

陽偏勝之所致也法宜補益腎水收斂心氣俾陰

陽調和而汗自止常以六黃湯生熟地芩連柏芪加丹皮

酸棗仁治盜汗甚捷但苦寒藥太多恐傷脾胃元

氣致陰陽兩虛不若當歸湯本門為妙有心氣不

足恍惚驚怖而盜汗者辰砂妙香散參芪茯神茯苓山藥桔梗

證治大選

醫學近編 盜汗 九 貞白堂

木香辰砂麝香 胆經有熱目合則汗出者半夏湯驚悸門

勞傷心脾虛煩不得安臥而盜汗者歸脾湯健忘門

腎陰虛弱發熱盜汗者益陰腎氣丸虛損門 腎氣

虛乏盜汗惡寒者八味丸熟地黃山藥茯苓丹澤桂附 心腎俱虛

盜汗者班龍丸 氣血俱虛者十全大補湯參朮苓草

歸身熟地 加五味子

錢仲陽云小兒盜汗此陰虛不能配陽也宜當歸湯

汗上至頭下至項此六陽虛汗也四君子加黃芪

麥冬五味子上至胸下至臍此胃虛汗也四君子

加黃芪白芍。

陳遠巖云盜汗睡出醒止屬胆熱小柴胡湯

柴芩參半

醫按

薛立齋治一婦盜汗不止遂致廢寢神思疲甚口乾

引飲作血虛有熱用當歸補血湯代茶

芩芪一兩當歸三錢

又以六黃湯加人參五味子二劑而愈

孫尚治小兒盜汗用胡黃連銀柴胡等蜜丸芩實大

每三九酒化入水五分煎服

當歸六黃湯

東垣

治陽盛陰虛盜汗

證治大還

醫學近編

盜汗

辛

貞白堂

當歸

黃芪二錢

生地

熟地

各一錢

黃連

黃芩

黃柏

三味俱炒黑

當歸湯

綱目

治陰虛不能配陽盜汗

當歸

黃芪

生地

熟地

黃連

麥門冬

五味子

芍藥

甘草

浮麥

用猪心一個批

開黃湯煎藥

辰砂妙香散 治心氣不足驚悸恐怖虛煩盜汗

人參

黃芪

茯苓

茯神

山藥

甘草

桔梗

木香

辰砂

麝香

每二錢燈心湯下

圓眼湯尤妙

正氣湯

治陰虛相火妄動夜多盜汗

黃柏

炒知母炒甘草

猪心湯

心液為汗此方欬心氣補心血諸虛不足

發熱盜汗

猪心

一個批開入

人參

當歸

酸棗仁

柏子仁黃食之

黃芪湯

治驚恐喜怒房室虛勞致陰陽偏勝自汗

盜汗發厥

黃芪

熟地

當歸

白茯苓

甘草

炙天門冬

證治大還

醫學近編

盜汗

辛

貞白堂

五味子

防風

龍骨

桂枝

麻黃根

炒小麥

盜汗方

黃芪

麻黃根

各二錢

浮小麥

黑豆

各一錢

獨求散

治盜汗

白朮

小麥

一合同煮乾取末為末以黃芪麻黃根煎湯調

服 又棉花子炒泡湯飲三四日妙

治盜汗 用黃芪蜜炙三錢北五味二錢棗仁炒研

五錢炙草一錢麥門冬去心三錢人參三錢白芍

炒二錢香附童便浸炒二錢圓眼肉十枚

惡寒 三十二

形證是寒，按之而鼓激，此陽盛拒陰也。形証是熱，按之脈得微細無力，此壯火食氣之義也。

丹溪云：惡寒非寒，明是熱症。經曰：戰慄動搖，火之象也。河間云：熱極似水，熱甚而反覺似冷，實非寒也。如不飲酒之人，因飲酒而寒慄者，皆酒熱助其心火也。經曰：火鬱則寒。凡此皆內真熱而外假寒也。火鬱者，宜用發揚之劑，實熱者，宜用鹽寒之劑。其間有用辛熱藥而少愈者，辛能開發，鬱過暫開耳。

證治大遺
卷之九
醫學近編
惡寒
主
貞白堂

實非探本窮源之法。

薛立齋云：惡寒有內外真寒者，有內真熱而外假寒者。有陽虛者，仲景曰：陽微則惡寒。又曰：陽虛惡寒者，寒尤甚。又曰：寸口脈微，名曰陽不足，陰氣上入陽中，則洒淅惡寒。經曰：陽氣少，陰氣多，身寒如坐水中出。又曰：胃足陽明之脈，氣虛身以前皆寒慄。東垣云：病人怠惰嗜臥，洒淅惡寒，乃陽虛不能升散也。勞傷形體而惡寒，乃無陽以護衛也。晝則惡寒，夜則安靜，是陰氣上溢於陽分也。夜則惡寒，晝

則安靜，是陰氣自旺於陰分也。晝夜惡寒，是重陰

無陽也。晝則惡寒，夜則煩躁，是陰陽交變也。飲食難化，大便不實，腸鳴腹痛，飲食畏寒，手足逆冷，怕見風寒，面黃嘔吐，此內外真寒也。飲食如常，大便堅實，胸腹脹滿，飲食喜寒，手足逆冷，畏見風寒，面黃嘔吐，此內真熱而外假寒也。凡此之類，陽虛及真寒者，宜用大辛熱甘溫之劑，以回陽內真熱而外假寒者，宜用寒涼鹽冷之劑，以清熱。經曰：益火之源，以消陰翳。壯水之主，以鎮陽光。苟不分真寒假熱，而泛以寒藥治之，則舊疾不去，新病復生矣。可不慎哉。

證治大遺
卷之九
醫學近編
惡寒
主
貞白堂

按暴惡寒，兼頭痛肢節痛，此外感也。宜發表惡寒，身體不痛，止倦怠嗜臥，此陽虛不能升發，無陽以護衛也。宜升陽益胃。參朮芪朮芍防羌獨柴半橘茯澤連惡寒五心煩熱，脈沉數，此火鬱則寒也。宜升陽散火。羌獨葛升防柴參芍惡寒四肢厥冷，脈沉數有力，此熱鬱於內，逼陰於外也。宜用鹽寒之劑。惡寒泄瀉，飲食不食，手足厥冷，唇青脈弱，此內真寒也。宜用回陽補氣之劑。

上集寒宜參芪藿香良姜中集寒宜大建中湯本門

附子理中湯參朮乾姜下集寒宜八味丸天眞丹本門

氣分寒桂枝附子湯血分寒當歸四逆湯歸桂枝芍辛吳

黃甘草通草

仲景云心下有留飲其人背寒如手大丹溪云久

病惡寒乃痰鬱於脾抑遏陽氣不得外泄治當解

鬱陽虛惡寒參芪之類加附子

醫按

玉田隱者治一人雖盛夏必襲重裘擁火坐密室中

證治大還

醫學近編惡寒 黃柏甘草 貞白堂

他醫投以桂附轉劇曰此熱極似寒非真寒也用

硝黃大寒之劑而愈

抱一翁治一人泄瀉惡寒見風輒仆日臥密室坐火

炭毡出語呶呶如嬰氣衆以沉寒涸冷屢進薑附

益甚翁診之脉濡弱而微數濡者濕也數者脾伏

火也脾伏火邪濕熱下流非寒也法當升陽散火

以逐其濕熱治以柴胡升麻羌活澤瀉等劑繼以

神芎丸滑石大黃牽四五泄而毡去次日遂安

東垣治一人脚膝痿弱尻臂俱冷陰汗臊臭精滑不

固脉沉數有力此火鬱於內逼陰向外爲陽盛拒

陰也用苦寒之劑下之而愈

丹溪治一人酒後大惡寒戰慄言渴不飲脉大而弱

右關稍實畧數重按則瀉此酒熱內鬱不得外泄

由表寒而虛也以黃芪二兩爲根一兩煎飲大汗

而愈

又治一人肥厚夏患惡寒戰慄咬熱啣綿已服附子

三十餘枚渾身痒甚脉沉瀉重取稍大知其熱甚

而血虛也以四物去川芎倍地黃加參朮黃芪炒

證治大還

醫學近編惡寒 黃柏甘草 貞白堂

黃柏甘草每用參一劑兩服之反大泄目無視

口無言由其熱極藥無反佐之過也以前藥炒熱

與服一劑利止十劑全愈

薛立齋治一人雖盛暑喜擁火四肢常欲沸湯浸之

喜食辛辣熱湯面赤吐痰一似實火吐甚則宿食

亦出日食入反出是脾胃虛寒也用四君子加姜

附而愈

又治一人內熱作渴大便秘結畏風寒手足逆冷此

內真熱而外假寒以黃連解毒湯治之愈後用地

黃九壯水之主以鎮陽光

又治一婦食少作吐口吐痰涎面黃腹痛手足逆冷此內外俱寒之症也用六君子加附子木香治之而愈。

一士人患惡寒右尺獨滑尺滑者濕熱下陷也惡寒者因積勞傷脾胃氣下陷穀氣不得升發無陽以護榮衛也用補中益氣湯加肉桂一劑而愈。

天建中湯 治脾胃虛寒少氣手足厥冷小腹脹急腹中寒痛或陰縮入

諸治大還

醫學近編

惡寒

美

貞白堂

人參 黃芪 桂心 附子 當歸 半夏

芍藥 甘草 薑棗

黃芪補胃湯 治表虛惡賊風。

黃芪 甘草 麻黃 草豆蔻 橘皮 青皮

當歸 白芷 升麻 藁本 柴胡 黃柏

白朮附子湯 治陰盛生內寒厥氣上逆寒氣積於

胸中是腎水反來侮土作中滿腹脹涎流清涕足痛難行骨乏無力喜睡多溺兩尺冷痛妄見鬼夢亡人腰背脊俱痛不渴不瀉此溫氣去寒獨留留

則血凝泣泣則脈不通故盛大以瀉名曰寒中

白朮 附子 陳皮 蒼朮 厚朴 半夏

茯苓 澤瀉 各一錢 猪苓 肉桂 各五分

天真丹 治下焦陽氣虛寒

沉香 益智 巴戟 茴香 杜仲 葫蘆巴

破故紙 肉桂 各一兩 人參 一兩童便

酒糊為丸

諸治大還

醫學近編

惡寒

毛

貞白堂

惡熱 三十三

弦數無力為陰虛洪大而虛重按全無為血虛身熱
脈數按之不鼓激為陰盛格陽之症丹溪云惡熱
非熱明是虛証經曰陰虛則外熱蓋陽在外為陰
之衛陰在內為陽之守精神外馳嗜慾無節陰氣
耗散陽無所附遂致浮越於肌表之間而惡熱也
當作陰虛治之

東垣云發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣其
脈洪大而虛重按全無此脈虛血虛也宜當歸補

醫治大還

醫學近編 惡熱 天 貞白堂

血湯門主之候用白虎湯必死

薛立齋云惡熱有內外真熱者有內真寒而外假熱
者如飲食如常大便堅實胸腹痞脹飲食喜冷手
足煩熱面赤嘔吐此內外真熱之症也宜黃連解
熱湯建不拖以退熱六味地黃丸熟地黃藥以滋
陰若飲食少思大便不實吞酸噯氣胸腹痞滿手
足逆冷面黃嘔吐此內寒而外假熱也宜附子理
中湯參朮乾以回陽八味丸以益火苟不知真水
火之故而泛以寒熱藥治之適足以增病所謂有

者甚之也

醫按

璜溪隱者治一人得熱病雖和寒四肢亦以水浸手
握冰輪眾以為熱曰此寒極似熱非真熱也治以
附子辛熱之劑而愈

東垣治一人惡熱目赤煩渴引飲脈七八至按之則
散此無根之火也用薑附加人參服之愈

薛立齋治一人發熱無時日飲冰水數碗寒藥二劑
渴益甚肌肉消瘦尺脈洪大而數時或無力曰發

醫治大還

醫學近編 惡熱 天 貞白堂

熱而時作時止是無水也寒之不寒責其無水法
當壯水之主則虛火自歸經矣用加減八味丸料
不月而愈

又治一人面目俱赤下唇焦裂煩躁不眠或時喉間
如烟火上冲急飲涼茶少解捫其身烙手脈洪大
而無倫此腎虛火不歸源遊行於外也投以十全
大補湯加附子澤瀉山茱萸山藥丹皮五味一服
即愈

又治一人色慾過度煩熱作渴飲水不止小便淋瀝

大便秘結吐痰如湧面目色赤舌胎唇裂身體發熱時或如芒刺而無定足心如烙脉洪大而無倫此腎陰虛陽無所附而發於外非火也遂以加減八味丸料一斤以水頓煎六碗冰冷與服大睡至曉諸症悉去翼日畏寒足冷至膝諸症仍至此陽氣亦虛故也急以八味丸一劑服之至四日全愈大便久不去用猪胆汁導之諸症復來用十全大補湯而安。

又治一人積勞病大熱淚出隨凝目赤面黧揚手露

證治大還

醫學近編

惡熱

手

貞白堂

胸氣息沉沉舌乾如刺脉大鼓指按之如無此內真寒而外假熱也用十全大補湯得脉欲熟睡覺則惡寒脉頓微細此虛寒之真象也遂以人參一兩熟附三錢服二三劑遂愈後以大劑參朮歸身炙甘草調理而安。

又治一婦患痰喘熱渴醫以降火散氣藥治之肌肉日削反加痰盛身熱口腐腹滿神昏絕食此虛熱無火也投以壯水之劑而愈。

璜溪治一人自躁以下常覺熱冬不可加綿自誇質

厚曰此足三陰之虛宜早斷慾事以補養陰血庶可免病笑而不答後癢症而亡。

劉彥純治一人不能食而熱自汗氣短不食而熱脾陰弱也自汗氣短肺氣虛也以甘寒之劑補氣瀉火而安。

陳三農治一人身大熱兩目出火口舌乾燥手足欲以水浸不避親疎脉豁大服黃連解毒湯益甚此心之脾胃而心氣耗散故耳遂用炒黑乾薑一二兩人參三錢白朮一錢不用甘草者恐生者瀉心氣

證治大還

醫學近編

惡熱

手

貞白堂

炙者緩中致脾胃中火邪不得發散也三味煎服不踰時引被自益戰汗出而愈夫乾薑微炒溫中炒黑涼腎止泄。

當歸補血湯 治血虛脉虛發熱脉洪按之則無

當歸錢五 黃芪兩一 水煎服

寒熱三十四

經曰陽虛則惡寒陰虛則發熱陰陽俱虛故寒熱往

來也治宜人參養榮湯

參朮芪歸陳草桂芍熟地五味茯苓遠志薑棗加丹

皮知母外有火鬱則寒火發則熱者宜火鬱湯之

類

羌葛升防柴又有瘀血內蓄能令人忽寒忽熱

宜桃仁承氣湯

大黃桃仁桂枝芒硝草代抵丸大黃芒硝桃

黃肉桂山甲

婦人熱入血室往來寒熱者小柴

胡湯加生地丹皮

一古飲食不均遠行勞倦發熱煩悶症類傷寒乃禁

證 大還

醫學近編

寒熱

三

貞白堂

合不與余視之言語輕微手背不熱六脉數而軟

此真氣不足非有外邪也力勉其進粥乃與甘溫

大補之劑恰服數日熱退而安

一士精神倦怠腰膝異痛不可忍醫者咸曰腎主腰

膝乃用桂附之劑延兩月覺四肢痿軟腰膝寒冷

遂忤服熱藥了無疑懼余視之脉伏于下及重按

之振指有力因思陽盛格陰乃火熱過極反見勝

亡之化以黃柏三錢胆草二錢芩連梔子各一錢

五分加生薑七片為之向導乘熱頓飲移時便覺

腰間暢快三劑而痛若失

一婦久痢不止口乾發熱飲食不進猶服香連等藥

完谷不化尚謂邪熱不殺如欲進芩連數日不食

熱正危迫診之脉大而數按之極微詢之小便的

利腹痛喜手按此火衰不能生土內真寒而外假

熱也小便利則不熱可知腹喜按則虛寒立辨亟

追附子理中湯待冷與服一劑而痛止連服數劑

而愈

醫學近編

寒熱

三

貞白堂

雲間陳 治三農甫述 男

杖璣先 師柴羔愚 參

長白石文燦右容甫閱

門人 范 崧壽民 王 顯贊皇 校

泄瀉

石尺濡細者瀉腎。脉小甚者為洞泄。腎脉虛則泄。肺脉小甚則泄。數疾為熱。沈細為寒。開浮為風。緩為濕。滑為痰。滑數為食。弦而遲者氣泄。心脉止者驚。

證治大還

醫學近編 泄瀉 卷之九

頁白堂

泄微細滑者生。數大浮者危。

瀉屬濕。有風有痰有火有積有食有虛有寒。有色慾傷腎。不能閉藏。有忿怒傷肝。木邪淫土。有命門火衰。脾土虛寒。但因飲食不調。致傷脾胃者多。治須分看時令。分寒熱虛實。新久施治。濕則分利之。風則散之。寒則溫之。火則清之。痰則豁之。積則削之。食則消之。陷下則升提之。氣虛則溫補之。久泄滑脫不禁。則收澀之。隨病致宜。不可驟用補澀之藥。致瘀濕熱。變生諸症也。

戴復菴曰。濕者體重軟弱。泄下多水。小便不利。經曰。

濕勝則濡泄是也。胃苓湯。本 寒者。洞下清水無

聲。小便自利。清白。腹中雷鳴。米穀不化。經曰。腸中

寒。則腸鳴。飧泄是也。香砂理中湯。本 寒者。洞下清水無

寒泄瀉。腹痛無度。草果散。本 火者。痛一陣瀉一

陣。暴注下迫。煩渴溺赤。肛門焦痛。發色赤黃。經曰。

腸中熱。則出黃如糜。是也。名曰滯泄。此濕兼熱也。

四苓散。本 加木通滑石黃芩。積熱作泄者。宜

下之。積者。腹痛而瀉。瀉後則痛減。木香檳榔丸。

證治大還

醫學近編 泄瀉 卷之九

頁白堂

香積散。本 陳蓬壳連。食者。腹胸滿悶。噯氣惡食。平

胃散。加麴蘖山查。痰者。或瀉或不瀉。糞粘如膠。

導痰湯。本 實亦茯苓姜。加蒼白朮。風邪入中而瀉

者。腸鳴脉弦。或浮大而長。完穀不化。經曰。久風入

中。為腸風。飧泄是也。此濕兼風也。神朮散。本 羌活

辛膏。或麻黃桂枝湯。本 麻桂細乾姜。腸胃虛。風邪客

之。而作瀉者。胃風湯。本 桂芍白朮。氣虛者。脾肺脉

弱。小飲食減少。完穀不化。四君子加炒芍藥肉豆

蔻升麻。清氣下陷而生飧泄者。補中益氣湯。或

升陽除濕防風湯本門 脾胃虛寒四君子加煨姜

肉豆蔻久下不能禁固此濕勝氣脫也各曰滑

泄實脾固腸丸本門 瀉痢惟氣勃勃當利小便四

苓散白赤茯苓澤瀉加木通食下即腸鳴腹急泄盡所

食之物始安此脾虛不勝飲食也快脾丸本門 一

日大便三四次而不甚澹此腸胃中有濕熱也平

胃散若陳朴甘加黃芩白朮茯苓藥澹而不多此胃

氣下陷也升胃湯本門 每晨泄瀉一二大日以為

常此縱慾傷腎不能閉藏也補中益氣湯參朮芪

證治大還醫學近編泄瀉三 貞白堂

升送二神丸本門 腸脹食少善怒瀉青或寒熱作

嘔此忿怒傷肝脾虛肝所乘也六君子湯參朮芪

加柴胡芍藥木香升麻中焦氣弱脾胃受寒大

便滑泄腹中雷鳴四肢逆冷心胃絞痛冷汗不止

此寒水侮土腎之脾胃病也用六君子加薑桂澤

瀉或益黃散參朮芍朮陳或沉香溫胃丸食難運

化飲食不食手足厥冷泄瀉完穀此命門火衰不

能生土及真陽虛敗也八味丸六味加桂附固真丸虛損

門 大便秘利小便秘瀉或肢體漸腫喘嗽吐痰

此脾胃氣血虧損也十全大補湯虛損本門 下四神丸

或加減腎氣丸虛損本門 體重節痛口乾舌燥不

貪飲食二便不調酒漸惡寒悽慘面惡此肺之脾

胃而陽氣不伸也升陽益胃湯羌獨防柴朮芪澤瀉

泄瀉而裡急後重數至圓而不能便或有白膿或

血此飲食勞役傷脾精華之氣反下陷於腎肝也

升陽除濕防風湯本門 久瀉不止腹中重墜此中

氣虛而下陷也補中益氣湯參朮芪 久瀉不

止腹中窄狹此脾氣虛散而不收也四君子參朮芪

證治大還醫學近編泄瀉四 貞白堂

加陳皮芍藥瀉久覺胸腹痞滿此陽氣下陷而

濁陰填塞也升陽益胃湯羌獨防柴朮芪澤瀉

瀉久而口渴引飲此津液內亡也錢氏白朮散本門

瀉已愈至來年此日月時復發者以脾胃有積脾

主信故也視虛實消息下之

仲景曰下利脈滑者實也當下之下利三部脈皆平

按之心下堅者急下之下利脈伏其人欲自利雖

利而心下堅滿此為留飲也甘遂芍藥半夏湯

脾泄

泄瀉彌年不愈為脾泄脾虛濕熱者蒼朮復煎散

蒼朮膏破故紙丸俱本門脾胃虛寒者補脾丸小茴

香丸俱本門泄中有垢膩積滯用補脾收澁等藥而

不效者此為積泄宜和中丸木香檳榔丸香檳青陳達先

連柏大黃香附牽牛積去後調補脾胃

陳三農治脾泄用白朮一斤切片大棗半斤朮一層

棗一層入礮中煑爛搗成餅晒乾加炒松花一兩

米糊為丸服

脾腎泄

證治大還

醫學近編

泄瀉

五

黃白堂

每至五更洞泄一二次日以為常者為脾腎泄因脾

胃虛寒寒濕下流乘腎或腎氣虛而閉藏之令不

行也腎氣虛者二神丸五味子丸脾腎俱虛者四

神丸不應急以八味丸補火以生土

陳三農云凡腎虛作泄宜脾胃兼補用熟地生薑各

一兩同煮搗成餅焙乾山藥茯苓各一兩為丸服

又云五更泄瀉名腎泄宜杜仲生薑各一兩炒肉豆

蔻去油破故紙各一兩吳茱萸二錢五味子一錢

生薑煑棗肉為丸仍灸氣海關元尤妙

飧泄

飧泄者米穀不化而完出也經曰清氣在下則生飧

泄蓋清氣者胃氣也元氣也脾胃衰不能升發元

氣降下陰分故不能消化穀味而完出也又曰久

風入中則為飧泄夫胃者土也其氣中和風邪于

胃是木剋土也土衰則冲和之氣不能化食故令

完出也亦有飲食太過致傷脾胃不能運化而完

出者凡此皆升浮以扶持胃氣不可用降下藥及

利小便經曰下者舉之又曰頭有疾取之下謂陽

證治大還

醫學近編

泄瀉

六

黃白堂

病在陰也足有疾取之上謂陰病在陽也中有疾

取之旁旁者少陽甲胆也

胃中寒腸中熱則脹而且泄由寒則痞塞熱則下

注也腸中寒胃中熱則疾飢小腹痛脹由胃熱則

飢寒主痞塞故脹也

中者脾胃也脾胃有疾取之少陽甲胆者甲風木

也胃中濕勝而飧泄助甲胆風勝以剋之也宜四

君子加柴胡防風升麻蒼朮白芍虛寒加肉豆蔻

砂仁炒麴之類又宜先奪其食次用上方為妙其

脉小手足寒難已。脉小手足溫易已。腸鳴腹滿。四肢清脉大為逆。

酒積泄

飲酒便泄。此脾胃虛不能當濕熱也。用六君子湯加葛根黃連酒麴。若酒後腹痛作瀉。此酒積也。用黃連滑石葛根酒麴。或解醒湯。或平胃散。加丁香砂仁麥芽神麴。

頓肚泄

肚脹泄瀉。瀉後脹減。已而復脹。復泄。俗名頓肚泄。因

證治大選

醫學近編

泄瀉

七

貞白堂

脾病不能分利。陰陽故清濁混淆。致生填脹也。小

兒多有此症。食滯者必惡食。瀉白臭腐。平胃散。

甘加砂仁麴蘖。山查白朮茯苓。濕熱者必小便赤

澀。引飲胃苓湯。明加滑石。脾胃虛轉運失司者。六

君子加炮薑砂仁木香氣。下陷加升麻柴胡防風。

泄瀉證治各有所宜論

醫學集成云。瀉宜有汗解者。若保命集治久風為殭。泄用蒼朮麻黃防風之屬是也。有宜下愈者。若張長沙言下利脉滑數者。宿食也。當下之。有因吐愈

者。若格致論。治積濕成痰。流於肺沖。致大腸不固。

當吐之。有宜補者。若脾胃論言脉弦氣弱。四肢發

熱。自汗泄瀉。從黃芪建中湯。有宜調和脾胃而止

者。若潔古言四肢怠惰。飲食減少。小便不利。大便

走泄。治以白朮茯苓芍藥。有宜升舉而安者。若試

效方。言胃濕脾弱。不能運行。食下即泄。助甲胆風

勝以剋之。治以羌活獨活防風升麻甘艸。升陽之

屬。有宜燥濕而愈者。若東垣言濕土有餘。脉緩怠

惰。四肢不收。大便泄瀉。從平胃散。有宜收瀉而止

者。若蘭室秘藏言寒滑氣泄。不固。宜訶子散。若此

諸法。各有所宜。治者審之。

一士喜食瓜果。縱飲無度。忽患大瀉。先用分利不應

再用燥濕。反加沉困。余見其六脉皆浮。因思經曰

春傷于風。夏生發泄。非汗不解。以麻黃三錢。參朮

各二錢。甘艸升麻各一錢。與之泄瀉頓止。以四君

子調治而愈。

陳三農云。泄瀉久而不愈者。宜保元湯。參朮炙艸。加

茯苓炒松花。或加臘肉骨灰。益智五味子。瀉皆宜

四君子參朮暴瀉胃苓湯傷食亦服腹痛自利理

中湯參朮乾夏月泄瀉屬濕熱小便赤澀五苓散

白朮赤茯苓渴甚益元散滑石暑瀉胃苓湯本門虛寒

理中湯其餘五苓散身熱無汗熱湯調服利水止

瀉冷水調服止渴人參湯調服腹脹瀉湯探吐久

瀉四君子加黃芪白芷吐加乾姜久瀉胸中滿悶

補中湯去當歸加附子身熱加羌活以風能勝濕

也久瀉自汗潮熱畏寒建中湯蜜炙芍藥加入參

久瀉潮熱脈細數者不治凡身熱泄瀉腹痛防有

證治大還醫學近編泄瀉九貞白堂

伏水杜仲姜汁炒為君澤瀉臣之泄瀉出有白泡

且作聲此濕熱在小腸用平胃散加乾薑清晨泄

瀉夜間潮熱自汗夢遺宜坎離丸加牡蠣山藥打

糊為丸不拘大人小兒泄瀉皆宜補脾用參苓白

朮散加木香砂仁豆蔻為丸久瀉恐有鬱火加黃

連少許小兒積泄加使君子

醫按

滄公治一人下利完穀衆以洞泄寒中服理中四逆

輩轉劇六脉弦長右關浮於左關一倍目外青如

滋草知肝風傳脾因成飧泄非藏寒也以小續命
湯麻黃參防風已黃桂枝朮芍苓附子甘去麻黃加白朮服三五升
而愈

又治一人病飧泄彌年不愈衆以休息病治勿效時

秋半脉雙弦而浮曰此病驚風因肝主驚虛風自

甚故乘脾而為飧泄若至明春病當益甚法當平

木之太甚扶土之不及而泄自止遂以黃牛肝和

攻風健脾之劑而愈

子和治一人腸鳴飧泄百治不效診其脉浮數曰此

證治大還醫學近編泄瀉十貞白堂

風入腸胃脾土受邪也宜汗之投以麻黃湯麻黃桂枝

杏仁汗出而愈

一人脾胃素弱少有所傷即泄瀉此肝氣乘脾且久

瀉濕熱在腎故也用白朮八兩紅棗去核四兩二

物間襯煮至焦色搗餅烘乾入松花七錢白豆蔻

五錢新米糊為丸午前服愈

一人脚膝常麻飲食多即泄瀉此脾虛濕熱下流也

用補中益氣湯加防己黃柏而愈

丹溪治一老人右手風攣泄瀉百法不效右脉洪滑

此太陰經有積痰肺氣壅遏不得下降六腸虛而作瀉當治上焦用蘿蔔子搗碎和漿水蜜調勻探吐膠痰數升而愈。

又治一人稟厚形瘦患下利久不愈神猶不瘳溺澀少不赤脉濡頗弦膈微悶食減此積痰在肺肺爲大腸之藏宜大腸之不固也當澄其源而流自清以萊菔陳皮青葱鹿首根生薑濃煎探吐去痰半升利減半再飲而利止與平胃散加黃連調理而安。

證治大還

醫學近編 泄瀉 十一 貞白堂

薛立齋治一人患泄瀉諸藥不效曰此肝腎泄也經

曰諸厥固泄皆屬於下下調下焦肝腎之氣也門戶束要肝之氣也肝氣厥而上行故下焦不能禁固而泄利腎爲胃關關門不利故倉廩不藏而飧泄也用木香散門而愈。

治一婦每至寅卯時泄瀉一二次裡急後重睡則胸中飽悶曉則體雜吞酸此因脾胃虛寒寒濕之氣下陷於腎而成脾腎泄也胸膈痞悶濁陰不降也裏急泄瀉清陽不升也吞酸體雜脾氣虛寒失其

運化也五更泄瀉胃不要倉廩不藏也用理中湯參朮乾姜加蒼朮肉豆蔻茴香五味子煨芍藥升麻二劑而安。

一婦有孕常作瀉久瀉屬腎用白朮四兩煑熟山藥二兩炒甘艸一兩炙杜仲姜汁炒松花炒各七錢米糊爲丸服愈。

治婦人腎泄無子肉豆蔻粉裹煨四兩吳茱萸湯泡二兩五錢補骨脂三兩五味子三兩人參一兩木香六錢砂仁八錢爲末山藥粉糊丸每服三四錢

證治大還

醫學近編 泄瀉 十二 貞白堂

白湯下。

三農治一人食物入口頃從大便出其脉洪數此火性急速也用黃連滑石水通澤瀉人參徐徐服一二貼愈。

升陽除濕防風湯東垣治飲食不節起居不時損

其胃氣上升精華之氣反下流肝腎而成瀉利久則太陰傳於少陰而爲腸僻或大便秘塞或裡急後重或至固而不能便或下白膿或血膿勿利之利之必致重病反鬱結而不通矣法宜填補中氣

升之舉之道舉其陽而陰氣自下。

蒼朮 四錢

防風

白朮 各二錢

白茯苓

白芍 各一錢

水三鍾煎蒼朮至二鍾入諸藥煎至七分服。

升陽除濕湯

東垣

治脾胃虛不思飲食腸鳴腹痛

泄瀉無度自下而上者引而竭之。

升麻

防風

柴胡

蒼朮

神麴

麥芽

澤瀉

猪苓

陳皮

甘艸

生薑

大棗

瀉利久不愈陽氣下陷加羌

證治大還



醫學近編

泄瀉

主

真白堂

活參朮

胃苓湯

治夏秋之間脾胃傷冷水穀不分泄瀉

不止

蒼朮

白朮

茯苓

猪苓

澤瀉

陳皮

肉桂

甘艸

厚朴

加草豆

薏名對金飲子

加減防風芍藥湯

机要

治風入腸胃泄利發泄脉

弦腹痛頭疼微汗。

防風

芍藥

黃芩

等分

蒼朮

加倍

參苓白朮散 錢氏

治久瀉及脾胃虛弱泄瀉

人參

白朮

白茯苓

蓮肉

山藥

白扁豆

薏苡仁

砂仁

桔梗

甘艸

黃芪人參湯

東垣

治勞役傷大腸大便後有血膿

或全白朮

黃芪

人參

白朮

蒼朮

當歸

麥門冬

五味子

黃柏

酒炒

炙甘艸

神麴

升麻

陳皮

證治大還



醫學近編

泄瀉

主

真白堂

腹痛作瀉

人參 二錢

蒼朮 三錢

黃連 一錢

姜汁

炒三次

北五味

橘紅 一錢

肉豆蔻

五分

吳茱萸

湯泡各

一錢

白茯苓 一錢

藿香

五分

治泄瀉在脾胃二經者

白茯苓 三錢

白朮 炒二錢

炙甘艸 一錢

車前子

炒

三錢

陳皮 二錢

升麻 五分

乾葛 一錢

薑片

大

砂仁 炒一錢

川連 一錢

五分

姜汁炒

如無濕熱者去之

治脾腎泄

肉豆蔻	粉暴煨	北五味	四兩	補骨脂	二兩五錢
白芍	二兩五錢	砂仁	一兩五錢	甘艸	八錢
吳茱萸		桔梗	各三兩	人參	二兩
湯下三錢		爲末山藥糊丸	空心白		
蒼朮	一兩	人參		白朮	
柴胡		薏苡仁		升麻	各一錢
水三碗先煎蒼朮入諸藥		黃連	一錢	黃連	一錢
升胃湯		治一日大便三四次瀉而不多腹鳴			
證治大還		醫學近編	卷之九	五	貞白堂
人參		黃芪		甘艸	
柴胡		陳皮		益智	
木香散		治臟腑虛寒下泄水穀口舌生瘡嘔吐		紅花	
木香	一兩	破故紙	炒各一兩	良薑	三錢
砂仁	三錢	赤芍	五錢	橘紅	五錢
胡椒		吳茱萸	泡各一錢	肉豆蔻	
每三錢猪肝批開糝藥在內水醋鹽蔥薑煮乾食		之			

草果散		治腸胃虛寒泄瀉無度	
厚朴	<small>姜汁拌炒二兩</small>	肉豆蔻	<small>煨</small>
薑湯下三錢		草豆蔻	<small>煨十枚</small>
白水安胃散		治瀉痢經久不愈滑脫不禁日夜	
無度			
五味子	烏梅肉	<small>炒各一兩半</small>	車前子
白朮	<small>炒一兩</small>	栗殼	<small>二兩去頂醋煮</small>
每五錢水煎服			
附子溫中湯		治中寒腹痛下利米穀不化脾胃	
證治大還		<small>醫學近編 卷之九</small>	
弱不食倦怠		附子	
附子	<small>泡</small>	乾薑	<small>泡七</small>
白芍	<small>炒</small>	茯苓	<small>炒</small>
車前子散	治暴注水泄小便不利	陳皮	<small>甘</small>
車前子	<small>畧炒爲末</small>	清米飲調下八九錢	
快脾散	治久瀉不止脾氣虛寒		
人參	白朮	乾薑	訶子
茯苓	藿香	木香	甘
或單用豆蔻乾薑木香糊丸服			

五味子散。治腎經虛弱。大便不實。或夜間五更

泄瀉。

五味子 炒二兩 吳茱萸 五錢 二味共炒香熟

為慶 每二錢米飲下

蒼朮膏 秘傳 治脾泄日久不愈

蒼朮 五斤為咀片水一鍋 煎減半去渣入下藥 石楠葉 楮實子

各一 當歸 二兩 煎成膏去渣入蜜一斤煎和

每服一小鍾

補脾丸 治脾虛發泄久不愈者

證治大還

醫學近編 泄瀉 卷之九 七 貞白堂

白朮 十兩 破故紙 小茴香 肉豆蔻

吳茱萸 各 人參 蓮肉 各一 芍藥 炒

炙甘草 各五 山藥 陳皮 各七 木香 四錢

乾薑 三錢 陳米飲打神麴糊為丸

脾腎雙補丸

人參 去蘆 蓮肉 去心炒 更絲子 如法研末

五味子 蜜蒸烘乾 山茱萸肉 烘乾 淮山藥 炒

一斤 車前子 米泔淘淨 肉豆蔻 兩 橘紅 六

砂仁 六兩 炒 巴戟 十二兩 甘州 補骨脂 鹽水

研末 蜜九菴豆大空心每服五錢

快脾丸

生薑 六兩切片飛 砂仁 白朮 各二 橘皮 二

甘草 炙一 丁香 五錢

蜜九如彈子大姜湯下二九

破故紙丸 治脾虛濕熱脾泄

破故紙 炒一 厚朴 姜製 蒼朮 炒各 白朮 炒

陳皮 甘州 炙各 黃連 姜汁炒黑

紅棗去核煮爛為丸

證治大還 醫學近編 泄瀉 卷之九 六 貞白堂

皂子丸 治脾泄

紅棗 去皮核 烏梅肉 各四兩 肥皂子 獨子者

共為爛為丸

三神丸 治腎泄久不愈。脉沉細無力

破故紙 炒四 肉豆蔻 煨二 紅棗 五十 薑 兩

同煮取棗肉為丸梧子大鹽湯下五十九 加五

味子 炒 吳茱萸 一兩 名四神丸治脾腎泄

澹荊加茴香木香亦名四神丸

五味子丸 治腎司閉藏縱慾傷腎而失其職以

成腎泄。此湯主之。

人參 五味子 白朮 破故紙各一兩

吳茱萸 巴戟 肉豆蔻煨 龍骨煨各一兩

山藥 白茯苓 兔絲子各一兩半 牡蠣煨五錢

酒糊丸如梧子大鹽湯下

豆蔻丸 治滑泄

陳米一兩 肉豆蔻煨 赤石脂 五味子各五錢

粟米湯下二錢

小茴香丸 治脾腎泄

肉豆蔻煨 小茴香炒各二兩 破故紙炒四兩

木香 薑切片 棗七枚 同煮取肉爲丸

實脾固腸丸 治瀉痢日久不愈及脾泄無度或腸

胃虛寒滑脫不禁者

白朮土炒 人參 乾薑炒 甘草炙各二兩

茯苓二兩 蒼朮 厚朴姜製 陳皮各一兩

訶子 粟殼去弦蜜水炒各二兩 砂仁一兩 酒糊丸如

梧子大米湯下七十九 虛寒加附子炮三錢

滑脫不禁加龍骨赤石脂煨各一兩

桂香丸 治臟腑虛爲風濕所搏冷滑注下不禁虛

危垂絕者

附子泡 肉豆蔻煨 白茯苓各一兩 桂心

良薑泡 木香各五錢 丁香二錢半

糊丸米湯下五六十丸

蔻附丸 治臟腑虛寒泄瀉及元氣虛寒者

乾薑 良薑 丁香 豆蔻各四兩

茯苓四兩 木香二兩 附子 生薑各一兩

一小兒 痘後泄瀉二三年體瘦腹大善食此久瀉

傷腎腎不納氣肝木火起脾無正火不殺穀故作

瀉瘦削成瘠耳用紅麴丸加草果三錢服之愈

紅麴丸

錫已兩燒 紅麴三錢 松花三錢

俱爲細末入白糖霜和勻服 紅痢加麴 白痢

加松花

吐瀉不止同藥無效者艾炙大樞氣海穴

雲間陳 治三農甫述 男

拭璣先 參 師柴羔愚

長白石文燦右容甫訂

門人 范 崧壽民 校 王 顥贊皇

虛損 二十一

脉軟弱微緩濡小者為虛。平人脉大為虛。浮大裡虛。

微細或緩而無力。或右手弱者氣虛。軟大或數而

無力。或左手弱者血虛。寸弱而軟。上虛。尺弱而澀。

證治太還

醫學近編 虛損 卷之十

一

真白堂

下虛。陽虛脉遲。陰虛脉弦。真氣虛。脉緊小者。血氣

俱少。沉小遲者。脫氣。寸脉下不至。關為陽絕。尺脉

上不至。關為陰絕。弦為中虛。細微為氣血俱虛。

虛損有陰虛者。有陽虛者。有陰陽兩虛者。有脾胃虛

者。有因病致虛者。因虛致損者。治當隨病致宜。不

可用。大熱大寒之劑。大熱者。適足以發其虛陽。大

寒者。亦足以傷其胃氣。今人皆執丹溪多屬陰虛

之說。槩用知柏降火滋陰。又謂人參甘溫之劑。皆

不可用。則陽虛胃虛。及病後致虛者。焉能當此若

寒之氣味耶。雖云多屬陰虛。然亦未嘗專指腎經

一臟受傷而言。經曰。腎為都會關司之所受。五臟

六府之精而藏之。若嗜慾無節。則臟腑之精氣皆

傷。臟腑俱虛。精血消耗。徒用苦寒之藥。不唯瀉腎

經之真元。抑且寒涼傷胃。元氣下陷。脾失運化。必

食減泄瀉。反增脾胃元氣俱虛之症矣。夫脾為陰

中之至陰。脾虛則不能生肺金。肺虛則不能生腎

水。理當滋化源為主。況人之真元精血。皆賴水穀

之精氣所化。仲景云。穀入于胃。其氣乃行。水入其

證治太還

醫學近編 虛損 卷之十

二

真白堂

經其血。乃生經。曰。脾為主陰之首。胃為五臟之原

又曰。胃者衛之原。脾者榮之本。是脾胃乃元氣精

血之根蒂也。導其流而不濬其源。欲其精生血長

氣充也難矣。此古人所以有補腎不如補脾之說

也。苟能補養脾胃。脾陰強健。能運能化。散其精

微。上歸於肺。朝於百脈。灌溉四旁。榮養氣血。四臟

不虛。腎受其精而藏之。則虛者實矣。嘗治虛損以

白朮為君。歸芍地黃山藥萊菔為臣。佐以酸棗仁

麥門冬茯苓以補心。使心火不妄動。以耗其陰血。

且以杜肺金之賊邪。加牡丹皮以去血中之熱。加地骨皮以去氣中之火。潮熱加軟柴胡黃芩。骨蒸加青蒿鱉甲。有熱加五味子酸收。有痰加貝母灰。芫仁潤下。因腎虛水泛為痰者。六味丸間服之。咳嗽加瓜蒌仁知母阿膠。因脾虛不能生肺者。六君子湯。參朮苓艸半陳調養之。遺精山茱萸芡絲子遠志。因腎虛不能閉藏者。金鎖固精丸。門本以堅之。左手脉虛弱。或細數是腎經之真陰不足也。六味丸。門本為主。右手脉或遲軟。或沉細。是命門之真火不足也。鹽冷大還。醫學近編 虛損 三 貞白堂 卷之十

八味丸。門本為主。面白神怯。飲食減少。是脾胃之元氣不足也。補中益氣湯。參朮朮升。泄瀉食減潮熱。歸柴升。於酉戌時分。陰分脉洪數。陽分脉細弱。是苦寒之藥傷氣。元氣胃氣下陷於陰火中。陽氣抑鬱也。升陽補氣益胃為主。忌用苦寒滋陰潤腸之藥。凡用黃柏知母。必兩尺脉洪大。而見火証。方可加用。苟尺脉微弱。而候用之。則寒涼傷胃。而虛証蜂起矣。可不慎哉。

劉宗厚云。人身之本有三。元精元氣元神。乃身中之

真精真氣真脉也。夫精乃臟腑之真。非榮血之比。故曰。天癸氣乃臟腑之大經。為動靜之主。故曰神機。脉為天真委和之一氣。精不足。則氣失資化。氣不足。則血失所營。血不足。則氣無所附。天真散亂。則氣血精神。無所稟命矣。故相生長養之道。精化氣。氣生神。而皆稟乎身中。臟腑之真也。夫氣血從乎榮衛。榮衛宗乎經。隨經隨者。胃之水穀。氣所化以生。榮衛榮衛散而長養經脉。經脉順而資生天真者也。

證治大還

醫學近編 虛損 四 貞白堂 卷之十

五臟損陰損陽症治

機要曰。損陰則陽盛。其病自下而上。損陽則陰盛。其病自上而下。自上而下者。一損損於肺。皮聚而毛落。二損損於心。血脉虛少。不能榮於臟腑。婦人不月。三損損於胃。飲食不為肌膚。過於胃則不可治矣。自下而上者。一損損於腎。骨痿不能起於床。二損損於肝。筋痿不能自收持。三損損於脾。飲食不能消。尅過於脾。則不可治矣。難經云。從上下者。骨痿不能起於床者死。從下上者。皮聚而毛落者死。

心片損而色微腎肝損而形瘦穀不能化而即損
滋潤之深則勞瘵之候也治法損其肺者益其氣
損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒
溫損其肝者緩其中損其腎者益其精肺損皮
聚毛落宜益氣四君子湯門本心肺虛損皮聚毛
落血脉虛耗婦人月經愆期八物湯門本心肺損
及胃損飲食不為肌膚宜益氣和血調飲食十全
散門本脾肺俱虛人參養榮湯門本骨痿不能起
於床宜益精補腎金剛丸門本肝腎俱虛骨痿不
能起床筋痿不能自收持半膝丸門本肝腎損及
脾胃食穀不化煨腎丸陽盛陰虛肝腎不足形
瘦無力而色青黃宜養榮血補腎地黃丸陰盛
陽虛心肺不足面無血色食少嗜臥倦怠八味丸
門本

真西山云禮義以養心雖老而精神不散即此推之
則未老而老者非嗜慾以損精神即思慮過度以
傷氣血也
陳三農云虛損潮熱宜補中益氣湯參苓朮朮火熾

證治大還

醫學近編

虛損

五

貞白堂

證治大還

醫學近編

虛損

六

貞白堂

宜發用升陽散火湯羌獨葛升防柴虛而不泄宜
血分中補氣保元湯參朮炙朮加滋陰之藥若泄
瀉發熱宜氣分中補血保元湯加芍藥松花如自
汗乃陽虛加附子內火似燥胸中刺痛用白朮一
錢陳皮四分神麴為丸津咽下三十九三日愈則
止用保元湯或腹脹補中湯合和中散乾薑肉桂吳茱萸
脈見和平而不愈者乃藥力未到不可改換若脈
細數緊數則邪脈也更兼嘔吐則危矣口失滋味
不思飲食非胃絕也是內虛有火當滋生元氣若
用燥劑是以火濟火則心失所養上無以益下下
無以奉上五臟空虛而死矣凡虛損起於脾勞
瘵起於腎虛損蒸蒸發熱自汗按至皮膚間熱甚
重按至筋骨則不熱身雖熱喜近衣被不能食而
肥脈豁大重按則無力而不清勞病則骨蒸勞
熱輕按皮膚不熱重按至筋骨則熱蒸手身雖涼
不欲近衣被能食而瘦脈惟緊數虛損轉潮熱泄
瀉脈短數者不治勞病轉陰虛火動咽痛脈細數
不治見症各異治法迥別虛損調理補中益

氣湯八珍湯十全大補湯四君子湯理中湯參苓
白朮散丸藥亦以此數方調用補陰藥大忌勞
病調理六味地黃丸八珍湯加黃柏知母痰嗽加
知母貝母二門冬灰萎仁紫苑隨症加減香燥藥
大忌虛損作勞治必泄瀉而亡勞病作虛損治
必喘促而死故治虛損宜保元湯及四君補中加
減大忌潤劑即如當歸味辛辛走氣肺氣開散此
瀉之所由來也凡虛損咳嗽吐血宜保元湯加
炒黑乾薑五味子宜重用服此湯數十劑若兩足
證治大還
醫學近編 虛損 七 貞白堂
痿軟不能行動此脾腎俱憊也死不治慎勿再藥
以取殺人之誚若服二三十劑忽然泄瀉一二大
此將愈之兆也乃脾氣醒而濕熱運動也或六脉
平和諸症悉滅忽然咳嗽甚者此將愈之兆乃肺
氣復而濕痰流行也凡虛損脉弱則無火細則
無水細數則氣血兩虛細數宜加肉桂大熱宜用
附子右尺洪而有力非黃柏知母不能使火下
達左尺洪而有力非熟地佐以肉桂則火不歸
源凡虛損右手脉數止保元湯左手脉數宜茯

苓補心湯兩手俱數宜十全大補湯加遠志棗仁
五味子

虛損忌補劑者恐益傷脾胃轉增泄瀉所以虛損忌
潤劑勞症忌香燥藥者恐益損真陰而愈生煩躁
也所以虛損用勞病藥必泄瀉而死勞病用虛損
藥必躁熱而亡也虛損脉數為胃氣不足若轉
緩弱是胃氣生發之兆短數則無胃氣

四君子湯 補元氣養肺氣調和衛氣榮養脾胃之
聖藥也

證治大還
醫學近編 虛損 八 貞白堂
卷之十

人參 白朮 白茯苓 炙甘草

四物湯 治肝脾腎血虛發熱日晡熱甚補血之聖
藥也

當歸 川芎 白芍 熟地黃

八珍湯 治氣血兩虛
即四君子
合四物湯

十全大補湯 治氣血虛寒
即八珍湯加
黃芪肉桂

八神湯 補養榮血

當歸 熟地 白芍 川芎 阿膠 黃芪

牡丹皮
分等 乾薑
炒黑 加枸杞子紅花名十神湯

人參養榮湯 治脾胃俱虛發熱惡寒四肢倦怠肌
肉消瘦食少作瀉

人參 白朮 白茯苓 黃芪蜜炙 當歸酒洗各一錢

熟地姜汁炒一錢 白芍酒炒一錢 遠志五分 五味子炒五分

陳皮錢一 桂心錢一 甘草炙一錢

滋陰降火湯 峻補精血兼瀉腎經狂妄之火

當歸 熟地 白芍 川芎 山茱萸 山藥

牡丹皮 人參童便浸炙 牛膝 枸杞子 生地

黃柏鹽酒拌炒 知母鹽酒拌炒

證治大還 醫學近編 虛損 九 貞白堂

涼心清肺散 涼心肺解勞熱調和榮衛

知母 麥門冬 生地 軟柴胡 黃芩 桔梗

竹葉 地骨皮 人參 甘草 白芍 當歸

燈心

驚甲地黃湯 治虛勞手足煩熱心下怔忡身體羸

瘦

人參 白朮 茯苓 當歸 熟地 白芍

石斛 驚甲 柴胡 秦朮 麥門冬 肉桂

甘草

續斷湯 治肝勞虛寒脇痛脹滿縮頻悶

續斷 川芎 當歸 木瓜 人參 黃芪

五加皮 酸棗仁 甘草 虎脛骨 肉桂

桑寄生

遠志飲 治心勞虛寒夢寐驚悸

茯神 人參 遠志 黃芪 酸棗仁 當歸

肉桂 甘草

白朮散 治肝勞虛寒嘔吐不食腹痛泄瀉胸滿

人參 白朮 草果 肉桂 麥芽 陳皮

證治大還 醫學近編 虛損 十 貞白堂

木香 厚朴 甘草炙 薑棗

溫肺湯 治肺勞虛寒心腹冷痛胸脇逆滿少氣背

痛虛乏

人參 黃芪 五味子 乾薑 紫苑 阿膠

木香 鍾乳香 甘草 白豆蔻

平腎丸 治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈伸不

利陰痿遺泄

磁石醋煨 肉苁蓉 鹿茸 山茱萸 巴戟

韭子 兔絲子 熟地 續斷 杜仲 牛膝

肉桂	沉香	羊腎四枚	葱椒酒煮爛搗碎入酒
糊杓九	梧子大鹽湯下七八十九		
大補丸	治氣血兩虛		
人參	白朮	黃芪乳	白茯苓乳
			當歸身酒洗
枸杞子	白藥	山茱萸	熟地
			肉苁蓉
白芍	等分	鹿角膠煉蜜爲丸	
真元丹	補脾肺元陽肝腎真陰聖藥		
紫河車	水洗淨銅絲懸挂瓶口	鹽	白茯苓
	同濟勿令泄氣	煨火炙乾	四兩切片
人乳	浸至粉	人參	二兩
紅色重	八兩止	肉苁蓉	四兩
鹿膠酒			
治大還	醫學近編	虛損	士
化爲丸	小豆大每服二十九		
還元丹			
紫河車	山茱萸	補骨脂	懷熟地
			枸杞子
山藥	巴戟	芡實	各四兩
		天門冬	麥門冬
覆盆子	楮實子	各二兩	杜仲
		兔絲子	六兩
金櫻子	半斤	蜜丸	梧子大每服三錢
六味地黃丸	治腎水不足陰虛發熱作渴小便淋瀝		
瀝氣壅痰嗽	頭目眩暈耳聾咽燥牙齒動搖腰腿痠軟盜汗便血		

熟地黃	八兩	山茱萸	山藥	各四兩	白茯苓	三兩
丹皮	三兩	澤瀉	半兩	加當歸生地五味子各益		
陰腎氣丸	加懷生地甘菊花枸杞子北五味各					
加味六味地黃丸						
八味丸	即六味地黃丸	治命門火衰不能生土				
致脾胃虛寒飲食少思大便不實下元冷慙臍腹						
冷痛夜多遺溺脚膝痿軟陰虛陽乏等症	命門火					
在兩腎中間蓋一陽生于二陰之間所以成乎坎而象天之北也						
加減八味丸	即八味丸去附子	治腎水不足虛				
加五味子一兩						
治大還	醫學近編	虛損	士	貞白堂		
火上炎口舌生瘡牙齦腫痛發熱作渴等症						
大補陰丸	峻補精血清心補腎降火滋陰					
熟地	五兩	肉苁蓉	枸杞子	山茱萸	兔絲子	
破故紙	山藥	各三兩	當歸	白芍	牛膝	龜板
天門冬	麥門冬	各二兩	黃柏	知母	各一兩	龜板
鹿角膠酒溶化和煉蜜爲丸鹽湯下						
還少丹	即滋陰大補丸					
肉苁蓉	酒洗	遠志	甘草	小茴香	巴戟	去心
白茯苓	山茱萸	枸杞子	杜仲	五味子	炙	

兩熟地二兩	牛膝	山藥	各一兩半	楮實子	五錢
石菖蒲	錢五	紅棗肉和煉蜜爲丸			
虎潛丸	治下元虛損腰膝無力顏色不華精神倦怠滑精夢遺盜汗等症				
人參	黃芪	蜜	芍藥	煙	黃柏
瑣陽	酒浸	杜仲	枸杞子	虎脰骨	龜板
炙	兔絲子	酒煮搗成餅曬乾	五味子	破故紙	鹽水洗
牛膝	酒洗各一兩	熟地黃	四兩	猪脊髓	和煉蜜爲丸
天王補心丹	寧心神清三焦定驚悸除怔忡強志				
護治大還	醫學近編	虛損	三	貞白堂	卷之十
令人不忘					
人參	丹參	玄參	茯苓	山藥	石菖蒲
酸棗仁	炒	遠志	柏子仁	天門冬	麥門冬
五味子	生地	黃連	當歸	桔梗	蜜丸彈
子大	金箔硃砂爲衣	燈心棗肉湯化下			
加減安腎丸	治真氣虛憊脚膝緩弱夜夢遺精小便滑數而清				
青鹽	鹿茸	附子	肉蓯蓉	巴戟	石斛
山茱萸	山藥	兔絲子	肉桂	茴香	茯神

破故紙	杜仲	遠志	川椒	赤石脂	韭子
葫蘆巴	等分	山藥酒糊爲丸	如梧子大每服七八		
十九					
金剛丸	治腎損骨痠不能起於床				
草薢	杜仲	肉蓯蓉	酒浸	兔絲子	酒煮等分
酒煮猪腎	搗爛爲丸	少加煉蜜			
牛膝丸	治肝腎損骨痠筋弱				
牛膝	酒浸	草薢	杜仲	蒺藜	防風
肉蓯蓉	肉桂	葫蘆巴	破故紙	製丸如前	
護治大還	醫學近編	虛損	三	貞白堂	卷之十
全鹿丸	治諸虛百損				
人參	黃芪	白朮	當歸	生地	熟地
天門冬	麥門冬	牛膝	杜仲	山藥	芡實
楮實子	瑣陽	補骨脂	山茱萸	巴戟	
石斛	秋石	甘草	白茯苓	肉蓯蓉	枸杞
子	五味子	兔絲子	覆盆子	葫蘆巴	各一斤
小茴香	青鹽	各斤	川椒	沉香	各六兩
一隻	宰死去毛洗淨	桑柴火煮爛	取精肉切細薄		
片	慢火焙乾爲末	其髓肥脂腸肚	金留原汁內熬		

膏。入前藥末。肉末。入蜜搗丸。每服百丸。鹽湯送下。

天眞丸 治亡血過多。形容枯槁。飲食不進。腸胃滑

泄。津液枯渴。久服生養氣血。暖胃駐顏。

精羊肉 四斤批開 肉苁蓉 當歸 山藥 各六兩

天門冬 半斤為細末。入羊肉內。裹黃芪 末三兩

人參 白朮 末各一兩半 元米飯搗和為丸。酒下二百

丸

何首烏丸 治虛勞不足。精血耗竭。常服固精力。利

腰膝。壯筋骨。烏鬚髮。

醫治大選

卷之十 醫學近編 虛損 五 貞白堂

何首烏 赤白各半斤。水潤。竹刀切。細用牛膝。間蒸。曝。茯苓 赤白各半斤。人乳浸。晒至

半。牛膝 四兩。同何首烏。兔絲子 酒浸三日。枸杞子 酒洗

當歸 酒洗 破故紙 炒各四兩 肉苁蓉 酒洗 山茱萸

山藥 各三兩 煉蜜丸。如彈子大。日進三九。

萬壽丹

松脂 二斤。水炙三。柏實 斤 乳苓 斤 五加皮

一斤 芡實肉 一斤 胡麻 去壳 共搗煉蜜丸。如小

豆大。時酒三四十九。忌五辛厚味。

臘臍九 此藥補精血。壯元陽。暖丹田。利腰膝。固

精氣。

當歸 熟地 生地 枸杞子 五味子 牛膝

肉苁蓉 甘草 三錢 白茯苓 天門冬 麥門冬

臘臍九 兩 沉香 木香 各一兩 蛤蚧 海馬 各一對

海牛 一個 為細末。酒糊。花如梧子大。空心鹽湯下。

六七十丸

固真丸 此藥強陽道。固精血。壯陽補腎。房中之聖

藥。

肉苁蓉 酒 鹿茸 酥 熟地 山茱萸 兔絲子

醫治大選

卷之十 醫學近編 虛損 六 貞白堂

枸杞子 蛇床子 破故紙 各三兩 蓮花蕊 巴戟

牛膝 人參 童便 沙苑蒺藜 各二兩 益智仁

沉香 肉桂 各一兩 原蚕蛾 百枚 杜狗腎 炙

芡實粉打糊和雀卵為丸。

九子丹 壯下元。強陽道。利腰膝。生子延年。

巨勝子 楮實子 覆盆子 川棟子 枸杞子

兔絲子 韭菜子 金櫻子 五味子 各四兩 俱用人

青鹽 蓮蕊 各二兩 芡實 山藥 各五兩

乳拌。晒四五次。蒸麵糊丸。如梧子大。酒下三錢。日

服三次倘火大動飲細茶一盃解之

陰陽養壽丹

紫河車一具 人參 黃芪 白朮 杜仲炒 當歸

酒洗各一兩 牛膝一兩 五錢 甘艸炙 五錢 煉蜜為丸米飲

或酒下六七十丸如木火偏勝加黃柏知母各一

兩有虛熱加生地一兩益河車入血藥則補血入

氣藥則補氣入虛熱藥則退虛熱治癰瘤健忘失

志恍惚驚怖神不守舍多言不足骨蒸傳尸補陰

血養陽氣壯筋骨久服延年益壽屢試屢效

證治大還

醫學近編 虛損 七 貞白堂

集靈方補心腎益氣血延年益壽

人參 枸杞 牛膝酒 天門冬去 麥門冬去

懷生地 懷熟地 七味各一斤河水砂鍋熬膏

加煉蜜白湯或酒調服

補心腎方久服輕身延年

頭桑葉九蒸九 黑芝九蒸九 甘菊花 去蒂

何首烏一斤 白蒺藜炒 女貞實酒 九蒸

為細末蜜丸如梧子大白湯或酒服

補虛九方

棉花子仁一斤 補骨脂四兩 白茯苓二兩 沒藥二兩

蜜丸如梧子大空心淡鹽湯下

涼血去濕補陰益氣丸

真蒼朮二斤 懷生地酒 一兩 甘菊一 人參八

車前子米 八兩 牛膝八兩 白茯苓八兩 人乳一

天門冬炙 膏和丸

治虛弱陰精不足

白茯苓粉一斤 人乳一斤 另將重便重湯頓溫取壯

盛女子月經布一二個洗入便內拌入茯苓粉晒

證治大還

醫學近編 虛損 大 貞白堂

乾將茯苓粉再磨加鹿角膠四兩酒化同煉蜜丸

如梧子大空心白湯下三錢服久痰從大便出

又方 治同前症

熟地黃半斤 蒼朮八兩 鹿角膠四兩 兔絲子半斤

黃柏四兩 砂仁三兩

養陰涼血補心滋腎丸

麥冬六兩 鱉甲六兩 五味子六兩 懷生地六兩

山茱萸四兩 丹皮一兩 白茯苓三兩 人乳一 天門

冬四兩 杜仲去皮 切片四兩 黃柏四兩 砂仁二兩

甘草一兩	懷山藥四兩	柏子仁	淨八兩酒蒸	草
前子三兩	兔絲子	淨末	枸杞子	生枯者
肉三兩	牛膝四兩	蜜九	空心白湯下五錢	遠志
治虛以頭發 桑葉去筋九蒸女貞實兔絲子鹿嚼				
草煉蜜爲丸服				
萃仙丹 此方不偏寒熱而大補精血脾胃不足者用				
立於朝綱天 下大治矣				
白蓮花露	二兩	益將放未見	川續斷	三兩
沙苑蒺藜	五兩	取綠色肥	韭子	二兩
澄治大還	卷之十	醫學近編	虛損	元白堂
甘枸杞子	四兩	乳	芡實	四兩
蓮子	三兩	去	覆盆子	三兩
白茯苓	二兩	乳	龍骨	五錢
補骨脂	三兩	核	桃肉	黃魚膠
共爲細末煉蜜爲丸每服四五錢空心秋石湯下				
淡鹽湯亦可如元氣大虧精血虛損加人參四兩				
紫河車二具 如法 如元陽不足陽痿者加大鹿茸				
一對鹿膠酒化爲丸如因精神不足要種子者加				
鹿腎熬膏八兩酒化入蜜				

勞瘵 二十二

平人脉大爲勞虛極爲勞浮大爲裡虛乳動後緊男
子失精女子夢交虛數小瀉肉脫不受補者死勞
極之脉多弦

勞瘵由陰虛之極火寡於畏故附注於骨以蒸燥也
症雖屬火治則惟宜滋陰養血由火起於陰不足
蒸生於火有餘也慎不可過用寒涼之劑一至泄
瀉則氣血脾胃俱虛不可治矣宜大補陰九
爲主間服清骨散 蒸肺則毛折髮焦肌膚甲
枯治大還 卷之十 醫學近編 勞瘵 三 元白堂

錯咳嗽聲嘶吐痰咯血宜清金湯保和湯 蒸
心則口舌生瘡心神驚悸頰赤煩悶宜清心蓮子
飲 石蓮茯苓麥冬麥冬導赤散 生地木
麥二門冬 蒸肝則爪甲焦枯脇痛妨悶躁怒服
昏宜加味逍遙散 歸芍苓朮 六味地黃丸 虛損
蒸脾則肌肉消瘦食減唇燥泄秘無常宜人參養
榮湯四君子湯 俱虛 蒸腎則耳輪焦枯盜汗遺
瀝宜滋陰大補丸益陰腎氣丸 俱虛 蒸久則傷
氣氣傷則不能運化水穀停滯而生濕熱生虫生

積之所由也。其間有傳尸者。此虫因一氣相感而傳注耳。凡勞嗽日久。即當反其兩唇視之。上唇有白點虫蝕上部下唇有白點虫蝕下部急用殺虫之藥遲則侵蝕五臟。治療更難矣。或燒安息香吸烟入咽咳嗽者乃傳尸也不咳嗽者非也。

虛勞發熱

薛立齋云。虛勞發熱由足三陰虧損。虛熱無火之症。故晝發夜止。夜發晝止。不時而作也。宜用六味地黃丸為主。而以補中益氣湯調理脾胃。因脾胃先

證治大還

醫學近編

虛勞

主

貞白堂

損者。而以補中益氣湯為主。以六味地黃丸溫存肝腎。若誤用黃柏知母之類。復傷脾氣。則元氣下陷。飲食減少。腹痞作瀉。不可療矣。左尺脉虛弱。或細數是腎經之真陰不足也。用六味丸。右尺脉遲軟或沉細是命門真火之不足也。用八味丸。兩尺脉微弱是陰陽俱不足也。用大補丸。此皆滋其化源也。若酉戌時分脉洪盛。寅卯時脉細弱者。是陽氣虛弱。下陷於陰火中也。用瓊玉膏地生以助陽使復其位。微加瀉陰火之藥。若服

寒涼之劑。若酒酒惡寒。或志意不樂。或脉弦數。五心煩熱。是重陰覆其陽。火不得伸也。火鬱湯芩葛升防柴。若腎虛火不歸經。遊行於外。發熱煩渴。面目俱赤。舌生芒刺。兩唇黑裂。喉間如烟。火上升。兩足如烙。痰涎壅盛。脉洪大而虛。無倫次。按之微弱者。此腎虛火也。宜十全大補湯加熟附或八味丸。

虛勞失血

證治大還

醫學近編

虛勞

主

貞白堂

凡虛勞見血。因陰虛火暴盛者。宜四物湯加丹皮生地山梔。衄血咳血。加黃芩麥門冬。嗽血痰血。加瓜蒌仁。阿膠紫苑。嘔血吐血。加犀角黃連京墨童便。咯血唾血。加玄參羚羊角白芨。此皆為形病不太虛者設也。若陽氣虛。或脾肺氣弱。形病俱虛。不能攝血歸經者。皆當求其屬以主之。肺氣虛熱不能攝血而衄者。四君子加芎歸芍藥五味子。胃氣弱而嗽吐血者。四君子加芎歸升麻。胃經有熱而嗽吐血者。犀角地黃湯犀角生地赤芍。

鬱結傷脾而嗽吐血者歸脾湯參芪朮歸仁木香草圓眼肉黃連

遠加山梔腎經虛熱陰火內動而咯唾血六味

九加炒黃柏怒動肝火而見血者加味逍遙散

歸芍苓朮柴丹梔加犀角羚羊角大凡非外因所致皆當

調補脾肺滋其化源使各有司攝也

周慎齋云吐血久而不愈者腎虛不能納氣也雜病

久而不愈者脾虛不能統血也斯意乃從立齋悟

出耳

虛勞咳嗽

證治大還醫學近編 虛勞 卷之十 頁白堂

勞嗽因陰虛火動傷肺者宜清金養血湯門加知母

瓜蒌仁紫苑若脾胃氣虛不能攝涎歸源致生

痰嗽者六君子加桔梗麥門冬五味子脾虛不

能生肺而咳嗽者四君子加麥冬五味子阿膠

因腎虛火盛水涸津液壅而為痰致生咳嗽者六

味地加知母瓜蒌仁虛勞久嗽肺燥成痿者保

和湯木虛火上炎傷肺不得左臥左臥即嗽甚

宜收斂保肺順氣宜訶子瓜蒌杏仁天麥二冬知

母生地橘紅紫苑百部大抵因虛勞而嗽則非

嗽為本也治當滋其化源不必拘拘於止嗽之藥

已上方俱肺虛久咳用參朮二兩鹿角膠炙研

一兩薄荷湯點服

虛勞潮熱

潮熱於寅卯時者肝經燥熱也六味九加芍歸生地

軟柴胡補腎以生肝潮熱於巳午時者心經虛

熱也六味九加生地麥門冬壯水之主以鎮陽光

潮熱於申酉時者肺經虛熱也人參養榮湯加

麥門冬地骨皮培土以生金潮熱於亥子時者

證治大還醫學近編 虛勞 卷之十 頁白堂

腎涸虛熱也六味九加玄參兼手足冷者腎虛也

十全大補湯凡潮熱俱屬陰血不足理當滋其

化源不可純用骨蒸之劑更傷元氣胃氣已上方

陳三農云虛損潮熱先用升陽散火湯羌獨葛升防

白後用大補若日日潮熱寒熱間作宜補中益氣

湯參芪朮重芪艸此甘溫除大熱之義若脉細

數或大為難治凡見潮熱氣血兩虛用補中益

氣湯而熱難退甘草生熟重用之發散風熱之藥

毫不可用

虛勞盜汗

陽盛陰虛而盜汗者六黃湯生熟地 麥連柏 芪陰虛心火

妄動而盜汗者當歸湯歸芪 生熟地 連麥 冬五味 芍 艸 浮 麥加酸棗

仁熟地 腎氣虛弱盜汗發熱者六味丸加酸棗

仁五味子 腎氣虛乏盜汗惡寒者加減八味丸

虛勞泄瀉

勞瘵屬陰虛之極故大便乾燥者多若見泄瀉非苦

寒之藥傷其脾肺元氣即脾腎俱憊不能閉藏也

證治大選

醫學近編 虛勞 圭 貞白堂

脾腎氣虛者五味子丸人參 五味 米 故紙 吳 芡 巴 戟 肉 豆 蔻 龍 骨 山 藥 白 朮

壯陽若寒傷胃者胃受散明禁用補血骨蒸之劑

虛勞遺精白濁

夢遺精滑因肝腎虛熱六味丸 心虛不能攝腎者

遠志丸遠志 茯苓 神 茯 苓 人參 菖蒲 龍 齒腎虛不能閉藏者固本

鎖精丸山藥 枸杞 五味 山 藥 瑤 陽 參 米 熟 地 肉 苁 蓉 芡 實 絲 海 蛤 粉 石 蓮 芡 實白濁

因心腎虛者茯苓丸肉 山 藥 白 朮 蓮 芡 實肺腎虛熱者

黃芩清肺飲知母 麥冬 生地 柴 芩 枯 地 骨 竹 葉 參 艸 芍 歸 燈 心送六味丸

脾肺虛熱者補中益氣湯參 芪 朮 升 歸 柴 升送六味丸

肝腎虛熱者加味道遙散歸 芍 芩 朮 柴 丹 桅 艸 送 六 味 地 黃

九 按虛勞遺精白濁屬心腎虛熱者多因心虛

不能攝腎腎虛不能閉藏者白濁則又屬肝脾二

經者多矣脾主分利肝主疎泄故也

蒸病証治

毛折髮焦肌膚甲錯其蒸在皮用石膏桑白皮 外

熱內寒身振肉瞤其蒸在肉用芍藥 髮焦鼻衄

或復尿血其蒸在血用生地丹皮 身熱煩躁痛

如針刺其蒸在脉用當歸生地重便 爪甲焦枯

證治大選

醫學近編 虛勞 圭 貞白堂

眼昏腸痛其蒸在髓用天門冬生地當歸 頭眩

熱悶涎濁眵淚其蒸在腦用生地防風 男子失

精女子白淫其蒸在玉房用知柏歸芍 乍寒乍

熱中脫煩悶其蒸在三焦用石膏竹葉 小便赤

黃凝濁如膏用澤瀉滑石 大便秘結腹中雷鳴

其蒸在小腸用木通生地赤茯苓 大腹隱痛口

舌乾痛其蒸在大腸用大黃芒硝 口鼻乾燥腹

脹自汗睡臥不安其蒸在胃用石膏梗米硝黃葛

根 口苦耳聾兩脇下痛其蒸在胆用柴胡瓜蒌

裡急後重。肛門焦痛。秘塞。其蒸在廣腸。用枳殼。芩。小腹絞痛。筋脉縱緩。陰器自強。其蒸在宗筋。用黃柏生地。眩暈淚下。躁怒無常。其蒸在肝。用川芎當歸柴胡。舌黑氣短。煩悶洒淅。其蒸在心。用黃連生地當歸。唇乾口瘡。胸腹脹悶。畏寒不食。其蒸在脾。用芍藥木瓜苦參。咳嗽喘悶。咯痰吐血。聲嘶音啞。其蒸在肺。用天麥二冬。桔梗紫苑。烏梅。耳輪焦枯。脚氣酸痛。其蒸在腎。用生地石膏。知母寒水石。藥本。情想不寧。精物時下。其蒸在右腎。用黃柏。心膈噎塞。攻擊疼痛。俛仰煩冤。其蒸在膈。用山梔連翹。睡臥不寧。骨酥躁擾。其蒸在骨。用鱉甲地骨皮生地當歸丹皮。

證治大還

醫學近編 虛勞 毛 貞白堂 卷之十

不治證

大肉盡脫。骨痛痿軟。聲啞咽瘡。脉稿面黎。身汗而嗽。肌皮甲錯。泄瀉不止。脉虛數小。瀉不受補者。皆不治。

加減保和湯 治勞嗽肺燥。皮膚甲錯。

知母 貝母 欬冬花 紫苑 當歸 阿膠

天門冬 麥門冬 五味子 百合 百部 紫蘇 薄荷 瓜蒌仁 馬兜鈴 加減保真湯 治勞嗽體虛骨蒸。

人參 白朮 茯苓 熟地 當歸 山茱萸 芍藥 牡丹皮 地骨皮 鱉甲 柴胡 山藥 麥門冬 阿膠 瓜蒌仁 甘州 知母

清金養血湯 治陰血不足骨蒸勞熱咳嗽。

當歸 川芎 芍藥 生地 白朮 五味子 麥門冬 地骨皮 丹皮 知母 柴胡 薄荷

證治大還

醫學近編 虛勞 夫 貞白堂 卷之十

甘草 骨蒸加青蒿秦艽 咳嗽加紫苑瓜蒌仁 勞症惟在肝經者。用銀柴胡。若氣虛者。不過用些小助參芪。非用柴胡退熱也。

清骨散 專退骨蒸勞熱。

銀柴胡 胡黃連 鱉甲 秦艽 青蒿 白芍

地骨皮 牡丹皮 五味子 生地 知母

當歸 甘草 咳嗽加阿膠麥門冬。

秦艽扶羸湯 治肺痿骨蒸勞瘵咳嗽寒熱聲啞體

虛自汗四肢倦怠。

柴胡	秦艽	鱉甲	地骨皮	紫苑	人參
當歸	甘草	烏梅	熱甚加青蒿	汗多加黃	
補肺湯	治勞嗽肺熱盜汗自汗				
人參	黃芪	麥門冬	五味子	紫苑	熟地
桑皮	炒	蜂蜜			
胃愛散	治虛勞泄瀉及苦寒藥傷胃者				
人參	白朮	炒	肉果	炒	芍藥
慈苳仁	連肉	烏梅	破故紙	炮薑	
大阿膠丸	治勞咳嗽血唾血				
證治大還	醫學近編	虛勞	乾	貞白堂	
卷柏	阿膠	山藥	人參	茯苓	百部
麥門冬	五味子	柏子仁	生地	薄荷	
防風	遠志	大薊	蜜丸	彈子大	每服一九
鬼哭丹	專取尸虫				
貫衆	二錢	鱉甲	虎牙	俱醋	青蒿
桃仁	阿膠	白蠟	木香	各一錢	甘遂
鼓心	安息香	辰砂	各一錢	獾肝	具蜈蚣
麝香	三分	天靈蓋	錢半	用青蒿	一握
枝慈白	藍葉	各七莖	薑五片	童便	五碗煎至碗半

入煎藥末調勻密封再沸入麝香分三服四更時	服	虫下後以人參茯苓遠志犀角生地麥門冬	龍骨甘草防風煎服	王宇泰治勞損方	慈苳仁	百合	天門冬	麥門冬	桑白皮
地骨皮	枇杷葉	丹皮	五味子	酸聚仁	生地汁	藕汁	人乳	童便	有痰加貝母
有血加阿膠	熱盛倍地骨皮	食少倍慈苳仁	嗽倍桑皮枇杷葉	證治大還	醫學近編	虛勞	辛	貞白堂	
單方治勞用六月雪煎湯做酒醱服神驗神驗	青蒿丸	治骨蒸勞熱	青蒿搗汁熬膏入甘草末為丸白湯送下三四十	丸	桑椹丸	治虛損潮熱	桑椹子取汁入蒼朮共熬去蒼朮熬成膏腎虛入	枸杞四兩肺虛入人參二兩為丸服	

怔忡 二十三

寸口脉大而虛動而滑為怔忡。

怔忡者本無所驚心常自怯忽跳動而不寧是也。

有因心血不足心火妄動者有因心氣不足怔忡。

自汗者有膈上血中伏火火氣薰蒸心神煩亂跳。

動不寧者有火上炎為痰所鬱火動其痰者但有。

慮便動或變人時覺心跳者是血少宜養血安神。

飲本或四物湯加玄參生地黃連硃砂以鎮陰火。

之浮行時作時止或肥人偶爾心跳者是痰因火。

證治大選

醫學近編

怔忡

圭

貞白堂

動宜導痰湯。

半南橘紅枳實赤茯苓生薑

加黃連瓜蒌枳實或

小陷胸湯。

連半瓜蒌枳實

心氣不足者香參丸。本痰飲留於

於中脘怔忡者蠲飲枳朮丸。

枳朮半橘紅牽牛

痰飲留於

心包怔忡者砂礞丸。

本

水停心下怔忡者小半夏

茯苓湯。

半夏五錢茯苓三錢

陳三農云有陰火上冲怔忡不已甚則火炎於上或

頭眩眼花或言齒落頭脫或眼見異物或腹中作

聲皆陰火為患也宜滋陰抑火湯。本心不寧者加

養心之劑日久服降火藥不效加附子從治或人

參其有失志之人所求不遂或過悞自咎悞悞嘆

嘆不已遂成獨語書空若有所失宜溫胆湯。半

蘇陳去竹茹加人參柏子仁。

甲牒附

早者心常自羞愧悞者心常自迫怯或瘧寒不飲食

愛處暗地或停門後見人則驚避如失志狀此心

血不足而神氣虛怯故也宜人參養榮湯。參朮

桂芍熟地五味加補心安神之劑如柏子仁茯苓

之類或辰砂妙香散。參芪茯苓神效山精神太

證治大選

醫學近編

怔忡

圭

貞白堂

當歸熟地黃。

醫按

滑伯仁治一人胸腹脹痛心下怔忡嘔吐煩悶不食

情思惘惘不安目眈眈六脉結澁不調此因機深

憂思太過積痰涎鬱於膈上也以祛順丸服之而

安。

養血安神飲 治心血不足怔忡驚悸併榮衛俱虛

而成甲牒者。

人參 黃芪 當歸 芍藥 生地 菖蒲

茯神 酸棗仁 柏子仁 遠志 黃連 山藥
紫石英 甘草

滋陰抑火湯

當歸 白芍 熟地 川芎 黃連 生地

知母 肉桂 黃柏 鹽酒拌 炒黑色 甘艸 身如飛揚

心跳不寧者。加人參紫石英水煎。入童便服。

茯苓飲子 治痰飲蓄於心胃。怔忡不已。

半夏 赤茯苓 麥門冬 茯神 橘皮 檳榔

沉香 甘艸 生薑

證治大還

醫學近編 虛勞 壹 貞白堂

安神丸 治心虛怔忡驚悸

當歸 兩一 生地 錢五 黃連 錢五 甘艸 錢二 蒸餅爲

丸。硃砂爲衣。燈心湯下。加酸棗仁。胆星。天竹黃。

菖蒲各五錢。地黃再加五錢。治心胆虛驚悸不寐。

甚妙。

香參丸 治心氣不足。怔忡自汗。

人參 乳香 當歸 山藥 煮粥爲丸。棗湯送

下。

寧神定志丸

當歸 白芍 茯神 橘紅 貝母 麥門冬
川芎 酸棗仁 遠志 黃連 生地 人參
甘草 蜜丸。硃砂爲衣。

砂礬丸 治痰飲留於心包。怔忡不已。

硃砂 錢三 明礬 錢五 菖蒲 錢二 蜜丸。燈心湯下。

證治大還

醫學近編 怔忡 壹 貞白堂

安神丸 治心虛怔忡驚悸

當歸 兩一 生地 錢五 黃連 錢五 甘艸 錢二 蒸餅爲

丸。硃砂爲衣。燈心湯下。加酸棗仁。胆星。天竹黃。

菖蒲各五錢。地黃再加五錢。治心胆虛驚悸不寐。

甚妙。

香參丸 治心氣不足。怔忡自汗。

人參 乳香 當歸 山藥 煮粥爲丸。棗湯送

下。

寧神定志丸

雲間陳 治三農甫述 男

栳璣先 校
師柴羔愚

毘陵鄒言正仲衡甫泰

門人 范 崧壽民 閱
王 顯贊皇

痰火

痰火脉多有洪滑有力洪緩而滑者易治細數而澀者難治汗出如油喘急不休者不治

痰火為病發熱咳嗽喘急吐痰甚則喘嗽汗出不得

證治大還

醫學近編 痰火 卷之十一

頁白堂

安臥六七日方愈愈後隨感復發者是也此症多起於厚味酒濕者多肥人因多痰滯氣瘦人因多火生痰然二症恒相因者以有痰則阻礙氣道拂逆而生火有火則薰蒸津液膠固以成痰要之火則痰之本痰則火之標也未發時以清熱滋陰為主已發時以利氣豁痰為要然亦當根其致病之由以施治如嗽而痰難出者此肺燥勝而火熾也用芩連梔子石膏以清火地骨皮麥門冬瓜蒌仁杏仁以潤肺嗽而痰易出者此脾濕勝而痰多也

用星半二末蛤粉以燥脾芩連梔子石膏以清熱

因風寒鬱熱者用蘇葛防風前胡以解表邪芩梔

枳殼以清內熱因陰虛火動其痰至陰分嗽甚者

用知柏山萸生地五味白芍以滋陰補紅桑皮地

骨皮麥門冬瓜蒌以保肺因食積厚味者用清胃

散以清胃加牙茶皂莢山查荀子石碱以洗垢因

痛飲助其濕熱者解醒湯加滑石因內蘊痰熱膜

理疎豁易於感冒者清氣豁痰湯加酒炒大黃

清氣豁痰湯 秘方

證治大還

醫學近編 痰火 卷之十一

頁白堂

黃芩 黃連 金鹽 汁炒 南星 半夏 金鹽 礬製 橘紅

枳殼 金鹽 水 玄明粉 桑皮 地骨皮 瓜蒌仁

芽茶 蘇子 前胡 茯苓 甘艸

清痰降火湯

陳皮 半夏 茯苓 杏仁 白芥子 麥門冬

白芍藥 當歸 知母 玄參 瓜蒌仁 枳實

黃芩 桔梗 甘艸

蚊蛤散 治痰火喘嗽

五倍 附圖者 木香 一分 每二分用酒洗皂莢針

汁調成塊送下吐痰

流金丸 治一切痰火痰厥中風癱瘓小兒急驚

大黃 酒蒸六兩 石膏 貝母 各四兩 礞石 二兩

膽星 二兩 陳皮 香附 重便浸各三兩 枳殼 牙皂

白礬 各二兩 木香 五錢 煉蜜為丸硃砂為衣

香圓膏 秘方 治痰火喘急不得坐臥

香圓 陳者一枚去穢水煎數沸入貝母五錢再煎加蜜煉成膏服之

久嗽痰火方

瓜蒌 二枚搗爛河井水各二碗入竹瀝二盞蜜四兩再熬服

證治大選

醫學近編 痰火 三 貞白堂

治痰火

殭蚕 條直者二兩 蛤粉 煨一兩 文蛤 大者一兩 瓜蒌 一兩

青黛 五錢 苦茶下三錢

治久嗽痰火 用核桃三斤取肉搗如泥置汁梨汁

細茶末各四兩白果一斤水黃去皮殼加烏梅半

斤砂礮內煮二三沸去烏梅共前藥再搗入蜜服

又治痰火

用殭蚕條直者焙為末生薑汁法為丸每服三錢

臨臥白滾湯下兼治哮喘

咳嗽

浮為風緊為寒數為熱細為濕浮緊則虛寒沈數則

實熱弦數則血少洪滑則多痰滑數則房勞脾脉

微為咳肺脉微急為咳而吐血右關濡傷脾左關

弦短傷肝浮短傷肺尺浮濇而數傷腎浮直而濡

者易治喘而氣上逆者難治久嗽脉弱者生大數

實者死

咳嗽皆有聲但咳則有聲無痰咳則有聲有痰潔古

云咳謂肺氣傷而不清嗽謂脾濕動而生痰咳嗽

證治大選

醫學近編 咳嗽 四 貞白堂

謂內傷肺氣而動脾濕或因脾濕而滯肺氣也咳

而無痰或痰不易出者此肺燥勝也宜以辛甘之

劑潤其肺用枳殼蘇子杏仁瓜蒌之屬嗽而多痰

或痰易出者此脾濕勝也宜以辛苦之劑燥其脾

用半夏南星皂莢白朮之屬是知脾無雷濕雖傷

肺氣不為痰也然風寒暑濕七情飢飽勞鬱陰虛

痰火五臟六腑悉能令人咳嗽治者必審新久虛

實內外諸邪虛則補之鬱則開之風寒則解散之

濕熱則清滲之久嗽虛弱滋之潤之斂之降之因

病致宜慎勿驟用補瀝之藥變生他症也

傷風嗽者鼻塞聲重涕唾稠粘發熱惡風自汗口

乾煩躁桂枝湯桂芍加防風杏仁前胡感寒咳

者發熱無汗惡寒煩躁不眠二陳湯加麻黃杏仁

枳桔桑皮風寒鬱熱於肺咳嗽者三拗湯本加

知母風入肺者久嗽鵝管石雄黃鬱金欬花為末

和艾以生薑一片置舌上用藥艾於薑上灸取烟

入咽中傷暑而嗽者自汗煩渴香薷飲如朴茯

加麥門冬知母五味子傷濕而嗽者身體倦怠

證治大選

醫學近編

卷之十

五

貞白堂

骨節煩疼自汗痰滑二陳湯加蒼白朮防風澤瀉

桑皮熱乘肺者口乾煩熱面赤胸滿喘急多痰

降火清金湯本或小陷胸湯連半瓜火乘肺者

咽喉乾痛鼻出熱氣咳喘上壅甚則聲嘶咯血其

痰嗽而難出黃色且濃清肺化痰湯本加黃連因

寒鬱者發散之勞嗽者盜汗煩赤午後身熱肌

膚索澤食不為肌此因陰虛火動傷肺蓋陰虛致

嗽則非嗽為本宜滋陰保肺滋陰則火自降火降

則痰自下肺氣自清用四物湯芍歸芍加橘紅瓜

麥仁知母地骨皮貝母麥門冬五味子紫菀人參

或以四物湯加橘紅瓜麥黃柏順而下之肺氣

虛甚咳嗽者人參膏以生薑陳皮佐之有痰加痰

藥此好色腎虛者多有之蓋腎虛則水失所養不

能制火火竄於畏而侮所勝肺金受傷所謂子能

令母虛也六味丸加知柏脾土衰不能生肺金四

君子加阿膠痰嗽者嗽動有痰聲痰出則嗽止

因痰滯氣氣不得升降故也導痰本加前胡蘇子

或順下丸痰証若因咳而有痰者咳為重治主在

證治大選

醫學近編

卷之十一

六

貞白堂

肺若因痰而生咳者痰為重治主在脾若外寒鬱

熱生痰作咳又宜解其表邪邪解則熱自除痰自

降矣肺鬱痰嗽睡臥不寧者用貝母杏仁砂糖

薑汁為丸喻化食積嗽者面色青黃不定面上

常如蠟爪路一黃一白二陳湯加荀子山查枳實

薤葉青黛石碱飲酒傷肺咳嗽者用瓜蒌仁葛

根杏仁滑石黃連神麴凡食停痰涎滯氣咳嗽

者止宜消其積治其痰而咳自愈不必拘拘於止

嗽之藥肺脹者咳而上氣煩躁脉浮大者越婢

湯石羔白朮附加半夏煩躁而喘脉弦者有水氣

小青龍乾薑細辛麻黃肉桂芍藥五味子加石膏甚則壅滿左右

不得眠因火極傷肺遂成鬱遏脹滿宜收斂用訶

子青黛杏仁為主佐以海粉瓜蒌仁香附山梔半

夏神麴薑蜜調喻化若痰挾瘀血碍氣左右難

眠者宜逐瘀順氣斂肺消痰用瓜蒌仁桃仁當歸

尾沒藥香附薑黃枳殼訶子五倍非汁竹瀝乾

咳嗽係火鬱之甚乃痰鬱火邪在肺也宜開痰降

火用白芥子竹瀝薑汁蛤粉青黛山梔貝母桔梗

證治大還 醫學近編 卷之十一 七 貞白堂

瓜蒌天門冬麥門冬連翹蜜丸喻化後用補陰降

火藥不已多成勞瘵此不得志者多有之方約之

云氣鬱火炎久嗽無痰當以清熱潤燥為主用天

門冬麥門冬知母貝母瓜蒌仁之類人參半夏皆

在所禁也嗽而脇痛宜疎肝氣導痰湯痰証倍

青皮白芥子香附暴嗽聲啞屬寒包熱宜細辛

半夏生薑辛以散之痰盛熱壅於肺金實無聲者

清咽寧肺湯本門久嗽聲啞屬肺氣虛人參阿膠為

主或四君子加阿膠嗽而失聲潤肺散本門清音

九若進冷劑聲愈不出宜以生薑汁調消風散別

蟬脫參參少少進之或一味薑汁緩緩咽下嗽

而聲嘶乃血虛受熱肺金衰也四物加天麥二冬

地骨皮知母片苓阿膠青黛蛤粉嗽而寒熱往

來小柴胡柴胡參加知母乾薑咳嗽遇冬則發

此寒包熱也解表熱自除華蓋散本門感冷則嗽

此膈上有熱痰二陳加桔枳黃芩麻黃蒼朮木通

生薑肺虛感受風寒又兼使內過度用人參為

君麻黃連根節為臣煎服脾虛受寒咳嗽三拗

證治大還 醫學近編 卷之十一 八 貞白堂

湯本門加入參蘇葉桑皮半夏陳皮久嗽脉澀此

積痰在肺枯滯如膠碍氣升降故也用瓜蒌青黛

香附海粉僵蚕杏仁蜂房竹瀝薑汁貝母蜜丸喻

化脉澀而大者肺熱也紫杏仁本門脉大而無力者

肺氣虛也人參清肺湯本門咳嗽煩滿是腎氣之

逆也補陰平胃散本門咳嗽吐臭痰是胃中濕熱

壅滯也清中喻化丸本門

東垣云心脾肺感受寒邪喘咳氣逆煩心胸滿夜則

涕出多嚏鼻塞不通此肺金火實以子能助母也

心下怔忡，嘔多唾，口出清水，脇肋脹痛，不食，此寒水傷土，致於畏也。名曰寒中。當於肺中瀉腎水，非大辛熱之藥不能退。宜半夏溫肺湯。本門

仲景云：咳家，脈弦，為有水，飲也。宜十棗湯，咳而時發熱，脈卒不來者，非虛也。此為胸中有寒痰也，須吐之。

證治大還

醫學近編 卷之十一

九

貞白堂

若數行解散，重亡津液，邪蘊而為肺癰，肺痿矣。故凡肺受邪，不能輸化，小便短少，皮膚漸腫，咳嗽日增者，宜六君子湯。參朮半茯苓陳以補脾肺。六味丸。熟地山萸以滋腎水。若冬月外感風寒，形氣病氣俱虛者，宜補其元氣，而佐以解散。若專於解表，則肺益虛，腠理益疎，外邪乘虛，益易客矣。若夏月喘嗽，面赤潮熱，其脈洪大，黃連解毒湯。芩連柏梔躁熱而咳，梔子仁湯。梔子升白芍皮寒水咳嗽有血，麥門冬湯送六味丸，壯水之主，以鎮陽光，而保肺金也。

嗽分時令及虛實證治

丹溪云：咳嗽須分虛實。久嗽肺虛，宜五味子、款冬花、紫苑、馬兜鈴之類，補之。肺實有邪，宜黃芩、桑白皮、杏仁、天花粉之類，瀉之。上半年日嗽多者，此胃中有火，用知母、石膏、黃連。午後嗽多者，此屬陰虛，四物湯加黃柏、知母、五味子。早晨嗽多者，胃中有食積，或邪或痰滯，肺氣不利，宜山楂、薤白、海石、橘紅、枳殼、黃芩、嗽多者，火氣浮於肺，不可純用寒藥，宜五味子、五倍子、斂而降之。風寒鬱熱於肺，遇夜嗽甚。

證治大還

醫學近編 卷之十一

十

貞白堂

者，三拗湯。本門加知母、貝母。按薛立齋云：竹前嗽，屬胃火盛，竹葉石膏湯。葉膏麥冬半屬胃氣虛，六君子湯。加麥門冬。山梔子。午後嗽屬陰虛，四物湯。歸芍地加知柏、腎水虛，六味地黃丸。黃昏嗽，四物湯。歸芍地加五味子。麥門冬。五更嗽，六君子湯。嗽而不得眠，及兩脇下痛，六味地黃丸。嗽而鼻鼾聲重，風邪傷肺也。參蘇飲。傷風門嗽而寒熱交作，肝氣不和也。四君子湯。參朮半加知母、柴胡、桔梗，咳嗽氣短，則氣虛也。人參補肺湯。本門體倦食少，脾氣虛也。參朮補

脾湯參朮茯苓冬五味升麻枯歸口燥咽乾腎虛火炎也六味

地黃丸熟地山萸山黃丹茯苓澤面赤喘嗽火尅金也人參平

肺散本因氣虛六淫所侵當祛外邪而固中氣固

心火太過當伐肝木而滋肺金因腎水虛火上炎

常補肺腎以滋化因肺金氣虛當補脾土以生肺

氣蓋金生已上嗽久不愈者多因脾土虛不能生

肺金致痰埋不密外邪易入或因肺氣虛不能生

水以致虛火炎上傷肺也治當壯土生金滋腎水

為善按以上論治的係虛弱及久嗽者為宜然

證治大還醫學近編卷之十一 貞白堂

暴嗽及氣實者遠用補養不惟外邪不散抑且肺

熱還傷肺炎矣

久嗽作虛治秋冬身熱身涼咳嗽喘急乾嘔胸膈脹

悶宜小青龍湯加細辛乾薑桂白芍穀半五味子

甘艸薑無汗加麻黃杏仁

勞熱咳嗽痰中有血用欬花一兩百合二兩蜜煉丸

彈子大喻化

熱嗽用知母貝母各一兩巴豆七粒同炒去豆二味

研末薑湯下二錢

虛嗽百花木蜜丸彈子大臨臥嚼碎薑湯送下

老年咳嗽用杏仁去皮尖五錢胡桃肉二兩去皮共

搗如泥蜜三兩炙去沫和前搗勻入薑汁半盞為

丸喻化老人久嗽紫苑欬花百部烏梅少許炙

膏入薑汁調服

咳嗽痰來壅盛六君子加生薑腹痛加乾薑身脹痛

加肉桂

先咳嗽而後痢此肺氣虛陽氣下陷也先咳嗽而

後瘧此金氣衰不能平肝木也兼瘧用溫肺湯加

證治大還醫學近編卷之十一 貞白堂

柴胡以引入肝經素有痰火咳嗽而瘧作者宜

溫肺為主素有脾虛泄瀉而雜症見者宜理脾

為主先生臟毒後轉咳嗽此腑病傳臟久患痰

火咳嗽而生臟毒此火來尅金多痰

嗽分臟腑虛實證治

仲景云嗽而兩脇痛不能轉側兩胛下滿脇肋稍也

脇經中有邪故傷為肝咳小柴胡湯咳而嘔苦水

為膽欬黃芩半夏生薑湯咳而喉中如梗狀甚則

咽腫喉閉為心咳心氣虛為小 栝梗湯咳而失氣

心氣虛為小

證治大還

醫學近編卷之十一

三

貞白堂

其方對症用之奏功甚捷方見玉機微義

千金云欲語因咳言不得竟為風咳飲冷食寒因之而咳為寒咳心下堅滿咳則支痛其脉反遲為肺咳咳則引脇下痛為肺咳咳而唾血引手少陰為心咳咳而涎出續續不止引小腹為脾咳咳引頸項而唾涎沫為肺咳咳則耳無所聞引腰并臍中為腎咳咳而引頭痛口苦為膽咳咳而引舌本為厥陰咳

陳無擇云咳而發寒熱引腰背痛或喘滿尺脉浮膈

腸咳芍藥甘艸湯咳而右肋脇痛引肩背甚則不可以動動則轉劇脾主濕濕動則氣欲行而為濕痰所碍故動則轉劇也為

脾咳升麻湯咳而嘔嘔其則長舌出為胃咳烏梅

丸咳而喘息有音甚則為唾血為肺咳麻黃湯咳

而失屎為大腸咳赤石脂禹餘糧湯咳則腰背相

引而痛甚則咳涎為腎咳腎主五液故也麻黃附子細辛

湯咳而遺溺為膀胱咳茯苓桂枝生薑甘艸湯久

嗽不已三焦受之其狀腹滿不食涕唾面目浮腫

氣逆喘息異攻散參朮茯苓陳木藁姜按此乃外感致嗽

證治大還

而欬此房勞傷腎也咳而中滿腹脹搶心痛不欲

食此飢飽傷脾也咳而左脇偏痛小腹并膝腕痛

左關脉弦短此疲極傷肝也唾吐白涎口燥聲嘶

右寸浮短此呼傷肺也咳而煩熱自汗咽乾咯

血此勞神傷心也按此乃內傷致咳惟當補養

為主房勞傷腎者六味丸加知母五味子杜仲飢

飽傷脾者人參補脾湯疲極傷肝者四物湯加柴

胡人參山茱萸知母呼傷肺者人參補肺湯本

勞極傷心者柏子養榮湯參生熟地歸山藥蓮心柏子仁棗仁茯苓麥冬

證治大還

醫學近編卷之十一

西

貞白堂

五味甘

肺癆證治

金匱要畧云咳嗽聲啞口中有濁涎涎沫寸口脉數

而虛瀉者肺癆症也或因多汗或因嘔吐或從消

渴小便利數或從便難快藥下之重亡津液致熱

在上焦咳嗽為肺癆也玉機云肺癆吐涎沫不咳

不渴遺尿便數此為肺氣虛寒上虛不能制下也

宜四君子加阿膠乾薑如吐涎沫咳嗽咽燥而渴

宜甘艸生薑人參大棗湯如聲啞聲嘶咯血口乾

宜甘艸生薑人參大棗湯如聲啞聲嘶咯血口乾

此屬陰虛火熱熾也。宜清金養血湯。本門紫苑散加阿膠山梔天花粉天門冬。而人參半夏皆在所禁也。

醫按

薛立齋治一婦咳嗽早間吐痰甚多。夜則喘急不寐。曰。早間多痰。脾虛飲食所化。夜間喘急。肺虛陰火上冲。以補中益氣湯加五味子。麥門冬而愈。

又治一婦咳嗽。其痰上壅。日去數碗。作腎虛水泛。以六味丸料。及六君子湯數劑愈。

證治大還

醫學近編
卷之十一

圭

貞白堂

又治一婦咳嗽。脇痛發熱。日晡益甚。此肝脾虛熱而傷肺也。用加味逍遙散加熟地黃治之。愈後因怒氣勞役。前症仍作。聚太陽痛。寒熱往來。此肺氣虛。而尿屏失制也。復用前散而愈。

又治一娠婦咳嗽。則便自出。此肺氣不足。腎氣虧損。不能司攝。用補中益氣湯培土生金。六味丸加五味子以生腎。上症宜用保元湯加黑薑五味子補骨脂。

汪石山治一人。每遇秋冬。患咳嗽。喘急不得臥。時值

和暖。卽安。他醫用發散藥。暫愈復發。脉來洪滑。此內有鬱熱。秋冬肌腠緻密。熱不得泄。故病作耳。內熱乃病本也。以涼膈散加酒炒芩連香附。樵芎。蒼朮。枳殼。杏仁。愈。

又治一婦久嗽。咯膿血。日輕夜重。脉濡細而滑。此肺病也。因服人參清肺散。知母茯苓。藥俱犯。人參半夏一助肺中伏火。一燥肺金津液。故病益甚。遂以天麥二門冬。貝母知母。阿膠山梔爲君。紫苑生地爲臣。桑皮兜鈴爲佐。款花當歸甜葶。塵爲

證治大還

醫學近編
卷之十一

六

貞白堂

使五劑而愈。

綱目治一婦乾咳。寸脉動滑。餘皆散大。左大於右。用石膏香附爲君。芩連青黛瓜蒌子。貝母。門冬。陳皮。炒柏歸。芎。桔梗爲臣。五味紫苑佐之。漸愈。

衍義治一婦肺熱久嗽。身如火炙。肌瘦將成肺勞。此熱氣壅滯於肺胃也。以紫苑丸喻化。不終劑而愈。予婦遇夜嗽甚。多痰。作陰虛火動。以四物換生地。加知母。貝母。瓜蒌仁。杏仁。麥門冬。五味子。二劑而愈。

華蓋散 和劑

治肺感寒邪。咳嗽聲重。胸膈煩滿。

麻黃 蘇子炒 桑皮炒 陳皮 茯苓 甘艸

杏仁 生薑

三拗湯和劑

麻黃 杏仁 甘艸 加苦梗 荆芥 瓜蒌仁 桑白

皮 烏梅名五拗湯 治風寒氣逆喘急

疎邪清肺飲附餘 諸病後火熱乘肺 咳唾則有血

胸膈脹 五心煩熱 及傷寒傷濕 解利未盡 餘邪在

經絡咳嗽者

麻黃 前胡 桔梗 桑皮 地骨皮 知母

證治大還

醫學近編 卷之十一 咳 七 貞白堂

貝母 麥門冬 紫苑 半夏 生地 竹茹

甘艸 五味子

加味瀉白散

桑皮 地骨皮 知母 黃芩 桔梗 陳皮

青皮 甘艸

降火清金湯統旨

梔子 黃芩 知母 麥門冬 貝母 桑皮

桔梗 橘紅 茯苓 甘艸

清肺化痰湯統旨

梔子 黃芩 知母 麥門冬 貝母 桑皮

桔梗 瓜蒌 茯苓 橘紅 甘艸

人參平肺散東垣 治心火乘肺 咳嗽肺痿及肺熱而喘

人參 地骨皮 天門冬 知母一錢 桑皮炒二錢

陳皮六分 五味子一錢 甘艸 肺熱而喘嗽 宜用

桑皮 心火乘肺 宜去桑皮 加黃連

清金養血湯宜底 治骨蒸勞熱咳嗽 不拘男婦

地骨皮 麥門冬 知母 瓜蒌仁 貝母 丹

皮 山梔 當歸 橘紅 川芎 芍藥 生地

證治大還

醫學近編 卷之十一 咳 六 貞白堂

五味子

射干麻黃湯金匱 治咳而上氣 喉中如水雞聲

射干 細辛 紫苑 欬花 麻黃 半夏

生薑 五味子

人參清肺湯謙甫 治咳嗽胸滿 聲瘖自汗 肺胃虛

寒 腹脇脹滿 逆塞短氣 倦怠減食

人參 阿膠 桑皮 麥門冬 地骨皮 杏仁

知母 栗殼 烏梅 甘艸

人參養肺丸 治肺胃傷氣 奔於上 客熱薰肺 咳嗽

喘急嘔血吐血

人參 黃芪 蜜炙六錢 白茯苓 天花粉 二錢 杏仁 七錢

半夏 二錢 皂莢子 十粒 煉蜜九如彈子太嚼下

寧肺湯 治榮衛俱虛發熱自汗咳嗽喘急

人參 白朮 茯苓 甘艸 當歸 川芎 熟

地 白芍藥 阿膠 五味子 乾薑 麥門冬

桑皮

瓊玉膏 治虛勞乾咳

生地 四兩 白茯苓 十三兩 白蜜 二斤 人參 六兩 以地

證治大還 醫學近編 卷之十一 白蜜 乾白堂

黃汁同蜜熬沸攪勻用絹濾過將參苓為末和勻

前汁入磁瓶內封固桑柴火煮三晝夜仍懸井中

一日白湯點服 一加減者 辨白者去粉 合時不冷大易

潤肺散 統旨 貝母 一兩 瓜蒌仁 青黛 各五錢

人參欬花散 謙甫 治咳嗽久不愈者

人參 欬花 知母 貝母 半夏 粟殼 炒黃

烏梅

清咽寧肺湯 統旨

桔梗 梔子 黃芩 知母 貝母 桑皮

前胡 甘艸 瓜蒌

胃風湯 治風邪入胃咳嗽則嘔吐

陳皮 半夏 茯苓 甘艸 升麻 葛根

白芷 藿香 檳榔

紫苑散 海藏 治咯中有血虛勞肺癆

人參 紫苑 少 知母 貝母 各一錢 阿膠 一錢 茯苓

五味子 十一粒 桔梗 甘艸 各五錢

人參補肺湯 治肺癆因腎不足虛火上炎發熱作

證治大還 醫學近編 卷之十一 干 白蜜 乾白堂

渴咳嗽短氣

人參 黃芪 白朮 茯苓 當歸 山藥 山

茱萸 熟地 牡丹皮 五味子 橘紅 麥門

冬 甘艸 杏仁煎 治咳嗽失音

杏仁 三兩去皮尖研 桑皮 貝母 木通 各一兩二錢五分 紫苑

五味子 欬花 葛蒲 各一兩 細辛 五錢 水三升

煎至半升入杏仁泥白蜜錫糖薑汁各一兩再熬

成膏每用一匙含化

寧肺益氣湯 王機 治肺虛久嗽成肺痿

白芨 兜鈴 訶子 紫苑 百合 知母

貝母 人參 欬花 生地 當歸 甘艸

御米 每兩用細辛三分煎湯拌半日用

蛤蚧散 治肺間積虛熱久嗽成瘡咳吐膿血喉中氣塞胸膈噎痛

蛤蚧 阿膠 犀角 羚羊角 鹿角膠 各一兩

右除膠外俱爲細屑入膠分爲四服每用河水三升煎徐徐嚥下渣再煎服

證治大還

醫學近編 卷之十一 咳 主 貞白堂

二母散 治咳嗽吐膿血乃肺傷也

知母 貝母 白芨 白礬 等分爲末姜湯下三錢

葶藶散 治咳嗽面目浮腫不得安臥涕唾稠粘

甜葶藶 隔紙炒 郁李仁 去皮 桑白皮 各一兩 紫苑 旋

覆花 木通 大腹皮 各五錢 每三錢薑三片水煎服

煎服

知母茯苓湯 宣明 治肺痿喘嗽不已往來寒熱 自注

知母 茯苓 薄荷 柴胡 桔梗 欬花 麥

門冬 阿膠 人參 白朮 川芎 黃芩 五

味子 半夏 甘艸

半夏溫肺湯

半夏 陳皮 芍藥 赤茯苓 甘艸 細辛

乾薑 肉桂 人參 桔梗 旋覆花

紫苑丸 治久嗽

瓜蒌仁 一兩 百部根 欬花 蜜水炒 紫苑 烏梅

貝母 地骨皮 訶子 各五錢 蜜丸嚥化

傳信方止用百部五錢紫苑欬花各一兩生薑烏

梅湯下三錢

證治大還

醫學近編 卷之十一 咳 主 貞白堂

抑痰丸 治痰嗽

瓜蒌仁 一兩 貝母 半夏 各三錢 炊餅爲丸

含膏丸 治上氣喘嗽不得臥

知母 貝母 葶藶 隔紙炒 共搗爲末以棗肉

半兩砂糖兩半和丸彈子大綿裹一九含之

治久嗽上氣心胸煩熱吐血

蘇子 微炒 杏仁 炒 鹿角膠 各三兩 薑汁 一合 蜜 一兩

蘇杏搗細入三汁中慢火熬膏三四匙米湯化下

入牛酥一升尤妙

治久嗽虛弱者

栗殼八兩 人參 鹿茸各五錢 半夏姜糖炙 爲末

蜜湯下一錢

欬花膏秘方 治久嗽

欬花 桑皮各一兩 紫花 玄參各六錢 五味子 烏

梅肉 麥門冬各三錢 粟殼微炒 爲末用紅棗肉

畧加蜜煉爲餅重二錢每餅入白糖二錢水一碗

煎半碗黃昏時服久嗽加訶子肉三錢痰盛加杏

仁三錢喉音不清加百合三錢

證治大還 醫學近編 咳嗽 卷之十一 重 貞白堂

紫杏丸 衍義 治肺熱久嗽身如火炙肌瘦將成勞

蔡

枇杷葉 紫苑 欬花 杏仁 桑皮 木通等分

大黃減半 蜜丸嚙化

星半丹 附餘

南星煨製 半夏各二兩 甘艸五錢 瓜蒌黃熟者 入薑

汁搗爛入上三味拌勻盒作麴研爲末竹瀝一碗

拌勻焙乾再拌再沃以瀝盡爲度臨臥蜜湯下二

錢

百花膏 治久嗽不已痰中有血

百合蒸焙 欬冬花等分 煉蜜爲丸如彈子大嚙化

治脾經痰飲五更咳嗽喉中如有物咽之不下

白茯苓四兩 蘇子三兩另研如泥入藥同搗 白豆蔻仁七錢 貝母

去心 括萎根三兩 薄荷一兩 神麴炒一兩 連翹三

兩 研砂二錢另 橘紅四兩 麥冬三兩 貓兒 葉六兩

山查三兩 麥芽淨麵一兩五錢 霞天膏麴四兩 枇杷葉四兩

爲末山藥粉糊丸如麻子大白湯下

劫嗽丹

證治大還 醫學近編 咳嗽 卷之十一 香 貞白堂

五味子五錢 甘艸二錢 五倍子 風化硝各錢二分半

蜜丸嚙化

薰嗽法 丹溪 治久嗽不已或風邪入肺咳嗽不止

及臥則嗽甚者

佛耳艸 欬冬花各二錢 鵝管石 雄黃 南星

艾葉各七 入有嘴瓶中燒之蓋其瓶口以小嘴出

烟吸烟氣以茶清咽下

清中嚙化丸 治咳嗽吐臭痰

大黃一兩 石膏二錢 生蜜丸如彈子太

徐徐喻化

勝金方 治久嗽喘急

杏仁半升。去皮尖。童便浸三四日。取出研細入蜜

一兩。童便煎成膏。沸湯下二錢。

治痰嗽吐不已。胸膈有冷物上塞。候熱湯稍下。

橘紅 白茯苓 蘇子 研細 瓜蒌仁 蛤粉 拌炒研

錢半 夏 一錢 姜 遠志 去心 甘 升 汁 浸 白豆蔻仁 五

吳茱 湯 泡 去 梗 一 錢 河水二碗半煎八分服加薑汁五

匙竹瀝一盃

證治人還

醫學近編 卷之十一 咳喘 重 貞白堂

痰飲咳嗽。蚌粉新瓦上炒紅。入青黛少許。淡蘆水。滴

麻油數點。調服。

人參蛤蚧散 治二三年肺氣上喘。咳嗽咯血。滿面

生瘡。遍身黃腫。

蛤蚧一對。河水浸逐日換水。浸 杏仁 五兩 去 甘 艸

炙三 兩 人參 茯苓 貝母 知母 桑白皮 各二

為末茶清下一服

陳氏醫學近 卷之十一

雲間陳 治三農甫述 男

栳幾先 師柴羔愚 泰

毘陵鄒言正仲衡甫閱 門人

范 崧壽民 校 王 頤贊皇

欬逆一

脉浮而緩。或急或促。或微者。可治。弦急按之不鼓者。

難治。右關弦而代者。危。肺脉散者。死。

欬逆者。俗名呃是也。其聲短促不長。纔發聲於咽膈

證治人還

醫學近編 卷之十一 欬逆 一 貞白堂

間。則噎而中止。名曰欬逆。千金方以欬逆為噦。保

命集以欬逆為噫。夫胃病為噦。心病為噫。欬逆則

氣自臍下奔急上行。直冲清道。而肺金不納。故作

噎聲而止也。經曰。諸逆冲上。皆屬於火。火飲上行。

或為痰飲所碍。或為食物所滯。或為寒氣所抑。或

胃氣元氣陰氣虛弱。陰火乘虛上逆。奔迫而行。直

冲清道。故作吃忒。觀平人食入太速。或急食乾物

氣塞。作呃等證。但有虛實不同。如傷寒汗下吐後

或瀉痢日久。或病後產後而見此症。皆氣血太虛。

胃弱脾寒。逼其虛熱上升也。丹溪云人之陰氣

依胃為養。胃傷木侮。陰為火所乘。不得內守。木挾

相火。故直冲清道而上也。若平人食入太速。而

氣噎。或飲水喜笑錯喉而氣噎。或因痰飲停蓄心

下。或因大怒氣逆痰厥。或傷寒熱病失下。地道不

通。而見此症。此則皆屬於實也。初虞世云。欬逆

頻頻相連者為實。易治。半時許一聲者為虛。難治。

氣血兩虛而呃。參朮湯下。大補陰丸。虛損氣虛

有痰者。六君子湯。參朮苓陰虛氣自臍下逆上

證治大還 醫學近編 卷之十一 欬逆 二 貞白堂

作呃者。補陰平肺飲。知栢歸芳 瓜蒌仁生地丹皮桑皮地骨

皮麥加竹茹橘紅半夏。吐利後胃弱脾寒。手足

逆冷。脉遲澀者。理中湯。參朮乾加附子丁香柿蒂

不拘氣虛陰虛。火逆上作呃。俱宜於補劑中加

肉桂。以為向導。而引火歸源。吐利後。胃虛熱者

橘皮竹茹湯。本欬逆自利。參朮竹茹湯。本傷

寒汗吐下後。中氣不足。脉虛微。氣不相續而呃者。

補中益氣湯。參朮苓加麥門冬五味子炒黃栢

不應加熟附去黃栢時常飲之。傷寒陽明內實。

失下。躁渴便秘而呃者。大承氣湯。大黃厚朴 枳實芒硝 各一兩飲

水太過。水結心下而呃者。小半夏湯。半夏生薑 各一兩加

桑皮木通或五苓散。白朮赤茯苓 澤瀉肉桂水寒相搏而呃

者。小青龍湯。乾姜細辛麻黃肉桂 芍藥五味去麻黃加附子。傳

經熱症。誤用姜桂助火。生痰而呃者。黃連解毒湯

連芩加竹瀝。平人偶緣氣逆暴呃者。小半夏茯苓

芩湯。半夏茯苓 枳殼黃連或木香調氣湯。香

厚朴蒼朮烏藥枳殼陳皮貝母。寒氣所遏者。半

夏生薑湯。痰飲碍氣者。二陳湯。半夏陳皮 茯苓甘草加枳

證治大還 醫學近編 卷之十一 欬逆 三 貞白堂

實積榔竹瀝或五苓散

醫按

丹溪治一女子。性躁味厚。夏月因大怒發呃。舉身跳

動神昏。視其形氣實。以人參蘆煎湯大吐頑痰數

碗。即熟睡而安

遂高治一人傷寒。陽明內實。地道不通發呃。其脉長

而實。以大承氣湯下之而愈

又治一人傷寒七日熱退而呃聲不絕。六脉沈細

無力。倦甚。以補中益氣湯加附子日進三服而安

脈有力
肺熱
胸中
胃氣
逆

一人酒色過傷，醫作外感治，發汗過多，絕食日久，致氣血兩虛，相火上冲，呃逆五六日不止。治以半夏黃連以瀉逆氣，歸芍生地知母以養陰，炒梔以瀉冲火，二三劑而愈。

予治一人患溫熱病十餘日後，身熱面紅舌燥黑，欬逆日夜不止者三日。眾醫以脈微遲無力，欲用丁附回陽熱劑，予以手按其胸腹痛不可近，曰：脈微遲，非元氣虛，由邪熱內實，壅滯其脈而然也。用解毒承氣湯入甘遂末三分，下咽，噪熱片時去黑糞。

證治大選
醫學近編 欬逆 四 貞白堂 卷之十一

三四升熱退呃止而安。
又治一人患溫熱病，大便不通，用下藥糞去而呃大作，眾尤下藥之過，曰：此燥糞在腸胃，過氣於下糞去而鬱氣暴升，故奔迫而作呃耳。以枳殼飲之而安。

陳三農云：欬逆大便實，脈來有力，小承氣湯。大黃 枳實 芍藥
下失下熱氣入胸于肺故也，便軟脈來無力瀉心湯，胃氣冲逆故也。吃逆用益智小茴香各二錢，不通生地各五分，桂四分煎服，服後不愈理中橘皮。

湯便燥六君子加川芎當歸

一人吃逆連聲，脈來有力，因相爭肝木受邪，白思金能尅木，用鉄二斤燒紅水淬，飲之即愈。

一婦患時疫，飲水過多，心下堅痞，欬逆倚息短氣，不臥，湯藥不下，諸藥靡效，作停飲治之，進以五苓散一劑而安。

橘皮竹茹湯 活人 治胃虛膈熱欬逆

人參 橘皮 竹茹 各一錢五分 半夏 一錢 生姜

大棗 加茯苓白朮各參朮竹茹湯

證治大選
醫學近編 欬逆 五 貞白堂 卷之十一

橘皮生姜湯 活人 治氣虛有痰發呃

橘皮 半夏 人參 乾姜 甘艸 加桂心通

艸名橘皮乾姜湯治胃虛寒欬逆

枳殼散 治氣暴逆發呃

枳殼 五錢 木香 一錢 沸湯調一二錢服

丁香柿蒂湯 治久病呃逆因於寒者

柿蒂 丁香 各二錢 人參 一錢 生姜 五片

逆氣二

氣逆者氣自下而壅逆上行也，經曰：諸逆冲上皆屬

於火又曰肺苦氣上逆又曰腹中常鳴氣上冲胸
喘不能久立邪在大腸又曰任脉別絡生病從少
腹上冲心痛不得前後又曰衝脉爲病令人逆氣
而裏急又曰胃爲氣逆東垣云胃氣虛爲冲脉所
逆氣上冲咽不得臥而喘息有音調中益氣湯參
升陳木香加炒黃柏夏加炒黃連冬加吳茱萸此
症隨四時爲寒熱如夏月有此症乃爲大熱宜以
酒炒知柏黃連等分爲丸湯下二百丸隨以美膳
壓之勿令停留胃中直至下元以瀉冲脉之邪若

證治太還

醫學近編 逆氣 本 貞白堂

卷之十一

平居氣息如常行動則氣促而喘或素有陰虛之
症氣自小腹上攻令人不得臥而喘息有音此腎
氣虛而冲火上逆也滋陰降火湯本怒動厥陰之
火氣自下逆上攻冲兩脇作痛喘息不寧者伏龍
湯本氣上逆喘呼氣促而無痰聲者蘇子降氣湯
蘇子厚朴歸前氣上逆痰涎喘急吐濁涎者導痰
半陳沉香甘湯亦茯甘加蘇子前胡倍皂莢火逆上氣
咽喉不利者麥門冬湯本上氣脉浮者厚朴麻黃
湯本脉沈者澤漆射干湯本

醫按

丹溪治一婦氣自小腹丹田冲上遂吐清水火氣上
逆由丹田虛寒故也用白朮二兩白豆蔻五錢爲
末早飯後以白湯送下白朮補脾豆蔻溫肺此藥
服之則金水相生其病自愈若在男子純陰無陽
則爲不治之症矣

證治太還

醫學近編 逆氣 七 貞白堂

卷之十一

陳三農治一人怒氣感寒病後小腹有塊偏左氣逆
上行喘息不安衆用散氣降氣藥益甚曰此因汗
下過多傷其胃氣胃虛爲衝脉所逆并脇下少陽
脉二道而反行病名厥逆以調中益氣湯加炒黃
柏炒青皮一劑愈
又治一老人大怒氣自臍下上攻兩脇作痛喘息
不臥此怒動厥陽之火也兩脇肝膽部分怒氣傷
肝而動龍雷之火故逆上作痛耳用伏龍湯下佐
金丸愈連米
又治一貴人患氣從小腹上攻胸脇頭項遍身急
脹而痛諸治罔效曰此督脉爲病也經曰督脉爲
病令人逆氣而裡急以四物加炒黑黃柏醋炒青

皮一劑愈。

滋陰降火湯 秘方 治陰虛火自小腹上冲令人不

臥而喘息。

黃柏 知母 俱鹽水拌炒 青皮 醋炒 熟地 川芎 山

茱萸 芍藥 當歸 丹皮 麥門冬 五味子

伏龍湯 秘方 治怒動龍雷之火氣自小腹上冲令

人喘息脇痛難忍。

黃連 吳茱萸炒 黃柏 鹽水炒 香附 童便浸 青皮 醋炒

芍藥 川芎 柴胡 甘艸

證治大還

醫學近編 卷之十一 逆氣

八

麥門冬湯

麥門冬 半夏 人參 甘艸 粳米 大棗

厚朴麻黃湯

厚朴 麻黃 石膏 杏仁 細辛 乾姜

半夏 五味子 小麥一合水三碗煮麥熟下藥

澤漆射干湯

澤漆 射干 桑皮 黃芩 白朮 茯苓

竹茹

皂莢丸 治氣上逆吐濁唾但坐不得臥者

皂莢 酥炙去皮弦 蜜九梧子大棗湯下

短氣 三

寸口脉微胸中短氣

短氣者呼吸短促而不能相續甚則欲低頭屈身坐

而欲伏者是也仲景云平人無寒熱而短氣為實

少氣小便不利為虛虛者由肺氣不足不能布息

故氣短促欲屈身低頭以接其氣也宜補中益氣

湯 參朮芪艸歸柴升姜棗 加五味子白芍藥小便不利者四

君子 參朮 去茯苓加黃芪實者由風濕相搏或水

證治大還

醫學近編 卷之十一

短氣

九

停心下或痰阻其氣致心腹脹滿故氣短促也風

濕者羌活勝濕湯 羌活防風草薢 痰者導痰湯 半南橘

赤茯苓 停水者小半夏茯苓湯加桑皮金匱要畧云

短氣氣塞胸背為胸痺形腫心下堅築或若眩冒

或心下悸或短氣而渴四肢歷節痛或倚息皆飲

症也治以逐飲之劑

東垣云肺脹膨膨而喘咳胸高氣滿壅盛上逆而氣

短促者以黃芪人參湯補之多加五味子人參次

之麥門冬又次之黃連少許服正藥二三劑氣稍

短併者為肌表間有風寒所遏當引陽氣上升多
加升麻黃芪羌活次之柴胡又次之藥本少許
黃芪人參湯

黃芪 人參 白朮 橘皮 蒼朮 麥門冬

五味子 當歸 酒洗 黃柏 炒麴 升麻 甘艸

噯氣四

胃脉微澁寸脉緊皆屬寒寸口脉弱而緩弱者陽氣
不足緩者胃氣有餘則噯而吞酸食卒不下氣煩
於膈也

證治大還

醫學近編 卷之十一 噯氣

十 貞白堂

噯氣即內經所謂噯是也由氣欲上行或因痰因食
因鬱以逆其氣氣不得順故也經曰脾病則腹脹
善噯又曰心病善噯仲景云上焦竭善噯蓋上焦
受氣於中焦中焦食不化故善噯也又曰上焦不
歸者噯而作酸不歸者不至也上焦之氣不至其
部則物不能傳化故噯而作酸也由是觀之則噯
氣乃火土之氣噯而不伸也治法胃中有實火膈
上有稠痰二陳湯陳皮半夏茯苓甘艸加黃連石羔梔子青
黛香附蘇子前胡良用平胃散蒼陳甘艸加麴藥山查

痞而噯氣旋復代赭湯旋覆花代赭石人參半夏甘艸心下蓄積

痞悶或作痛多噯敗卵氣枳殼散枳殼散門有食纔下咽

未及運化胃氣因抑而作噯一兩聲者此氣因鬱

而暴升也不必治陰火上炎噯氣滋陰清膈飲連

梔柏歸芎
生地甘艸

陳山農云噯氣屬食與火二陳加山梔神麴

醫按

一婦鬱怒不發久之噯聲甚高言談不知終始嘈雜
易飢經曰心病為噯此因憂鬱於心胸也用桃仁

證治大還

醫學近編 卷之十一 噯氣

十 貞白堂

承氣湯大黃桃仁桂枝芒硝甘艸下蓄血數升而安經曰血蓄
在上則喜忘在中則喜狂也

一人氣上逆每飯下一二口輒噯氣數十口再飯再

噯此氣不歸元中焦不運也用人參六錢麥冬三

錢五味子二錢橘紅一錢砂仁一錢白芍二錢角

沉香五錢益智仁一錢五分山茱萸肉三錢真蘇

子二錢枇杷葉三大片水煎臨服加沉香汁十五

匙逆水蘆根汁一大盞

婦咳嗽飽脹痰喘水火不通眠食俱廢以人參白

芍為君蘇子炒研細為佐。枇杷葉三大片白茯苓
佐之二服得眠大小便通。

枳殼散 本事 治心下蓄積痞悶噫敗卵臭氣。

香附 一兩 枳殼 白朮 檳榔 神麴 各三錢

米湯下三錢

保和飲 治噯氣吞酸倒飽

香附 醋炙 山查 神麴 蘿蔔子 炒各一兩 砂仁 錢五

陳白酒麴 共為末酒下二錢

惡心 五

證治大選 醫學近編 惡心 主 貞白堂

雖曰惡心實非心經之病皆在胃口上或痰或食或

熱或寒或虛悉能致之皆用二陳湯加生姜為主

熱加姜炒芩連梔子寒加乾姜藿香砂仁食加青

皮麴藥虛加參朮砂仁鬱火加山梔神麴香附薑

炒川蓮頭暈加藿香紫蘇天麻鈎藤甘菊

大半夏湯 治痰涎停聚惡心嘔吐

半夏 陳皮 茯苓 生薑

生薑半夏湯

半夏 一兩 生薑 一兩五錢
水煎 搗汁和服

茯苓半夏湯 治脾胃虛弱身重有痰惡心欲吐是
邪羈絆於脾胃間當先實脾土

神麴 麥芽 陳皮 半夏 白朮 茯苓

天麻 生薑

嘔吐 六

脉浮而洪為氣為熱浮而匿為積沈而遲為寒弦為
虛關前沈伏或沈滑為痰為食關脉浮大為風在
胃中陽緊陰數者難治寬緩者可治。

嘔吐皆有聲有物但物頓出為吐漸出為嘔有聲無

證治大選 醫學近編 嘔吐 主 貞白堂

物為乾嘔不作嘔吐狀但聲如乾嘔怯弱濁惡而

長者為噦嘔輕噦重丹溪云河間謂火氣炎上特

一端耳有胃中有熱膈上有痰者有痰膈中焦食

不得下者有寒氣鬱於胃口者有食滯心肺之分

新食不得下而嘔者有氣逆者有七情鬱結為關

格者有風邪入胃者有胃虛久病嘔而不納穀者

但火與痰作嘔吐為多治法胃中有熱膈上有痰

者惡心痞悶體雜煩熱嘔酸吐痰二陳湯 陳半

姜炒黃連山梔竹茹姜汁 火炎上者食已暴吐

喜冷惡熱面赤煩渴氣逆上冲三陳湯加姜炒芩

連山梔杷杷葉檳榔竹茹蘆根不止宜利小便以

導氣下行不效用養正丹或運寒氣客於腸胃

陽氣不得下行厥逆上出而嘔者食久反出食物

不消四肢發涼喜熱惡冷加減溫胃散門加茱萸

痰涎阻隔者嘔則食與痰並出惡心眩暈二陳

湯陳半加白芥子枳實竹瀝姜汁不止用滾痰丸

食滯胸膈者胸腹痞悶惡食吞酸嘔吐酸苦黃

水并宿食平胃散甘加麴蘖半夏枳實生薑

證治大還

醫學近編 嘔吐 西 貞白堂

氣逆者覺氣自下逆上蘇子降氣湯蘇朴歸前牛

不效用靈砂丹本氣滯者胸膈不利心腹刺痛本

香調氣散本氣鬱胃口結聚痰涎嘔吐者胸膈痞

悶不思飲食加味七氣湯本加梔子沉香不效用

碧霞丹本風邪入胃者嘔則飲食不得進吐而多

汗脉弦葛根湯葛麻黃桂枝芍加陳皮半夏前胡生薑

風痰乘於脾胃者金花丸本胃虛久病嘔吐間

穀氣藥氣即欲吐者先用元米炒黃濃煎汁入姜

鹽徐徐熱服以養胃氣間用參朮炮姜飯丸服候

吐少止用參朮養胃湯本或六君子湯加藿香丁

香生薑若脉弱小便復利身微熱而手足厥冷此

虛寒之極也更加附子脾土虛寒水反侮土以致

嘔逆者加澤瀉丁香乾薑痞滿短氣而嘔者調

中益氣湯參芪朮得食即嘔靜而復煩吐中

有出烏梅丸烏辛附桂參王宇泰曰嘔吐別無他

症諸藥不效乃就在胸膈見食則動動則不納藥

物而吐也當以虫治血虛氣不歸源而吐十全

大補湯參朮苓加陳皮半夏藿香嘔吐

證治大還

醫學近編 嘔吐 支 貞白堂

心下痞眩悸者膈間有水也先渴後吐水停心下

也益小半夏茯苓湯渴欲飲水水入即吐名曰

水逆五苓散白朮赤茯苓嘔吐清水屬濕吳茱

萸湯一味蒼朮丸嘔吐青綠水肝木乘脾也六

君子參朮苓加青皮肉桂嘔吐涎沫手足厥冷

半夏乾薑湯嘔噦手足厥者橘皮湯橘皮似

嘔不嘔似噦不噦心中潰潰無柰者生薑半夏湯

嘔而胸滿吳茱萸湯人參嘔而煩渴煮枇杷

葉汁飲之嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯生

人參連 嘔吐湯藥不納肌肉不減此痰氣隔塞

於胸膈也宜開關散本

按嘔吐皆屬於胃然胃氣下行即順今逆而上行為吐忌用下藥以逆其氣若先因大便不通後嘔吐水漿不下此因地道不通氣逆厥上即幽門不通上冲吸門之義老人虛人多有此症宜用當歸生地桃仁紅花和血涼血潤血微加硝黃以通其閉或諸導法大便去氣得下行嘔自止矣不大便秘者禁用

證治大選

醫學近編 嘔吐 六 貞白堂 卷之十一

王宇泰云嘔吐諸藥不效當借鎮墜之藥以墜其氣逆用蘊蘇湯下靈砂丹百粒俟吐止隨症調治又有痰氣結在咽膈間粥藥到咽即吐出亦當治以前法俟吐定繼進以順氣導痰之藥

陳三農云嘔吐用藥各自不同不嘔而吐者此為假吐熱在胃脘故也真吐必待嘔而吐也吐者物出而無聲因飲食所傷之物吐出也嘔者有聲有物腹中響而突上出是也吐有虛有實吐而手足冷是虛理中湯參朮乾姜傷食者香砂平胃散香砂蒼陳甘草

枳朴 吐瀉胃苓湯二朮二苓澤 姜 陳朴枳肉桂以澤瀉為主吐而

烟虫出或口吐清水理中湯去甘艸加黃蓮花柳或萊豆湯嘔吐不止半夏二兩用一兩同生薑片

一兩炒用一兩同肉桂五錢炒去火毒焦末每二錢姜三片煎服嘔吐因受熱邪喜冷寸脉緊數作

茹湯本心痛嘔吐宜作火治饘雜胸膈痛而嘔屬

火四聖丸嘔吐無時寸脉沉遲沉伏宜陳皮半夏

丁香各三錢姜水煎嘔而大便秘者此葉落根枯

胃氣傳送不及死不治渾身作脹者不治無脉者

證治大選

醫學近編 嘔吐 七 貞白堂 卷之十一

不治嘔而且吐用檳榔下氣兩三次而不止者死

吐而不嘔木鬱達之虛者香砂養胃湯參朮苓砂

乾早晨作吐者胃氣空虛腎水被木火吊動故也

用白朮五分吳茱萸半分黃連三厘養胃降火使

氣得以下達有食即吐者亦是氣虛非補命門火

何以得效凡病嘔吐早晨吃飯至晚吐出或午前

吃物臨晚吐出或天明吐出或突出若無阻之者

胃氣太虛也宜二陳加丁香檳榔枳殼溫而降之

或用黃連半分吳茱萸三厘同炒姜水煎服一二

病而
吐食入
多胃定
胃水也
益肺生
引時生
以藥引
水既絕
則不能
納氣
之難
肺手工
肺故
吐而出
也
有藥
中有人
醫治大建
卷之十一
嘔吐
文
貞白堂
貞白堂

貼加人參。吐中兼嘔者。嘔屬火。宜下。陳湯加黃連。吳茱萸之類。惟吐而不出聲者。屬虛。宜溫。不宜寒。此名反胃。隨吃隨吐。或吐未幾。即吐。痰涎。吐出。因火在胃中。而丹田真火不足故也。宜破故紙。小茴香。艾實。沉香。虛加人參。凡吐不止。二陳湯加姜汁。不止。加丁香。溫而不愈。惡虛中有火。加炒黑山梔。人參。或理中湯。煩躁。更加人參。或烏藥。人參。沉香。為末。生薑三片。淡鹽蘸。嚼。津液送下。吐而胸膈痛。脉洪大而硬。大便秘。三日不愈。名曰厥逆。其死甚速。吐而虛煩。發熱。自汗。腹痛。煩悶。泄瀉。便血。麥朮。湯加炒黑乾姜。

醫按

陳霞山治一婦。產後傷食。致胃虛不納。穀四十餘日。聞穀氣。藥氣俱嘔。以參。苓。白朮。炒。麴。各一錢。陳皮。藿香。各五分。炙甘草。三分。砂仁。五分。陳米一合。用沸湯二碗。泡伏龍肝末。澄清汁煎。藥服而安。

薛立齋治一婦。因怒嘔噦。時或昏。慣口噤。舉體肉。面色或青。或赤。作肝火熾盛傷脾。用小柴胡湯加

山梔。釣藤。黃連。治之愈。

又治一人。痢後嘔噦。諸藥入口。即吐。脉洪大。按之虛細。作渴引飲。此脾胃虛寒。不能司納。以參。朮。炮姜。各一錢。飯丸。米飲。不時下。至三兩。開藥不嘔。以六君子湯調理而安。

治一人。湯藥入口。即吐出。六脉洪大有力。此因地道不通。故氣厥逆上行。而食物難入。耳曰不更衣。已十日餘。服承氣等湯。俱不納。曰秘結日久。湧逆勢盛。故也。止沸。莫若抽薪。遂用蜜導。去燥糞。數升。

醫治大建

卷之十一

嘔吐

文

貞白堂

嘔吐即止。調以養血清火之劑而安。

治一婦。苦於生育。孕及三月。以面粉燒酒調服。墮胎。胎去下血不止。嘔吐。湯藥不納。六脉細小。欲絕。作毒藥傷胃。氣胃虛。不能司納。以人參二錢。甘草五分。水煎。徐徐與服。嘔止。用八珍湯調理而安。又治一孕婦。用前藥。患前症。腹胸飽滿。嘔吐不止。用藥。豆甘草湯飲之而安。

治一小兒。因食積。用消導通利藥。過多。致嘔吐。湯藥不納。將成慢驚。百治不效。此因過用寒涼。剋削之

藥倍其胃氣耳。遂用半夏生姜各二錢切作小塊同炒香熟。入肉桂三分再炒加姜三片炒元米一撮濃煎與服而安。

陳三農治一人飲食如常每遇子時作吐大便秘結其人必苦慮憂思脾氣鬱結幽門不通宜扶脾通竅爲主遂以參苓白朮以蒼朮炒炙甘草各一錢烏藥附子各三分姜水煎服愈。

一士鬱熱嘔吐用竹茹山梔各三錢陳皮茯苓各二錢甘草一錢煎成加姜汁五匙熱服而愈。

證治大還

醫學近編 嘔吐 辛 貞白堂 卷之十一

藿香平胃散 治嘔吐不止

藿香 半夏 蒼朮 陳皮 厚朴 甘草

生薑

竹茹湯 治胃熱嘔吐及傷寒汗後餘熱留胃脘中

作嘔吐

葛根 竹茹 半夏 甘草 生薑 大棗

大黃甘草湯 治食已即吐

大黃 甘草 檳榔

荊黃湯 治上焦熱氣所衝食已暴吐脉浮而洪

荊芥 人參 甘草 大黃 水煎調木香檳榔末服愈

麥門冬湯 治煩熱嘔逆

人參 麥門冬 黃連 炒 竹茹 茅根

甘草 姜汁

旋覆花湯 治中脘伏痰嘔吐痰水心下痞悶

旋覆花 半夏 橘紅 枳實 白朮 茯苓 二

甘草 薑汁

前胡旋花湯 治風痰嘔逆飲食不得下頭目昏悶

證治大還

醫學近編 嘔吐 主 貞白堂 卷之十一

旋花 前胡 細辛 川芎 赤茯苓 枇杷葉

生薑

加味七氣湯 治氣鬱嘔吐

半夏 厚朴 香附 枳殼 陳皮 青皮

蒼朮 茯苓 木香 甘草

木香調氣散 治氣滯嘔吐

木香 丁香 砂仁 藿香 白豆蔻 陳皮

半夏 枳殼 甘草 生薑

開胃散 治胃虛嘔逆

訶子 人參 甘艸 生姜

加減安胃湯 治脾胃虛寒嘔吐

人參 藿香 丁香 砂仁 陳皮 半夏 吳

茱萸 蒼朮 枇杷葉 生姜

加減溫胃湯 治脾胃虛寒嘔吐清水冷涎

人參 白朮 茯苓 甘艸 藿香 丁香

半夏 陳皮 肉桂 乾姜

參朮養胃湯 治脾虛不能司納嘔吐

人參 白朮 茯苓 甘艸 橘紅 半夏

醫治大還

醫學近編 嘔吐 卷之十一 三 真白堂

藿香 砂仁 神麴 陳米 炒 脾胃虛寒加吳

茱萸草豆蔻丁香

靈砂丹 治上盛下虛痰涎壅盛用此鎮墜

水銀一兩 硫黃五錢 新鈔砂成珠入水大鼎煅煉

爲末元米爲丸如麻子大水下四五丸

椒紅丸 治胃寒嘔逆及上膈有虫嘔吐

花椒炒脆去開口及子 取紅棗肉爲丸

藿香安胃散 治脾胃虛弱不得腐熟嘔吐不食

藿香 丁香 人參 陳皮 茯苓 半夏

甘艸 每三錢薑水煎服

開關散 治痰氣搏結胸膈湯藥不納

陳皮 半夏 茯苓 甘艸 枳實 檳榔 熟

加黃連怒加青皮鉄銹水水煎入姜汁服

金花丸 治風痰乘胃嘔吐

半夏 南星各一兩 檳榔 雄黃各三錢 薑汁浸炒

餅爲丸

經驗方治吐逆

用黃丹醋煮乾仍煨通紅研細以粟米飯丸如梧

醫治大還

醫學近編 嘔吐 卷之十一 三 真白堂

子大醋湯下七丸名碧霞丹神效

張文仲治胃冷吃食即欲吐白豆蔻三枚好酒研細

服

一方以硃砂一兩研極細末水飛過入射香三分

煉蜜爲丸菜豆大每用三五丸立止

雲間陳 治三農甫述 男

拭痰先 參 師柴羔愚

毘陵鄒言正仲衡甫參

門人 范 崧壽民 校 王 顯贊星

乾嘔 七

乾嘔者嘔而無物出也。因熱氣與痰搏結於胃。熱氣

上冲。心下痞結。故有此症。用二陳湯加姜炒芩連

竹茹枳實生姜。大便不通而乾嘔者。此氣逆冲上

證治太還

醫學近編 乾嘔 卷之十二

貝白堂

也。當通利其大便。

周慎齋云。乾嘔用乾姜炒為末。鹽湯調服。汗出。乾嘔

桂枝芍藥甘草各一錢。姜棗煎下。利乾嘔。姜附各

一錢煎服。無汗惡寒。脇痛嘔利。十劑湯

噦 八

噦者。胃氣敗而然也。仲景云。病至於噦。亦危矣。有胃

氣虛。復飲冷水。水寒相搏。氣逆而噦者。有胃虛停

滯宿食。強與新穀。新故相亂。氣併相逆而噦者。有

胃氣虛。虛熱壅塞而噦者。有胃中虛。痰水滿塞而

噦者。皆以補養胃氣為主。而佐以治病之藥。用參

苓竹茹炙甘草。虛寒加姜附。宿食加麴蘖砂仁。痰

水加橘紅半夏。大便不通而噦者。外治以蜜導法

慎勿用利藥。更傷胃氣也。

陳三農曰。噦因胃氣太虛。汗下太過所致。輕則溫散

腹滿者。生薑半夏湯。重則承氣湯。小便不利。五苓

散。噦至八九聲。收氣不回者。因吐利後。胃中虛寒

膈間有痰也。丁香柿蒂湯。飲過復噦。噦家不尿者

死。

證治太還

醫學近編 乾嘔噦 卷之十二

貝白堂

噎雜 九

噎雜者。似飢而甚。有懊惱不自寧之意。有胃熱火動

其痰者。有食鬱滯為濕熱者。有氣鬱氣滯者。眩暈

噎雜。乃火動其痰也。二陳湯加姜炒芩連。梔子石

羔。噎氣吞酸。乃食鬱為熱也。平胃散。蒼朮。加麴蘖

香附。半夏。梔子。氣鬱者。越鞠丸。香附。撫芩。氣滯者

四七湯。黃蘗。朴。枳。加桔。枳。因思慮傷心者。五更噎

雜。茯苓。補心湯。茯苓。桂。心。甘。艸。麥。冬。人。參。元。氣。胃。氣

脾陰不足而噎雜者。君子倍山藥。參。水。扶。若以火

治之必變吞酸中滿之症有蓄血在中焦而餽雜

者桃仁承氣湯大黃桃仁桂枝芒硝餽雜覺火似下焦

起六味丸在中焦白朮為君黃連陳皮為佐或白

朮芍藥山藥蓮子之類或人參甘艸和之切忌香

燥藥在胃口芎歸芍藥加梔沉在胸中加蘇梗在

下焦用人參煎湯下鹿角膠服之效以人參瀉肺

火鹿膠補腎故也凡補脾陰不足餽雜山藥多用

火旺甘艸多用大便燥當歸多用心不寧蓮子薏

仁多用忌用生熟地以脾惡血藥也

證治大還醫學近編 卷之十二 三 貞白堂

加味小陷胸湯秘方治火動其痰餽雜

黃連炒三錢半夏二錢瓜蒌半個枳實一錢梔子一錢

三白丸 治噯氣餽雜

南星 半夏 石羔 梔子 炒香附 童便 粥為丸

三聖丸 治餽雜

白朮四兩黃連 橘紅各一兩神麴糊丸臨臥津

咽三四十九又名通神效

吞酸十

兩寸洪數者濕熱右關沈微者虛寒氣口緊盛者宿

食。

吞酸吐酸辨

丹溪曰吞酸與吐酸不同吐酸是平時津液隨上升

之氣鬱積而成鬱積之久濕中生熱故從火化遂

作酸味吐出也吞酸是濕熱積久不能自湧伏於

脾胃之間肌表得風寒則腠理閉密而內熱愈鬱

酸味刺心肌表得溫暖或內食香熱湯丸則腠理

開發津液得行故暫解也然治酸必用吳茱萸順

其性而折之仍須卻厚味蔬食自養則病易安

證治大還醫學近編 卷之十二 吞酸 四 貞白堂

或問吞酸一証素問明以為熱東垣則指為寒丹溪

則曰寒鬱熱三說不同其果熱也寒也寒鬱熱耶

曰此症有虛有實三論俱不可偏廢內經言熱者

指病形而言也如穀食弗熱則不酸非熱而何東

垣言寒者指病本而言也蓋謂脾胃虛寒不能行

濕濕鬱為熱因以作酸非寒而何故用丁香以溫

胃人參以養胃去其虛與寒食物自然消化而不

至於留滯為酸矣汪石山云吐酸若水由脾胃虛

不能行濕濕鬱為熱故水作酸若也宜用辛熱之

劑濕逢熱則燥鬱遇辛則開濕去鬱開酸苦自降

矣丹溪言寒鬱熱者兼標本而言也以飲食入胃

未及運化或食生冷或受風寒濕熱被鬱因而作

酸故用平胃散加梔子黃連以去其本熱茱萸蒼

朮以散其標寒寒散熱除酸自止矣是知屬熱屬

寒皆病機之所必有者審其脾氣虛寒飲食不能

輸化濁氣不能下降而作酸者用加減安胃湯

偶爾作酸饋雜便秘食物易化此濕熱鬱遏也用

加減清胃湯

證治大選

醫學近編

卷之十二

五

真白堂

茱萸炒黃連山梔茵陳香附薑汁神麴能分虛實

用藥則溫胃清胃隨投隨效矣若痰飲停食而作

酸黃水吐出者二陳加蒼朮香附枳實神麴麥芽

噫腐噦酸每晨吐酸水數口或膈間常有酸折意

皆飲食傷胃所致平胃散加麴蘖砂仁半夏茱萸

茯苓時常吐清水乃胃中濕熱所致平胃散加白

朮茯苓滑石半夏胃寒者理中湯

衰不能生土者八味丸

留飲酸折心痛吐清水用神麴蒼朮砂仁陳皮姜

汁養神麴糊為丸

欬唾臭氣

本草云老血在心脾能令人欬唾臭氣又經曰肺臭

腥肝臭脾心臭集脾臭香腎臭腐又胃熱則口臭

脾肺間濕熱痰壅滯則欬唾臭痰治法濕熱痰壅

滯者清中喻化丸

飲二地不年天冬批杷老血在心脾者射干丸

五臟臭者以五臟熱治之

醫按

證治大選

醫學近編

欬唾臭氣

六

真白堂

丹溪治一人因濕熱病嘔吐酸水如醋用二陳湯加

姜炒苓連蒼朮白朮梔子藿香香附砂仁而愈

薛立齋治一婦因大怒患吞酸噯腐胸腹脹滿或治

以二陳湯加石羔吐痰涎如湧身熱如火尿洪大

按之如無此脾胃虧損虛陽發越於外脾敗不能

攝涎也用六君子加姜桂一劑即熱睡數劑而安

予治一婦每食止碗許稍加大便泄瀉即噯腐吞

酸腹脹痞悶此脾胃虛寒不能化也用六君子加

茱萸藿香香附砂仁神麴煨姜而愈

加減安胃湯 治脾胃虛寒。噎膈吞酸。嘔吐酸水。

人參 藿香 丁香 茱萸 半夏 白朮

陳皮 砂仁 炮薑

加減清胃湯 治濕熱鬱遏。吞酸吐酸。

黃連炒 黃芩炒 山梔炒 蒼朮 陳皮 厚朴

赤茯苓 姜

茱連丸 治嘔吐酸水。

吳茱萸 黃連土炒 黃芩土炒 陳皮各五錢

蒼朮八錢 神麴糊入薑汁丸

證治大還 醫學近編 欽定四庫全書 卷之十二 七 貞白堂

加味麴朮丸 治中脘宿食流飲。酸折心痛。口吐清水。

神麴炒三兩 蒼朮炒一兩 陳皮一兩 胃中濕熱加厚

朴黃連 吳茱萸 胃虛寒加丁香 藿香 砂仁 人參

薑汁煮神麴糊丸 姜湯送下。

射干丸 治老血在心脾。欬吐言語氣臭。

射干 桃仁 沒藥 大黃等分 韭汁為丸 彈子大 噤化

清中噤化丸 見咳嗽門

加減甘露飲 見口門

噎膈 十一

緊而滑。吐逆。小弱而澁。或尺微澁。為反胃。沈緩無力。或大而弱。為氣虛。澁小或數而無力。為血虛。數而有力。為熱。寸關沈伏。或大而滑。為痰。亢澁。為血膈。緊澁者難治。

氣留咽噎。噎塞窒碍。食物不得順利。曰噎。氣結胸膈。填塞隔絕。食物不得下通。曰膈。反胃者。因其隔絕。不得下行。故復反出於胃也。噎者。膈之漸。膈則必至於反胃也。二者皆由陰中伏火而作。蓋陽無陰。

證治大還 醫學近編 欽定四庫全書 卷之十二 噎膈 八 貞白堂

不能施化。陰之失位。而陽伏其中。傳化不變。而反上行也。丹溪云。噎病生於血乾。血陰也。陰主靜。內外兩靜。則臟腑之火不起。金水二氣有養。陰血自生。腸胃津液。傳化合宜。何噎之有。唯血液俱耗。胃脘乾稿。其槁在上。而近咽之下。水飲可行。食物難入。名之曰噎。其槁在下。與胃為近。食雖可入。良久復出。名之曰膈。亦曰反胃。

薛立齋云。反胃善食。喜冷飲。是為有火。食少喜熱湯。是為無火。王太僕曰。食不得入。是有火也。食久反

出是無大也。食不得入。先用散結清中飲。門後

用利膈豁痰湯。食久反出。用六君子湯。參末苓加

黃連炒萊更炮薑白豆蔻藿香。痰飲阻滯。脉結

瀉者。利膈豁痰湯。本或清咽含化丸。本利膈丸

陰火冲上。食不得入。尿洪大。而數。滋陰清膈飲。本

加枇杷葉倍蘆根。飲食不思。大便不實。吞酸噎

腐。食久不化。是為脾胃虛寒。補真丸。發熱煩熱。

身惡風寒。腹喜熱。食手足俱冷。胸滿腹脹。是內真

寒。而外假熱。附子九。或八味丸。熱地山藥山萸

治大還 醫學近編 噎膈 九 貞白堂

飲食起居。七情虧損。脾胃痰飲停滯。六君子湯。參末

茯苓加桔梗木香 鬱結傷脾。歸脾湯。參末苓歸

甘艸姜棗。加桔梗枳殼。七情鬱結。胸背引疼。脉

沈而濇。四磨湯。本沉枳 加黃連梔子貝母香附蘇

子。大怒血苑於上。積在胸膈。碍氣升降。津液聚

為痰飲。二陳湯。陳半加白芥子香附韭汁桃仁泥

五靈脂 悲怒傷肝。小柴胡湯。柴苓參加茯苓香

附梔子。咽喉閉塞。胸膈痞悶。屬氣滯者。利膈豁

痰湯。本加白豆蔻。食物下咽。屈曲白腐而下。梗

滯作癰。多是瘀血。以韭汁調桃仁泥。大黃莢水酒

化。徐徐嚥之。若過用行氣之藥。胸膈痞悶。六君

子。加川芎當歸。大便燥結。糞如羊屎。屬血熱者。

四物湯。熟地加條芩枳殼桃仁生地。若過用通

利之藥。或過用香燥之劑。致血液耗竭。而愈結者。

四物湯加參朮。膈氣嘔而不出。聲者。屬虛。此名

反胃。宜溫不宜寒。經云。形苦志苦。病生於咽。益

蓋憂愁思慮。則氣結不舒。故聚於咽。噎而為病也。

子和云。三陽結。謂之膈。三陽者。大小腸膀胱也。小腸

證治大還 醫學近編 噎膈 十 貞白堂

熱結。則血脉燥。大腸熱結。則便不通。膀胱熱結。則

津液涸。三陽既結。則前後秘澇。下既不通。必反而

上行。所以飲食不下。縱下而復出也。此陽火不下

推而上行也。

張雞峯云。噎膈。是神思間病。惟內親自養。薄滋味。忌

香燥。戒鬱怒。可獲全安。若氣血兩虛。口吐涎沫。糞

如羊屎。六脉緊澇。皆不治也。

劉宗厚云。噎膈之症。皆由氣聚成積。自積成痰。痰積

之久。血液俱病。以其為病在咽。在膈。故立噎膈二

者之名。嚴氏主化痰下氣。夫氣之不下。痰之不下。必有為病之因。苟不治其本。而專用香燥之藥。治其標。痰氣何由而自下也。

按噎膈皆起於暮年之人。其屬血乾也。明甚。蓋血枯則無以制火。火熾則津液脂膏。因火成痰。水穀道路。因火乾稿。故痰火窒塞胸膈而成噎膈也。其中年之人。偶有病噎者。此則多屬鬱怒憂思所致。夫鬱怒則氣滯。憂思則氣結。痰因氣聚而日生。氣因痰碍而愈結。故為噎膈。反胃也用藥之時。勿宜執

證治大遺

醫學近編 噎膈 十一 貞白堂 卷之十二

滯痰涎上阻。微用酸苦湧出。因而治下。藥勢易行。燥結久閉。微用蜜導通幽。因而潤養。則開局自透。若鬱滯既久。則壅塞堅頑。不用開結軟堅之藥。遽爾補養。吾恐痰因補而愈多。氣由補而愈塞矣。切見世人治噎膈。非用香燥之劑。即用牛羊之酪。豈知香燥能助火耗血。酥酪能滯氣生痰。求其病愈。不亦難乎。

陳三農曰。噎氣有氣隔。血隔。痰隔。治隔先當開氣。隔開關。小茴香。烏藥。檳榔。血隔開關。當歸。烏藥。枳

殼。檳榔。沈香。桃仁。紅花。痰隔。用半夏。附子。開胃可治者。宜理脾胃。溫肺。用補中益氣湯。加附子。養烏藥。止用一錢。大便如羊屎者。此陽陷于陰。而陰氣

絕矣。亦用補中益氣湯。加升提調理。俱按內傷血。隔吐時。胸膈痛連心背。此因積血在于膈中也。氣行則血行。宜用氣藥。二陳。加川芎。當歸。檳榔。枳殼。沈香。梔子。生姜。順氣降痰。痰膈膠固稠粘。痰積胸中。二陳。加白芥子。檳榔。枳實。水荳蔻。生薑。導痰順氣。又曰。膈氣中焦無火。惟熱在上焦。不用溫。暖。安能

證治大遺

醫學近編 噎膈 十二 貞白堂 卷之十二

開胸膈。上焦宜清。中焦宜溫。食積停痰。氣實之人。二陳隨所傷之物。加消導。傷酒性熱。黃連少加。用之。氣虛人。六君子加砂仁。木香。三門不通。即成膈氣。凡膈氣病。由脾胃不足。陽氣在下。濁氣在上。故痰氣壅塞膈上。而飲食難入也。若脉右手大于左手。宜補中益氣湯。若脉弦。宜建中湯。脉滑。見脾胃不足之症。宜六君子湯。若脉寡弱。不惟無胃氣。亦不見病氣。此不治之症也。

梅核氣

楊核氣由陰而氣不歸源。治痰治火。治其標也。宜四
物湯加黃柏知母炒山梔烏藥枳殼導火歸源以
治其本。

梅核氣乃噎膈之漸也。用四七湯加人參桂枝白芍
半夏各一錢乾姜三分細辛二分。下氣散核。溫中
升陽。非細辛之升陽。則上焦痰氣焉得下降。
按梅核氣皆因陰血不足所致。蓋三陰至項而還。三
陰虛則陰妄動。故痰火交結於咽喉也。曾用四物
加丹皮知柏山梔其驗。

證治大還

醫學近編
卷之十二

梅核氣

圭

貞白堂

醫按

陳三農治一老人患膈氣。飲食不下。大便乾燥。六脉
浮大而硬。用烏藥四分。小茴香炒一錢研末。肉湯
調下二錢。飲食即進。三服後用烏藥三分陳皮蘇
梗杏仁各五分。薏苡仁錢半。煎服而愈。

治一中年婦患梅核氣。用二陳加芎歸梔連枳實烏
藥瓜蒌旋覆花香附桔梗。十數劑而愈。

山氏患咽喉噎塞如梅核。時時噎氣。足冷如冰。用散
結化痰湯。十數劑固效。細思之。此陰火也。三陰至

項而還。陰虛火炎。故噎氣咽塞足冷耳。用滋陰清
膈飲數劑諸症悉愈。

一士膈噎嘔吐。或與清火或與疎通。或與化痰散鬱
之藥。半載愈甚。余曰。氣口無力。兩尺遲難。脾腎交
虛之論也。脾虛則升降失職。而痰起中焦。腎虛則
真火衰微。食難運化。與白朮五錢炒焦色。半夏二
錢炮姜二錢沈香一錢。二劑而痊。

散結化痰湯

秘方

治氣留咽噎。有如梅核。俗名梅

核氣。此噎膈之漸也。

證治大還

醫學近編
卷之十二

梅核氣

古

貞白堂

黃連

姜汁

梔子

炒

香附

童便

貝母

撫芎

半夏

橘紅

蘇葉

青黛

枳殼

鳳尾草

白豆蔻

些

生薑

嘔吐加枇杷葉

利膈豁痰湯

秘方

治氣結痰壅。隔噎飲食不下。

半夏

橘紅

枳實

檳榔

沈香

桔梗

瓜蒌

黃連

梔子

炒

香附

製

細茶

白芥子

石膏

初服二三貼

加蘇葉麻黃

散結清中飲

秘方

石膏

三錢

細茶

二錢

桔梗

二錢

山查

二錢

麻黃

七分

香附重便沒一錢五分 藿香 葛蒲 紫蘇各五錢 陳皮一錢

共為細末水二鍾煎三沸分二三次飲忌硬飯

滋陰清隔飲 治陰火上冲食不得入脉洪數者兼

治血虛有火咽喉噎塞如梅核。

黃柏鹽水炒 黃連姜汁炒 黃芩少 梔子炒 當歸 芍藥

生地 甘艸入童便汁

枇杷葉散 治胃寒反胃。

枇杷葉 白豆蔻 蘇子 厚朴 陳皮 半夏

檳榔 良姜些 杵頭糠 白芥子 肉桂些

證治大還 醫學近編 梅核氣 圭 白自堂

丁香些 人參 茯苓 藿香 沈香些 生姜

參芪苓附散 治脾胃虛寒反胃。

人參 附子 茯苓 黃芪 粉草等分 鹽湯

點服三錢

神功散 治血滯胸腹作痛噎膈

五靈脂炒 莢朮 桂心 姜黃 芸臺子各五錢

酒下二錢

大半夏湯 治反胃嘔吐不止

半夏二合 人參三錢 白蜜一兩 生姜七片 水二

升和藥二百餘遍煮藥分為二服

香砂胃氣湯

香附 砂仁 陳皮 青皮 白朮 厚朴

檳榔 茯苓 甘艸 半夏 白豆蔻 生羌

臨服入蜜一匙木香汁三四匙

化滯和中湯 治脾胃虛弱飲食過傷胸膈噎塞食

不運化。

白朮 枳實麵炒 半夏 陳皮 茯苓 砂仁

黃連炒 厚朴姜製 神麴炒 山楂 麥芽炒 甘艸

證治大還 醫學近編 梅核氣 圭 白自堂

生薑

滋血潤腸湯 治血枯及死血在膈飲食不下大便

燥結。

當歸 芍藥 生地 紅花 桃仁 大黃酒洗

枳殼麵炒 韭汁

潤腸膏 治噎膈大便燥結食入反出。

威靈仙新者四兩 生薑四兩 白蜜四兩 煎

麻油二兩 同入銀石器內熬膏如餛飩時時挑食

之

<p>雄黃二荳丸 治反胃噎食</p> <p>烏梅<small>肉三錢</small> 礞砂<small>雄黃各二錢</small> 乳香 百草霜<small>各五錢</small></p> <p>萊豆 黑豆<small>各四錢</small> 用烏梅搗丸彈子大每一丸嚥化若有微碍一二日再服一丸</p>	<p>瓜萸實丸 治噎膈胸膈痞悶痛徹背脇喘急妨悶</p> <p>瓜萸<small>二枚</small> 枳殼<small>麵炒</small> 桔梗 半夏 青黛 黃連<small>各一兩</small> 姜汁和米糊為丸</p>	<p>桐子大</p> <p>厚朴<small>姜製一兩</small> 木香 檳榔<small>各七錢五分</small> 滴水為丸梧</p>	<p>證治大選</p> <p>醫學近編 梅核氣 卷之十二 七 貞白堂</p>	<p>人參 當歸 藿香 枳實<small>麵炒</small> 大黃<small>酒蒸各一兩</small></p>	<p>急脾胃壅滯</p>	<p>人參利膈丸 治噎膈胸中不利大便燥結痰嗽喘</p>	<p>用大黃石膏等分蜜丸嚥化</p>	<p>連翹 甘艸<small>各一錢五分</small> 薑汁捏成膏含化 一方</p>	<p>化硝 蘇藥 蘆根 桔梗<small>各二錢五分</small> 杏仁 訶子</p>	<p>半夏 貝母<small>各一兩</small> 大黃 酒蒸 橘紅<small>各五錢</small> 茯苓 風</p>	<p>核氣用七氣湯藥入咽即過病所宜以此丸含化</p>	<p>治喉間有物咯不出嚥不下俗名</p>
--	--	---	--	--	--------------	-----------------------------	--------------------	---	--	--	----------------------------	----------------------

<p>雄黃 五靈脂 青黛 猪膽汁為錠紅水下</p>	<p>五噎丸</p>	<p>礞石<small>各五錢</small> 白豆蔻 沉香<small>各三錢</small> 蜜丸嚥化</p>	<p>一兩 貝母 青黛 枳殼<small>各一兩</small> 桔梗<small>各一兩</small> 玄明粉</p>	<p>瓜萸<small>新鮮肥大者三枚</small> 大黃 酒蒸 黃芩 酒炒 黃連 薑汁炒</p>	<p>利膈豁痰丸</p>	<p>龍花 雄黃<small>等分</small> 錠水和蜜為丸彈子大嚥化</p>	<p>聖花丸 治噎食病用此殺虫</p>
<p>蘇子研細二錢橘紅二錢五分麥冬去心五錢白芍酒炒四錢枳殼去毛刷淨蜜炙三大片山查肉三錢白豆蔻仁四分先呷下人參三錢逆水蘆根汁一大盞河水一碗半同蘆根煎至八分加姜汁三匙竹瀝一杯服</p>	<p>證治大選</p> <p>醫學近編 梅核氣 卷之十二 文 貞白堂</p>	<p>神仙倒取氣法 治隔氣滴水不下</p>	<p>金頂砂<small>色如麵以水濕之即黃紙隔中有</small> 鵝脫 鷹爪 兔腦 骨 啄木舌<small>五分</small> 四味俱用陰陽瓦炭火焙存性為末聽用 鳳仙根 明天麻 絲瓜上細藤</p>				

馬齒莧 俱用九蒸九晒採為末。以上俱用一錢
加朴硝一錢入小口瓶內用無灰酒一斤二兩密
封口外以麴固之用水一鍋入瓶鍋內四圍煖緊
上用鍋蓋蓋之煖一炷香取出埋土中一宿明早
取出噴熱開瓶口以病者口對瓶口吸氣七日日
三次三日而愈。

神效沈香丸又名聚寶丹 治反胃嘔吐飲食不通
此是胃脫寒痰結阻。

真沈香 二錢 真麝香 八分 血竭 一錢 乳香 一錢

證治大還

醫學近編 梅核氣 卷之十二 真白堂

宿砂仁 二錢 木香 二錢 玄胡索 一錢 沒藥 五分

辰砂為衣糯米糊丸燒酒磨服

治隔氣梅核氣。

猪牙皂 末三兩 大黃 一兩 麝香 二錢 蜜丸芡實大

每服一丸姜汁調下

梅核氣方

半夏 南星 瓜蒌 青黛 黃芩 一兩 橘紅

枳實 青皮 各七錢 香附 一兩 砂仁 白豆蔻

桔梗 甘州 各五錢 共為末蒸餅丸

又方

茯苓 厚朴 半夏 陳皮 蘇梗 青皮

枳殼 砂仁 南星 神麴 檳榔 益智

白豆蔻 姜五片水煎服

治火上升有痰留滯喉間如有核上宜降氣清火

蘇子 研二錢 橘紅 三錢 貝母 三錢 括萎根 三錢 白茯苓

三錢 麥冬 五錢 白芍 三錢 酒炒黑連翹 一錢 黃柏 錢半

五味子 一錢 水煎加竹瀝服

翻胃方

證治大還

醫學近編 梅核氣 卷之十二 真白堂

人參 白朮 茯苓 甘州 陳皮 白豆蔻

白芍藥 薑水煎此藥溫肺養脾久服有效服十

數劑不效者因胃生肺肺氣虧損也死不治

金匙散 出馬氏

老薑以蒲包包之三月三日浸糞缸中至六月三

日取起曬乾螻蛄取活者以線繫懸當風處二味

等分白滾水送下一錢三四服其開自開後隨症

調治。

隔悶散 枳殼去瓢入皮硝巴豆於中合定以線縛

之煮熟去皮硝巴豆爲散。火酒下五分。壯實者一錢。一方以黃丹入狗胆中。陰乾爲丸。如圓眼核大。姜湯下。又方用牙皂半夏麝香。每二分入粥內煮食之。

又方 出慎齋

梨一枚去子。入五靈脂末一兩。濕紙包裹。火內煨熟。取靈脂爲細末。木香沈香陳皮各三錢。附子煮烏藥二錢。半黃五分。入前開關散三錢。煉蜜爲丸。如圓眼核大。酒下一丸。

證治大要

醫學近編

梅鑑

辛

貞白堂

又方用皂芽去皮。弦子一斤。紅棗去核一斤。河井水各十碗。煮至一碗。再用二水。各五碗。煮至一碗。再用二水。各三碗。煮至一碗。三次合煎。成膏。每用三四匙。白湯調服。則痰從口中流出。或從大便泄出。或流散四肢。而胸膈自開豁矣。後用六君子湯調養。

效方

五藥檀 山梔 姜炒 馬蹄香 廣木香 草果 枳實 炒 木通 桔梗 甘草 當歸 白豆蔻

陳皮 分五

治噎膈藥方

用真阿魏初服半分。逐釐加至一分止。不可多服。燒酒一小盃送下。

又方 疝隔或痰盛飲食難進。用鹽湯半碗。隨用松樹根下青皮去泥刮下煎湯服。頃卽吐痰。反胃百藥不效。以鹽尿飲之良。

痰氣壅結胸膈反胃方

半夏 南星 枳實 天花粉 烏藥 檳榔

證治大要

醫學近編

梅鑑

辛

貞白堂

蘇梗 桔梗 山梔 白芥子 橘紅 甘艸

薑

溫中養胃湯 治氣虛中滿及鼓脹水脹單腹脹效

方

人參 姜汁炒 白朮 蒼朮汁炒 神曲 炒黃 白芍 桂枝炒 半夏

陳皮 茯苓 薏仁 各一錢 肉桂 七分 黑姜 六分 吳

萊苳 七厘 甘艸 二分 水腫加澤瀉八分 鼓脹

加水香八分

一方以野田瓜燒存性陳本陽調服
一方以多存此散乾薑調服侯平進以養血順氣之劑

乳蛾

一邊有白泡腫痛或紅者名單乳蛾兩邊有者名雙乳蛾生于關上者易治關下者難治初起作寒熱須荆防敗毒散散之不作寒口乾燥穢氣蒸熱甚者辛涼解毒

玄參 甘桔 連翹 薄荷 牛蒡子 歸尾 赤芍之類熬浮于上內以酸味收之

雄黃 鬱金 各五錢 生二錢 半 白礬 錢半 膽礬 五錢 爲末吹喉

證治大還

醫學近編 卷之十二

乳蛾

頁白堂

玄參散 玄參 一兩 升麻 麝香 大黃 各半兩

甘草 水煎時時含呷此亦治懸癰痛不下食即

會壓垂長懸而壅塞妨礙飲食是也一法用白礬

一兩燒灰鹽花一兩共研細以筋頭點腫處立消

俗云吊下咽喉用鹽點

乳蛾實熱結滯腫塞不開宜從治粉香散主之

白礬 三錢 巴豆 三粒 去油皮 輕粉 麝香 各少許

右于鐵器中燒礬沸時入巴豆在礬上待枯去巴

豆和三味研細吹喉中

乳蛾紅腫不消杜牛膝根紅者研爛男加女乳汁女

用男乳調納鼻中即前破汚血法

黑牛膽 一個 膽礬 三錢 硼砂 二錢 山豆根 一錢

右爲末入膽內懸陰處吹咽中

華陀危病方 治喉風喉閉其症先兩日胸膈氣

急出氣短促漉然咽喉腫痛手足厥冷氣急不通

頃刻不治

巴豆七粒 三生四熟生者去殼炒存性 雄黃 皂子大明研熟者去殼炒存性

鬱金 一個 研末 三味研細每服半匙茶調細呷

證治大還

醫學近編 卷之十二

乳蛾

頁白堂

如喉咽塞用小竹管納藥吹喉中須臾吐利即醒

如無前藥用川升麻四兩剉碎水四碗煎一碗灌

服又無此用皂角三椀槌碎搗水一盞灌服或吐

或不吐即安

走馬痺喉死在須臾用巴豆去皮綿紙微裹隨左右

塞于鼻中立透如左右俱有者左右各塞一粒巴

豆乃斬開奪門之將熱則流通雖是以熱攻熱自

不妨也

咽喉門

經云一陽一陰結謂之喉痺一陰乃手厥陰心包絡之脈一陽乃手少陽三焦之脈二脈金絡于喉氣熱內結故爲喉痺喉主天氣咽主地氣地氣通于喉咽即咽之低處也咽喉者水穀之道路也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者聲音之戶也懸雍者音聲之關也張子和云咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其用各異喉以納氣故喉氣通于天咽以納食故咽氣通于地會厭管乎其上以證治大選

證治大選

醫學近編

咽喉

貞白堂

開關掩其喉則其食下不掩之其喉錯必舌抵其齦則會厭能閉其喉矣四者交相爲用闕一則飲食廢而死矣
三農曰經云喉痺者謂喉中呼吸不通言語不出而天氣閉塞也云咽痛者噎痛者謂咽喉不能納唾與食而地氣閉也云喉痺咽噎痛者謂咽喉諸病天地之氣金閉塞也蓋病喉痺者必兼咽噎痛病咽噎痛不能兼喉痺也今喉咽俱病方並入喉痺門中

平鐵荆芥湯 咽喉腫痛語聲不出噤之痛甚

荆芥 五錢 桔梗 二兩 甘草 一兩 每服四五錢水

煎食後服 按此即甘桔湯也海藏云治咽痛

以甘桔湯加大力子竹茹妙

本事方 治中風急喉痺欲死死者

白蠶蚕爲細末生薑自然汁調下喉愈

寶鑑馬鞭草散 治喉痺咽腫連頰吐氣數者

馬鞭草 本草云味辛涼破血主痼癖血痺通月經搗自然汁噉一合許

即愈

證治大選

醫學近編

咽喉

貞白堂

孫召先生方 治急喉閉

猪牙皂角 白礬 黃連 各等分 新瓦上焙乾爲末

每用五分吹入喉中吐出膿血立愈

急喉痺其聲如鼯有如痰在喉中响者此爲肺絕之

候速宜人參膏救之用竹瀝姜汁調下獨參湯亦

可若服之早者十全七八次則十存三四遲則十

不救一也

丹溪曰喉痛并瘡多屬虛火遊行無制用人參黃柏

蜜炙荆芥氣虛人參竹瀝血虛四物竹瀝 咽喉

燥痛四物湯加桔梗荆芥黃柏知母立止。喉舌之疾皆屬火熱雖有數種之名輕重之異乃火之微甚故也微而輕者可以緩治甚而重者惟用鍼砭刺血最為上策。

治喉痺 用青艾汁灌下愈

喉痛必用荆芥陰火炎上必用玄參

又方 茜草根一兩 此所謂治血中之火也

咽中瘡腫 草麻子一粒 朴硝一錢 同研新汲水

作一服連進二三服效

證治大要

醫學近編 咽喉 三 貞白堂

本事方利膈湯 虛損上壅脾肺有熱咽喉生瘡

雞蘇葉 荆芥 防風 桔梗 人參 甘草

大力子炒各一兩 為細末每一錢沸湯點服 如咽

痛口瘡甚者加蠶蚕一兩

東垣桔梗湯 咽腫微覺痛聲破季冬用之

麻黃五分 桔梗 甘草各一錢 黃芩三錢 白僵蚕三錢

馬尾勃一兩 桂枝少許 當歸身 水二鍾煎一

鍾食後稍熱徐徐呷之

三因發聲散 咽痛煩悶咽物即痛不宜寒涼藥過

泄之此煩悶乃虛熱也

瓜蒌一枚 白姜蚕微炒五分 桔梗七錢 甘艸炒錢

右為細末少許乾摻咽喉中若腫痛左右有紅或

止一邊紅紫長大水米難下用此一錢朴硝一錢

和勻摻喉中咽津如喉中生赤腫或有小白頭瘡

用前散一錢七白礬細研五分乾摻

三因蜜附子法 治感寒咽閉不能咽

大附子一枚生去皮臍切作 以附子片塗蜜炙用以効用為度已上皆散寒之劑也

證治大要

醫學近編 咽喉 四 貞白堂

丹溪治咽痛諸藥不效者此非咽痛乃是鼻中生一

條紅線如髮懸一黑泡大如櫻珠垂挂到咽門而

止口中飲食不入惟用深取土牛膝根獨條肥大

者搗碎入好醋三五滴同研細滴入鼻中二三點

即系斷珠破吐出瘀血立安此法漱口凡乳鵝喉

患按治喉疾藥皆大同小異不過疎風清熱散毒破

血激痰而已明乎此則凡單鵝雙鵝之症皆可類

丹溪喻化丸 治痰結核在咽必用鹹能軟堅之味

瓜蒌仁 青黛 杏仁 海蛤粉 桔梗 連翹風化散 右為末蜜丸喻化

瘡門

瘡者邪入陰部也。經云邪搏陰則爲瘡。然有二症。一曰舌瘡。乃中風舌不轉運之類是也。一曰喉瘡。乃勞嗽失音之類是也。蓋舌瘡但舌本不能轉運。言語而咽喉音聲則如故也。喉瘡但喉中聲嘶而舌本則能轉運言語也。

痰涎乘虛閉塞舌本之脉。道令人瘡。丹溪謂一人

年二十五。連日勞倦。發嗽發瘡。醫與藥三發。後

變爲發熱舌短。言語不辨。喉間痰吼有聲。脉洪數

證治大遼

醫學近編 瘡

一

貞白堂

似滑遂以獨參湯加竹瀝兩甌亮許。兩服後吐膠

痰三塊。舌本正而言可辨。餘症未退。遂煎人參黃

芩湯。服半月而諸症皆退。粥食調補。兩月方能起

一中年舌短。言語不辨。始傷寒身熱。師與傷寒藥五

帖。後變神昏而瘡。遂作體虛有痰治。以人參五錢。

黃芪當歸白朮陳皮各一錢煎湯。入竹瀝薑汁飲

之。十二日。其舌始能言語得一字。又服之半月。舌

漸能轉運言語。熱除而瘡。

足少陰脉挾舌本。凡太陰之脉連舌本。手少陰別繫

舌本。若此三脉虛。則痰涎乘虛而閉塞其脉道。故舌不能轉運言語也。若此三脉亡血。則舌無血營養而瘡。

經云刺舌下中脉太過。血出不止爲瘡。治當補氣血

一男子年五十餘。嗜酒吐血桶許。後不食。舌不能語。

但渴飲水。脉畧數。與四物各一兩。參朮各二兩。陳

皮一兩半。甘草二錢。入竹瀝童便薑汁。至二十餘

帖。乃能言。凡此三脉風熱中之。則其脉弛縱。故舌

亦弛縱。不能轉運而瘡。風寒客之。則其脉循急。故

證治大遼

醫學近編 瘡

二

貞白堂

舌強舌卷而瘡。治在中風半身不收求之也。

脉要精微篇岐伯謂心脉搏堅而長。當病舌轉不能

言。

丹溪治俞繼道遺精。誤服參芪。及升浮劑。遂氣壅于

上焦。而音聲不出。用童便浸香附爲末調服。而疎

通上。以治瘡。又用蛤粉青代爲君。黃柏知母香附

佐之爲丸。而填補下焦。以治遺。十餘日良愈。本

草云。童便主久嗽失音。故治瘡多用之。由其能降

火故也。

山音聲方 訶子泡去核木通各一兩甘草半兩用

水三升煎一升半生薑地黃汁一合再煎數沸放

溫分六服食後日三服訶子治逆氣破結氣水通利九竅治肺癰其當

訶子湯 治失音不能言語

訶子四兩半桔梗一兩半甘草二寸半右末每

服二錢童便一盞水一盞煎至七沸溫服甚者不

過三服愈桔梗通利肺氣訶子順肺導氣童便降火其速

又方 桔梗三兩大訶子四箇甘草炙二兩每服三四

錢水煎入砂糖一小塊不入童便時時細呷一日

證治失遺 醫學近編 卷之十二 疳 疳 貞白堂

服盡其效甚速

發聲散 治咽喉語聲不出

栝蒌皮 白姜去頭甘草 俱炒黃等分爲末

每溫酒調下三錢或生薑自然汁調下用五分綿

裹喻化咽津亦可日二三次不拘時

肘後方 咽喉卒失音不出

陳皮五兩水三升煮取一升頓服

玉粉丸 冬月寒痰結在咽喉語聲不出

半夏泡五草烏炒二桂二分爲末生薑汁浸

餅糊爲丸雞豆大每夜喻化一丸多年不愈皆效

黃帝針經中說寒氣客于會厭卒然而啞此藥主

之

蛤蚧丸 治肺間邪氣胸中積血作痛失音并治久

欬失音

蛤蚧一對去嘴足溫水浸去訶子煨阿膠炒生地

麥門冬北細辛甘草炙各五錢爲末蜜丸棗子

大每食後喻化一丸

千金方 暴失音語聲不出

證治木遺 醫學近編 卷之十二 疳 疳 貞白堂

杏仁泥 姜汁 砂糖 白蜜各一五味子

紫苑各三通草 貝母各四桑白皮五右水九

升煮五味紫苑通草貝母桑皮淨三升去查納杏

仁泥薑汁蜜糖微火攪煎取四升初服三合日再

服一合後稍加

通聲膏

五味子 款冬花 通草各三人參 石菖蒲

細辛 桂心 竹茹各二杏仁一白蜜二棗膏

薑汁一酥五水五升微火煎三上三下去查納薑

汁麥骨脂蜜煎。今調和酒服如棗大二丸。

丹溪治咳嗽聲嘶者。此血虛受熱也。用青代蛤粉蜜調服之。

濟世方 治失音及咯血。

槐花瓦上炒香。出火毒。三更後。床上仰臥。隨意吞之。

又方 治卒啞。

杏仁去皮尖三分桂一分研如泥和。取杏核大綿裹。含細

細呷之。日五夜三。

證治大遠

醫學近編 卷之十二 瘡

五 貞白堂

丹溪治失音。以桂末著舌下。嚥津妙。于金半門金思聖惠方同

內侍曹都使。新造一宅。落成入居。半月飲酒大醉。臥

起失音。不能語。召孫至診曰。因新宅故得此疾耳。

半月常愈。但服補心氣薯蕷丸。治濕用川芎。細辛。

又十日。其病漸減。二十日全愈。曹既安見上。問誰

治曰。孫兆即中。上召問曰。曹何疾也。對曰。凡新宅

壁上皆濕地。亦多陰人。乍來。陰氣未散。曹心氣素

虛。飲酒至醉。毛竅皆開。陰濕之氣。乘虛而客。心經

所以不能語。臣先用薯蕷丸。使心氣壯熱。然後以

川芎細辛去其濕。所以能語也。

靈樞經曰。黃帝問于少師曰。人之卒然憂悲。而言無

音者。何道之寒。何氣出行。使音不彰。願聞其方。少

師曰。咽喉者。水穀之道路也。喉嚨者。氣之所以上

下者也。含厭者。聲音之戶也。口唇者。音聲之扇也。

舌者。音聲之機也。懸雍垂者。音聲之關也。頰桑者

分氣之所泄也。橫骨者。神氣所使。主發舌者也。故

人之鼻涕。洞出不收者。頰頰不開。分氣失也。是故

厭小而薄。則發氣疾。其開闊利。其出氣易。其厭

證治大遠

醫學近編 卷之十二 瘡

六 貞白堂

大而厚。則開闊難。其氣出遲。故重言也。人卒然無

音者。寒氣客于厭。不能發。發不能下。至其開闊不

至。故無音。黃帝曰。刺之奈何。岐伯曰。足之少陰上

繫于舌。絡于橫骨。終于會厭。兩瀉其血脉。濁氣乃

辟。會厭之脉。上絡任脉。取之天突。其厭乃發也。

胎前產後瘡。

素問黃帝曰。人有重身九月而瘡。此為何也。岐伯曰。

胞之絡脉絕也。帝曰。何以言之。岐伯曰。胞絡者。繫

于腎。少陰之脉。貫腎係舌本。故不能言。帝曰。治之

奈何此伯曰無治也當十月復

郭氏論產後不語者何答曰人身有七孔三毛產後

虛弱多致停積敗血閉于心竅神志不能明心

氣通于舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語但服

七珍散

七珍散 產後敗血閉塞心竅令人不語

人參 石菖蒲 生地 川芎 各一 細辛 防風

辰砂 另研各 爲末每服一錢薄荷湯調下

胡氏鳳丹 產後閉目不語

證治大遺

醫學近編 卷之十二 婦

七

頁白

白礬研末每一錢熱水調服

陳氏醫學近編 卷之十三

雲間陳 治三農甫述 男

枳璣先 校 師柴羔愚

三韓張 鏞元聲甫訂 門人 范 崧壽民 閱 王 顯贊皇

鬱證

鬱脉皆沈沈澁爲氣沈細爲濕沈數爲熱沈滑爲痰

沈而便紅爲血氣口緊盛爲食丹溪云氣血冲和

百病不生一有怫鬱諸病生焉大抵諸病多有兼

證治入還

醫學近編 卷之十三

頁白

鬱者有鬱久生病者有病久生鬱者凡治病當以

鬱法參治按有氣鬱血鬱濕鬱熱鬱痰鬱食鬱雖

有六者之分皆因氣有所鬱結而不行故濕熱痰

食血亦因而停滯也使本氣暢達流行則亦何鬱

之有故治鬱宜先行氣爲主而開鬱兼之俾氣行

不失其常則氣血冲和而怫抑自爲舒暢矣

氣鬱胸膈痛兼痞悶不舒脉沈澁宜木香調氣散

門加沈香 濕鬱遍身走痛或關節間痛遇陰雨

則發脉沈細宜除濕湯 二水卦陳亦扶半 夏神曲蒼香甘州加防風

治熱鬱五心煩熱目昏便赤脉沈數宜先以

火鬱升散門火後以黃連梔子清之痰鬱動則喘

急痰嗽不出脉沈澀加味二陳湯血鬱四肢無

力或脇痛面青昏睡痞悶時寒時熱脉沈微當歸

活血湯門本食鬱惡食吞酸胸腹痞悶右寸緊盛

香砂平胃散門本加升提之劑以開提其氣如食在

氣上氣一升而食自下矣又丹溪治諸鬱皆以蒼

朮香附蘇芎為主濕加白朮茯苓防風熱加山梔

青黛痰加南星半夏海石橘紅氣加木香沈香青

證治大還

醫學近編 卷之十三

二

貞白堂

皮血加當歸桃仁紅花沒藥食加山查神麴子

針砂久病惡寒亦宜開鬱久鬱傷脾宜歸脾湯加

沈香

內經五鬱論

經曰木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之水鬱

折之者謂木性本條達火性本發揚土性本冲和

金性本肅清水性本流通鬱則失其性矣達發奪

泄折正所以遂其性也達之者通暢條達也或升

發或宣越或輕散皆達之之法也發之者升散之

也或升舉或消散或從治皆發之之法也奪之者

攘取之也或攻下或劫奪令無壅滯皆為奪也泄

之者瀉去之也或通利小便或疏通其氣皆為泄

也抑之者抑之制其衝逆也或制禦或伐挫或漸

殺其勢皆為折也不可拘以達為吐發為汗云云

也

醫按

丹溪治一女子許婚後犬經商三年不歸因不食困

倦如痴多向裡床坐臥此思想氣結也脾主思思

證治大還

醫學近編 卷之十三

三

貞白堂

則氣結故不食怒勝思怒則木氣升發而冲開脾

土矢往激之大怒而哭令人解之與藥一劑遂求

食病雖愈必得喜方已乃始以夫回既而果然遂

不舉

又治一室女因事忤意鬱結在脾半年不食深惡粥

飯俾食菱角棗子數枚因思脾氣實非枳實不能

開以溫膽湯加竹茹數劑而愈

又治一婦因大不如意膈滿不食累月慊甚已午間

發熱面赤酉戌時退小便數而點滴脉沈澀而盤

經按月惟數滴而已此氣不遂而鬱於胃口中宮却因食鬱而生痰遂補瀉兼施以參朮陳皮紅花少許食前與服藥行與粥食之少頃以神佑丸減輕粉牽牛細丸津下五十九晝夜二藥各進四服食進熱退七日而愈

薛立齋治一婦因事件意不食日飲清茶數碗水果數枚經水過期而少作脾氣鬱結用歸脾湯加吳茱萸數劑而安

一婦因夫遠商不歸遂不食如癡語言失次此思則證治大還

醫學近編

四

貞白堂

氣結而痰聚於心脾也以溫膽湯加黃連菖蒲沈香二三劑而愈

木香調氣散 治氣鬱胸膈痞悶

香附 撫芎 蒼朮 烏藥 枳殼 陳皮 貝

母 厚朴 蘇葉 黃連 姜炒 山梔 檳榔 桔

梗 木香 鬱甚如沈香鬱金

當歸活血湯 治血鬱脇痛面青多睡時寒時熱

香附 撫芎 當歸 薑黃 桂心 青皮 烏

藥 紅花 桃仁 丹皮 莪朮 沒藥

香砂平胃散 治食鬱胸膈痞悶體雜吞酸

蒼朮 厚朴 陳皮 香附 撫芎 神麴 山

查 砂仁 枳實 青皮 木香 蘿蔔子

越鞠化痰丸 治痰鬱動則喘急痰嗽不出

橘紅 貝母 半夏 青黛 海石 白芥子

瓜蒌仁 茯苓 香附 撫芎 蒼朮 枳殼

前胡 烏藥

流氣飲 治憂愁思慮太過陰陽之氣鬱結不散壅

滯生痰心前痞悶噎塞不通或上氣喘急或氣攻

證治大還

醫學近編

五

貞白堂

兩脇走注疼痛

半夏 橘紅 青皮 香附 厚朴 檳榔 枳

殼 烏藥 紫蘇 防風 當歸 川芎 芍藥

木通 茯苓 甘艸

散滯氣湯 治憂愁氣結中脘腹皮底微痛心下痞

悶不思飲食

當歸 陳皮 柴胡 半夏 香附 木香

紅花 甘艸 生薑

越鞠丸 丹溪 解諸鬱治鬱抑氣滯胸腹痞滿不思

飲食

香附 撫芎 蒼朮 梔子 神麴 水滴為丸

氣鬱則痰滯宜加貝母半夏麴烏藥木香芥子

香附丸 治抑鬱憂思傷脾不食

芍藥 酒炒 黃連 姜炒 香附 甘艸 入青六九末

姜汁糊丸

六鬱湯 開鬱消痰順氣行血化食

香附 撫芎 蒼朮 梔子 神麴 蘿蔔子

山查 半夏麴 牽牛 二兩 五靈脂 莖朮

證治大還

醫學近編 卷之十三 諸氣 一 貞白堂

海石 橘紅 神麴糊丸

諸氣

喜則脉散怒則脉弦悲則脉細恐則脉沈憂則脉濡

驚則脉動思則脉短沉滑兼痰沈瀉為鬱沈為氣

沈氣極則伏長則氣旺代則氣衰細則氣少天素

脉云怒則肝木弛張木氣奮激肺氣乘之脉必弦

瀉喜則神庭融洩火氣赫曦腎水乘之脉必沈散

思則意舍不寧土氣凝結肝木乘之脉必洪弱憂

則魄門不閉金氣滯滯心火乘之脉必洪短恐則

志室不運水氣旋怯脾土乘之脉必沈緩此五志

動不以正傷所不勝勝起乘之侮反受邪也

劉宗厚云人身之氣常則導引血液升降三焦周流

四體捍衛中和榮養一身氣何常病於人也惟五

志之間發七情之交攻乖戾失常斯清者變而為

濁行者遏而反止外失衛護內失健捍肺不主持

妄動不已則變而為火矣何也氣本屬陽反勝則

為火也河間曰五志過極皆為火也丹溪曰氣有

餘便是火氣變為火有升無降燔灼中外致血液

證治大還

醫學近編 卷之十三 諸氣 七 貞白堂

稽留為痰為積為痞為脹為喘逆為噎塞變化多

端難以枚舉治者凡遇氣動於痛作之時即以辛

溫散之稍久即以辛平和之辛寒折之或於苦寒

藥中加辛溫升散之劑寒治其火辛開其鬱斯本

末兼該矣所以治氣用辛香燥熱之劑但可切滯

氣冲快於一時以其氣久鬱滯暫行開發耳若不

佐以制伏則以火濟火未有不增熾者且肺受火

邪子氣亦弱降令不行火無以制相扇妄動燥水

散元一旦火氣狂散則喘急死者有矣又局方發

揮云、冷者高陽生之謬言也。蓋氣屬陽、無寒之理。病人自覺冷氣、自下而上者、非真冷也。上升之氣、自肝而出、中挾相火、自下而上、其熱為甚。火極似水、陽亢陰微也。或謂氣無補法、以其為病、痞悶壅塞、似難於補、不思正氣虛不能運行、所以為病。壯者氣行則已、怯者着而成病。氣虛不補、氣何由行。故壯實而氣為病者、積則削之、滯則行之、鬱則發之、熱則清之、升之散之、調之運之、以平為期。若虛由七情及勞傷等因所致、則正氣元氣不足、必須補之。則氣實氣化、病邪漸除。經曰：虛則補之。是也。若至臟腑精氣已憊、天真元氣已絕、至此欲補、無能及矣。

諸治大選

醫學近編 諸氣 八 貞白堂

喜則氣散不斂、憂則氣滯不宜怒、則氣上不下、恐則氣下不上、驚則氣亂不定、悲則氣消不聚、思則氣結、不開鬱則氣痞、不行勞則氣傷、不生。方古菴云：氣病用氣藥不效、而兼補腎者、正以氣之所藏無以收、而補腎所以攝氣歸源也。丹溪云：調氣用木香、然木香味辛、能使氣上升、如氣

鬱而不達、則宜用。若陰火冲上而用之、則反助少邪矣。故必用黃柏知母、而少用木香佐之。稟受素壯、而氣刺痛者、常用枳殼烏藥。若因氣不舒而刺痛、當用木香調達之。若肥白人、氣刺痛者、常用烏藥。人參白朮、加枳殼木香、解五臟結氣。益少陰經血、用梔子炒令黑、為末、以姜汁入湯同煎飲、其效甚捷。

諸治大選

醫學近編 諸氣 九 貞白堂

戴復菴云：實熱在內、相火冲上、有如氣滯者、宜炒黃柏知母、苓連青皮。陰虛氣滯者、四物湯加玄參。香附、陳皮、黃柏。濕熱氣滯者、蒼朮、香附、滑石、苓連。腎虛不能納氣、歸源氣厥、頭疼眩暈者、補腎益氣湯。參芪扶艸、熟地、歸麥、冬。或六味地黃丸、加炒柏。勞則氣耗者、補中益氣湯。參朮、芪、升。喜樂無極、傷魄者、宜四君子湯。參朮、加麥、門冬、黃連、阿膠、五味子。喜則氣散不斂、易於健忘者、歸脾湯。參朮、朮、歸、仁、木香、艸。悲哀慟中、傷魄者、宜加減八味丸。八味丸、加常歸、川芎、木瓜、薏苡仁、煨陽思慮傷脾者、補心湯。遠志、柏仁、參、茯、歸、天、冬、桂、心。思慮過度

者四七湯門加人參、菖蒲或歸脾湯。憂愁不解

傷意者，歸脾湯。憂則氣閉，塞不行者，散滯氣湯。陳

柴半香附本香，紅花甘艸生薑。盛怒不止，傷志者，六味丸加枸

杞子。玄參怒則氣上者，四七湯門加柴胡、青皮、枳

殼、木香。香附盛怒成疾，面色青黃，兩脇滿痛者，兼

用六味丸料。恐懼不解，傷精者，滋腎丸。和知驚

恐成疾，神亂不定，心下怔忡恍惚者，溫膽湯。半枳

茹陳艸加香附、茯神或十味溫膽湯。即溫膽湯加

生薑。恐則氣下，精怯不升，下焦服者，調中益氣湯。參

證治大還 醫學近編 諸氣 卷之十三 貞白堂

艸蒼朮升，吳則氣消者，清暑益氣湯。參芪朮歸

橘皮、木香。冬神曲、葛蒼，氣鬱氣攻，刺作痛者，二陳加枳殼

升澤、青陳艸。香附姜炒、芩連，卒怒氣攻，冲脇肋痛如刀刺，不

得喘息，香薷葉、搗汁和酒飲。

論九氣動為諸證

經曰：諸痛皆因於氣，百病皆因於氣。怒則氣上，喜

則氣緩，悲則氣消，恐則氣下，寒則氣收，是則氣泄。

驚則氣亂，勞則氣耗，思則氣結，怒則陽氣逆上，而

不乘脾，故甚則嘔血及衄泄也。喜則氣和，志達

榮衛通利，故氣緩也。悲則心系急，肺布葉舉，而上

焦不通，榮衛不散，熱氣在中，故氣消也。恐則精怯

怯則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣不行也。

寒則衛氣沈，而腠理密，氣欲於中，故氣收也。是則

腠理開，榮衛通汗，大出，故氣泄也。驚則心無所倚

神無所歸，慮無所定，故氣亂也。勞則喘息汗出，內

外皆越，故氣耗也。思則心有所有，神有所歸，正氣

留而不行，故氣結也。

經曰：有所恐懼，則神志蕩散而不收，宜益腎而壯其

證治大還 醫學近編 諸氣 卷之十三 貞白堂

志。恐者，腎氣微弱，而志衰怯也。然肝虛亦令人善

恐，又血有餘則怒，不足則恐，又心虛而腎氣并之

亦恐。如人捕之，驚悸不寧，傷心，則舌黑，傷膽則目

黃，傷腎則面目青而小腹急。

夫怒傷肝，肝屬木，怒則氣并於肝，而脾土受邪，木

太過則肝亦自病，喜傷心，心屬火，喜則氣并於心

而肺金受邪，火太過則心亦自病，悲傷肺，肺屬金

悲則氣并於肺，而木受邪，金太過則肺亦自病

恐傷腎，腎屬水，恐則氣并於腎，而火受邪，水太

過則腎亦自病。思傷脾。脾屬土。思則氣并於脾。而
 骨水受邪。土太過則脾亦自病。寒傷形。形屬陰。寒
 勝熱。則陽受病。寒太過則陰自亦病。其傷氣。氣屬
 陽。熱勝寒。則陰受病。熱太過則陽亦自病。凡此數
 者。內經以五行相勝之理。互相為治。故悲可以治
 怒。以悽慘苦楚之言。惑之。喜可以治悲。以譁浪狎
 泥之言。娛之。恐可以治喜。以遽迫死亡之言。怖之。
 怒可以治思。以污辱欺罔之言。觸之。思可以治恐。
 以慮彼忘此之言。奪之。其可以治寒。寒可以治熱。
 證治大還 醫學近編 諸氣 卷之十三 三 貞白堂
 逸可以治勞。習可以治驚。驚者。以其忽然而遇也。
 習見習聞。則弗驚矣。

醫按

子和治一婦。久思不已。遂不眠。令觸其怒。大怒後。即
 熟睡。此怒勝思也。又嘗擊拍門窓。使聲不絕。因驚
 畏。魂氣飛揚。此驚者平之也。又嘗以巫妓跳躍
 以治人之悲。結者。此喜勝悲也。

治一婦。鬱怒。憂思。胸腹脹痛。甚則四肢厥冷。口噤
 冷汗。用陳湯加芍歸。藥青皮。枳殼。香附。厚朴。

蘇葉。即愈後去蘇葉。加姜炒黃連。再煎
 而安。

正氣天香湯 河間 治一切土氣。痞心。心胸築痛。婦

人性執宜。此湯導之。

香附 八兩 烏藥 二兩 陳皮 蘇葉 乾薑 各一兩

臨湯調服三錢

四七湯 和劑 治七情所傷。痰氣相結。噎塞咽喉。咯

吐不下。或中脘停痰。氣痞嘔逆。惡心。

紫蘇 厚朴 茯苓 各一錢五分 姜棗

證治大還 醫學近編 諸氣 卷之十三 三 貞白堂

蘇子降氣湯 和劑

蘇子 厚朴 當歸 前胡 半夏 陳皮

沉香 甘艸

沉香降氣湯 約說 治陰陽之氣。壅滯。氣不升降。胸

膈痞塞。咽酸妨悶。

沉香 砂仁 各五錢 香附 四兩 甘艸 炙一兩 鹽湯調

下三錢

木香順氣湯 濟生 治濁氣在上。致生填脹。

升麻 柴胡 青皮 陳皮 厚朴 蒼朮 草

豆蔻	半夏	益智	木香	澤瀉	吳茱萸
乾薑	生薑				
升陽順氣湯	和劑	治七情所傷及勞役飲食不節			
滿悶短氣兼治恐則氣下者					
升麻	柴胡	陳皮	半夏	人參	黃芪
草					
豆蔻	當歸	神麴	黃柏	甘艸	生薑
辛涼化氣湯	治一切久鬱之氣攻冲作痛				
蒼朮	香附	撫芎	梔子	蘇梗	烏藥
黃					
連	黃芩	枳殼	陳皮	半夏	當歸
證治大還	醫學近編	諸氣	南	貞白堂	
木香	磨入				
分心氣飲	治一切抑鬱之氣留滯胸膈痞悶噎塞				
陳皮	青皮	半夏	桑白皮	大腹皮	蘇葉
羌活	茯苓	木通	桂心	赤芍	甘艸
當歸和氣飲	治血凝氣滯氣刺痛				
當歸	枳殼	烏藥	香附	黃芩	木香
五磨飲	治七情鬱結氣脹痛或攻注走痛				
木香	沉香	檀榔	枳實	烏藥	俱以白酒
磨飲暴怒暴死	宜此方蓋怒則氣上上焦氣實而				

不行	下焦氣逆而不吸故宜降氣順氣也				
治氣六合湯	治血虛不能統氣致氣逆行				
當歸	川芎	芍藥	地黃	檀榔	木香
蠲痛散	治血氣刺痛				
荔枝	燒存性	香附	一兩	鹽湯調下三錢	
木香	檀榔	九	子和	散滯氣胸腹脹滿實痞氣結痛	
氣積痢疾					
木香	檀榔	青皮	陳皮	蓬朮	枳殼
黃連	黃柏	大黃	各三兩	香附	牽牛
各四					
證治大還	醫學近編	諸氣	辛	貞白堂	
滴水爲丸					
山農四製香附	治走氣痛如神				
香附	四兩鹽酒童便	烏藥	五錢	鉅肩艸	二兩
浸一日曬乾					
浸酒以汁	紫蘇	一兩	共爲末酒下一錢		
盡爲度					
又方	治遍身走氣痛				
麻黃	一兩熬膏入艸果	木香	二錢	良薑	一錢
木七錢收晒					
殭蚕	一錢	每五錢酒煎服	氣築攻冲牽牛五錢		
檀榔	二錢半爲末	蘇梗煎湯下二錢			
劉禹錫治一切結氣	壅胸膈以薑汁和杏仁煎服之				

効

一人得子時他他不快漸至痞脹四年肌肉盡削以當歸六錢韭菜子一兩香附童便炒八錢下之胸膈間若勇士猛力一擁解黑糞數升而愈

痰證

脈或伏或大或滑者痰開前脈浮弦大而實者膈上有痰眼下如烟煤色者胃中有痰歇止不勻胸腹中及經絡中有痰

王節齋云痰屬濕乃津液所化因風寒濕熱所感七證治大還

醫學近編 痰證

去

貞白堂

情飲食所傷致氣逆液濁變為痰飲或吐咯上出或凝滯胸膈或留聚腸胃或客於經絡四肢隨氣升降遍身上下無處不到病則為喘為咳為惡心為嘔吐為痞隔壅塞為開格反胃為泄瀉為飢雜為怔忡驚悸為癰瘤狂厥為癖積腫痛或胸膈間轉轉有聲或背上一片常如冰冷或四肢麻痺不仁或頭項重痛不舉或神思昏倦多睡或手足重墜頑痺或左癱右瘓或半身不遂或卒然昏悶口眼喎斜似中而實非中或四肢戰曳身如浮雲似

虛而實非虛或忽患頭項胸背手足腰膝痛不可忍或連筋骨牽引吊痛走易如注風而非風凡一切奇怪之病皆痰所為也古菴云暴病之謂火怪

病之謂痰丹溪云諸病尋痰火痰火生異症是也然致痰之由有因濕熱而生者有因風寒外束鬱

熱蒸發而成者有因氣滯而生者有因驚而得者有痛飢而得者有食積所生者有陰虛火炎而生

者有脾虛不能運化而生者然痰生於脾宜實脾燥濕又隨氣而升宜順氣為先因火盛上逆則降

證治大還

醫學近編 痰證

火為要若舊有痰積氣因痰以結滯尤當先逐去痰結則滯氣自行又須分新久輕重新而輕者形

色清白稀薄氣味亦淡咳咯易出久而重者黃濁稠粘膠結氣味鹹苦酸辣腥臊咳咯難出乾黃屬

火熱所蒸色黑屬敗血所化治法濕熱蒸發則清燥之風寒鬱鬱則疎散之氣鬱氣滯開之理之驚

者平之痛飲者逐之食積者消之陰虛者補而清之脾虛者固中氣以運之痰在膈上及在經絡間

膠固稠粘者俱宜用吐法以防風川芎桔梗芽茶

子 49-291

生薑薑汁升提其氣於無風處吐之或用瓜蒂散在咽喉間咯不出嘔不下此痰結也宜鹹藥軟堅用瓜蒌仁杏仁海石玄明粉文蛤連翹桔梗五倍子明礬薑汁蜜丸嚥化在脇下宜白芥子在皮裡膜外及四肢宜竹瀝姜汁荊瀝在腸胃間宜下用枳實甘遂硝黃之類輕則滾痰丸重則小胃丹亦不可過用利藥虛人中焦有痰胃氣亦賴所養過於攻激則脾氣愈虛痰反易生而多矣只宜固中氣以運動之熱痰多煩熱口渴面赤怔

證治大選 醫學近編 痰證 大 頁白堂

仲宜黃連瓜蒌枳實青黛竹瀝青礞石丸本門風痰多面青躁怒眩運頭風暗風癱瘓奇症宜南星白附子礞石皂莢天麻全蝎牛黃雄黃濕痰多面黃倦怠軟弱宜油炒半夏蒼白朮蛤粉南星海石茯苓興痰多面色黧黑痞塞骨痺宜二陳加丁香薑汁驚痰沃心多心痛癰疾宜妙應丸門重加硃砂菖蒲膽星酒痰多嘔酸餽雜惡心眩暈解醒湯傷酒食積痰多惡食痞悶癖塊保和丸

香附山查神曲卜 子陳白酒曲砂仁 老痰色黃成塊宜海石五倍

子玄明粉瓜蒌仁半夏香附飲痰多脇痛臂疼宜茯苓丸扶半風若流入四肢肩背痠痛兩手痺軟不可作風治宜導痰湯門加薑黃風化硝木香薛立齋云久病陰虛虛火上炎津液生痰不生血宜滋陰制相火端其本而痰自除又腎虛不能納氣歸源氣積生痰俱用六味丸之類使陰水一盛火氣下行痰涎自然隨氣下降不必於拘拘治痰等劑又氣虛有痰飲亦宜用六味丸料治之

證治大選 醫學近編 痰證 大 頁白堂

者皆當分治因痰以生諸症者如仲景救四飲五隱居論痰生異症是也因所傷而生痰者如陳無擇論七情氣鬱結聚生痰六淫外冒鬱汗成痰酒食過傷色慾無度運動失宜致生痰飲是也因痰生病者治其痰因病生痰者療其病斯能洩痰之標治痰之本矣瓜蒂稀涎散治上焦痰劑也滾痰透羅治中焦痰劑也三花十棗治中下焦痰劑也滌痰丸氣痰之劑也二陳加白朮濕痰之劑也玉壺丸星牛金花丸門風痰之劑也清氣化痰

大小醫胸膈熱痰之劑也保和丸白餅子食積痰之劑也妙香丸驚痰之劑也祛痰丸老痰之劑也隨其虛實加減用之皆能洩標治本

醫按

薛立齋治一婦咳嗽其痰上壅日去五六碗作氣虛水泛為痰用六味丸料及四君子各一劑愈

陳三農治一人痰出盈盆不止脉豁大無力此內傷不足之症用人參附子各五錢乾薑草薢檳榔枳殼一劑而愈

證治大還

醫學近編

痰證

子

貞白堂

又治一人滿口痰珠至舌尖則成大泡綿綿不絕此火熱在胃大寒在肺也用參附湯保定肺氣後以辰砂益元散瀉胃火而安

又治一人痰涎壅盛汗出不止此脾虛不能攝痰而肺失所養切不可作痰治只補脾胃為主用參朮煨薑各二錢半夏一錢煎服愈

治一婦患眩運腰痛過寅卯二時則日夜昏迷不省人事身如浮雲中脉細數弦滑細為濕數為熱弦為飲滑為痰濕熱痰快留滯胸膈隨氣升降上

湧則為眩運下墜則為腰痛沃心包致竅不通故昏不省人事至巳午時心火助其濕熱鼓激痰涎故昏痴益甚也此必痛飲所致叩之果然遂以稀涎散湧酸吳痰數升仍以舟車丸泄如屋漏水者五六次諸症頓愈繼以解醒湯數服而愈

二陳湯

和劑 治濕痰嘔吐惡心眩運心悸

半夏 橘紅 茯苓 甘草 生薑 痰結胸膈

加海石瓜蒌枳實五倍 熱痰加黃連青黛天花粉 濕痰加蒼白朮南星蛤粉 風痰加僵蚕南

證治大還

醫學近編

痰證

子

貞白堂

星天麻皂莢 食積痰加芽茶神麴山查蘿蔔子

驚痰加膽星菖蒲硃砂 寒痰加丁香 鬱痰

加貝母香附 老痰加海石五倍瓜蒌 火盛上

逆加石羔黃芩

導痰湯

濟生 治一切痰飲留積不散頭目眩運

半夏 南星 橘紅 枳實 赤茯苓 甘草

生薑

化痰寧膈散 治痰火上壅咽喉噎塞不通頭目不清

半夏 橘紅 天花粉 白茯苓 薄荷 枳殼

桔梗 梔子 黃芩 連翹 甘艸 生薑	膠胃燥熱加酒炒大黃玄明粉	流氣化痰湯 <small>濟生</small> 治氣鬱氣滯結聚痰涎哈吐不出	半夏 茯苓 紫蘇 香附 厚朴 貝母	梔子 烏藥 桔梗 甘艸	清源飲 治心脾有熱或胃中濕熱上薰吐臭痰	甘艸 桔梗 山梔 黃連 石羔 防風	瓜蒌 半夏	加味小陷胸湯 <small>秘方</small> 治熱痰留滯胸膈痞滿煩悶	證治大還 <small>醫學近編 卷之十三 庚子 主 貞白堂</small>	半夏 黃連 <small>姜汁炒</small> 枳實 <small>炒</small> 瓜蒌 生薑	潤下丸 <small>丹溪</small>	半夏 南星 黃連 黃芩 甘艸 <small>各一兩</small> 橘紅 <small>兩</small>	鹽水 滴水為丸	海石祛痰丸 <small>節齋</small> 治一切老痰頑痰	海石 <small>一兩</small> 五倍 南星 <small>各五錢</small> 半夏 <small>一兩二錢</small> 水浸	四味同黃瓜七枚搗成餅上下用青	黃芩 香附 白朮 <small>各四錢</small> 茯苓 甘艸 <small>各三錢</small>	晉礬 <small>一錢五分</small> 淡黃湯為丸
-------------------	--------------	---------------------------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------	--------------------------------------	--	--	-----------------------	---	---------	---------------------------------	---	----------------	--	------------------------------

清肺豁痰丸 <small>集成</small>	黃芩 黃連 白朮 枳實 貝母 瓜蒌仁	香附 茯苓 橘紅 <small>鹽水拌炙</small> 半夏 <small>各三兩</small> 南星 <small>二錢</small>	化痰丸 <small>丹溪</small> 治痰飲	牽牛 枳實 風化硝 <small>各三錢</small> 皂莢 <small>二錢</small> 白礬 <small>二錢</small>	蘿蔔汁為丸	礬石丸 <small>隱居</small>	半夏 南星 風化硝 黃芩 茯苓 <small>各五錢</small>	證治大還 <small>醫學近編 卷之十三 庚子 主 貞白堂</small>	礬石 <small>煅二兩</small> 神麴為丸	滾痰丸 <small>隱居</small> 攻腸胃積痰濕熱痰食積痰	大黃 <small>酒蒸</small> 黃芩 <small>各八兩</small> 礬石 <small>煅二兩</small> 沉香 <small>一兩</small>	水為丸 <small>王宇泰加百藥煎飲而降之亦妙</small>	小胃丹 <small>仲景</small> 上可取胸膈之痰下可取腸胃之痰	甘遂 <small>麵包煮</small> 大戟 <small>水浸</small> 芫花 <small>醋拌一宿炒</small> 大黃 <small>酒炒</small>	一兩 黃柏 <small>酒炒</small> 褐色 粥九粟米大芡姜湯下十九	四白丸 化痰神效兼治喉閉及小兒驚風	白礬 <small>通明者</small> 白礬 <small>醋浸炒</small> 南星 <small>二兩切片</small>
-------------------------	--------------------	---	---------------------------	--	-------	-----------------------	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------------------	---	--	-------------------	--

乾 半夏湯洗二兩 薑汁糊丸薑湯下二十九 驚

痰加硃砂 濕痰加白朮 風痰加皂莢 熱痰

加黃芩 寒痰加桂

神佑丸 子和 治濕熱痰飲變生諸症

甘遂 大戟 芫花各五錢 大黃 一兩 黑丑 二兩

輕粉 一錢 水滴為丸如菜豆大初服十九漸加

至便利止若多服不惟頓攻不開反加痛悶矣

豁痰丸 治老痰頑痰積痰濕痰熱痰

半夏 二兩切片磨水浸一宿 南星 二兩切片皂莢水浸一宿 硝石 五錢 蘿蔔水

薑治大還 醫學近編卷之十三 真白堂

白礬 五倍 白礬 海石 礞石 黃芩

枳實 茯苓 橘紅 鹽水炙 白芥子 各一兩五錢

蘿蔔汁滴丸

控涎丹 仲景 治痰飲在胸膈上下令人胸背手足

頸項腰膝隱痛筋骨牽引吊痛時時走易或手足

冷痺氣脈不通病似癱瘓

甘遂 大戟 白芥子 等分 糊丸梧子大淡薑

湯下七丸

透羅丹 玉機 治實痰

皂莢 去皮炙去微炒 牽牛 半夏 各一兩 巴豆 去油杏仁

白餅子 錢氏 治風痰驚痰癲癇驚搐用此下痰

巴豆 二十四粒水一升煮乾為度 半夏 輕粉 南星 各一錢

滑石 一錢 元米飲為餅子葱白湯下

大還 醫學近編卷之十三 疾證 真白堂

積聚

有形為積或聚或散為聚有食積有痰積有虫積有血積

三農曰積在中為痰飲在右為食積在左為死血乃丹溪確論也然胃脘有食積而病發在中者亦有肝氣與宿食相假而積在左者又不可拘泥也曾治一少年體薄弱且咳血左邊一塊不時上攻作痛左金蘆薈俱不應診其脉三部雖弦而細澀不流利因作陰虛治四物加知柏玄參牡丹皮鱉甲證治入選

醫學近編

積聚

卷之十三 一 貞白堂

剝頓愈此又陰虛似肝積也推此雖因部分名積診視之際猶當詳審病病皆然惟圓機者不昧此語

食積酸心腹痛大黃牽牛之類甚者礞石巴豆酒積目黃口乾葛根麥蘖之類甚者甘遂牽牛氣積噎氣痞塞木香檳榔之類甚者枳殼牽牛涎積咽如拽鋸硃砂膩粉之類甚者瓜蒂甘遂痰積涕唾稠粘半夏南星之類甚者瓜蒂藜蘆癖積兩脇刺痛三稜廣茂之類甚者甘遂蠲稍

水積足脛腫痛李商陸之類甚者甘遂羌花血積打撲閃腦瘀血產後不月桃仁地榆之類甚者虻虫水蛭

肉積癢癰膩粉白丁香甚者阿魏礞砂或硃刺出血河間曰腸胃之絡傷則血溢腸外與痰沫相搏復遇外寒凝聚而成積矣若于皮裏膜外苟非剖腹割腸之技何能消除但不防碍飲食抵宜養胃補中

大法鹹以軟之堅以削之行氣開痰為主積塊不可專用下藥徒損其氣病亦不去當消導使證治大還

醫學近編

積聚

卷之十三 二 貞白堂

之鎔化塊去須大補積久胃弱形羸曾經攻下不消脉弱或大無力宜養胃氣善乎潔古之論曰養正積自除辟如滿座皆君子縱有一小人自無容地而出真氣盛胃氣強積自無也乃千古至確之論

或中或右硬痛不移嘔吐飽脹或作寒熱身痛有類外感氣口緊盛或弦急為食鬱二陳導痰山查枳實神麴香附平胃有下症者枳實導滯九保和九隨症加減

五臟之積古方有五種丸皆辛散鹹軟已豆薑附棧
水等出入學者因時制宜大抵不外行氣開痰等
法猛烈恐未可驟用也

因肉食積者阿魏丸佳

惡心膈難心下痞塞忽時眩暈麻木脉沉滑為痰積

二陳海粉香附枳朮越鞠之類作丸服有火症者

滾痰丸妙

口出清水或時吐虫或偏嗜一物脉乍大乍小面上

白斑唇紅能食時痛時止為虫積上半月頭向上

證治大綱

醫學近編 卷之十三

積聚 三

頁白堂

易治下半月頭向下難治先以肉汁及糖蜜食引

虫頭向上用化虫丸萬應丸或苦楝根檳榔鶴虱

煎湯飲妙

石礮去痰積食積滌垢厥最妙

瓦礮子能消血塊大消痰積燒紅以醋淬三度醋膏

為丸治一切氣血塊癥瘕

痞塊在皮裏膜外須以二陳湯加補藥香附開之兼

二陳湯先須斷厚味為要

木香檳榔去氣積 流金膏去酒積 桃仁紅花蘇

木去血積其則用童虫水蛭 山查阿魏去肉積
牽牛甘遂去水積 雄黃膩粉去涎積

積塊方用海石三稜莪朮香附俱醋煮桃仁紅花五

靈脂之類為丸石礮白朮湯下

黃蜀根煎湯治小腹有塊曾服瀉藥止經因而血滯

成塊丹溪用此法妙入人參白朮青陳皮甘草牛

膝煎膏入研細杏仁玄明粉各少許熬飲之二服

當見塊下病重者補接之後加減調理或再行一

度去塊一二次去葵根玄明粉

證治大綱

醫學近編 卷之十三

積聚 四

頁白堂

取虫丸

胡黃連 蕪荑 雷丸 鶴虱 大黃 史君子

錫灰 三稜 蓬朮 木香 檳榔 青皮

腸中痰積行倒倉法妙但虛人不可輕試耳

三聖膏貼積用未化白石灰半斤為末瓦上炒紅提

出入桂心末五錢畧炒以米醋熬成膏厚攤烘熱

貼之

琥珀膏用大黃朴硝各一兩為末以大蒜搗膏貼之

阿膠丸 治肉積成塊

阿魏 山查 各一兩 連翹 五錢 黃連 六錢 以三味爲

細末以阿魏用米醋煮糊九桐子大每服五十丸

脾胃虛者以白朮三錢陳皮茯苓各一錢煎湯下

一方加半夏一兩以皂角水同煮透晒乾用石鹼三

錢 又一方以醋煮神麴爲丸兼連翹

又一方兼諸方而又有瓜蒌貝母南星風化硝胡連

萊菔子麥蘖麵湯浸蒸卷九服治諸般積聚皆妙

智者因病增損原無一定妙在合宜耳

大溫中丸俱因食積或痞塊而色黃肌膚虛腫飲

證治大還 醫學近編 積聚 五 貞白堂

食無味等而設藥雖稍峻對症必奏奇效藥籠中

亦不可不備蓄也方見痘門

婦人腹中有塊多屬死血

一方治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作雷鳴

膈雜眩暈身熱時作

黃連 一兩五錢半用吳茱萸 萊菔子 一兩 台芎

梔子 三錢 蓬朮 麥麴 桃仁 五錢 各

香附 童便浸 山查 一兩 右爲細末蒸餅九黍米大

每服一百丸薑湯下

一法醋煮香附一斤先浸半日煮焙乾爲末醋糊丸

醋湯下七十九治經候不調痞癥積塊頭暈惡心

加莖朮當歸各四兩俱酒浸各濟陰丸消血塊刺

痛妙

一方治婦人血塊如盤有孕難服峻藥

香附 四兩 桃仁 去皮 白朮 一兩 海石 二兩 右神麴爲丸

每服二錢白湯下

廣瀉潰堅湯治積塊堅硬如石形大如盤令人坐臥

不安中滿腹脹

證治大還 醫學近編 積聚 六 貞白堂

半夏厚朴湯治症同前見腫脹門

東垣草豆蔻丸 治酒積或傷寒冷之物胃 痛咽

膈不通

草豆蔻 煨 白朮 各一兩 大麥芽 神麴 各 黃芩

半夏 兩 枳實 兩 陳皮 青皮 乾薑 各二錢 炒

炒鹽 兩 炊餅九菜豆大每服百丸白湯下

木香通氣丸 治痰癖氣滯心腹痞悶嘔吐咳嗽

切氣滯順氣消痰進食消痞

人參 木香 各一兩 玄胡索 一兩 陳皮 牽牛 各六兩

檳榔 丁香各半兩 三稜 莢朮各三兩 半夏 茴香

木通 神麴 麥蘖各二兩 青皮

右末糊丸小豆大每服三四十九生薑湯下

千金硝石丸 磨積塊不令人困須量虛實用之

硝石即朴硝六兩 大黃八兩 人參 甘草三兩

右爲細末以三年陳醋三升置磁器中用竹片作

準每入一升作一刻先入大黃不住手攪使微沸

盡一刻乃下餘藥又盡一刻微火焚使可丸如彈

子大每服一九白湯下或丸如桐子大每服三五

證治大還 醫學近編 積聚 七 貞白堂 卷之十三

十九服後下如雞肝或如米泔赤黑色等物乃効

下後忌風冷宜微粥將息

局方妙香丸 治久年陳積方見火門

兩關脉弦急脇痛有塊是肝實也龍膏丸二錢半加

桃仁薑黃各五錢蜜丸服

勝紅丸 治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐酸

水丈夫酒積婦人血積小兒食積並妙

陳皮 青皮 莢朮 三稜二味醋炒乾薑二兩

香附二兩 右末醋糊丸桐子大每服二十九薑湯下

房勞丸 治久不愈積在左脇下如覆盆有頭足如龜

魚背久不愈積在通嘔其脉弦細

當歸 莢朮各兩 青皮一兩 莢朮 三稜

醋炙米糊丸菜豆大每服四五十丸當歸浸酒下

伏梁丸 治心之積名曰伏梁起臍上大如臂猶梁

橫架于胸間久不已令人煩心身體脛股皆腫環

臍作痛脉沉而芤

枳殼炒 茯苓 厚朴 人參 白朮 半夏 三

稜各等分 右爲末麵糊丸桐子大未飲下二十九

證治大還 醫學近編 積聚 人 貞白堂 卷之十三

作散酒下亦可

痞氣丸 治脾積在胃脘覆大如盤久不愈令人四

肢不收發黃疸飲食不爲肌膚心痛微背背痛微

心其脉浮大而長

附子半兩 赤石脂煨醋 川椒炒出 乾薑 桂心半兩

大烏頭二錢半泡 去皮脂

右末蜜丸桐子大硃砂爲衣每服十九米飲下

魚黃湯 治脾積在右脇下大如覆盆久不愈病酒

下

酒惡寒氣逆喘咳發肺癰其脉浮而毛

半夏湯泡 吳茱萸湯洗 桂心 人參 甘草炙

桑白皮炙 葶蘆各一兩 右剉每服四錢水鍾半

薑七片棗二枚煎八分食遠服

奔豚湯 治腎之積名曰奔豚發于小腹若脉狀或

上或下無時久不愈令人喘逆骨疼少氣其脉沉

甘李根皮焙 乾葛各一兩 當歸 川芎 半夏湯

四兩白芍 甘草炙 黃芩各二兩

右剉每服四錢水鍾半煎七分服

證治大還 醫學近編 續聚 九 頁白堂

茶癖

石膏 黃芩 升麻 共爲末砂糖水調下

一方食茶葉面黃

白朮 軟石膏 片苓 白芍 膽星 薄荷

共爲末糖調成膏臨睡津液嚥下

大凡偏食一物中必有虫卽以所好投之隨下虫藥

無不應手獲效

一人飲茶過度且多憤懣腹中常嘔嘔有聲秋來發

熱寒似瘧以十劑湯料黑豆煮晒乾研末棗肉和

九芥子大而以棗湯下之初服五分不動又服五

分無何腹痛甚以大劑湯飲大便五六行皆糖漿

無水時益晡時也夜半乃大下數斗積水而疾平

當其下時瞑眩特甚手足厥冷絕而復甦舉家號

泣咸咎藥峻嗟乎藥可輕哉

一法病人果有積水瘀血實者可用小胃丹行水抵

當湯行血虛者不若且以淡滲之劑加竹瀝薑汁

以治痰而於隨症藥中加桃仁韭汁之屬以活血

以漸而平慎無取旦夕之功而貽後悔也

證治大還 醫學近編 續聚 十 頁白堂

一切有餘濕熱痰火痰涎壅滯酒客膏梁實人脉滑

實有力者遇仙丹妙又治血積氣積痰癖肢節

腫痛等症

白牽牛頭末四兩 白檳榔一兩 茵陳五錢 蓬朮 三稜

俱醋炒生半炒半 牙皂炙去皮 一方加沉香一兩

右末醋糊丸棗豆大每服三錢五更時涼茶下天

明看所去之物有積去積有虫去虫小兒減半孕

婦勿服

霞天膏 卽倒倉法有人指授韓懋天爵投煎劑治

痰而遂推廣之。

用黃牯牛一具選純黃肥澤無病纔一二歲者右洗淨取四腿項脊去筋膜將精肉切作塊子如栗大秤三十斤或四五十斤于淨室以大銅鍋或新鐵鍋加長流水煮之不時攪動另以一新鍋煮沸湯旋加常使水淹肉五六寸掠去浮沫直至肉爛如泥漉去渣卻將肉汁以細布漉入小銅鍋用一色桑柴文武火候不住手攪不加熟水只以汁漸如稀飭滴水不散色如琥珀其膏成矣此即火候最要小心中

證治大遺

醫學近編 卷之十三

積聚

土

真白堂

不然
壞矣

大段每肉十二斤可煉膏一斤磁器盛之用調煎

劑初少漸多沸熱自成溶化用和丸劑則每三分

攪白麵一分同煮為糊或同煉蜜寒天久收若生

微用重湯煮過熱天冷水膏之可留三日

枳實導滯丸

保和丸 俱見傷食門

化重丸

萬應丸 俱見血門

十聚湯

小胃丹 俱見痰門

抵當湯

見血門

陳氏醫學近編 卷之十四

雲間陳 治三農甫述 男

拭幾先 校
師柴羔愚

三韓張載齡弘度甫訂

門人 范 崧壽民 閱
王 頤贊皇

發熱

弦數為熱洪數煩熱滑數心下結熱緊數寒熱流細滑疾者內熱洪浮滑緊者外熱流而緊上熱下寒浮緊滑直外熱內寒寸浮大而疾為陽中之陽病證治大遺

證治大遺

醫學近編 卷之十四

發熱

真白堂

辨諸發熱病本不同

諸病皆能發熱六情七淫內傷外感陰虛陽虛痰症瘡瘍悉皆發熱治者必須詳辨外感內傷虛熱實熱在表在裡氣分血分用藥丹溪云暴熱病在心肺積熱病在腎肝外感熱者頭痛心疾惡寒發熱左手脉緊盛內傷熱者口不知味腹中不和

寒熱間作，下體痠痛，右手脉大而無力，內外俱傷熱者。人迎氣口俱緊盛，發熱惡寒，腹不和而口不知味，煩渴，傷食熱者，胸滿惡心，嘔吐惡食，陰虛熱者，午後熱甚，咳嗽盜汗，脉數而無力，血虛發熱者，肌熱煩渴，引飲晝夜不息，脉洪大而虛重按全無，陽虛熱者，發熱倦怠，自汗背惡寒，脉隱微或大而無力，火鬱而熱者，因心火下陷於脾土，抑而不伸，五心煩熱，口苦咽乾，煩躁悶亂，血中伏火而熱者，心神煩亂，蒸蒸不安，痰飲熱證治大還

醫學近編 卷之十四 發熱 二 貞白堂

者，憎寒發熱惡風，自汗，胸膈痞滿，但頭不痛，項不強，脚氣熱者，發熱惡寒，頭寒身痛，病如傷寒，但有脚膝腫痛為異，瘡瘍亦發熱憎寒，但身有痛處，溫病熱者，發熱不惡寒而渴，脉微洪，風溫熱者，身熱頭痛，自汗多，眠陽脉浮滑，陰脉濡弱，風濕熱者，一身盡痛發熱，日晡則劇，傷風熱者，汗出身熱惡風，傷暑熱者，脉虛身熱多汗，傷濕熱者，發熱體痛身黃，表熱者，頭疼骨痛，怕風寒裏熱者，蒸蒸發熱，自汗口乾便難，身熱脉弦。

數戰慄惡寒汗出者，虛也。發熱身體沉重，无注疼痛，濕熱相搏，風熱鬱而不伸也。晝則發熱，夜則安靜，是陽氣自旺於陽分也。夜則發熱，晝則安靜，是陽氣下陷於陰中也。晝夜發熱煩躁，是重陽無陰也。不能食自汗，氣短發熱，此脾虛也。能食口乾舌燥，便難發熱，此胃實也。治法：外者散之內者下之。虛者補之，實者瀉之。暑則清之，濕則燥之，風則解之，寒則發之，火鬱而熱，升之舉之。血中伏火，清之鎮之。經曰：小熱之氣，涼以和之。大熱之氣，寒以取之。甚熱之氣，以汗發之。發之不盡，則逆以制之。制之不盡，則求其屬以衰之。養血益陰，其熱自愈。又曰：治熱以寒，溫而行之。涼膈散。

證治大還 醫學近編 卷之十四 三 貞白堂

桔竹葉 上焦實熱藥也。調胃承氣湯。大黃芒硝。下焦實熱藥也。八正散。大黃瞿麥滑石扁蓄。白虎湯。石膏知母。氣分實熱藥也。四順清涼飲。當歸赤芍大黃。血分實熱藥也。洗心散。門氣血實熱藥也。清心蓮子飲。門氣分虛熱藥也。四物二連湯。門血分虛熱藥也。

十全大補湯氣血虛熱藥也麻黃桂枝各半湯

治發熱惡寒之劑也柴胡桂薑湯

治寒熱自汗之劑也參蘇飲

知母葛根湯

散暑大柴胡湯

通聖散

劑也清燥湯

兔活湯

證治大還

熱之劑也

經曰諸寒之而熱者取之陰諸熱之而寒者取之陽

所謂求其屬也王太僕曰取之陰者所以補腎水

之不足以制夫心火之太過取之陽者所以益心

火之不足以勝乎腎水之有餘又曰益火之原以

消陰翳壯水之主以鎮陽光又曰取心者不必齊

以熱取腎者不必齊以寒益心之陽寒亦通行強

腎之陰熱之猶可又曰熱來復去晝見夜伏夜發

晝止時節而動是無火也當助其陽熱動復止倏

忽往來時動時止是無水也當養其陰寒之不寒

捫摸辨五臟熱法

東垣云以手輕捫則熱重按則不熱是熱在皮毛血

脈也輕捫不熱重按亦不熱不輕不重按之乃熱

是熱在肌肉也輕捫不熱重按之筋骨之分熱蒸

手甚是熱在筋骨也肺熱者輕手乃得微按全

無日西熱甚其皮毛之熱也其症喘咳寒熱

證治大還

起毫毛惡風寒舌上黃胸背

膈散門地骨皮散

肉之間乃熱少加力按之則不熱日中熱甚其熱

在血脈也其症心煩而痛掌中熱而嘔

熱者輕手捫之不熱重按之筋骨之間亦不熱不

輕不重按之方熱遇夜猶甚是熱在肌肉也其症

怠惰嗜臥四肢不收無氣以動

瀉黃散

肝熱者重按至肌肉之下筋骨之上

胃熱
便溺
初起
也
善惡
熱也

方熱寅卯時尤甚其症四肢滿悶便難轉筋多怒
多驚又小便黃腹痛多臥身熱狂言腸滿痛手足躁不得安臥瀉青丸柴胡飲
子門腎熱者重按至骨其熱蒸手亥子時尤甚其
人骨蒸不能起床又腰痛筋痠苦渴數飲滋腎丸

門本

按部分辨臟腑熱法

玉機微義云面熱身熱或一身盡熱狂而妄見妄
聞足陽明足外熱耳前後熱足少陽肩背頭

腦熱足小指外廉脛踝後熱足太陽口中熱如

證治大還

醫學近編
卷之十四

發熱

六

貞白堂

膠口熱舌乾足下熱而痛腹中熱而喘足少陰

身熱膚痛手少陰掌中熱手厥陰洒淅寒熱

手太陰熱而筋緩不收陰痿足厥陰肩上熱

肩似拔手太陽臍以上熱為胃熱臍以下熱

為腸熱

薛立齋云肌熱煩熱面紅目赤渴而引飲血虛熱也

當歸補血湯黃歸各一兩

發熱而飲食惡寒大便不

實氣虛熱也十全大補湯

八珍加芪桂

身熱而右關

脉浮大無力脾肺氣虛也補中益氣湯

參芪朮艸歸柴升姜

桑數而有力脾肺氣實也竹葉石膏湯

冬半夏人參梗米右寸脉微數無力肺氣虛熱也竹葉黃

芪人參黃芪麥冬生地芍藥川芎左手關數

而有力心肝之氣熱也柴胡梔子散數而無力心

肝之氣虛也六味地黃丸熟地山萸山藥白茯苓丹皮澤瀉尺脉

數而無力腎經陰虛也加減八味丸熟地山萸山藥白茯苓丹皮澤瀉

肉桂附子午前熱屬氣分清心蓮子飲門本午

後熱屬血分四物湯加參朮丹皮熱從左邊起

肝火也實則四物龍胆山梔虛則四物參芪白朮

證治大還

醫學近編
卷之十四

發熱

七

貞白堂

熱從臍下起陰火也四物參朮麥門冬五味子黃

柏知母桂心不時而熱或起兩足或起足心發無

定處此無根虛火也加減八味丸佐以十全大補

湯加麥門冬五味子若誤用寒涼治火之劑致腹

滿泄瀉手足俱冷此是三陰虧損虛寒之症急用

八味丸六味加肉桂附子

一日病有輕重論

帝曰病有旦慧晝安夕加夜甚何也曰朝則人氣始

生病氣衰故旦慧日中人氣長長則勝邪故安夕

則人氣始衰。邪氣始生。故加。夜半人氣入臟。邪氣獨行於身故甚。病有旦晝或加。或甚。而夕夜或愈。或安者。何也。曰。此臟氣獨主其病也。是必以臟氣之所不勝時者。甚以其所勝時者起。如脾病不能勝旦之木。如肺病不能勝晝之火。故為加為甚也。若人之臟氣能勝時之氣。如心氣能勝夕之金。脾氣能勝夜之水。故為愈為安也。治者惟順天之時。如脾病不能勝旦木。則補脾瀉肝。而病可愈矣。

潮熱

證治大還

醫學近編 卷之十四

陰虛

八

貞白堂

醫學集成云。潮熱於平旦。熱在行陽之分也。肺氣主之。白虎加片苓。潮熱在日晡。熱在行陰之分也。腎氣主之。六味丸加丹皮。知母黃柏。潮熱用芩連甘草。辰戌時加羌活。午時加生地。犀角木通。未時加石膏。申時加柴胡。升麻。夜加當歸芍藥。有汗加參芪白朮。

陶節菴云。潮熱於寅卯時。屬少陽。巳午時。屬太陽。未申時。屬陽明。

周慎齋云。小兒潮熱。多屬飲食所傷。

陰虛火動不可妄用苦寒藥論

醫學統旨云。陰虛火動之說。出自丹溪。蓋謂腎水虛。則相火妄動。故用四物以補陰。知柏以降火。此治之善者也。但黃柏知母。苦寒之藥。非脾胃虛者所宜。每見患此病。服此藥者。多致泄瀉。飲食不進。正胃虛不能勝苦寒。而為所傷也。五臟以胃氣為本。胃氣既傷。求其腎陰之長。必不可得矣。故用黃柏知母者。須視脾胃虛實。而增損焉。始善。

論虛熱發汗之悞

證治大還

醫學近編 卷之十四

陰虛

九

貞白堂

東垣云。仲景傷寒分例。不可發汗者。三十餘條。至一證有三禁。若寒熱。血弱。氣虛者。況雜病乎。若飲食勞倦。諸証發熱。自汗。表虛。認作有餘。誤用麻黃發之。汗大出。則表益虛。為禍至速。所謂一逆尚引。再逆促命期也。

嬰兒諸熱見證

心熱者。額上先赤。巳午甚。喜合面臥。搖頭咬牙。口舌生瘡。小便赤澀。肺熱者。右頰先赤。日晡甚。手掐眉目。喘嗽鼻衄。便難。肝熱者。左頰先赤。寅卯甚。

手尋衣領亂捻物。流淚羞明。直視叫呼。脾熱者。鼻上先赤。遇夜猶甚。口角流涎。怠惰昏睡。胃熱者。頤間先赤。兩足不喜衣履。齒痛。驚熱者。遍身熱。面青自汗。頻叫恍惚。睡臥不寧。疳熱者。形瘦多渴。骨蒸髮焦。泄瀉腹滿。食熱者。肚腹先熱。足冷。酸氣吐乳。大便秘臭。風熱者。汗出身熱。呵欠多睡。而赤氣粗。感寒熱者。肢急身蹇。通身皆熱。無汗呻吟。積熱者。頰赤口瘡唇紅。喜近冷處。

潮熱發作有時。虛熱面色青白困倦神怯。

證治大還

醫學近編 卷之十四

寒熱附

十

貞白堂

寒熱附

薛立齋云。陽虛則外寒。陰虛則內熱。陽盛則外熱。陰盛則內寒。益寒氣并於陰。則發寒。熱氣并於陽。則發熱。寒熱往來。此乃陰陽相勝也。寸口脈微。為陽不足。陰氣上入陽中。則惡寒。尺脈弱。為陰不足。陽氣下入陰中。則發熱。陽不足。則先寒後熱。陰不足。則先熱後寒。陽陰不歸其分。則寒熱交爭也。又上盛則發熱。下盛則發寒。陽勝則乍熱。陰勝則乍寒。陰陽相勝。虛熱不調。故邪氣更作。而乍寒乍熱也。

夫少陽膽界乎太陽陽明之間。半表半裏之分。陰陽之氣。易於相乘。故寒熱多主於肝膽經。以小柴胡湯。加減調之。若祇見寒熱。起居如常。久而不愈。及大病後。元氣未復。悉屬陰虛。生熱。陽虛。生寒。宜用八珍湯。十全大補湯。

陳三農云。寸脈沉而喘。寒熱。脈沉細數散者。寒熱。寒熱交作。汗出熱退。少頃又寒。熱此陰陽不和也。宜小柴胡湯。加芍藥。芎歸之類。和之。

醫按

證治大還

醫學近編 卷之十四

寒熱附

十

貞白堂

一人煩躁發熱。肌體骨立。目不得瞑。已三年矣。醫者以清熱養陰。化痰安神之藥。及千劑弗效。一刻不得安臥。診肝脈獨沈而數。此怒火久伏。木鬱宜達。用柴胡四錢。白芍二錢。丹皮梔子各二錢。五分。甘草五分。桂枝四分。藥進熱寐。至一晝夜後。用逍遙散。加入參九服而愈。

本事治一人。乍寒乍熱。面赤心煩。或時自汗。惡風體倦。診視脈無寒邪。但厥陰脈弦長。而出魚際。治以抑陰地黃丸而愈。

想茲

府漢治一人心中如火燒便入小腸急去小便大便亦隨出年深不愈脉滑數此相火送入小腸經也以四物加炒黃柏黃連小茴香木通四劑而愈并溪治一人夜間發熱早晨退五心煩熱無休六脉沈數此鬱火也用升陽散火湯熱退後以四物加知柏佐以乾姜調理而安

陳三農治一人右脇痛引背口乾舌燥上身發熱腰以下俱冷右手關尺不起此血虛氣無所附宜用溫藥行動其氣使氣有所歸水升火自降矣用乾

證治大還

醫學近編 卷之十四

寒熱

主

貞白堂

薑肉桂各五分當歸一錢吳茱萸半份鹽水煮煎服上熱退下體溫暖陽氣漸回但食難消化此元氣未復耳理脾胃為主養血次之胃氣一轉諸病自愈用參苓歸朮各一錢薑桂各五分神麴六分陳皮四分炙甘草三分漸愈

隣婦面上一熱即遍身躁熱而汗隨之日夜六七次百療不愈細思之經曰而熱者足陽明病此脾陰不足而胃火有餘也以山藥為君歸芍地黃為臣以補脾陰之不足用石羔生甘艸以瀉胃火黃

芪麥門冬五味子以固腠理加竹葉以去煩熱二劑愈

余弟昏倦發熱頭痛惡風因中氣大虛元氣下陷陽氣不充而頭痛形氣衰少而內熱用調中益氣內加葛根一劑而安更製脾腎丸服逾月而痊

瀉白散 治肺熱心胸壅悶咳嗽煩喘大便不利

桑白皮 地骨皮 杏仁 桔梗 知母 酒炒

甘艸 一方有山梔黃芩

導赤散 治小腸熱及心熱

證治大還

醫學近編 卷之十四

寒熱

主

貞白堂

生地黃 木通 甘艸 一方有犀角黃連天門冬竹葉

瀉青丸 治肝經鬱熱

當歸 膽艸 川芎 梔子 大黃 羌活

防風 蜜丸芡實大

瀉黃散 治脾熱口臭咽乾口舌生瘡

藿香 梔子 石膏 防風 甘艸 熱甚加芒

硝生地淡竹葉

滋腎丸 治腎熱

黃柏 知母 金鹽酒拌 炒各三錢 肉桂 煉蜜為丸

瀉白湯 治大腸實熱腹脹不通夾臍疼痛不能

立口舌生瘡。

條芩 梔子 黃柏 竹茹 茯苓 芒硝

生地黃 薑棗

半夏湯 治膽腑實熱精神不守口苦不眠。

半夏 黃芩 遠志 茯苓 酸棗仁 生地

秫米 宿薑

前胡湯 治胃氣實熱唇口乾裂心中熱燥大便秘

結煩渴。

證治大還

醫學近編 諸熱

西

貞白堂

大黃 葛根 枳殼 前胡 杏仁 桔梗

生薑

茯苓湯 治膀胱實熱小腹脹小便不通口苦舌乾

咽腫不利。

茯苓 猪苓 葵子 瞿麥 木通 滑石

車前子 枳實 黃芩 甘艸

玄參湯 治腎經實熱心胸煩滿耳聾無聲腰背僂

仰強痛口乾溺赤。

玄參 生地 黃芩 茯苓 通艸 菖蒲 五

加皮 羚羊角 麥冬 甘艸

左金丸 瀉肝火開痞結治肝邪

黃連 六兩 吳茱萸 一兩 粥糊爲丸

二母飲 治肺勞實熱面目浮腫咳嗽喘急胸膈不

利。

桑白皮 紫蘇子 前胡 杏仁 貝母 知母

甜葶藶 半夏 橘紅 秦艸 甘艸

麥門冬湯 治心勞實熱口瘡煩渴小便不利。

麥門冬 生地 木通 梔子 黃芩 黃連

證治大還

醫學近編 諸熱

五

貞白堂

茯苓 甘艸

羚羊角散 治肝勞實熱兩目赤澁煩悶熱渴

羚羊角 決明子 柴胡 黃芩 當歸 羌活

赤芍藥 防風 甘艸

小甘露飲 治脾勞實熱身體悉黃舌乾咽痛。

黃芩 升麻 茵陳 梔子 生地 石斛

桔梗 甘艸

橘皮湯 治肺熱咳息喘奔。

橘皮 麻黃 紫蘇 柴胡 杏仁 宿薑 各一錢

石膏 五錢

清心蓮子飲 治發熱口乾小便白濁夜則安靜書則發熱

麥門冬 車前子 地骨皮 柴胡 黃芩

人參 黃芪 茯苓 蓮肉 甘艸

人參白虎湯 治氣分熱心煩發渴用此清氣

人參 石膏 知母 甘艸 粳米

四物二連湯 治血分熱晝靜夜劇

當歸 白芍藥 生地黃 川芎 宣黃連

證治大選

醫學近編 諸熱 卷之十四 六 貞白堂

胡黃連

瀉血湯 東垣 治發熱晝少夜多熱在血分及足太

陽有浮熱及熱入血室

生地黃 熟地黃 當歸 桃仁 蒲黃 丹參

防己 柴胡 羌活 甘艸

清涼飲子 治血脈壅實臟腑生熱面赤煩渴睡臥

不寧用此涼血

大黃 赤芍藥 當歸 甘艸

柴胡飲子 治一切肌熱蒸熱積熱或汗後餘熱脈

洪寶弦數

柴胡 黃芩 人參 芍藥 當歸 大黃

甘艸

子芩散 涼心肺解勞熱

黃芩 芍藥 人參 白茯苓 麥門冬 生地

桔梗 知母 甘艸 竹葉 燈心

竹葉黃芪湯 治氣血虛胃火盛發熱煩渴

黃芪 人參 當歸 白茯苓 麥門冬 生地

川芎 黃芩 石膏 竹葉 甘艸

證治大選

醫學近編 諸熱 卷之十四 七 貞白堂

干味人參散 治虛熱身體倦怠或因虛邪客於經

絡咳嗽煩熱頭目昏痛

人參 白朮 茯苓 甘艸 當歸 芍藥

半夏 黃芩 柴胡 葛根

瀉陰火升陽湯 治肌熱煩熱面赤食少喘嗽有痰

右關緩弱或浮數

羌活 柴胡 升麻 蒼朮 人參 黃芪

石羔 黃連 黃芩 甘艸

洗心散 局方 治風熱上壅頭目昏痛口苦唇焦咽

喉腫痛心神煩躁五心煩熱引飲小便赤澀大便
秘結壯熱不已用此清氣涼血。

大黃煨 當歸 芍藥 麻黃 荊芥 白朮

甘艸 每三錢薄荷生薑湯下

連翹飲本事 治大人小兒五臟積熱躁渴唇裂喉

閉目赤鼻額結硬口舌生瘡一切風壅等症

山梔 甘艸 赤芍藥各一兩 大黃 朴硝 連翹

薄荷 乾葛各二兩 爲散每二錢水一盞入竹葉

七片蜜三匙煎服

證治大還 醫學近編 諸熱 太 貞白堂 卷之十四

上清散 治上焦熱耳鼻壅塞頭目不清

川芎 荊芥 薄荷 桔梗 石羔 朴硝

甘菊 片腦

黃芩湯 治心肺蘊熱口瘡咽痛小便不利。

梔仁 黃芩 連翹 麥門冬 生地 黃連

犀角 木通 澤瀉 甘艸

牛黃膏 治熱入血室發狂不識人

牛黃二錢五分 硃砂 鬱金各三錢 牡丹皮二錢

龍腦 甘艸各一錢 煉蜜爲丸如芡實太新汲水

化下一丸

錢氏安神丸 治熱渴心煩頰赤口燥脉實。

麥門冬 馬牙硝 白茯苓 寒水石 山藥

甘艸各五錢 硃砂一兩半 龍腦三分 蜜丸芡實

沙糖水下一丸

龍腦甘露丸 治風熱心煩口乾狂言渾身壯熱及

中毒等症。

寒水石八兩煨埋土中一宿 甘艸 天竹黃各二兩

龍腦二錢 元米膏丸彈子大蜜水磨下一丸

證治大還 醫學近編 諸熱 太 貞白堂 卷之十四

硃砂涼膈丸 治上焦虛熱咽喉氣喘如烟

黃連 梔子各一兩 人參 茯苓各五錢 硃砂三錢

片腦五分 蜜丸芡實大燈心湯下一丸

神芎丸子和 治濕熱導結滯甚捷能令通鬱結宜

通清頭目利咽喉一切熱症

滑石 牽牛各四兩 大黃 黃芩各三兩 黃連 川芎

薄荷各五錢 滴水丸如梧子大

碧雪治一切積熱口瘡咽痛閉塞。

芒硝 玄明粉 馬牙硝 石羔 寒水石

滑石 犀角 天花粉 薄荷 細茶 等分
 甘艸煎濃汁。入藥末再煎。柳條攪勻。入青黛再攪。
 候冷入片腦傾盆內結成霜。每用少許含化。

證治大還

醫學近編
 卷之十四

諸法

手

貞白堂

卷之十四

消癰門 啟玄子註癰為消熱病也

渴而多飲為上消。消穀善饑為中消。渴而便數。
 有脂膏為下消。

東垣曰。上消者。舌上赤裂。大渴引飲。經曰。心移熱于
 肺。傳為膈消是也。以白虎湯加人參主之。

潔古曰。上消者。上焦受病。又謂之膈消。多飲水而少
 食。大便如常。小便清利。知其燥在上焦。治宜流濕
 以潤其燥。

上消者。經謂之膈消。渴而多飲是也。

證治大還

醫學近編
 卷之十四

消癰

一

貞白堂
 卷之十四

治上中下三消水火圖。

上消 熬猪肚湯 羊肉冬瓜湯

上消手太陰 大渴不止 麥門冬飲子 化水丹

中消 調胃承氣湯 瘕成消中而數小便

消中足陽明 胃熱清穀善饑 易老順氣

下消 益火之源以消陰翳則便溺有節

腎氣丸 地黃丸

腎消足少陰 飲少瘦多小便如膏

內化丸 鳳髓丹 壯水之主以制陽光則渴飲不思

東垣論消渴末傳能食者必發腦疽背瘡不能食者

必傳中滿鼓脹聖濟總錄皆為必死不治之症惟

潔古分而治之能食而渴者白虎加人參湯主之

上中既平不復傳下消矣前人用藥厥有旨哉或

曰末傳瘡疽者何也此火邪勝也其瘡痛甚而不

潰或赤水者是也經曰有形而不痛者陽之類也

急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得強者生失

強者死末傳中滿者何也以寒治熱雖方士不能

繩墨而更其道也然臟腑有遠近心肺位近宜制

證治大遺

醫學近編

消渴

二

貞白堂

小其服腎肝位遠宜制大其服皆適其至所為故

知過與不及皆誅罰無過之地也如膈消中消制

之太急速過病所久而成中滿之疾正謂上熱未

除中寒復生非藥之罪失其緩急之宜也處方之

際宜加審焉

總錄論消渴有三種一曰渴而飲水多小便數有脂

似麩片而甜者消渴病也二者吃食多不甚渴小

便少有似油而數者消中病也三者雖渴飲水不

不能多腿腳瘦小痿弱小便數此腎消也特忌房

勞千金方云消渴病宜慎者有三一忌酒二忌房

勞三忌鹹食及麵能慎此三者雖不服藥亦可自

愈消渴之人愈與未愈當須慮患大癰必于骨節

間忽發癰疽而卒

內經云熱中消中不可服管梁芳草石藥石藥發癰

芳草發狂芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣急

疾堅勁故非緩心和人不可以服此二者

東垣謂滑石治渴本為竅不利而用之以燥能亡津

液也天令濕氣太過者當用之若無濕而用之是

證治大遺

醫學近編

癰

三

貞白堂

犯禁也小便不利而渴知內有濕也小便自利而渴知內有燥也濕宜泄之燥宜潤之

內經云脉實大病人可治脉懸小堅病久不可治

又脉經曰消渴脉數大者生細小浮短者死

上消治例渴而多飲為上消

丹溪云治消渴養氣降火生血為主瓜蒌根治消渴

之神藥心移熱于肺傳為膈消

人參石膏湯治膈消上焦煩渴不欲多食

人參錢五石羔兩一知母錢七甘草錢四每五錢水煎食後服

潔古治能食而渴者白虎倍人參湯主之

王海藏治脾胃虛弱大渴不止而食少小便不利大便不調精神短少腹窄狹如繩束

白茯苓 橘紅 各一兩 生薑五錢 煉蜜九彈子大 每

二九空心白湯化服忌生冷硬物怒發思慮過度

如脉弦或腹中急甚者加甘草三錢

易老門冬飲子 治老弱虛人大渴

人參 枸杞子 白茯苓 甘草 各三分 五味子

麥門冬 各五錢 加薑 水煎服

羅太無門冬飲子 治膈消胸滿心煩精神短少多

證治大還 醫學近編 消癰 四 貞白堂

知母 甘草 瓜蒌仁 五味子 人參 葛根

茯神 生地 麥門冬 各一兩 每五錢 加竹葉十四

火府丹 治消渴 本事方云一卒病渴日飲水三

斗不食者三月心中煩悶時孟冬予謂心中有伏

熱與此丹數服每服五十九溫水下越二日來謝

云當日三服渴止又次日三服飲食如故此方本

治淋用以治渴得效信乎藥要變通易能執一

丹溪治消渴泄瀉先用白芍藥白朮各炒為末調服

後隨症用藥

錢氏加減地骨皮散 治上消

知母 柴胡 甘草 炙半夏 地骨皮 赤茯苓

黃芪 石膏 黃芩 桔梗 白芍藥

每三錢薑五片水煎食遠服

東垣止渴潤燥丸 治消渴大便乾燥喜溫飲陰頭

縮舌上白燥唇裂口乾眼澀難開及干黑處如見

升麻 一錢 柴胡 七分 甘草 五分 紅花 少 杏仁 六粒 桃仁

研麻仁 研防風 歸身 荆芥穗 黃柏 知母

石羔 錢 熟地 錢 川椒 細辛 各一 水煎食遠服

證治大還 醫學近編 消癰 五 貞白堂

化水丹 治手足少陰渴飲不止或心痛者 本事

方治飲冷水多者

川烏 脂大者四 甘草 炙一兩 牡蠣 生用 蛤粉 用厚者

為細末醋浸蒸餅為丸每服十五丸新水下心痛

者醋湯下立愈飲水一石者一服愈王海藏此藥

能化停水

甘草石膏湯 治渴病全愈再劇舌白滑微腫咽喉

嚔睡覺痛噤腫時渴飲冷白沫如膠飲冷乃止

升麻 一錢 柴胡 七分 甘草 稍五 石膏 六分 黃柏 桃仁

防風 荊芥穗 生地 知母 當歸身各一錢

杏仁炒 黃連各三 細辛一 紅花少 川椒三

水煎食後服。

丹溪云消渴病退後而燥渴不解此有餘熱在肺經可用參苓甘草少許生薑汁冷服虛者可用人參

東垣六經渴治例 太陽經渴其脉浮無汗者五苓

散滑石之類主之 陽明經渴其脉長有汗者白

虎湯清膈散之類主之 少陽經渴其脉弦而嘔

者小柴胡湯加瓜蒌之類主之 太陰經渴其脉

證治大還 醫學近編 消渴 六 貞白堂

細不欲飲縱飲思渴不思水者四君子湯理中湯

之類主之 少陰經渴其脉沉細自利者猪苓湯

三黃丸之類主之 厥陰經渴其脉微引飲者宜

少少與之

聖濟治時氣煩渴用生藕汁一盞入蜜一合和勻分

為三服。

中消治例 消穀善飢

瘰成爲消中胃中熱則消穀善飢東垣曰消渴中消

自古只治燥止渴悞矣殊不知內經云三陽結謂

之消三陽者足太陽也又手陽明大腸主津液所

生病熱則目黃口乾是津液不足也足陽明主血

所生病熱則消穀善飢血中伏火是血不足也結

者津液不足結而不潤皆燥熱爲病也此因數食

甘美而多肥故其氣上溢轉爲消渴治之以蘭除

陳氣也不可服膏粱芳草石藥其氣悍烈能助熱

燥也越人云邪在六腑則陽脉不和則氣留之氣

留之則陽脉不和矣陽脉太虛則陰氣不得榮也

故肌肉皮膚而消削也。

證治大還 醫學近編 消渴 七 貞白堂

素問有病口甘者病名爲何何以得之岐伯曰此五

氣之溢也名曰脾瘕夫五味入口藏于胃脾爲之

行其精氣津液在脾故令人口甘也此肥美之所

發也此人必數食甘美而多肥也肥者令人多熱

甘者令人中滿故其氣上溢轉爲消渴治之以蘭

除陳氣也。

潔古治胃熱善消水穀以甘辛降火之劑治之用黃

連末生地白藕各自然汁牛乳各一升熬成膏和

黃連末一斤丸如桐子大每服三十九白湯下日

進十服。

河間猪肚丸 治消渴

猪肚具一黃連一兩 天花粉四兩 麥門冬四兩 知母一兩

為細末，納猪肚中，線縫置甑中蒸極爛，乘熱于石

臼中杵，可丸為度，如硬加蜜丸，如桐子大，每服三

十丸，漸加至四十丸，渴則進之。三因方多梁米

杜仲本草云猪肚能補中益氣止渴。

調胃承氣湯 治消中渴而飲多食此初起時宜服之。

三黃丸 治三焦熱渴

證治大還

醫學近編 卷之十四

消瘴

人

貞白堂

易老順利散 治中熱在胃而能食，小便赤黃微利

至不欲食為効，不可多服。

厚朴 枳實各一兩 大黃四兩 每服五錢水煎服食遠

大腸移熱于胃，善食而瘦，又謂之食休。食休者，謂食

生肌膚，亦易飢也。東垣云：善食而瘦者，胃

伏火邪于氣分，則能食。脾虛則肌肉削也。

胃移熱于脾，亦曰食休。

河間參蒲丸 治食休胃中結熱，消穀善飢，不生肌肉

人參 菖蒲 赤茯苓 遠志 地骨皮 牛膝

酒浸各一兩 石煉蜜每服二十九，米飲下。

下消治例 渴而小便數有膏為下消

羅太無治張某，夫四十五歲，病消渴，舌上赤裂，飲水

無度，小便數多，先師以此方治之，良愈。消渴多傳

瘡瘍為不救之疾，既效後亦無患。享年七十五而

終，名之曰生津甘露飲，子治消渴，上下齒麻，舌硬

赤爛腫痛，食不下腹，時脹滿疼痛，渾身色黃，目白

睛黃，甚則四肢痿弱無力，面塵脫色，腸下急痛，善

噦，善怒健忘，腎肉腰痛，背兩丸。

生津甘露飲子 一方用石膏一兩二錢

證治大還

醫學近編 卷之十四

消瘴

九

貞白堂

石膏一錢 人參二分 甘草生 山梔 白豆蔻 白芷

連翹 萆薢 黃連 姜黃 藿香 炙甘草

杏仁 木香各一錢 白葵 麥冬 當歸身 蘭香

柴胡各五錢 黃柏酒炒一錢 升麻根 知母酒炒各

桔梗三錢 全蝎二枚 右為末，湯浸蒸餅和勻，捏

作餅子，曬乾杵碎，如黃米大，每服二錢，挑干掌內

以舌舐之，津液嚥下，或白湯食後服之。凡消渴

為病，燥熱之氣勝也，內經云：熱淫所勝，佐以甘苦

以甘瀉之，熱則傷氣，氣傷則無潤，折熱補氣非甘

寒之劑不能故以石膏之甘寒為君。啟玄子曰壯水之主以鎮陽光。故以柏連梔子知母之苦寒瀉熱。補水為臣。以當歸杏仁麥門冬全蝎連翹白蔘。蘭香甘寒和血潤燥為佐。柴胡升麻苦平。行陽明少陽二經。華澄茄白豆蔻木香藿香反佐以收之。又用桔梗為舟楫。使浮而不下也。

東垣和血養氣湯 治口渴舌乾小便數舌上赤裂此藥生津除燥生肌又名地黃飲子

黃連酒炒生地各七紅花少黃柏酒炒升麻各一炙甘

證治大還

醫學近編

消癰

十 貞白堂

草 防已

酒洗各

桃仁六枚當歸四分知母酒洗

五分

羌活

五 分

麻黃根三分口渴舌乾再加杏仁六枚生甘草三

分小便數加石膏六分右作一服煎稍熱服忌

酒麵房失

清涼飲子 治消中能食而瘦口舌乾自汗大便結

小便數

羌活稍柴胡稍甘草稍知母酒洗黃芪酒洗黃芩酒炒

升麻稍防風稍防已酒洗生地酒洗當歸酒洗

石膏 龍胆草 黃柏各一錢紅花少許桃仁

杏仁各五甘草一錢水二鍾酒一小盞服

治消渴以天花粉為末用人乳汁生薑汁煎膏尤如

菜豆大每服百丸食後白湯下

千金地黃丸 治腎渴

黃連四兩生地半斤取汁連渣拌黃

為末

連末和勻晒乾用

為細末煉蜜為丸食後麥門冬湯下五六十九

冬瓜飲子 治消渴能食而飲水多小便如脂麤片

日夜無度

冬瓜一枚黃連十兩為細末先以冬瓜破開去穢摻入

酒洗

消癰

十 貞白堂

證治大還

醫學近編

消癰

十 貞白堂

黃連末在內卻用頂蓋定于熱灰中煨熟去皮切

細爛研絞汁每服一盞至二盞日三服夜一服

治消渴飲水不止小便數用田螺五升水一斗浸一

宿渴則飲之每日一度易水換螺為妙

脾胃虛弱食少不能生津液而渴者當理脾補中益

氣加二門五味能食而渴者白虎加人參湯不

能食而渴者錢氏白朮散倍葛根乃潔古法也

火盛大抵治須分新久虛實如膏粱之家醉飽濃鮮

脈滑實口乾作渴是痰火盛也宜滾痰丸先蕩滌

之勢盛調胃承氣湯當從實火治脉實而堅大者死。細而浮短者死俱無胃氣也。

陰虛如勞碌失意軀體薄弱之人有此悉屬陰虛養血滋水為主。

脉洪大無力形氣不足而渴悉屬陰虛。

天花粉渴家聖藥亦是潤劑太便燥者宜之若脾弱作瀉者恐非所宜。

氣血兩虛身倦色白而渴兩手俱無力右寸或虛大或玉膏嚴捷大病後亡津液而渴者補養為主。

證治大還

醫學近編 卷之十四

消瘴

三

頁白堂

脉散加知母花粉甘草茯苓神竹葉或加葛根以開發胃氣上消脉虛者亦妙即河間麥門冬飲子。

癰疽潰後渴悉屬虛黃芪六一湯時時代茶佳或加

生脉散黃芪六兩甘草一兩

脉虛數口乾燥兼火症者降火藥中兼生津液便秘

兼潤劑如東垣生津甘露飲用石膏苓連梔柏升

柴又有人參麥門當歸知母加減在人不必拘泥

也。

勞後饑飽失時中氣受虧虛火炎上口燥舌乾有似

于渴誤用涼劑漸危宜補中益氣湯。

戴氏曰無病而渴與病後瘡疽產後同悉屬氣虛津

少四君子及參苓白朮散縮脾湯加葛根開提清

氣引津上潮或七珍散如少食而瘦八味丸兼黃

芪湯果積水在腹小便不利而渴者明知是水阻

真水不潮者乃可用春澤湯即五苓加人參也。

戴院使曰三消不宜用燥劑峻補之惟當滋養除消

脾外心腎二消用黃芪六一湯或參湯吞八味丸

或玄兔丹小兒絲丸又用竹龍散六神飲皆可用

證治大還

醫學近編 卷之十四

消瘴

三

頁白堂

惟脾消加當歸去黃芪三消小便既多大便秘

宜常服四物湯以潤大腸加人參木瓜更妙仍煮

四皓粥及糯米折二泔飲之口燥咽乾不可謬指

為火。

診心脉微小為消瘴滑甚為善渴。肺脾腎微小

皆為消瘴。心肺與而散者當消渴自己脉實大

病久可治懸小堅病久不可治。數大者生細小

者死。消渴多洪數無力洪數者虛火盛也無力

者氣血不足也。

消腎為病，比諸為重。古方謂之強中，又謂之內消，多因恣意色慾，或餌金石，腎氣既衰，石氣獨在，精水無所養，故常發虛陽，不交精出，小便無度，唇口乾燥，黃芪飲，吞玄兔丹，八味丸，鹿茸丸，加減腎氣丸，小兒絲子丸，靈砂丹，皆可選用，未效，黃芪飲，加菴蓉五味山茱萸各四分，薺芎湯，喻化丹，生津止渴，遠行不可少。

百藥煎 烏梅肉 紫蘇葉 人參 麥門冬

甘草 共為末，煉蜜丸，彈子大，喻化一九

諸治大還

醫學近編 消痺 卷之十四 頁白堂

胎前渴屬火，宜清火潤燥養血

產後渴悉屬虛，八物加麥門知母花粉

忍冬丸

忍冬草一味，不拘數，花莖葉全用，入瓶灌內，用無灰酒浸，以糠火煨一宿，取出曬乾，入甘草少許，碾為細末，以所浸酒打麵糊丸，桐子大，每服一百丸，不拘時，米飲白湯下。

無病忽大渴，少頃又定，飲蜜湯佳，及縮脾湯或折二泔涼飲數口，酒渴乾葛湯調五苓散佳，又果

木渴多食果子所致，藥中宜加麝少許。

五豆飲能解酒渴，及諸消小兒痘疹不出，並解。

黑豆 黃豆 菜豆 青豆 赤小豆 各五升

乾葛 一斤 甘草 一斤 貫眾 半斤 右一處用水五升，臘八日，用大鍋熬至熟，濾去渣，將汁入磁罐中，第葉封固，春夏遇渴症，取飲之，隨意小兒痘疹不出，俱效。

三消久而小便不臭，反作甜氣，在渴桶中涌沸，其病為重，更有浮在溺面，如猪脂，膿在桶邊，如柏燭，此精不禁，真元竭也。玄兔丹菴蓉丸主之。

諸治大還

醫學近編 消痺 卷之十四 頁白堂

玄兔丹 治三消渴利神藥，常服禁遺精，止白濁，延

兔絲子 酒浸通軟，乘濕研 五味子 酒浸，別為末，秤七兩

白茯苓 乾蓮肉 各二兩 右為末，別碾乾山藥末

六兩，將所浸酒餘者，添酒煮糊，搜和得所，搗數千杵，丸如桐子大，每服五十九，空心食前，米飲下。

鹿茸丸 見虛損門 小兒絲子丸 見便濁門

靈砂丹 見喉門 黃芪飲 即黃芪六一湯 見汗門

縮脾湯 見暑門 五苓湯 見渴門

四皓粥 見泄瀉門 六神飲

竹籠散 治消渴

五靈脂

另研

生黑豆

去皮各
穿分

右為末。每服二錢。不拘時。冬瓜煎湯調服。冬瓜子皆可。一日兩服。少渴者只一服。渴止後宜入味。仍仍以五味子代附子。此方流存中。載於靈苑方。得効者甚多。

證治大還

醫學近編
卷之十四

消癰

貞白堂

秘結門

經曰。大便。腎之所主。腎主五液也。腎氣充。則大便潤。虛則津液耗竭而燥結矣。又飢飽勞役。損傷胃氣。及食辛熱厚味之物。而助火邪。伏于血中。煎熬真陰。皆能使大便燥結。又有年老陰血不足而燥者。惟當補而潤之。不可用峻利之劑。又大便燥結者。不得發汗。汗則重亡津液。必秘結而死矣。

秘

有陽結。有陰結。有風結。有實結。有虛結。有氣秘。有血

證治大還

醫學近編
卷之十四

秘結

貞白堂

仲景曰。脈浮數能食。不大便者。此為實。名曰陽結也。期十七日當劇。脈沉而遲。不能食。身體重。大便反硬。名曰陰結也。期十四日當劇。陽結者散之。陰結者熱之。風結者諸藥中加羌活防風之類。此二味雖是風藥。然味辛所以能潤燥也。經曰。腎惡燥。急食辛以潤之。潔古曰。臟腑之秘。不可一概治療。有虛秘。有實秘。胃實而秘者能食。小便赤。以麻仁丸七宣丸之類。主之。胃虛不能食。而小便清利者。厚朴湯主之。實秘者物也。虛秘者氣也。

東垣曰有物有積而結者當下之食傷太陰腸滯

不化腹脅攣然不能大便秘者以苦泄之

宣九皆以大黃為君之類是也治注夏大便滯滯者血少血中伏

火也黃芪人參湯加生地當歸身桃仁泥潤之如

潤之大便秘仍久不快者少加煨大黃微利之如加

大黃久不利者非血結血秘是熱生風止當服

黃芪人參湯內用羌活防風各五錢水四盞煎至

一盞空心服之其便必大走也

醫治大還

醫學近編

秘結

二 貞白堂

而金行清化木邪有制脾土清健而運行津液津

液入胃則腸潤而矣須知在西北以開結為主

在東南以潤燥為主慎勿膠柱而調瑟也

王海藏云桃杏仁俱治大便秘當以血氣分之年老

虛人大便秘脈浮在氣谷仁陳皮主之脈沉在血

桃仁陳皮主之所以俱用陳皮者以其干陽明病

與手太陰為表裡也脈多沉伏而結陽結脈沉而數

老人虛人便秘脈雀啄者不治老人產婦病後汗下吐瀉後大便難悉屬血虛津液

不足虛秘須用潤劑切不可用牽牛巴豆大黃等

瞑眩藥以反耗津液也雖獲效目前久之必變他

症慎之慎之經曰臟得血而能液當補血為主微

加辛以潤之

一切秘結胃強能食者通幽湯間服古方潤腸丸微

利之今人急於獲効一味大黃或加巴霜云潤腸

丸屢秘屢投卒至夭折終莫之悟悲哉

丹溪曰有虛有風有濕有熱有津液不足者有寒者

有氣結者切不可例用芒硝大黃等利藥血虛津

液枯竭而秘結者脈必小澀而無精光大便雖難

努瀆不出大劑四物湯加陳皮甘草紅花通幽湯

血少兼有熱者脈洪數口乾小便赤少大便秘硬潤

燥湯活血潤腸丸四物加酒芩佐桃仁紅花

虛秘腸澀枯槁面不澤當歸潤燥湯投滋腸五仁丸

佳

脾虛不能運化倦怠懶于言動補中益氣湯倍升麻

當歸清氣一升濁氣自降

醫治大還

醫學近編

秘結

三 貞白堂

三百六

腸熱結宜四順清涼飲吞潤腸丸實者承氣湯

年高虛人大便秘者脉浮在氣杏仁陳皮主之脉沉

在血桃仁陳皮主之所以俱用陳皮者以手太陰

與手陽明為表裏也

膏梁輩二便澀滯或欲便不輒搜風順氣丸妙

吐瀉後忘津液便秘者消導加花粉當歸蘇子等潤

劑仍以麻子仁橘水煎藥妙

氣結者脉必沉伏上下攻走脹悶或痛由氣不升降

穀氣不行其人多噫宜蘇子降氣湯加枳殼吞養

證治大要

醫學近編

秘結

四

貞白堂

正丹或半硫丸來復丹未效木香檳榔丸少壯氣

實用牽牛丸一服無碍

三農治中州王太學素多酒食病下極脹痛二便不

通坐臥不能泥吟七日矣醫用百般通利不應予

思濕熱之邪塞遏二陰壅脹隧路故前後不通病

不在大腸膀胱也乃用韭菜子以山甲茴香棟實

各一錢五分入牽牛頭末三錢水煎服一服即減

三服即愈乃知牽牛能達右腎命門走精隧故東

垣老人用六真丹以牽牛鹽水炒黑入佐沈香杜

仲破故紙官桂治下焦陽虛也牽牛有毒畏厚之

得不得已而用之方克有濟

脉沉實體健神旺二便俱秘者升柴二朮二陳湯先

服後吐以提之

久病骨中實熱脉弦滑有力十數日不大便潤腸丸

甚者承氣湯

過食寒冷之物停滯不便腹痛脉沉伏為寒結從食

陰治腹痛甚不通備急丸

方書云由冷氣積于腸凝陰固冷用藿香正氣散加

證治大要

醫學近編

秘結

五

貞白堂

宜桂枝散吞半硫丸熱藥多秘惟硫黃暖而通冷

藥多泄惟黃連肥腸而止

風秘者脉必浮數乃熱急生風或遍身虛癢養血藥

中加防風羌活秦艽皂角等治血潤燥丸搜風順

氣丸俱對症藥

方書謂風傳大腸用小續命湯去附倍芍加竹瀝吞

潤腸丸恐未必

老人氣血弱大便秘蘇子麻仁粥妙用蘇子麻仁淘

淨不拘多少研爛濾汁煮粥

產後有三病鬱冒則多汗即血多汗則大便難故難

用藥惟此粥佳

注下大便難黃芩人參湯加生地歸身桃仁泥潤之

潤之久不快利者少加煨大黃微利之如服大黃

不應此非血秘是熱生風也黃芩人參湯加羌活

防風

古方潤腸方

麻仁兩半用生絹袋盛百沸湯中連袋泡水

枳實黃芩厚朴薑汁芍藥各三兩大黃四兩杏仁去皮

證治太還

醫學近編 秘結 去 貞白堂

失另研二

右為末煉蜜丸桐子大每服三十丸

空心白湯下

滋腸五仁丸 治津液枯竭傳化艱難

栝子仁半兩

桃仁 杏仁炒去皮尖 松子仁一錢

陳皮四兩另

郁李仁炒二錢 右將五仁另研為

膏入陳皮末研勻煉蜜丸桐子大空心下五六

九

通幽湯 治大便難上衝吸門不開即燥結

不得下治在幽門以辛潤之

甘草炙 紅花各三 生地 熟地各五 升麻

桃仁泥 歸身各一錢 麻仁三錢 臨服加槓榔末

半錢加大黃麻仁為潤腸湯治秘而有火者大黃

酒蒸者二仁俱後加

活血潤腸丸 治大便風秘血秘常燥結

歸梢五錢 防風三錢 大黃酒煨 羌活各一兩

皂角仁燒存性 桃仁二兩去皮尖 麻仁二兩半淨肉

右除二仁另研外共為細末煉蜜丸桐子大每服

五十丸白湯下餘丸封固不可見風一通之後即

證治太還

醫學近編 秘結 七 貞白堂

以麻仁煮粥每日早晚用庶不再結

枳殼丸 治濁氣閉塞三焦二便不通水穀不得下

枳殼二兩 陳皮二兩 槓榔半兩 木香二錢

黑丑四兩半生一 右細末煉蜜丸桐子大每服

十五丸薑湯下

枳實導滯丸 治傷濕熱之物不得施化胸膈作痛

方見傷

丹溪治一人胃虛有滯不通不納藥用黃蠟包備急

丸穿一孔令服三丸取其不犯胃氣故得遲化達

齒門而出也。次日下結屎升許。繼以四物湯加沙
作湯吞潤腸丸調理而安。

又一兒痘後秘結。百藥不効。令使婢口含香油以小
筒一箇套入肛門。將油吹入。少時病者自覺油入
肛門。如蚯蚓漸漸上行。再過片時許。下黑屎二升。
困眠而安。

仲景脾約丸。治胃強脾弱。約束津液不能行于大腸。
因而秘結。方用煨大黃六錢。杏仁麻仁各五錢。枳
實厚朴芍藥各八錢。蜜下二十九。丹溪曰。既曰脾

證治大還

醫學近編

秘結

人

真白堂

約必陰血枯槁。因火燔灼。熱傷元氣。脾失轉輸。肺
失傳化。宜乎大便秘而難。小便數而無蓄藏也。理
宜滋陰養血。使陽火不熾。金行化令。脾土健旺。使
津液復入于胃。大小便潤而通矣。此丸止宜熱甚
而氣實者。與壯盛酒客輩。

金匱真言論曰。北方黑色入通于腎。開竅于二陰。故
腎陰虛。則大小二便難。宜以地黃從容車前茯苓
之屬。補真陰利水道。少佐辛藥開腠理。致津液而
潤其燥。施之于老人尤宜。若大小便秘結之甚。求

通不得。將廁時用力太過。便仍不通。而氣被掙脫。

下注肛門。有時泄出清水。裏急後重。不可忍者。胸
膈間梗梗作惡。乾嘔有聲。渴而索水。飲食不進。呼
吟不絕。欲利之則氣已下脫。命在須臾。再下即絕。
欲固之則溺與燥屎膨滿腸間。恐反增劇。欲升之
使氣自舉。而穢物不為氣所結。自然通利。則嘔惡
不堪。宜如何處。惟益血潤腸丸。多服自愈。俗以便
秘為後牢固。壽考之徵。而一時難堪。此方不犯大
黃。可以久服。

證治大還

醫學近編

秘結

九

真白堂

丹溪曰。余觀古方通大便。皆用降氣品劑。蓋肺氣不
降。則大便秘。傳送用枳殼沈香訶子杏仁等是也。
又老弱津液少者。宜胡麻仁阿膠潤之。妄用峻藥
旋通。旋秘。必變肺痿吐血。

益血潤腸丸

熟地

六兩

杏仁

炒去

麻仁

各三兩

以上三

枳殼

橘紅

各二

阿膠

炒

肉苁蓉

各兩

蘇子

荆芥

各一

當歸

三兩

共末和前三味杵千餘下。加煉蜜丸。

桐子大。每服五六十丸。空心白湯下。

導引法

先以皂角末加老蜜作小槌或加鹽以鹹能軟堅也納肛門中如不動乃燥結甚也以豬膽七八箇取汁加米醋半盃盪溫入雞豚中以小絳管接入肛門將豚捏上少時通必轉尿氣覺已在肛即得出熱結乃可

冷秘用醫生薑導或於蜜煎中加烏頭末以化寒消結

烏梅湯浸去核丸如棗大亦可導

證治大還

醫學近編

秘結

十

貞白堂

醬瓜削如棗亦可導

一儒者大便素結服搜風順氣丸後胸膈不利飲食善消而帶陽色左關尺脉洪而虛余曰此足三陰虛也彼恃知醫不信服潤腸丸大便不實體倦與補中益氣六味地黃月餘而驗年許而安

若脾肺氣虛者用補中益氣湯若脾經鬱結者用加味歸脾湯若氣血虛者八珍湯加肉苁蓉若脾經津液潤者用六味丸若發熱作渴者用竹葉黃芩湯若燥屎直腸用豬膽汁導之若肝膽邪侮脾者

脉必弦數兩脇脹小柴胡加山梔郁李枳殼

若膏藥厚味積熱者用加味滑胃散亦有熱燥風燥陽結陰結者當審其因而治之苟一槩妄下復傷胃氣多成敗症

一法皂角燒烟于馬桶中薰之

一法皂角末加皮硝一撮水丸煉蜜和成挺子入肛中佳

勢甚者用麻油一盞熱水一盞入猪尿胞內漬入肛中立通

證治大還

醫學近編

秘結

十二

貞白堂

二便不通燒鹽鋪臍內切蒜一片於鹽上用艾灸二

三壯

東流飲治大便熱結

細茶一撮

生芝麻

生桃仁

大黃

一錢或二錢

用長流水生搗服

倒換散治二便不通

方見淋門

陰症二便不通及諸雜病陰症急危者用牡蠣陳粉乾薑炮各一兩右為末男病用女唾調手內擦熱緊拊二卵上得汗出愈女用男唾拊二乳上蓋卵

與乳乃男女之根蒂，坎離之分屬也，非急不可用。治二便不通。

六七月間，取大蟻蟻囊中者，不拘多少，線穿懸風處陰乾，以刀從中切斷，如大便秘，用上截，小便秘，下截，各為末，新汲水調下，二便俱秘，則全用之。

養生論：一法用細灰於患人臍上及丹田，作一泥塘，徑如碗大，一指厚，四圍高起，以新汲水調朴硝一兩，傾入灰塘中，勿令走須臾逆出。

大小便俱秘

證治大遺

醫學近編

秘結

主

貞白堂
卷之十四

脈盛皮熱，腹脹前後不通，脅悶此謂五實。

脾胃氣滯，不能轉輸，加以痰飲食積，阻碍濁道，大小便秘，澀不快，升柴二朮二陳湯數服，能令大便潤而小便長。

濕熱痰火結滯，脈洪盛，大小秘赤，肢節煩疼，涼膈散通聖散，金匱厚朴大黃湯選用。

丹溪治一婦人，腹疼後患二便不通，此是痰隔中焦，氣聚上焦，二陳加木通，先服後吐，杏再煎，燒皂角灰為末，粥清調下。

一法推車客七箇，土狗七箇，二物新瓦上焙乾，為末，以虎杖向東南者，取皮煎濃湯服之。

連根葱一二莖，帶土生薑一塊，淡豆豉二十一粒，鹽二匙，同研爛作餅烘熱，揜臍中，以帛紮定，良久氣自透，不通再換一餅。

關格

關無出，格無入，關則不得小便，格則吐逆。

寒在胸中，則格而吐，熱結下焦，則不得小便。

丹溪曰：寒在上而熱在下，故多死，法當取吐，以提其

證治大遺

醫學近編

秘結

主

貞白堂
卷之十四

氣之橫格，不必在出痰也，吐中便有降。

久病氣不運者，補氣兼升降，補中益氣湯加枳椇使清升濁降也。

凡遇此病，吐逆而小便不利，急先灸氣海、天樞等穴，各三七壯，其吐必止，後以益元散等藥，以利小便。

一法治吐逆溺塞，用藿六平胃散合五苓散加薑棗煎服。

一尼體厚，病吐逆，忽小便不利，頭汗出，立斃。

既濟丸 治關格脈沉，手足冷者，此陽虛之極用。

製附子人參各二錢，麝少許，共末糊丸，桐子大，燈心湯下七丸。十種不利者，此湯最宜服。

閉癰遺溺不禁辨

三農曰：閉者，小便不出，塞而不通也；癰者，罷弱而氣不充，淋瀝瀝瀝，點滴而出，或澀而疼，一日數十次，或百次，俗名淋病者，是也。閉則多是急病，癰則是緩病。遺溺是夢中溺出，醒而方知是也，不禁者，日夜無遍數，頻頻而溺也。今各分枝門詳載治法，以見新久虛實，寒熱氣血，各有所攸重也。惟肝與腎證治大還。

醫學近編 秘結 十四 貞白堂

脈曰膀胱主之

經云：膀胱主小便淋瀝，膀胱足厥陰之脈，達陰莖，所生病者，遺溺閉癰。又云：督脈者，女子入繫廷孔，其孔溺孔之端也。其男子循莖下至纂，與女子等。其生病癰痔遺溺閉癰，皆取厥陰、膂穴及督脈、膂穴也。又三焦主之者，經云：三焦下膂在于足太陽之前，少陽之後，出于臍中，外廉名曰委陽，足太陽絡也。三焦者，足太陽少陽之所將，太陽之別也。上踝五寸，別入貫膈腸，出于委陽，並太陽之正，入絡膀胱，約

下焦實則閉癰，虛則遺溺。遺溺則補之，閉癰則瀉之，是也。又膀胱主之者，經云：膀胱不利為癰，不約為遺溺。然遺溺閉癰，不取膀胱、膂穴者，蓋膀胱但止藏溺，其出溺皆三焦及膀胱也。又經云：三焦者，決瀆之府，水液出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。由是言之，膀胱藏水，三焦出水，治小便不利，故刺灸法但取三焦穴，不取膀胱穴也。

證治大還 醫學近編 秘結 十五 貞白堂

雲間陳 治三農甫述 男

拭璣先 師柴羔愚 泰

毘陵鄉言正仲衡甫問 門人

范 崧壽民 校 王 顯贊皇

水腫 十四

寸口沈滑者中有水氣浮而遲為水浮而滑為風水
泡數為熱沉遲為寒或洪或浮大而軟者易治微
細或沈細虛小者難治實與虛皆死

經治大題

醫學近編 卷之十五

水腫 一

貞白堂

經曰諸有水氣者微腫先見於目下故水腫必先目
下腫或足脛腫後漸及臍腹四肢甚則皮薄而光
手按成窟舉手即滿時欬陰股間寒其水已成矣
經曰諸濕腫滿皆屬脾土諸腹脹大皆屬於熱是
水腫皆濕熱之相兼也但有脾虛受濕或脾土濕
熱自甚者須分辨久虛實用藥如始因氣鬱或飲
食積滯或濕熱自甚者宜先與疎導或發洩或利
氣脉浮在表或上身腫用越脾湯俱本或二朮
散汗之脉沈在裡或身以下腫用加味胃苓湯

俱本 五皮散滲泄之 因飲食積滯噎氣胸滿面

黃腹痛消導寬中湯門本 因氣鬱滯而腫其脉沈

伏或腹脹喘急用木香分氣散香遂丸俱本 利氣

兼滲泄之 益治水先當利氣經曰邪氣內逆則

氣為之閉塞而不行不行則為水脹利其氣俾氣

行不失其常則水亦隨而順下矣忌用甘味及鹽

物以甘能令人中滿鹽能生水助邪故也 脾虛

受濕者惟以補養脾氣為主而佐以燥脾利氣之

劑用參苓蒼白朮為君以補中臣以半夏桑皮蘇

經治大題

醫學近編 卷之十五

水腫 二

貞白堂

子使肺氣下降而滲道開通佐以陳皮腹皮厚朴
木通以泄氣氣不運加木香沈香小便不利加澤
瀉金沙氣下陷加升麻柴胡或用六君子湯加厚
朴木香澤瀉但使脾氣得實自能升降運動其樞
機而腫自消若用五苓神佑之類則一利一衰矣
若肚腹痞滿肢體腫脹手足俱冷呼吸氣冷食物
難化大便泄瀉此真陽衰敗脾肺腎虛寒不能司
攝而水泛行也急用加減腎氣丸門本
經曰三陰結謂之水三陰脾肺也肺主氣肺為邪結

則氣不行。不行則為水腫。脾主分利。脾為邪結。則氣不化。不化則為水腫。

經曰。水腫其本在腎。其末在肺。蓋腎者。胃之關也。關門不利。故聚水而從其類也。水病下為跗腫大腹。上為喘呼。不得臥。此標本原病也。又曰。下焦溢為水。下焦乃分注之所。氣窒不通。則溢而為水也。又曰。脾移寒於腎。名曰涌水。針經曰。肢脛者。人之管以趨翔也。並垂者。身中之機。陰精之候。津液之道也。飲食不節。喜怒不時。津液內溢。下流於壘。血道不通。日以益大。趨翔不能。此病榮有水。不上不下也。劉宗厚云。內經諸論水。皆諸藏本病。針經所引。則又主飲食七情等因。皆能致之。則臨症不可不詳審也。

肺主水。管藏水。以寒相移。故水涌於大腸之腑也。又腎者。胃之關。關門不利。腎氣壅滯。致膝下至少腹脹滿。甚至脛有大小。足跛偏枯等症。皆氣滯下部所致也。

仲景曰。諸有水氣者。腰以上腫。宜發汗。腰以下腫。宜

證治大還

醫學近編 卷之十五

水腫

三

真白堂

利小便。即內經。開鬼門。潔淨府也。東垣云。開鬼門。發汗也。潔淨府。利小便也。又曰。中滿者。瀉之於內。謂脾胃有病。當令上下分消其濕。下焦一清。氣血自然分化。不待洩瀉穢也。如大實大滿。小便不利。權以寒熱藥下之。丹溪云。脈堅實。人壯盛。可用攻藥。隨即收拾。

證治大還

醫學近編 卷之十五

水腫

四

真白堂

葉石峰曰。腫病不一。或遍身腫。或四肢腫。脚腫。或面腫。皆謂之。水氣。又有陰水。陽水之殊。濕氣浮腫之異。如遍身腫。濕甚困重者。宜分利小便。氣攻皮膚者。宜行氣散鬱。肢腫。五皮湯加薑黃。面腫。蘇子降氣湯。加沈香。蘇子。朴。歸。前。面與脚浮腫。早則面甚。晚則脚甚。此風濕也。五苓散。白朮。赤茯苓。白芷。腹皮。木瓜。面目手足浮腫。導滯通經湯。感濕而腫者。其身雖腫。腰腿足尤甚。胃苓湯。喘急。分氣香蘇散。不服水土。而腫。胃苓湯。飲食所傷。或胸滿。噎氣。消導寬中湯。陽水煩渴。小便赤澀。大便或秘。脈沈數。疏鑿飲子。前金沙

微本 陰水大便澀小便少而不赤澀脉沈遲實

脾湯本 皮水跗腫按之沒指其腹如鼓水氣在

皮膚中聶聶動防已茯苓湯本 裡水脉沈遲腹

滿而喘小便不利越婢湯本 加蒼朮 石水小腹

腫硬如石起臍下少陽故堅硬如石也至少腹垂

垂然至胃則死八味腎氣丸本 水腫其脉沈小

屬少陰麻黃附子甘草湯 肺經有濕通身腫脹

者續隨子丸本 腫只在下五尋除濕湯二朮朴

半夏曲 加木瓜防已 因洗瘡逼毒入內而腫者

澄治大還 醫學近編 水腫 五 貞白堂

消風敗毒散 因大病後或瀉痢或久瘧浮腫白

朮壯脾湯參朮茯苓 產後浮腫八珍湯加蒼朮

陳皮半夏香附紫蘇 脾胃虛弱不能通調水道

而腫者用補中益氣湯補脾肺六味丸補腎 風

熱閉塞咽喉忽遍身浮腫用牛旁子半生半熟酒

調服

婁全善云丹溪治水腫之法大率以參朮陳皮茯苓

等劑補中氣為君木通滑石郁李仁海金沙行水

為臣厚朴腹皮蘇梗木香通滯氣為佐氣不升浮

脉沈者探吐以提之頭面腫者加麻黃微汗之按

積者佐以餅和溫中等丸以摩化之挾熱者佐以

芩連以清涼之挾瘡腫者佐以犀角連翹以清解

之隨症以增損也

按腫與喘二証恒相因治須分先後用藥先腫而

後喘者是腎水上溢於肺以致氣壅不得下降而

生喘也治當伐腎邪利水道次清肺中壅滯則濁

氣降而金清喘斯定矣先喘而後腫者是肺金受

邪氣不輸化以致小便澀少水溢皮膚而生腫也

澄治大還 醫學近編 水腫 六 貞白堂

治當清金降氣行腎中蓄積之水則清化行而水

自下腫自消矣若下則為肺腫大腹上為喘急不

得卧此是肺腎俱病治當補養脾土滋其化源脾

實則肺有所藉腎有所制且降令行而喘脹皆消

矣

經曰邪氣內逆則氣為閉塞而不行不行則為水脹

蓋陰陽氣道不通則四海閉塞三焦不瀉津液不

化穀并於腸胃之中別於迴腸留於下焦不得滲

於膀胱則下焦脹而水溢故為水脹也

劉河間曰。小便不利。腹脹。水化為血。即成腫滿。火在上焦。故也用細辛升陰腎水。以降其火。然後佐以利下之藥。其脹自消。

陳三農云。腫脹之疾。先從脚下腫者。此濕熱在下。宜先溫補脾胃。服五六貼。次以補中益氣湯。服二三貼。和之。後以五苓散利之。從上身腫者。此濕熱在上。宜先利其濕熱。服二三貼。口渴加蘇葉。次加溫補脾胃藥。多服之。合上二症調理。總不外乎脾胃二經。雖有上下之不同。大抵脈浮無力。宜汗。五積證治大還。醫學近編 水腫 七 貞白堂 卷之十五

散。脈沈無力。宜溫。四君子合和中散。氣濕水三腫辨。以手按之。隨手即起者。水也。頃時而起者。氣也。成窠不即起者。濕也。

不治症

從四肢歸入腹者。大便澹泄者。唇黑缺盆平者。臍突足底平者。背平肉硬者。手掌無紋者。男從脚下腫而上。女從上身腫而下。皆不治。

醫按

羅謙甫治一人。面目肢體浮腫。大便澹泄。腹脹腸鳴。飲食減少。脈弦細而緩。曰榮運之氣。出於中焦。中焦者胃也。胃氣弱。不能布散水穀之氣。榮養臟腑。經絡皮毛。故氣行而澹。為浮腫。大便澹。腹脹腸鳴。皆濕勝也。治腫以胃氣為本。遂以平胃散加白朮茯苓草豆蔻數服。而諸症皆愈。但四肢尚腫。以導滯通經湯而安。

丹溪治一人。忽滿身發腫。頭面尤甚。目不可開。膈滿如築。兩足麻至膝。怕風陰挺長。脈左沈重。取不應。

證治大還

醫學近編 水腫 八 貞白堂 卷之十五

右三部短滑。遂用白朮煮湯。空心探吐。食後用白朮二錢。麻黃防風川芎作湯下。保和丸。如此二日。吐中得汗。腫漸減。後去麻黃防風。加木通通草下。保和丸而安。

又治一婦。夜間發熱。面先腫。次及肚足。渴思冷水。用麻黃葛根川芎蒼白朮木通腹皮梔子甘草愈。

又治一人。久坐受濕。順氣清熱。用滑石蒼白朮葛根蘇葉厚朴木通下。保和丸而安。

又治一人。秋冬患腫。午前上甚。午後下甚。口渴乏力。

脉清弱食減此氣怯汗不能自出鬱而爲痰遂灸肺俞大椎合谷分水用葛根蘇葉白朮木通海金沙大腹皮茯苓皮厚朴陳皮黃芩甘艸漸愈

陳霞山治欬逆上氣體腫氣短脹滿坐不得卧常作水雞聲用白前湯白前二兩紫苑半夏各三兩大戟一兩以水一斗煮三升分三服

越婢湯 治脉浮在表及腰以上腫宜此發汗兼治

勇而勞甚腎汗出汗出遇風內不得入臟腑外不得越皮膚客於玄府行於皮裡傳爲附腫本之於

證治大還 醫學近編 水腫 九 貞白堂 卷之十五

腎名曰風水其症惡風一身悉腫脉浮不渴續自

汗出風水症少氣時熱從肩背上至頭汗出苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難行正臥則咳煩

而不能食

麻黃 石膏 各四錢 甘草 生薑 各二錢 大棗 二枚

惡風加附子

二朮散 治腰以上腫用此汗之若渴而下利小便

數者不宜服

麻黃 三錢 蒼朮 白朮 防風 木通 川芎

葛根 大腹皮 甘艸稍

加味甘芩湯 治脉沈在裡及腰以下腫用此燥脾

利水

蒼朮 白朮 茯苓 澤瀉 猪苓 厚朴

陳皮 桑皮 防已 木香 肉桂 大腹皮

郁李仁

五皮湯 謙甫 治癰痢後身體面目虛浮四肢腫滿

腹脹上氣喘急

大腹皮 茯苓皮 桑白皮 陳皮 薑皮

證治大還 醫學近編 水腫 十 貞白堂 卷之十五

脚腫加五加皮防已木瓜

五子五皮湯 治水腫上氣喘急

蘇子 荀子 葶藶子 香附子 車前子

桑皮 陳皮 大腹皮 茯苓皮 薑皮

香砂五皮湯 治脾氣不運濕遊經絡腫脹痞悶或

脾肺虛弱不能運行諸氣氣虛不理散漫於皮膚

而爲腫脹

木香 砂仁 荀子 神麴 蒼朮 厚朴

陳皮 廩皮 桑皮 茯苓皮 薑皮 白朮

澤瀉

分氣香蘇飲

桑皮 陳皮 茯苓 桔梗 枳殼 香附

草果 紫蘇 腹皮 食鹽 五味子

索矩三和湯

陳皮 厚朴 各三錢 檳榔 紫蘇 各二錢 白朮 三錢

木通 枳殼 茯苓 腹皮 海金沙

漢防已散 治水氣喘急

防已 澤漆葉 石葦 澤瀉 桑白皮 丹參

證治太還

醫學近編 水腫 上 貞白堂 卷之十五

茯苓 郁李仁 陳皮 白朮 通草 生薑

人參木香散 治水氣

人參 木香 茯苓 滑石 琥珀 海金沙

猪苓 枳殼 檳榔 甘草 等分 生薑 每五

錢水煎服

實脾散 治陰水發腫用此先實脾土

白朮 厚朴 木瓜 木香 乾薑 草果

訶子 茯苓 甘草 大腹子

加味實脾散 玉機 治脾虛受濕用此方養脾氣

蒼朮 三錢 白朮 三錢 人參 二錢 白茯苓

半夏 大腹皮 桑皮 各一錢 厚朴 八分 熟附子 五分

車前子 炒一錢 沈香 磨入

消導寬中湯 純音

白朮 枳實 厚朴 蒼朮 陳皮 半夏

茯苓 山查 神麴 苟子 草果

海金沙散 東垣

治脾濕太過通身腫滿喘不得臥

牽牛 一兩 白朮 一兩 甘遂 海金沙 各五錢

每二錢用倒流水調下利止後服

證治大還

醫學近編 水腫 上 貞白堂 卷之十五

防已茯苓湯 仲景

治皮水四肢腫水氣在皮膚中

聶聶動

防已 黃芪 桂枝 各三錢 赤茯苓 六錢 甘草 二錢

桑白皮

導滯通經湯 謙甫

治脾濕有餘氣不宜通而目手

足腫注悶痛

茯苓 澤瀉 白朮 陳皮 木香

葶藶木香散 河間

治消腫甚捷但虛弱人不宜服

葶藶 茯苓 猪苓 各二錢 澤瀉 木通 甘草

各五 白朮 二兩 滑石 二兩 肉桂 二錢

石簞散 秘傳 治水腫利小便甚捷

石簞 一兩 楊樹草 七錢 鬱金 酒炒 五錢 木香 三錢

蝸牛 燒灰 麝香 五釐 酒下二錢

茯苓湯 治脾氣不實手足浮腫小便赤氣喘

赤茯苓 澤瀉 桑皮 大腹皮 香附 陳皮

乾薑

木香分氣湯 治氣滯不行胸腹四肢膨脹氣喘小便不利

證治大遺

醫學近編 水腫 三 貞白堂

木香 猪苓 澤瀉 茯苓 半夏 枳殼

檳榔 蘇子 燈心

神金散

雄黃 澤瀉 椒目 減半 大戟 芫花 醋浸 一日 葶藶

元米和炒去 巴戟 茯苓 甘遂 桑皮 各一兩

從腳腫加葶藶 肚腫加椒目 陰腫加澤瀉

面腫加桑皮 四肢腫加茯苓 心腫根在肋加

雄黃 肢腫根在肋加甘遂 口腫根在小腸加

巴戟 腰腫根在腎加大戟 膝腫根在肝加芫

花 每用水調一錢加至五錢以利為度忌鹽醋

生冷油膩之物 加味腎氣丸 仲景 治脾胃虛損腰脚腫重濕飲留

積小便不利肚腹腫脹

熟地 四兩 白茯苓 山茱萸 丹皮 山藥 車

前子 澤瀉 牛膝 各二兩 肉桂 附子 各一兩

白朮 炒 茴香 炒 各二兩

遂香丸 新仙 治邪氣內逆氣不行為水腫用此利

氣洩水

證治大遺 醫學近編 水腫 十 貞白堂

橘紅 一兩 木香 青木香 沈香 檳榔 皂莢

甘遂 乳香 沒藥 各三錢 人參 一錢 醋糊丸如

梧子大燒酒下八分漸減分數

復元丹 無擇 治三焦不瀉氣脉閉塞樞機不通喘

息奔急水氣盈溢滲透經絡皮膚溢滿足脛尤甚

腿肢間冷心腹堅脹正偃則咳嗽小便不通

獨活 二兩 木香 茴香 川椒 羌活 厚朴

白朮 吳茱萸 陳皮 肉桂 各二兩 澤瀉 肉果

廣榔 各五 粥丸梧子大紫蘇湯下五十丸

葶藶丸 河間

治涌水如溢囊裹漿遍身腫滿

則濯濯有聲喘咳不定

葶藶

澤瀉

椒目

桑皮

杏仁

猪苓 各五錢

蜜丸梧子大蔥酒下三十九

續隨子丸 東垣

治肺經有濕遍身虛腫喘咳

人參

防已

赤茯苓

檳榔

木香

續隨子

海金沙 各五錢

葶藶

炒一兩

棗肉丸桑皮湯下

蒼朮丸 野夫

治水腫行水燥脾奏捷甚速

大戟 二兩

蒼朮 二兩

沈香 五錢

陳米糊丸酒下三

證治大還

醫學近編 卷之十五

水腫

五

貞白堂

錢 一法用陳大麥上下覆觀蒸為末酒下二錢

以上五方皆刮劑也非濕熱痞甚痰涎隔氣及壯

實者不宜用衰弱者理當滋其化源如加味腎氣

丸之類

治水腫

用陳香圓 炙脆

牙皂 三錢

椒目

一錢五分

大麥麵 炒熟

白湯調服

張尚客治水腫

以大戟當歸橘皮各一兩水三碗

煎一碗分二服

孟洗治腫滿

以鯉魚一大尾開腹入胡椒末五錢

大蒜三枚納腹中系緊赤小豆一升和煮二三沸

下蘿蔔四五個葱一握煮熟空腹食之則洩氣無

限

梅師治水腫坐臥不得 取東引桑花枝燒灰淋汁

煮赤小豆空腹吃飽不得飲湯

秘方治水腫 用牽牛四兩菜豆二合沙糖一碗煮

乾為末淡酒下三錢

海上方治水腫

以萬年青根搗汁和酒溫服 水

腫大小便不利馬齒莧入鹽少許猪脂炒食

證治大還

醫學近編 卷之十五

水腫

去

貞白堂

裴氏治水腫及暴腫 葶藶三兩搗入防已末四兩

綠頭鴨血及頭搗丸梧子大湯下十丸 一方用

老洗雞屎新瓦上炒乾為細末每三錢酒下

氣滯通身浮腫 用陳香圓麥芽炒各二兩水十碗

黃四碗分四五服自愈

按鼓脹水腫諸方惟石礬丸遂香丸取効甚速但

先補後攻或脹減即補方獲全安不則元氣益虛

不久即復脹矣補中益氣之劑決不可少

凡大人小兒通身浮腫喘急小便不利自下而上

者名附水。自下而上者名陽水。俗名河白。用河白草濃煎湯洗滌。此草三尖底平。葉底及梗皆有芒刺。陽水用無刺者。陰水用有刺者。一二浴後而小便即利。浮腫自消。神效神効。

人年甫三旬。怒後發腫。飲水過多。且日肢體俱腫。腹脹異常。求診于余。余曰。年方壯而病發于驟。脈方實而藥不厭晚。若不急于疎通。久必成大患。以胃苓散加牛膝車前三進。而不為少動。是病深藥淺也。更以舟車神佑丹進。而小便泉湧。肢體漸收。

證治大選

醫學近編

水腫

七

貞白堂

卷之十五

仍與胃苓湯加白朮椒仁十五日而愈。

瘧症 附勞風

陳三農曰。古名瘧症。今訛謂瘧言其勁之義也。四肢強勁。有如角弓反張。無汗為剛。瘧外有風邪有汗為柔。瘧內因虛弱。診脈虛實以治。庶得其道。內經云。諸瘧項強皆屬于濕。諸暴強直皆屬于風。成無己曰。太陽病發汗太多。則亡陽而成瘧。

丹溪曰。大率與癰相似。瘧為虛。切不可作風治。而純用風藥。多屬氣血虛。有火有痰。宜補兼降火。參芪芎歸竹瀝之類。

證治大選

醫學近編

瘧症

貞白堂

卷之十五

薛氏曰。大凡病一切虛弱。用參朮濃煎。佐薑汁竹瀝。時時啜之。不應十全大補加附子。

又曰。昔之所謂剛柔。二瘧者。當以虛實論之。是也。一屬外感。一屬內傷。屬外感者為剛瘧。宜用麻黃葛根湯。括囊桂枝小續命湯。在裏者大承氣之類。屬內傷者為柔瘧。宜用補中益氣湯。八物四物之類。如以風濕二事。分剛柔。恐悞。今以虛實分治。其理昭然無疑矣。

常見瘧病多起于產後。及傷寒汗下後。氣血大虧。不

能榮筋筋強而然須十全大補少佐附子以行參

芪之氣補衛引歸地之性補榮妙甚古方重外感

故用續命等藥今人稟受不同故爾

妊娠產有初起心肝風熱盛者鈎藤湯肝脾血虛者

加味逍遙散肝脾鬱結加味歸脾湯氣逆痰滯紫

蘇飲二陳加竹瀝薑汁

當歸補血湯治一切去血過多因無血養筋令人

四肢攣急口禁如症

黃芪三錢當歸五錢羌活各一錢荆芥穗一錢

證治大還醫學近編 瘧症 卷之十五 二 貞白堂

甘草半錢減水煎服

防風當歸散治發汗過多發熱頭搖口噤背反張

能去風養血

防風 當歸 川芎 生地各二錢半作一劑水煎服

一方治少年痘瘡屬後或痘口噤不開四肢強直時

遠勝痛一陣則冷汗如雨痛定汗止脈急強緊如

直弦先因勞倦傷血瘡後血愈虛而又感風寒當

用溫藥養血辛甘散風歸芍為君川芎青皮鈎藤

為臣白朮甘草為佐桂枝木香黃連為使加紅花

少許水煎服愈

若肝氣盛而發熱脈弦者小柴胡發熱用逍遙散

若中氣不足補中益氣加芍藥山梔脾家鬱結

歸脾湯加香附

活人舉鄉鼓拜散治新產血虛發瘧汗後中風亦

然

荆芥穗不拘多少微炒為末每服三五錢外以大

豆黃卷以熱酒沃之去黃用汁調下其効如神

仲景法病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤獨

證治大還醫學近編 瘧症 卷之十五 三 貞白堂

搖卒口噤背反張者瘧病也傷寒太陽重感寒

溼則病瘧無汗曰剛瘧有汗曰柔瘧剛瘧無汗

麻黃葛根湯柔瘧有汗不惡寒桂枝瓜蒌湯

太陽病無汗而小便多少氣上冲胸口噤不開欲

作瘧活人用葛根湯夫既小便少而氣上冲此必

挾虛症絛脈症可也

一婦年三十餘身材小瘦弱月經數日後忽發瘧口

噤手足攣縮角弓反張予知其去血過多風邪乘

虛而入用四物湯加防風羌活荆芥少加附子行

經二帖病減六帖全安

亡血及產後瘡家發瘧自屬血虛

薛氏曰產後病後瘧由亡血過多筋無所養與傷寒汗下過多潰瘍膿血大泄變瘧皆敗症也急以十全大補湯如不應急加附子亦有六淫七情所致者

勞風 附

丹溪云瘧比癰爲虛蓋因勞汗遇風內挾太陽寒濕之邪治亦與瘧同法但當視其所勞則知虛在何

證治大還

醫學近編

瘧症

四

真白堂

臟如房勞則腎虛汗出腠理開風入皮膚得寒則閉風不能出與水俱行其人當目下腫如臥蚕之狀戴人云腎主水其經至于目下故也不禁房室則死明其虛在腎也所以關於太陽何也太陽主寒其經最在外腠理得寒則閉故太陽先受邪也治宜八物白朮散倉公當歸湯

黃芪湯 治汗多氣虛發瘧

黃芪

蜜炙

人參

白朮

茯苓

白芍

炒各

甘草

炙八

桂枝

分五

水煎服

當歸散 治血虛及去血過多發瘧

當歸 酒洗

川芎

熟地

防風

黃芪

各一

錢

芍藥 一錢

甘草 四分

水煎服

理氣平肝散 治七情所傷發瘧

烏藥

香附 各一

青皮

枳殼

芍藥

川芎

柴胡

木香 各一

甘草

薑三片

水煎服

木香磨

水二匙加入

清痰湯 治痰火攻作項強口噤角張及瘧

山梔

黃芩

半夏

橘紅

茯苓

瓜蒌仁

證治大還

醫學近編

瘧症

五

真白堂

枳殼

貝母

香附 童便浸

各一錢

甘草 五

水煎入竹

瀝薑汁各三四匙食遠服

去溼清熱散

白朮 二錢

蒼朮 二錢

澤瀉

茯苓

天花粉

山梔

各一

羌活 七

甘草 四分

水煎服

芎藭丸 治勞風強上冥視肺熱上壅唾稠

川芎

枳殼 等分

爲末

蜜丸

桐子大

每服三五

十

丸食後溫下水日三服

祛風清金散

治肺熱壅盛痰唾如膿

防風 括蕪根 桔梗 枳殼 旋覆花 川芎

錢 山梔 黃芩 貝母 瓜蒌仁 炒 茯苓 天

門冬 麥門冬 橘紅 各八分 五味子 十五粒 甘草 五分

水煎服

貞子曰按內經評熱病論帝曰勞風之病何如岐伯

曰勞風發在肺下其為病也使人強上冥視唾出

若涕惡風而振寒此為勞風之病帝曰治之奈何

岐伯曰以救俛仰巨陽引精者三日中年者五日

不精者七日咳出清黃涕其狀如膿大如彈丸從

證治大還

醫學近編 卷之十五

癰疽勞風

六 貞白堂

口中若鼻中出不出則傷肺傷肺則死也引精謂

情明引動能辨人與物也

啟玄子註曰勞風者從勞風生故曰勞風勞謂腎勞

也腎脉者從腎上貫膈入肺中故腎勞風生上

居肺下也強上好仰也冥視謂合眼視不明也腎

精不足外吸膀胱膀胱氣不能上營故使人頭項

強而視不明也肺被風薄勞氣上薰故令唾出若

鼻涕狀腎氣不足陽氣內攻勞熱相合故惡風而

振寒肺傷則營衛散解魄不內治故死林氏謂強

上者角弓反張也冥視者目開不見物也凡瘧病

皆同不識人或反視斜視也治法當與瘧同千金

方冥視作目眩

紫蘇飲 見氣門

麻黃葛根湯

大承氣湯

小柴胡湯

桂枝瓜蒌湯

俱見傷寒門

小續命湯

見中風門

八物四物四君

十全大補湯

俱見虛損門

補中益氣湯

見內傷門

歸脾湯

見健忘門

加味逍遙散

見婦人門

鈎藤湯

證治大還

醫學近編 卷之十五

癰疽勞風

七 貞白堂

疝

全屬肝經濕熱被外寒所鬱氣不得通故痛甚或上攻心下大率先從小腹起或左或右或痛連毛際陰囊必先用辛熱散之稍久可佐以涼藥蟠葱散之類

陰囊及睪丸熱則縱寒則痛濕則腫

痛甚脉必沉伏或弦急內經曰肝脉大急弦為疝

古方用梔子烏頭作湯甚捷隨症加減無不應驗但

濕熱又當分多少而治濕則腫多癰疝是也又有

證治太還

醫學近編 疝 卷之十五

貞白堂

挾虛而發者當以參朮為君疎導藥佐之桃仁山

楂枳實川練茱香橘核木香梔子玄胡索丁香之

類脉不甚沉緊而豁大無力是也其痛亦輕但重

墜牽引耳切不可攻下惟劫藥神効

蓋濕熱因寒鬱而用梔子以降濕熱烏頭以破滯氣

況二物皆下焦之藥而烏頭為梔子之所引其性

急速不容胃中停留也又按之痛定者屬虛須加

肉桂以薑汁九服定痛速効用枳核糖毯核茱萸

各炒濕盛者加荔枝核炒為末一本有川練子

又方 治食積挾瘀血而成病者

梔子 桃仁 山楂 枳實 吳茱萸 各等分

右為細末順流水作湯調服

按之不痛者屬虛必用桂枝山梔子炒烏頭伴為

末薑汁打糊九桐子大每服四五十丸劫痛効

諸疝發時用海石香附二味為末生薑入湯調下亦

治心痛因清痰為患者

又方 治疝痛

橘核 炒 桃仁 研 梔子 炒 吳萸 炒 川烏 炒 水煎服

證治太還

醫學近編 疝 卷之十五

貞白堂

小腸氣腎核脹痛

蒼朮 陳皮 川練子 各二錢半 甘草 五分 紫蘇葉 一錢半

水酒各一盞連鬚葱白五莖煎服

天台烏藥散川練子散簡易本香練子散皆用巴豆

炒藥許學士曰犬抵此病因虛而得不可驟補邪

之所乘其氣必虛留而不去其病則實必先滌去

所蓄之邪熱然後補之是以諸藥多借巴豆氣者

此也

定痛劫藥神効

川烏頭 梔子炒 搗細順流水入薑汁調服

陰囊腫脹大小便不通

白牽牛一兩 桑白皮 白朮 木通去節 陳皮各半兩

右爲末薑湯空心調下

偏墜初起穿山甲茴香二味爲末酒調下乾物壓之

外用牡蠣煨良薑等分爲細末唾津調塗大者一

邊須臾如火熱痛即安

三因燔葱散 治一切寒疝作痛

川芎 歸身 枳殼炒 厚朴炒 官桂 青皮

證治大還 醫學近編 疝 卷之十五 三 貞白堂

乾薑 茴香炒 茯苓 川練 麥蘖 神麴

三稜炮 莪朮 熟地 白芍 木香 人參

右細切每服五錢葱白三根鹽少許水煎空心服

又方

桃仁十四枚 枸橘子十四枚 炒山梔子九枚 吳萸七十粒

山楂十四粒 生薑一指大搗細以順流水煎服

又方 治癰疽不痛如升斗俗名氣胞用蒼朮神麴

白芷山梔川芎梔子半夏南星入薑煎服或加海

藻昆布必斷酒薄味

凡疝非斷房事與厚味酒麵不可治

一方治癰疽用香附爲末用酒一盞海藻一錢煎半

盞先撈海藻細嚼即以酒下之附末二錢

七疝痛不可忍灸大敦穴灸在足大拇指聚毛處

去甲一韭葉灸三壯屬厥陰井也

治疝痛神効方痛甚致氣上衝如有築塞心下欲死

手足冷者硫磺不拘多少火中溶化即投水中去

毒研細務枝核橘核炒黃陳皮 右三味爲末各

等分飯九桐子大每服四五丸酒下其痛立止甚

證治大還 醫學近編 疝 卷之十五 四 貞白堂

者不過五六丸不可多也

偏墜初起用川山甲茴香二味爲末酒送下

丹溪止痛方

蒼朮 香附鹽水炒 黃柏酒炒以 青皮去核 玄胡索

桃仁 益智仁以上爲臣 茴香 香附子鹽炒 炙甘草以上

爲佐 順流水煎服

五葉湯洗疝痛立効

枇杷葉 野紫蘇葉 椒葉 蒼耳葉 水晶葡萄

萄葉 右五味不拘多少煎湯薰洗

一方肥人腫痛作寒熱。五苓散加茴香煎服神効。

沉香桂附丸 治中氣虛弱。真火不足。臟腑積冷。腹

脇痛。手足厥冷。便利無度。七疝引痛。喜熱物熨。

沉香 附子 炮 川芎 乾薑 炒 良薑 官桂

吳茱萸 湯炮 七次 茴香 共為末。醋糊丸。桐子大。每

服五十丸。或七十九空心米飲下。

元戎加味五苓散。治疝氣卒痛。小便秘塞。

本方加川練子共末。空心米飲下二錢。

茴香練寶丸 治陰疝痛不可忍。及小腸氣痛。

證治大還 醫學近編 疝 五 貞白堂 卷之十五 二萬六千七百六十七

川練子 炒 茴香 炒 山茱萸 食茱萸 吳茱萸

青皮 陳皮 羌活 醋 馬蘭花 各等 醋糊丸。桐子

大。每服三十九空心溫酒下。

濟生葵子湯 治膀胱實熱腹脹。小便不通。口乾舌

燥。腸腕作痛。

赤茯苓 猪苓 冬葵子 枳實 瞿麥 木通

黃芩 車前 滑石 各半 甘草 二分

薑三片。空心服。

丁香練寶丸 治男子七疝痛不可忍。婦人瘕聚帶

下。任脈為病。治法同前。

當歸 附子 炮 茴香 炒 川練子 各一 兩

右為細末。每末一兩。入丁香木香各半。分。玄胡索

五分。全蝎十三箇炒。共為末。與前末同拌勻。酒

糊丸。桐子大。每服三十九。加至百丸。空心溫酒下。

一捏散 治七疝奔豚。痛不可忍神効。方見氣門

丹溪曰。凡治七疝。多用熱藥。獲效者。即內經從治之

法。須用寒涼鹽制。不可純用大熱之劑。如烏頭附

子之類。今人多服久服。必變劇。不可治矣。但以二

證治大還 醫學近編 疝 六 貞白堂 卷之十五 三萬零五百六十七

陳湯。加枳實。楠核。梔子。山楂等煎藥。入生薑汁。熱

服之。有瘀血作痛。有一塊隱隱。脈瀦者。是本方加

玄胡索。桃仁。泥氣。結作痛者。本方加木香。茴香。練

實等藥。如六脈沉細。手足厥冷者。本方加附子。乾

薑。肉桂之類佐之。如舉丸痛甚者。加荔枝核。乳

香。沒藥。為細末。調入本方藥內。煎或另用順流水

調服亦可。如木腎腫大。如升斗者。本方去甘草

加海藻。昆布。荔枝核。茴香。川練實等為末。順流水

調服。為丸亦可。

經驗馬蘭花九 治七疝癰氣及婦人陰癰墜下小

兒偏墜無不効者

馬蘭花醋炒 川練子 橘核 海藻 海帶 昆布

俱酒 木通 桃仁去皮尖 厚朴薑製 枳實 玄胡索

錢各五 肉桂 二錢

救命通心散 治疝痛小便不利

川烏頭一錢酒一盞浸烏頭 茴香半兩

川練子一兩用巴豆二十粒同炒候黑色去巴豆 石燕對芥子一錢六分

土狗五枚 爲末每三錢入羊石子內濕紙煨香熟

證治大還 醫學近編 疝 七 貞白堂

半夜時好酒半升入鹽將石子細嚼下不得作聲

小便大利即愈

大抵疝痛兼小便難須兼利之昔人曾用五苓散加

連鬚葱一莖茴香一撮鹽一錢水蓋半空心服小

便去如墨汁即愈此必多服熱藥而然

丹溪治一人酒後飲水致外腎偏大痛而作蛙聲用

炒枳實一兩茴香二錢鹽炒炒梔子三錢研煎下

保和丸 又一人膀胱氣下墜如蛙鳴真橘子炒十枚桃仁二

十枚蘇合自然汁研勻點湯下 保和丸治腎子疝痛亦効

外寒束內熱陰囊及小腹腫硬牽引疼痛及小腸氣

陰囊腫毛間出汗金鈴丸主之

金鈴子肉五兩 茴香炒 馬蘭花炒 兎絲子 海蛤粉

砥故破 海帶各二兩 木香 丁香各一兩

右爲末糊丸桐子大每服二三十九溫酒或鹽湯

抵聖丸 治陰癰腫滿赤痛大便秘飲水按之臍

腹痛

證治大還 醫學近編 疝 八 貞白堂

續隨子 薏苡仁 郁李仁 茵芋 白丑炒各等分

共爲末水丸桐子大每五丸用博濟方薑茶湯下

疝痛用紫蘇湯浴下部妙更以摩腰膏摩囊上橫骨

端火溫帛以覆之痛隨止煖隨氣行故也治見腰痛門

癰疝腫痛敗精惡血結于陰囊所致用阿魏二兩醋

和蕎麥麵做餅裹煨熟大檳榔二枚鑽孔溶乳香

填滿亦以蕎麥麵裹煨熟入硃砂末一錢赤芍末一

兩糊丸桐子大每服三十九空心酒下出范氏得效方

苦練子導小腸腸腕經熱故疝家最要近有四治七

治諸法俱妙用棟子五兩分五分一分破故紙二

錢炒黃一兩小茴香三錢食鹽半錢炒一入萊菔

子三錢炒一入牽牛三錢炒一入班蝥七枚去頭

足炒俱去惟畱破故紙茴香同研爲末酒糊丸桐

子大每空心酒下五十九

本草綱目一方天門冬五錢烏藥三錢水煎空心服

半月即驗疝氣作痛能除根張白門服之驗者

夫罽丸所絡之筋未必盡由厥陰而太陰陽明亦入

證治大還

醫學近編 疝

九

貞白堂

絡也往往見人偏患于左丸者則痛多腫少偏于

右丸者則痛少腫多此便可驗也

昔人嗜啖橘積成飲癖在右脇下隱隱然不敢復啖

數年已一日山行大勞饑渴遇橘芋食之橘動舊

積芋復滯氣即時右丸腫大寒熱交作因思脾肺

皆主右故積飲滯氣下陷太陰陽明之經筋俱傷

其邪從而入於囊中著在罽丸筋膜而爲腫脹張

戴人有言病分上下治雖是木鬱爲疝在下則不

可吐亦當從下引而竭之竊念病有不同治可同

乎今犯饑勞傷脾脾氣下陷必升舉之則胃氣不

復下陷而積可消先服調胃藥一二帖次早存想

使至下焦嘔逆而上覺肋下積到中焦則吐而出

之吐後癰腫減半次早又吐吐後和胃氣疎經絡

二三日愈此法治飲酒與水飲注右丸腫者皆効

又治一人飲水患左丸痛灸大敦穴外用烏附麝丁

香爲末磨其囊上抵橫骨灸溫帛覆之痛即止一

宿即消

天台烏藥散

證治大還

醫學近編 疝

十

貞白堂

天台烏藥

木香

茴香

炒青皮

良薑

炒五錢

檳榔二枚

川練子

十兩

巴豆

十四枚

右八味先以巴豆打碎同練實用麝炒黑去巴豆

麝共爲末每服一錢酒下痛甚炒生薑熱酒下

川練子散

木香

川練子

剉碎用巴豆十四粒如上法炒

茴香

鹽一匙炒

共爲末空心酒下二錢

木香練子散

治小腸偏墜腸腕疝氣久藥不效者

川練子

三十枚巴豆二枚如上述

草薺

半斤

石菖蒲

一兩

炒

青木香

二兩

荔枝核

二十枚

共爲末。每服二錢。入麝少許。空心茴香鹽酒下。

證治大要

醫學近編

疳

二

貞白堂

疳症

五疳均屬濕熱傷脾所致。宜分虛實。

大法宜利小便除濕熱。

脈浮腹中和宜汗。脈浮心中熱腹滿欲吐者宜吐。

脈沉心中懊憹或熱痛腹滿。小便不利而赤。自汗

出。宜下。脈不浮不沉微弦。腹痛而嘔。宜和解。

脈沉細無力。自汗泄利。小便清白爲虛。身目黃大

便自利宜補。饑飽勞役。內傷中州。非外感宜補。

痛飲人二便不利。目先睛黃。久變爲疳。初起脈有力。

證治大要

醫學近編

疳症

一 貞白堂

能食不大便者。茵陳大黃湯微利之。次用茵陳五

苓散。以滲熱解熱。稍久宜固脾湯。本方倍白朮氣

虛。脈緩弱體倦。加人參。

酒疸小便赤澀。用田螺洗淨。浸水煎湯。或用煮螺蛸

湯亦可。

酒疸心中懊憹或熱痛。梔子大黃湯主之。

多鬱悶人。身痛脈沉伏。不因于酒。心目俱黃。胸膈不

快。是穀疸。乃穀氣因鬱。不能四達。遏久脾傷。色見

于外也。宜舒鬱利膈。兼消導運脾。二陳二朮香附

撫芎 梔子 附枳實麥芽增減

久病痿黃倦怠不食脉緩無力屬脾虛非疸也大補脾氣從內傷治黃不退加秦艽薏苡

乾黃燥也小便自利四肢不沉重渴而引飲梔子漿

皮湯

濕黃脾也小便不利四肢沉重似渴不欲飲者茵

陳湯

黃如橘而明者熱多脉必數解熱為主

黃如薰黃而暗濕多脉必沉緩滲濕為主

證治大要

醫學近編 疸症

二

貞白堂

丹溪曰不必分五同是濕熱如會麴相似輕者小溫

中丸重者大溫中丸熱多加黃連濕多加茵陳五

苓散加食積藥

戴氏曰食積發黃量其虛實而下之其餘但利小便

小便清利則黃自退

或曰黃疸宜用倒倉法又曰黃疸倦怠脾胃不和食

少胃弱湯加減小便赤澀加滑石

小便赤澀為濕熱盛清熱滲濕若小便清白是虛症

一方治黃疸

芩連 梔子 茵陳 猪苓 澤瀉 蒼朮

青皮 龍膽

各五分

穀疸加三稜莪朮宿砂陳皮神麴氣不通作脹

或喘加苦葶藶

氣實人濕熱盛於上焦惡心飽脹宜吐之

撫芎 梔子 桔梗

各二錢

薑煎入薑汁服深吐

酒疸心中懊惱欲吐吐之愈

濕熱盛於上焦懊惱身目黃用瓜蒂散蓄鼻中黃水

從鼻流出佳

證治大要

醫學近編 疸症

三

貞白堂

瓜蒂 母丁香 黍米 赤小豆

各二錢

半錢

右為末每晚陰水一口於兩鼻孔吹上半匙便睡

至明日取下黃水便服黃連散五六服效若目黃

不退瓜蒂散搐鼻取黃水出愈

黃連散 治二便秘澀

黃連 大黃 黃芩 炙甘草

各二兩

各

共末每服三錢食後溫水調下日三服

一方用苦葫蘆瓢切棗大以童便浸二食頓內鼻

中黃水出妙 桃樹東引煎湯亦可

水濕傷脾脾寒色見于外為陰黃脉沉身冷是久雨
體弱有之四苓散加炮薑茵陳重者加附子從陰
症治

酒疸因於酒者葛根山梔豆豉枳實煎服發汗利小
便從傷酒治久則固脾

疸久不愈胃強嗜紫金丹

膽礬 黃蠟二兩 大棗五十枚 以砂鍋或銀石器

內用好醋三碗先下礬煮漫火熬半日取出棗去
皮核次下蠟再熬一二時如膏入蠟茶二兩同和

證治大還

醫學近編 疸症

四

貞白堂

丸桐子丸每服三十九茶酒任下酒人下血色黃
消黃色有餘者亦効

大溫中丸 黃病久者名食勞黃俗名黃胖此丸妙

香附一斤春夏一宿 甘草二兩針砂炒紅醋淬 厚朴七次一兩 厚朴製

陳皮 山查五兩 蒼朮五兩 白朮 茯苓各一兩

青皮六兩 芍藥 黃連 三稜 蓬朮 苦參各五兩

右為細末醋丸桐子大蒼黑筋骨露氣實者米飲
下五六十九肥白氣虛者白朮湯下三四十九忌

一切油膩生冷肉麵鵝羊穢難化之物服七日

後便覺手掌心熱涼口唇內有紅暈半月愈

小溫中丸 治黃胖 宜草野貧賤人以内無
食積厚味但燥濕而已

針砂一斤以醋炒為末 苦參 山查 茱萸 白朮

蒼朮 川芎 神麴 香附一斤

右末醋糊丸桐子大每服四五十丸米飲下忌口
輕者不過五六兩重者七兩愈

濕熱盛而口苦作渴面黃氣實者

白朮 連翹 羌活 通草 煎湯下

殺痺丸保和丸各四十粒阿魏丸五粒

證治大還

醫學近編 疸症

五

貞白堂

棗礬丸 治食勞黃目黃

皂礬不拘多少置砂鍋內燒赤米醋點之 為末棗肉蒸爛為丸每

服三十粒食後薑湯下

黃疸寒熱嘔吐煩渴引飲小便不利茯苓滲濕湯加

梔子青皮陳皮枳實水煎服

戴氏曰飲酒即睡酒毒薰肺散於皮膚則黃宜合脾

肺治宜藿樛飲葛根煎湯或梔子煎湯調五苓末

或葛花解醒湯

酒疸心胸堅滿不進飲食小便黃赤其脉弦濇者是

脾陰受傷也。當歸白朮湯。

酒疸久之。變中滿。面足腫。理脾為急。兼分利。從腫脹治。

秦朮退黃極妙。以性能逐陽明經濕熱邪氣也。喜食茶葉久之。面黃宜從茶癖治。

濕熱盛。小水不利。茵陳五苓散主之。卽五苓散加茵陳。

酒積面黃。腹脹不消。勢盛脉實。人強者。用甘遂末。以

猪膽頭肉細切和末。作一丸。紙裹煨。令香熟。取出。

證治大還

醫學近編 卷之十五

疸症

六

貞白堂

臨臥細嚼嚥下。取出病根。

治疸須分新久虛實。初起脉實有力。卽當消導分滲。如茵陳胃苓茯苓滲濕之類。

然脾胃為濕熱所傷。久之氣血漸弱。必兼補養。如參朮健脾。當歸秦朮散。使正氣盛。邪自退。庶可收功。

有瘀血發黃。大便必黑。腹脇有塊。或脹脉澀。或菀用歸尾。桃仁丹皮消之。大便不利。脉稍實而不堪。弱

者。桃仁承氣湯下。盡黑物則退。

瘀血後崩後。一切病後。脾胃肺元氣大傷。面色痿黃。

或淡白色。悉屬虛從內傷治。不可誤認作疸。

黃汗 附

黃汗身腫發出汗。沾衣如柏汁。古云。汗出入水所致。宜分表裏虛實治。身腫脉浮作寒熱關節疼。羌活勝濕湯仍表之。

一法。蔓菁子搗末。平旦井水下一匙。加至二匙。以知為度。每日小便中浸少帛子。辨帛色漸退白則瘥。不過五升。

脉沉外不熱。小便赤黃。宜分利解熱。

證治大還

醫學近編 卷之十五

疸黃汗

七

貞白堂

果脉弱無力。汗多無火症者。依古法黃芪白芍桂枝作湯服。

黃疸日久變為黑疸。死不治。氣實者。急以土瓜根搗汁六合。頓服。黃水從小便出愈。

諸疸口淡。怔忡耳鳴。脚弱微熱。小便白濁。又當作虛症治之。四君子吞八味丸。

古方養榮湯。不若八物加養心藥。隨症增損妙。若悞用涼藥分利。水枯面黑。灰

疸無熱症。小便白屬虛從虛治。

茶癖

白朮炒 蒼朮米泔浸 軟石膏煨 白芍藥炒

片苓一兩 薄荷葉七錢 膽星 陳皮各一兩

右爲末。砂糖水調。神麴糊丸。桐子大。每服五六十

丸。砂糖水下。一方用石膏升麻爲末。砂糖水調

服。一方花椒爲末。糊丸。桐子大。每服十丸。茶下

指迷七氣湯 治大人小兒諸般痞積。面色痿黃。肌

體羸瘦。四肢無力。皆緣內有虫積。或食生米。或好

食壁土。或好食茶葉炭。鹹辣等物者。是一服除根

證治太還 醫學近編 痘黃汗 貞白堂 卷之十五

蓬朮 三稜俱醋製 藿香 甘草 官桂 桔梗

青皮 益智子 香附 大黃 檳榔

右咬咀水二鍾。煎七分。再用水煎一次。空心溫服

不得些少飲食。不然。則藥力不到。而虫積不行。服

後。食頃腹必疼。當下如魚凍。或長虫。或血蠛。至日

午虫盡下。方用溫粥止之。服退黃丸。以除其黃。虛

者大健脾氣

退黃丸

平胃六兩 綠礬二兩 用醋糊丸。桐子大。每服六十九

漿湯送下。忌生冷油膩濕麵等物。

好吃泥。黃連膏丸。屬虫。

黃泥一斤 砂仁四兩 爲末。黃連膏丸。桐子大。每服

六十九。空心糖湯下。

脉洪大。大便利而渴者死。疸毒入腹。喘滿者危。

疸病渴者難治。不渴者易治。

黃疸死症。寸口近掌無脉。口鼻冷。有黑色起。俱不

可治

戴復菴諸失血後多面黃。然面色紅潤者。血榮之也。

證治太還 醫學近編 痘黃汗 貞白堂 卷之十五

血去。則面見黃色。譬之竹木。春夏葉綠。遇秋黃

萎。潤與燥之別也。宜養榮湯。枳歸湯。十全大補湯

妨食者。四君子加黃芪。扁豆各一錢。卽黃芪四君

湯。加陳皮。名異攻散。亦有遍黃者。但不及耳目。

病瘡後多黃。乃脾受困也。理脾爲先。異攻散加黃芪

扁豆各一錢。諸病後黃者皆宜。

食勞疳黃。名黃胖

夫黃疸者。暴病也。仲景以十八日愈。食勞黃者。久

病也。至有久不愈者。用六小溫中丸。以針砂伐肝

以木米助脾。一方以礬醋之酸瀉肝聚肉之甘。肥實人及田家作苦之人宜之。虛人膏粱柔脆者宜佐補劑。

女勞疸屬脾腎兩傷補脾滋腎補中益氣或四君子六味丸選用。

年壯氣實脈來有力者易愈年衰氣弱脈來微濇者難痊五十以後酒色悞鬱而得額黑者死。

疸疾有宜汗者兼身痛惡寒者是濕執鬱于表也桂枝加黃芪湯。初起脈有力九味羌活湯效。

證治大還 醫學近編 疸黃汗 十 貞白堂 卷之十五

吐法瓜蒂散。發黃散。二陳湯探吐上焦阻塞者宜之。內熱口乾大便不通宜下。梔子大黃湯。大黃硝石湯。

黃連散。

小便短少。脈實數宜利小便。五苓散。元散。

除濕熱茵陳五苓散。搖鼻瓜蒂散。

有宜溫者。是脾胃有寒飲不運也。茵陳附子乾薑湯。久病脈弱倦怠宜補養榮湯補中湯小建中湯。理中湯。

往來寒熱。一身盡痛者。小柴胡加梔子。

目病

陳三農曰。目稟五臟精華。一切諸證。不出氣血虛實而成者。故治之須審痰滯氣鬱脾胃諸火。或升散降墮。或清痰解鬱。或補元滋陰。法各有殊。方毋執礙。有兩岐兼病。不分先後輕重而治之。有假實而真虛。誤復耗其元氣以危之。故仁者之士。嘗在幾微消息之間。澄懷滌慮。方得其理。愚以為外障頭疼。額角眩痛。風痰火熱之疾。散而解之。消而降之。內障翳膜。神昏體倦。精血虛憊。腎衰脾弱之症。補陰則諸火自降。扶土則氣血自旺。此為治目之要道歟。

證治大還 醫學近編 目病 一 貞白堂 卷之十六

三錫曰。目病悉屬火熱。世俗之論也。須分新久虛實。痰鬱氣滯脾胃相火。或散或降。或開鬱。或養榮。或滋腎壯水。或益氣開痰。初無一定。方難執一。昧者不察。一槩施治。寒涼傷其脾胃。辛熱耗其神明。血氣愈虧。火邪愈熾。卒至盲瞽。良可太息。間有業是科者。久眼亦知補養。多用地黃滋陰。果陰虛相火盛者。固多利益。倘中焦氣虛而有痰。因痰生火。為

目患者服之寧不泥膈增病耶。諺曰：眼不醫不曉。此言雖淺，實為妄藥者之戒。謹將今古眼科諸書鈎其玄微，參以脉症，縷析如左。願與無盲于心者同治盲焉。

暴發赤腫，頭面發熱，或時作寒，脉浮弦者，屬上焦風熱，辛涼散之。

羌活 荆芥 升麻 白芷 薄荷 酒芩

枳桔 甘草 一二服加降火藥酒連梔子連翹

赤芍歸尾白睛紅加豆蔻少許

醫治大要

醫學近編 目病 二 貞白堂

已經發散，兩腫痛不減，脉弦數者，為血熱壅痛，宜涼血降火。血地涼血為君，赤芍歸尾川芎利血為臣，酒芩連龍膽草降火為佐，荆防羌活甘桔薄荷為使

洗髮發赤腫

杏仁

去皮四個

歸尾

赤芍

各一錢

防風

黃連

各五分

水半鍾，加入乳半盞蒸洗。

洗爛眼眶，用銅青皮稍淨，醃當歸黃連杏仁各等分，如上洗點。

年壯氣盛之人，或酒客膏粱輩，積熱上攻于目，痛不

可忍，連及頭者，脉必實數有力，涼膈散，易酒蒸大黃瀉之。見火門

體厚人發散降火久不愈，胸膈痞悶，食少倦怠者，右寸關脉必沉而滑，當從痰治。二陳二朮枳實為君，少佐苓連，間投小胃丹，或滾痰丸，胸坎一開，火自降而明矣。見痰門

目昏赤服涼藥不已，必下及兩脇脹悶，脉沉而弦者，屬氣鬱肝傷，宜舒鬱和肝，香附撫芎青皮柴胡，子歸芍，脉數實有力者，當歸龍薈丸佳。見脇痛門

醫治大要

醫學近編 目病 三 貞白堂

婦人久鬱肉脹昏暗者，益氣養榮湯妙甚，須多服。體瘦目赤或痛，脉數而細澀，屬血虛有火，宜養血降火，四物易生地加玄參蔓荊連翹苓連，稍久當滋陰，益腎坎離丸，或六味地黃丸俱宜。見虛損門

陰虛火盛，日久病多，飲童便為上。

黃白色體倦怠，目昏懶睡，食少心下不和，脉緩或虛大無力，屬脾胃弱而火盛，宜補中益氣湯加蔓荊子玄參，中年病後兼耳鳴多眵者，益氣聰明湯。耳門目昧不明，河間悉主于火，固是的論，但未分熱之虛

實爾。法曰：玄府者，萬物盡有，乃大氣升降出入之門戶。道路也。眼耳鼻舌神識，能為用，清明者，其神全也。血氣者，人之神。神衰則清明減，而獨火炎上，火與元氣不兩立。火既熾，則玄府塞，故曰攻耳斯曠，攻目斯曠，而口鼻舌可類推矣。

人病日久，不能視，涼藥盡試不應，診之兩手微弱，命服以珍加麥冬。一月如舊，乃知飲食不運，腸胃枯澀，髮落皮皴，噎膈淋閉等症。目昏耳聾，悉由氣液血脈榮衛衰少，不能升降出入。虛火阻滯，而然。

證治大遺

醫學近編 卷之十六

肝病

四

貞白堂

故玄府閉小，濁火炎上，則視昏花，隔簾視物之象也。丹溪東垣治目昏，用參芪補養氣血，久服靡不獲效。以氣血旺，則玄府得利，升降清明，乃復古方。斗肝丸用羊肝引黃連等入肝，解肝經諸鬱，蓋肝主目。肝中鬱解，則玄府通利而明矣。故黃連之類，解有餘之火鬱也。椒目之類，解濕鬱也。羌蔚之類，解氣鬱也。芎歸之類，解血鬱也。羌活荆防正辛之類，解經鬱也。磁石之類，解頭目鬱，墜邪氣使下降也。蔓菁下氣通中，皆治氣血鬱結。目昏有餘之法。

三錫曰：久病昏暗，責于血少。所謂目得血而能視也。不知血不自生，隨飲食化生。脾胃一虛，則納化艱，而飲食少。飲食既少，是生化之源已澁，血何自而旺？目何得以養？過服四物，脾胃轉傷，目愈昧矣。治必先理脾胃。脾胃一回，飲食如常甘美，血自生而目有所得，昏暗頓愈。由根實葉自茂，血者木之津脉也。神光者木之華葉也。脾胃者木之根也。推此則治病必求其本，豈欺我哉。

外障

證治大遺

醫學近編 卷之十六

肝病

五

貞白堂

外障屬風熱上壅。上下胞胥肉培壙，磨蕩其睛，久之生翳，微其精明，障之命名以此。當消風散熱，外用點藥點之，稍久當審氣血脾胃。

內障

內障屬虛，挾氣鬱，黑水神光昏翳。外似好眼，而不能照物。或外雖有翳膜，不痛不痒，惟不能睹，須分氣血脾胃治。左脉不足，或瀉或細，體羸色蒼，是陰虛。四物坎離為主。右脉不足，或虛大，氣口大于左，或緩或濡，屬氣虛。四君為主。食少或不能運化，當健

脾和中枳朮丸調中益氣湯選用兩尺洪盛或虛大兼煩赤盜汗夢遺者屬腎虛相火四物加知柏壯丹皮宜各加家菊蔓荊荆防升柴等佐使藥多鬱脉沉加香附撫芎見內傷及脾胃門

羞明火鬱于上也火須分虛實

瞳子散大風熱所爲也火性散挾風益熾神光怯弱力不能支亦隨而散漫猶風起而水波也亦有過服辛散縱恣燂灸而致者皆當視其有餘不足或除風降火或養血安神脉虛體薄必加五味子以證治大還

證治大還

醫學近編

目病

六

貞白堂

性寒體浮酸以收之也大法宜收四物去川芎加芩連採甘草五味子或六味地黃丸加當歸味子大忌辛散丹溪羌蔚俱禁況他藥耶惟當歸辛而苦可用耳

丹溪曰諸經脉絡皆走于面而行空竅其清氣散于目而爲精走于耳而爲聽若心事煩冗飲食失節脾胃氣虧心火太甚百脉沸騰邪害空竅而失明矣况脾爲諸陰之首目爲血脉之宗脾虛則五臟之精華皆爲失所不理脾胃養神血乃治標而不

治本也薛氏醫案載張給事目赤不明服祛風散熱藥反畏明重聽脉大而虛此因勞心過度飲食失節以補中益氣加茯神聚仁山藥山茱五味頓愈又勞役復甚用十全大補加前藥漸痊

一少年素嗜酒色兩目赤痛或作或止兩尺洪大按之微弱余謂少年得此當失明翼日索途而行不辨天日衆皆驚異余與六味丸料加門冬五味數劑頓明

目分五臟

證治大還

醫學近編

目病

七

貞白堂

目之上下胞屬脾 銳眦屬胆與二魚在外小脚爲銳眦在內近鼻者爲內眦 上網屬太陽膀胱小腸 下網屬陽明胃大腸 黑精神光屬腎 白精屬肺 白睛變赤火乘肺也 目胞赤腫火乘脾也 黑水腎光被翳火乘肝與腎也

治翳當辨其起自何經及翳形何色各加引經藥如東垣治一婦綠翳自下而上知其陽明來也綠非五臟正色殆肺腎相合而爲病耶乃就畫家以墨調膩粉合成色諦視之與翳同肺腎爲病無疑乃

乃瀉肺腎之邪。乃以陽明藥爲使。既效。他日復病者三。其所從來之經。與翳色各異。因詢此必經絡不調。目病未已。詢之果然。用和血藥養陰藥作丸服。遂永不舉。觀此則辨色分經。詎可畧哉。

眼有宜出血而愈者。卽素問血實決之之義。必起初血熱盛者。在太陽陽明二經乃可。以二經氣血俱多故耳。他經出血。其病轉劇。故曰。刺太陽陽明則目愈明。刺少陽陽明則目愈昏。近世有以草心于上下胞。及兩眦。打出血絲。往往獲功。卽三稜針刺血之法。惟可施之于有餘暴發耳。

醫治大遺

醫學近編

目病

入

貞白堂

迎風流淚。血虛而有火。火得風而內灼。則淚出。所謂肝熱則出泣也。四物四君審用。或加家菊。荆芥。肝火盛者。以貝母大者一枚。胡椒七粒研細。臨臥點之。內服當歸飲。柴芩芍藥甘草大黃人參滑石。當歸水煎服。

東垣曰。眼生倒睫拳毛者。由目緊急。皮縮之所致也。蓋內伏火熱。而攻陰氣外行。當瀉其熱。眼皮緩。則眼毛立出。翳膜亦退。用法。攀出臉向外。速以三

稜針出血。以左手抓甲。迎其針鋒立愈。又目眶歲久赤爛。俗呼赤睛是也。當以三稜針刺目眶。以瀉濕熱。而愈。余按此二條。乃急則治其標也。苟氣血不清。火邪內熾。精明失職。則隨刺隨愈。焉保其不發乎。縱清上竇。下養血。滋陰。日不輟口。猶當清心寡慾。遠風沙。戒暴怒。均勞逸。一切膏粱酒麪。悉屏除之。內境得以清。外竅自爽矣。今人不知。徒事醫藥。不審虛實。妄加治療。又昧者。日用鑷鑷去倒毛。毛出風入。爛赤滋甚。猶拔草春園也。殊可笑。

醫治大遺

醫學近編

目病

九

貞白堂

能遠視。不能近視。屬陰精不足。而火盛。老人桑榆之象。能近視。不能遠視。屬陽氣不足。而火盛。一屬氣虛。一屬血虛。此東垣至論。猶當以脉并所兼之症。參之。庶得肯綮。

眼眥初生小泡。視其背上當有小紅點。如瘡。以針刺破。眼卽時瘥。故名偷針。余以爲背眥俱屬太陽經。刺背上。乃所以瀉太陽經熱也。不針眼眥而針背。偷針之義微矣。

夏枯草治目珠痛。至夜猶甚者。神效。蓋目珠連目係

屬厥陰經。夜甚。及用苦寒藥點之。反甚者。夜與寒俱陰也。夏枯草有補養厥陰血脈之功。能活血行氣。故珠痛除。眼科宜多畜焉。一方用童便製香附一分。夏枯草三兩。為細末。食遠茶清下一錢。木賊能磨蕩器之不光者。故用以磨翳。蟬蛻蛇蛻皆取退之義。方書云。人年五十。膽汁減而目不明。余以為五臟六腑之精華。皆上注于目。不特膽也。得無精衰耶。

降治大還

醫學近編

目病

十

貞白堂

東垣治一人。因用猪肉煎餅。與醋蒜同食。復大醉。臥熱坑中。次日瞳子散大。視物無的。以小為大。以長為短。卒然見非常之物。行走踏空。諸方不應。乃以酒苓連泄熱為君。歸身地黃養血涼血為臣。五味子酸寒體收。瞳子散大。人參甘草地骨皮二門冬。甘艸桔殼。苦甘補中為佐。柴胡引經為使。頓愈。丹溪治一壯年人。早起忽然視不見。就睡片時。略見而不明。食減倦甚。脈緩大。重則散而無力。意其中濕所致。詢之。果臥濕地半月。遂以白朮為君。黃芪陳皮為臣。附子為使。十貼愈。且眼病而用附子。非

微妙玄通者。烏足以識此。妙甚妙甚。

又一老人忽盲。他無所苦。作大虛治之。急煎人參膏。續續進。垂愈。一人予磁石藥。先生曰。今夜死矣。果然。

二人形實。好飲熱酒。忽兩目盲。脈瀼乃熱酒傷胃。汚濁之血。畜于內。而然。以蘇木作湯。調人參末服。二日。鼻及兩掌皆紫黑。先生曰。滯血行矣。以四物加蘇木桃仁。紅花陳皮煎。調人參末服。數日愈。夫眼病因脈瀼。而知中有畜血。精于脈固可彷彿。以四物加蘇木桃仁紅花。猶或知之。至于畜血而用人參。則非尋常可得而知者。惟丹溪知之。且血畜于中。則沖和胃氣傷矣。消瘀藥中。佐以人參。助正伐邪。胃氣得以行。畜血因之而下。至妙至神。此丹溪所以為醫聖也。

海藏治一女。年病目。每一月或二月一發。紅腫難開。如此三年。服除風散熱藥。反生翳。從銳眥遮瞳人。右目亦有翳。從下而上。經曰。從內走外者。少陽病。從下上者。陽明病。乃少陽陽明有積滯也。脈短。

降治大還

醫學近編

目病

十

貞白堂

而實是則似短潔古曰短為有積滯抑遏臟腑宜下之遂用溫白丸減川芎附子下之加膽草黃連如東垣五積法從二九加起每日加一丸至大便利後減又從二九起忽一日于便中下黑血塊如黑豆大而堅硬遂翳去目明

小兒目病同大人惟刺差小耳外有疳疾痘後斑疹餘毒當別有法不可不辨

疳眼

小兒肥甘恣意寒暑不適生冷油膩傷脾糖麪熱物

證治大還

醫學近編

目病

三

貞白堂

助火因循積漸釀成疳疾渴而易饑善食而瘦髮豎下泄腹脹鼻乾作瞽瞽聲久久不治脾弱肝強肝火自療其竅遂成目青多生翳膜睫閉不能開眵淚如糊久而濃流乃中州弱而清陽不升肝火盛而濁陰不降所致當升清降濁以白朮人參先補脾胃為君柴胡枳殼輔上藥理脾為臣蒼朮茯苓澤瀉滲濕降濁為佐羌活蔓荊升麻川芎薄荷諸風藥勝濕為使乃正治妙法

雀目

雀目病方書以為木生子亥旺于卯而絕于申至酉

戌之時木氣衰甚故不能瞻至于日出于卯之時木氣稍盛故復明余以為目得血而能視血虛肝失所養則不能視夜屬陰人之血屬陰陰主靜而惡躁擾陰虛則火必盛弱陰不能制強火故夜轉劇昏暗而不能瞻天明以陽用事陽主動火邪暫開故稍明故治必以養血為主兼理脾胃久之不治漸至于盲上說恐太遠王節齋曰眼赤腫痛古方用藥內外不同在內湯散用苦寒辛涼之藥以

證治大還

醫學近編

目病

三

貞白堂

瀉其火在外點洗用辛熱辛涼之藥以散其邪故點藥莫要于冰片而冰片大辛大熱因其性辛甚故借以撥出火邪而散其熱氣古方用燒酒洗眼或乾薑末或生薑汁點眼皆此意也蓋赤眼是火邪內炎上攻于目故法先順其性而散之此用苦藥降之以治其本乃釜底抽薪也然火邪既客于目從內出外若外寒涼以阻逆之則鬱火內攻不得散矣故點藥用辛熱而洗眼用熱湯是火鬱則發之之義世人不知冰片為劫藥誤認為寒常用

點眼遂致積熱入目。昏暗翳生。又不知忌寒涼而妄將寒涼水物冷藥挹洗。皆致昏暗者。比比皆是。

勞役飲食不節。內障昏暗。荊子湯妙。參芪炙甘草酒白芍黃柏荊子水煎服。

眼痛。用生地酒浸。搗爛盒眼上。又用草烏南星乾薑桂枝爲末。醋調貼兩足心。時以牛膝膏洗眼。

肥人風熱上壅。眼目疼痛。

防風 羌活 荊芥 酒芩 水煎服

諸治太還

卷之十六 目病 古

貞白堂

瘦人目痛。是血少兼熱。須養血清上。

四物易生地加 荊防 參苓 家菊 水煎服

血熱壅痛。脈數實有力者。四物加草龍膽防己防風

羌活。一云實熱上衝。眼痛用黃連瀉火當歸補血

黃連瀉火湯 治暴發赤腫疼痛

黃連 八分 黃芩 俱酒 生地 各一錢 升麻 五分 柴胡 七分

水煎服

洗肝散 治風熱上攻。暴發赤腫。隱澁難開。眵淚

薄荷 當歸 羌活 防風 各去 梔子仁 甘草

大黃 川芎 各二錢 共爲末。每服二錢。食後白湯

下。

次明散 治目夜則昏暗。雖有燈月不能睹。責之精

衰。

石決明 二錢 夜明砂 同 猪肝一具。羯羊亦可。二

味共爲末。以竹刀切肝爲二片。鋪藥在中。紫緊勿

令藥走。泔水一大碗。砂鍋煮至小半碗。連肝汁服

之意。謂決明鎮腎益精。夜明升陽明目。肝與肝合。

方甚有理。示以爲非。地黃無以益腎精。非歸芍無

諸治太還

卷之十六 目病 古

貞白堂

以助肝血。加而用之可也。

目昧不明。河間一主于熱。爲熱氣鬱于玄府。眼耳鼻

舌身神各失所司。升降出入之機廢。故視不見也。

其理近是。但有熱有虛。實不可不辨。初起火盛。氣

濁鬱于上焦。邪害孔竅。宜散宜瀉。是實邪氣盛也。

久昏暗。清氣不能上升。尤竅不利。虛火上攻耳鳴

目暗。宜補宜升。是虛正氣奪也。

內障先患一目。次第相引。兩目俱損者。皆有翳在黑

睛內。遮瞳子。按黑睛連目系。屬足厥陰。足太陽手

少陰三經 此三經氣血虛則邪乘虛入經脈鬱結從目系入黑睛內翳龍木論所謂脂脂不清流下作翳即足太陽之邪也又云肝氣上衝成翳即足厥陰之邪也故治法以針言之則當取三經之腧穴如天柱風府太衝等穴是也其有手巧心諦者能用針于黑睛裏撥其翳取效尤捷以藥言之則當補中疎通此三經之鬱結使濁氣不上攻更審虛實

龍木論羚羊角飲子治圓翳內障不痛不痒

證治大要

醫學近編

目病

朱 貞白堂

羚羊角

在兩

細辛

知母

車前子

人參

黃芩

各一兩

防風

二兩

右為末

每服一錢

水一盞

煎至五分食後服

補肝散 治肝風內障不痛不痒眼見花發黃白黑

赤皮一物二形

羚羊角

防風

各三錢

羌活

車前

一兩

人參

一兩

茯苓

一兩

細辛

玄參

黃芩

一兩

少各

右為末食後米飲下一錢

羚羊角散 治綠風內障頭旋目痒眼內痛澀者

羚羊角 防風 知母 人參 茯苓 各一兩
玄參 黃芩 桔梗 各一兩 車前 細辛 三兩
右為末每服一錢水煎服

羚羊角湯 治青風內障勞倦加昏重頭旋腦痛眼內痛澀

羚羊角 一兩 車前子 一兩 人參 羌活 各一兩
地骨皮 玄參 各一兩

右四方皆羚羊角玄參細辛羌活防風車前為君蓋羚羊角行厥陰經藥丹溪曰羚羊入厥陰經甚

證治大要

醫學近編

目病

朱 貞白堂

捷是也玄參細辛行少陰經藥也海藏云玄參治胸中氤氲之氣無根之火之聖藥羌活防風車前行太陽經藥也醫者宜辨其孰從何經來本經藥中加玄參等清解藥一升一降更審虛實如氣弱脉緩色黃白多肉人必主以參芪朮草如益氣聰明湯補中益氣湯相兼服之血虛脉澀蒼黑清癯人必主以地黃丸坎離丸多鬱悶人更加夏枯草羌蔚子香附之類以舒鬱散結更內觀靜養不干塵累使陰氣平復藥乃有功

世俗見久眼動輒用羚羊角若病不在厥陰經寧不

引邪耶惟翳在黑珠者可用不則開門揖盜

治日用黃連多矣而羊肝尤奇效用黃連末一兩

白羊肝一具去膜同于砂盆內研令細衆手九梧

子大每服三十九溫水下輕者二料重者三料障

翳青盲俱妙氣虛加參芪血虛加歸芍并加家菊

又方治內障

羯羊肝一具新瓦焙熟地半兩兎絲子麤仁

車前子麥冬地膚子去壳五味子澤瀉

證治大還

醫學近編 目病 卷之十六 太 貞白堂

防風黃芩白茯苓桂心三錢杏仁炒細辛

枸杞蔚子苦葶藶青箱子各一

右爲末煉蜜丸桐子大每服三四十丸白湯送下

日三服一人久病目方士爲灸肝俞遂失明服此

良愈以餘藥予一盲者服一目覺燈下有一線亮

如門縫中見火次早見翳膜俱烈如線又月餘明

如初

內經曰肝虛則目眈眈無所見耳汨汨無所聞善恐

如人將捕之狀海藏曰目瞋肝氣不治也鎮肝明

目羊肝丸主之

羯羊肝一具新瓦盆中焙甘菊栢子仁

羌活細辛官桂白朮五味子各半兩

黃連三錢

右爲末煉蜜丸梧子大空心食前白湯下三四十

丸

補肝散 治肝虛失明

青羊肝一具新瓦焙蓼子一合

右爲末食後服方寸七日二加至三錢不二料可

證治大還

醫學近編 目病 卷之十六 太 貞白堂

夜讀細字

醫館錄云赤眼腫痛脾虛不能飲食肝脈盛脾脈弱

用涼藥治肝則脾愈虛爰藥燥脾則肝益盛惟于

平和藥中倍加肉桂殺肝而益脾一舉而兩得傳

云木得桂而枯是也此與別錄治脇痛之義相符

人所不知者

羊肝治目以肝補肝也看所挾而兼用藥本草云細

辛益肝膽氣故往往須之第辛散惟少佐乃可如

肝血不足必加四物或佐甘菊麤仁清風熱

素問曰久病血肝主血血傷則肝失養而目昏治必補血安神

房勞過度則傷腎腎主臟精腎傷精耗不能上榮于目多昏暗瞳人失神而生翳當滋腎陰六味地黃丸加五味當歸甘菊津液不足加二冬玄參兩尺脉大相火盛者加黃柏知母兩尺沈弱無火症者兼補右尺相火八味丸加兔絲枸杞覆盆楮實車前菟蓉隨病增損

左三部弦數有力或沉數內障不痛不痒或多眵淚
證治大遺
醫學近編 目病 辛 貞白堂 卷之十六

是肝火被鬱也當歸龍薈丸主之

蘆薈丸 治黑水凝翳內障不痛不痒

蘆薈 甘草 人參 牛胆 柏子仁

細辛 各一兩 羚羊肝 蜜炙一兩

右爲末煉蜜丸桐子大空心茶下十九

墜翳丸 治樞肩翳聚花翳等病後有頭旋額痛者

青魚膽 青羊膽 鯉魚膽 各七個 熊膽 二錢五分

牛膽 五錢 麝 少許 石決明 一兩

右爲末糊九桐子大空心茶下十九

用修方 生翳并赤白膜取雀屎細直者入乳和傅目上即消

鳥賊骨主目中浮翳細研和蜜點之又骨末主治目中熱有效

膽熱多眵昏暗十月間牛膽浸槐子陰乾百日每空心吞一粒

又能黑髮髮草決明性寒肝虛火盛日常病脉弦數者宜之外方治失明取二升并末食後粥飲下一錢效又方補肝散用白瓜子七升絹袋盛沸湯

證治大遺
醫學近編 目病 辛 貞白堂 卷之十六

中淖三次蒸乾以酢五升浸一宿暴乾爲末調下方寸匕日三服可夜讀書按白瓜子平寒酸入肝

亦肝虛有火治法也

能遠視不能近視當補腎滋陰地芝丸或六味地黃

丸亦可

生地 焙四兩 天門冬 淨肉四兩 甘菊花 二兩去蒂

右爲末煉蜜丸桐子大每服一百二十九空心鹽

湯下

能近視不能遠視法當補心益氣定志丸主之

遠志

去心苗二兩

人參

一兩

白茯苓

一兩

菖蒲

三兩

右爲末煉蜜丸。硃砂爲衣。彈子大。臨睡龍眼湯化

下。

大法曰。在腑則爲表。當除風散熱。即暴發在臟則爲

裏。當養血安神。久眼有體肥。濁氣盛而生痰。痰生

熱。熱生風。風熱上攻。目昏澁。槐子散主之。此由胸

中濁氣上行也。重則爲痰厥頭痛。久之能損目常

使胸中氣清。自無此病。有服涼藥多。損上焦氣。目

昏倦開者。當補益養腎。蒼黑瘦人。火盛腎水弱。不

證治大遺

醫學近編 目病 卷之十六

三

貞白堂

能上榮于目。駐景丸主之。

人乳點眼。久病昏暗極効。以乳卽血變而成。目得血

而能視也。

槐子散 治肥人胸中氣不清。上攻頭目。

槐子 黃芩 木賊 蒼朮

各等分爲細末。臨睡茶清下。

上膈痰涎壅盛。痞悶上攻。目宜茶調散吐之。極効。

夏婦僧尼。血盛多鬱。肝脉實數。多目病。宜瀉肝舒鬱。

益氣聰明湯 治內障初起。視物漸昏。空中有黑花。

神水亦淡綠色。視一爲二。或神光變白。傷氣不

之病。見耳門

撥雲退翳丸 治陽蹻邪。內眥漸生。赤脉縷縷。根生

于肉。肉生黃赤。脂橫浸黑。睛漸蝕。神水眦銳。亦然

俗名攀睛。

當歸 川芎 一兩 家菊 荆子 各二兩 蟬蛻 五錢

蛇蛻 各三錢 蜜蒙花 二兩 木賊草 去節二兩 荆穗 一兩

地骨皮 一兩 楮實子 黃連 各五錢 白蒺藜 去刺炒一兩

花粉 六錢 甘草 三錢 薄荷 川椒 各七錢

證治大遺

醫學近編 目病 卷之十六

三

貞白堂

右煉蜜丸。每兩作八九丸。食後臨睡細嚼茶清下。右

爲奇。經陽蹻爲病而設也。難經曰。陽蹻脉者。起于

跟中。循外踝上行。入風府。上屬于腦。故以川芎入

腦。以治風。菊花。荆穗。薄荷。清上焦。黃連降火。二

木賊。蜜蒙。退翳解熱。楮實。地骨。利小便。引火下行。

椒。紅利。五臟明目。當歸和血。

噤藥碧雲散 治腫脹紅赤。昏暗隱澁。難開。鼻塞頭

痛。腦酸。外翳攀睛。眵淚稠粘。

驚不食草 二錢 青黛 一錢 川芎 一錢

右爲細末。先嚥水一口。每用米許。吹入鼻內。以涕出爲度。不拘時候。此開竅蓋法也。當令邪熱不壅。結有出路。然力小而銳。隨之隨應。須頻啗之。諸頭目病俱效。

駐景丸 治肝腎氣虛。兩目昏暗。視物不明。

車前炒二兩 熟地各五兩 當歸各五兩 楮實炒各一兩 川椒炒各一兩

五味子 枸杞 兔絲子酒製半斤

共爲細末。蜜丸。桐子大。每服三十丸。空心酒下。

三農治餘大司寇 目患卽愈

證治大遠

醫學近編 日病 雷 貞白堂

內障用心太過。心血不足。火炎水少也。當朝服駐景丸。暮服磁珠丸。

磁珠丸

磁石二兩火煨醋淬七次 辰砂一兩水飛 神麴二兩炒

另用生神麴一兩。糊爲丸。每服二錢。至三錢。米湯下。

下

瑞竹四神丸

枸杞棟澤分四分。一分川椒。一兩同炒。一分乳香。

茴香各一兩。炒。一分芝蔴。一合。炒。時先用好酒。

淘洗透。各炒過去。椒等四味。止用枸杞。加熟地。白朮。茯苓。各一兩。同爲細末。煉蜜。九桐子大。每服五七十丸。空心溫酒下。加甘菊一兩尤妙。

風痰眼 用九節黃連。和槐樹皮。燒灰。麤末。熬湯。澄清洗眼。或以人乳浸黃連洗亦。

爛眶眼。由上膈有積熱。嗜酒多鬱。人上焦氣不清。而成火。火炎上薰。蒸沿邊爛。久生小蟲。作痒。內服。

防風通聖散。去硝黃。細末。酒拌。曬乾。依法服之。禁諸厚味料物。外用紫金膏點之。丹溪方。治爛眼二。

證治大遠

醫學近編 日病 雷 貞白堂

麥沙。用香油浸月餘。重綿濾過。點之。極効。紫金膏。飛過。就丹。蜜多水少。以器貯點之。又方。用青泥。

蛆。淘淨。曬乾。末。仰臥。用一錢。入眼中。少時去藥。

蘆甘石散 治爛風眼。以蘆甘石。不拘多少。先用童。

便煨七次。次用黃連。濃煎汁。煨七次。次用谷雨。前。

茶。濃煎。煨七次。又併三汁。餘者煨三次。乃放地。一。

宿。出火氣。細研。入水片。射香。點上。神妙。蘆甘石。煨。

時。先用紫銷炭。極大者。鑿一穴。以安蘆甘石。

瑞竹堂。用黃連。歸芍。薄荷。防風。蔓荊。甘草。各等分。煎。

汁滓甘石

育神夜光丸 治精衰眼昏

當歸 全用 遠志 以甘草水 牛膝 去蘆 淮 地骨皮 去

酒洗 浸 苁蓉 酒浸 一宿 加酒 煮 生地 酒浸 搗

淮熟地 酒洗 酒煮 同生地 枳殼 去 甘杞 甘菊 去

共為末煉蜜丸桐子大每服五六十丸空心鹽湯

下食後溫酒臨睡茶清亦可

病目多淚與涕初起清者辛散之久而濁者兼降是

陽明少陽受病也

證治水遠 醫學近編 目病 美 貞白堂

熟地黃丸 治氣血兩虛不能制火相火妄行上攻

于目腫子散大視物昏花法當養血涼血收神制

火

熟地 一兩 甘草 二錢 歸身 五錢 柴胡 八錢 黃芩 兩

天門冬 三錢 去心 地骨皮 三錢 人參 二錢 五味子 三錢

枳殼 二錢 生地 七錢 黃連 三錢

右為末煉蜜丸每服一百丸空心鹽湯下忌辛

驗方 治爛眼眶 薄荷 荊芥 細辛

右為粗末如香狀焚之以淨磁碗塗蜜少許于內

覆香烟盡刮取烟煤磁碗收貯風熱多淚者皆可

點之

目至春夏便發赤腫當舒鬱平肝酒茶童便製茶求

製香附 各一 南星 製 川芎 酒浸 梔子 膳草 俱酒

兩 陳皮 連翹 蘿蔔子 蒸青黛 各半 柴胡 二錢

共為末神麵糊丸服

掌毛倒睫 木鼈子一個去殼為末綿裹塞鼻中左

塞右右塞左一二夜其睫自分一法摘去掌毛

證治水遠 醫學近編 目病 毛 貞白堂

用虱子血點眼數次妙

點方 治火眼

臘月羊膽一枚以蜂蜜灌滿挂陰乾用時取一粒

磁器內水化開點之

三製黃連膏 治暴發赤腫眇粘澀

用雞爪黃連如連珠者不拘多少切碎洗淨先將

薑一大塊切作兩片空空將連入薑內以線縛緊

用濕紙包裹略煨少時紙焦為度以紅棗去核將

黃連盛入棗內少加礬末亦可濕紙包裹慢火內

煨熟待礬化取出黃連浸入人乳內點妙不可
綱目用丁香黃連人乳煎汁注之皆愈此得幸故
苦降乳汁養陰之妙

蕤仁膏

蕤仁淨仁一兩用紙裹筆管碾去油淨加白礬砂
一錢麝香三分同研極細末收入礬內貯之專去
翳障妙甚

努肉攀睛

還睛散 治眼翳膜昏澁淚出瘀血努肉攀睛

證治大遠

醫學近編 卷之十六

目病 三

真白

川芎 膽早 草決明 石決明 荆芥 枳殼

菊花 白茯苓 白蒺藜 麻子 甘草 木賊

川椒炒去子 仙靈脾 茵陳 各五錢

右爲末每服二錢食後茶清下

治卒患赤目努肉作痛取好消梨一個搗汁黃連三

錢碎之以綿裹漬令色變仰臥注目中努肉礙睛

用礬石最白者納一黍米大于翳上及努肉上即

冷淚出綿拭之令惡汁盡努翳自退

千金方 治目中息肉翳閉腫子及生珠管

貝齒七枚燒 真珠等分

共研絕細點翳肉上五六度瘥

夜光膏 治遠年日病昏暗翳膜須用臘月開日合

白沙蜜四兩白色佳隔年蒸一枝去脂皮切段與

今定用紙于上黃丹蜜陀僧各二錢研俱 甘石

面收去浮蠟童便淨過者五錢水飛研 赤芍 杏仁湯泡去

中用挑柳各一枝川芎五錢 川黃連淨二兩 秦皮 防風

訶子皮 石膏 玄精石 井泉石 無名異

玄參 黛精石 石決明已上十五味各三錢

證治大遠

醫學近編 卷之十六

目病 三

真白

紫金色入及藥勿火急乳香 沒藥 琥珀

殊砂 另研 蕤仁紙裹法油已上五味各三錢前四

方入前紫金藥內一同復熬一二沸以藥滴水中

不散爲度大抵不可過與不及取土中埋七日時

藥四味各一錢麝香 五分 南硼砂 珍珠 龍腦

珊瑚枝 右五味各五分另研細亦以挑柳枝攪勻

飛絲入目

用頭垢點入眼內即出

又方 用柘樹漿點了綿裹筋頭蘸水繳拭涎毒

又方 用火麻子一合杵碎井水一碗浸攪將舌浸

水中涎沫自流出茄子藥亦可

丹溪治飛絲入眼眼腫如珠痛澁難開鼻流清涕用

京墨濃磨以新筆塗目中閉目少時以手撐開其

絲自成一塊在白眼上卻用綿輕輕惹下未淨再

塗風翳游絲偶然入目內作痛若野蠶蜘蛛木

口即逆

治眯目 用鹽與鼓置水中浸之視水其塵即出

稻芒入眼 收蟬蟬以新布覆目上待蟬蟬從布上

行塵之其亡自出

證治大遠

醫學近編

目病

手

貞白堂

塵物眯眼

新筆塗墨自出

視岐亂見

邪中于中則視岐亂散神狂則亂見一

驅邪一安神

諸翳

翳初患時見蠅飛花發垂蟻薄烟輕霧先患一眼

看則滑翳翳如水澁翳翳如凝浮翳翳藏形睛上細

橫翳橫如劍脊兩邊薄中央厚

已上五翳皆先患一眼向後俱損初患之時其眼

痛滿頭旋額痛雖有形俱難下針獨懷月翳聚花

翳黑水翳微有頭旋額痛者宜輕針撥之

水翳初患時眼痛眼赤鼻如骨痛目內赤澁先

其翳穴出眼後翳如冰凍堅白宜于所過經絡針

外以針撥之 假月翳初患時微有頭旋額痛先患

一處薄宜先 聚花翳初患時微有頭旋額痛中時

從厚處撥之 聚花翳時疼痛先患一眼而後俱翳過

去如絲齒輕針撥去其翳散翳翳如針點乍青乍

黑水凝翳初患時眼赤眼痛見花黃驚振翳頭腦被打

入眼內至二三年成翳色白先患

雖不痛不痒其翳或黃或紅翳狀破散者中心濃

宜者俱不宜針撥撥之不動者名死忌撥獨黃

證治太遠 醫學近編 目病 手 貞白堂

心翳宜先服藥後針之若無翳者名風赤不宜針

白翳黃心翳四邊白中心黃先服逐翳散次針足陽

兩目俱損烏風無翳但瞳人小三五年內結成翳青

瀉肝風無翳眼前多見虛花或白或黑或赤或黃或

五風變初患時頭旋額痛或一目先患或 綠風眼見

紅或 黑花眼見青風勞倦加重

已上五風初患時頭旋額連眼臉眉及鼻額骨痛

眼內痛滿先患一眼向後俱損無翳

雷頭風變先患頭痛或鼻眩惡心嘔吐先患一日次

雀目

蛤粉丸 治雀目。日落不見物。因濕痰在胃中者。

蛤粉 細研 黃蠟 各等分

右溶蠟。搜粉丸。棗大。勿用猪肝一片。二兩許。批開。

裹藥一丸。麻線纏。入罐內水煮熟。棄熟蠟目。至溫。

吃肝。以愈為度。

千金方

地膚子 五錢 決明子 一升

右二味為末。以米飲汁和丸。食後服二十丸。至三。

證治大還 醫學近編 目病 卷之十六 至 頁白堂

十九至愈止。

又法 用蒼朮四兩。米泔水浸一宿。切作片焙乾。為

末。每服三錢。猪肝二兩。批開。摻末在內。用麻繫定。

粟米一合。水一碗。砂鍋內煮熟。薰眼候溫。連肝服。

治雀目不計時。用蒼朮一兩。為細末。每服一錢。米飲

下。

小兒雀目。屬肝脾二經。脾弱者健脾。肝虛者養血。宜

分兩途。飲食面色如常。但夜不能見物者。還明飲

妙。大人亦佳。

夜明砂 穀精草 蛤粉各等分

右為末。煎黃蠟丸。雞豆大三歲一丸。猪肝一片。切

開。置藥在內。麻扎緊。沙瓶中煮熟。先薰後服。連肝

食。

小兒過用甜物。口臭牙痛。眼腫。氣口脉洪。數屬胃火

瀉黃散妙。

小兒肝經濕熱。內甚。上攻于目。眼眵腹脹。尤味蘆薈

丸妙。兼脾虛痰黃瘦弱。不食者。間肥兒丸。粟來陰

弱有相火症者。心虛。少與六味地黃丸。說見家居

證治大還 醫學近編 目病 卷之十六 至 頁白堂

醫錄

九味蘆薈丸 治三焦及肝膽經風熱。目生雲翳。或

癰癰耳內生瘡。寒熱作痛。或肌燥消瘦。發熱作渴。

飲食少思。肚腹不調。或肝疳。口內生瘡。牙齦潰爛。

或牙齒蝕落。頰頰腐爛。食少。下部生瘡。

蘆薈 五錢 胡黃連 當歸 芍藥 龍膽草 酒洗

川芎 五錢 蕪荑 各一兩 木香 甘草 各五錢

右為疾神打糊丸。麻子大。每服五七十九。滾湯下。

肥兒丸 治食積發熱。眼目生翳。

黃連炒 蕪荑炒 神麴炒 麥芽炒

右另末等分水九量兒大小加減

海藏云東垣治斑後風熱餘毒翳膜氣障遮睛以瀉

青丸治之大効保命集云退翳膜妙不特斑後減

大黃服余以爲肝經久蘊風熱乃生翳膜瀉青丸

正所以拔病根也

小兒斑疹後毒上攻于目翳膜腫痛脉實強壯能食

者於羊角散加減以解之氣血虛而胃弱者須以

補養爲先而佐以解毒斯得之矣丹溪曰犀角性

證治大選

醫學近編 目病 言 頁白堂 卷之十六

升散較諸角猶甚痘後有餘毒者用之如無餘毒

虛虛之禍如指諸掌眼醫不可不知

痘瘡入眼白睛赤者決明散清之不赤但翳膜睛暗

蜜蒙散妙翳膜不去通聖散蛤粉散俱佳或加二

蛇

決明散

決明子

赤芍各錢

甘草一錢

共爲末每服一錢蜜湯調下

蜜蒙散 治小兒痘疹及諸毒入眼

蜜蒙花一錢 青廬子一錢 決明子 車前子各五

右爲末羊肝一片破開摻藥在內合緊濕紙數重

包裹灰火中煨熟空心食之

通聖散 治小兒痘瘡入眼及生翳膜

白菊花一兩 萊豆皮一兩 穀精草去根一兩

共末三歲一錢乾柿一個生粟米泔一盞同煮汁

盞去藥食柿不拘時日用二三個近者五七日遠

者半個月佳

蛤粉散 治小兒瘡痘入目

證治大選

醫學近編 目病 言 頁白堂 卷之十六

穀精草 蛤粉

右爲末三歲一錢猪肝一兩批開摻藥在內以竹

葉包裹線束定水一盞煮熟入確內薰眼至溫取

食之

三粉散 治小兒斑瘡入目

輕粉五分 粉霜一錢

右研勻結聚如患左瞼塞左耳右同之左右俱患

俱塞眼即開得瘡亦隨愈

癰

陽三稜曰。癰能也。下元罷憊而氣餒弱不能施行。故小便淋瀝點滴而下。是又稱為淋也。

陳無擇曰。淋。古謂之癰。名稱不同也。癰者罷也。淋者。滴也。古方皆云。腎氣鬱致小腸膀胱不利。復有冷淋。濕淋。熱淋。等屬外。所因既言心腎氣鬱。與驚思恐憂。即內所因。况飲啖冷熱。房室勞役。及乘急忍溺。皆致此病。豈非不內外因也。大率有五。曰冷口熱。曰膏。曰血。曰石。五種不同。皆以氣為本。

證治大要

醫學近編 癰 卷之十六

一、貞白堂

嚴氏曰。五淋氣。石血膏勞是也。氣淋為病。小便流常。有餘瀝。石淋莖中痛。尿不得卒出。膏淋尿似膏。出勞淋。勞倦即發。痛引氣衝。血淋。遇熱即發。甚則溺血。候其鼻頭色黃者。小便難也。大抵此症。多由心腎不交。積蘊熱毒。或酒後房勞。服食熱燥。七情鬱結所致。癰閉淋閉。為病皆一類也。

張子和曰。世人多為服金石燥熱之劑得之。常見藥家有此症。豈是服金石之人也。大抵是膀胱蓄熱。而成此疾。如湯瓶久在火中。煮瓶底白碱而不能

去沙石淋之類。與此理同。劉宗厚曰。此症極難。

內經云。小腹熱。溲出白液。亦甚似之也。東垣曰。凡小便癰閉。是無陰。而陽氣不化也。凡利小便之藥。皆淡味滲泄為陽。止是氣藥。陽中之陰。非北方寒水。陰中之陰。所化者也。此乃奉養太過。膏粱積熱。損北方之陰。腎水不足。膀胱腎之室。久而乾涸。小便不化。火又逆上。而為嘔噦。非膈上所生也。獨為關非格病也。潔古云。熱在下焦。填塞。不便是治關格之法。因治王善夫病。小便不通。漸成

證治大要

醫學近編 癰 卷之十六

二、貞白堂

中滿。腹大堅硬如石。壅塞之極。腿脚腫脹破裂。出黃水。雙睛突出。晝夜不得眠。飲食不下。苦痛不可名狀。求子治之。因問受病之始。知病不渴。近苦嘔噦。眾醫皆用治中滿利小便滲淡之藥。急難措手。乃辭歸。從夜至旦。耿耿不寐。窮究其理。記素問有云。無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。此病小便癰閉。是無陰。則陽無以化也。今病者內關外格之症。悉具。死在旦夕。但治下焦。可愈。隨處以北方寒水所化。太苦寒之氣。味俱陰者。黃柏知母為君。桂

爲引名曰滋腎丸沸湯下二百丸少頃前陰如刀
刺火燒之痛溺出如湧泉臥具皆濕牀下成流顧
盼之間腫脹消散予驚喜曰大哉聖人之言豈可
不遍覽而執一者也其症小便閉塞而不渴時見
煩燥者是也凡諸病在下焦皆不渴也

肘後方以杜牛膝根莖葉酒煮服治小便不利莖
中痛欲死及治婦人血結堅痛如神蓋牛膝治淋
之聖藥也但虛人當用補藥監治之耳

仲景云淋家不可發汗發汗則便血

證治大還

醫學近編 卷之六

癰閉

三

貞白堂
方金

劉宗厚曰按此則知淋閉有寒熱之殊大抵人之所
稟虛實受病不同宜參脈理分治

治熱之劑

火府丹 治心經熱小便澀及治五淋臍下滿痛

生地 木通 黃芩 甘草 煉蜜杵丸梧子大
每二十丸水通湯下

導赤散 治心蘊虛熱小便赤澀或成淋瀝

生地 甘草 木通 加竹葉煎服

車前子散 治諸淋小便痛不可忍

車前子

淡竹葉

赤茯苓

燈草

荆芥

分二帖水煎服

地膚子湯

治諸病後體虛觸熱熱結下焦小便赤

澀多起少出莖痛如刺或尿血

地膚子

豬苓

知母

黃芩

海藻

通草

瞿麥

枳實

升麻

葵子

各等分

薑三片水煎服

石葦散

治膀胱有熱淋瀝不去臍腹急痛蓄作有

時勞役即發或尿時豆汁或出沙石並治

芍藥 白朮

滑石

葵子

木通

瞿麥

各二兩

證治大還

醫學近編 卷之六

癰閉

四

貞白堂
方金

當歸 甘草

王不留行

各一兩

石葦

去毛二兩

爲末

每服二錢空心小麥湯調下

五淋散

腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出

或如膏如沙如石如豆汁並治之

赤芍藥

山梔仁

各十兩

當歸

甘草

生各五兩

條芩三兩

赤茯苓

六兩

每服七八錢水煎

八正散

治大人小兒心經蘊熱臟腑閉結小便赤

澀癃閉不通熱淋血淋膏淋沙淋石淋並皆治之

車前子

瞿麥

扁蓄

滑石

甘草

山梔

大黃 每服五七錢入燈心十莖煎
至六分服

又方 治諸淋

四苓散 二錢 益元散 山梔子 各一錢 燈心 三十根

水煎服

石葦飲 治小便不利莖中痛。

石葦 去毛 冬葵子 各二兩 瞿麥 一兩 滑石 五兩

車前子 三兩 爲末每服二錢日三服熟水下

花湯 治小便淋瀝

證治大還 醫學近編 卷之十六 癰閉 五 貞白堂

葵花根洗淨搗碎水煎服

治淋閉莖中作痛神效方。

石葦 滑石 瞿麥 扁蓄 木通 冬葵子

王不留行 地膚子 各等分 爲末每服三錢白湯

調下

治石淋方

杜牛膝 搗碎水五碗煎至一碗去查入麝香少

許調服效。

海金沙散 治膏淋

海金沙 滑石末 各一兩 甘草 二錢 爲末每二錢
麥冬湯調服燈心湯亦可。

鹿角霜丸 治全上

鹿角霜 白茯苓 秋石 各等分 爲末麪糊丸梧

子大每五十九米湯送下。

牛膝膏 治死血作淋

牛膝 四兩去蘆 桃仁 一兩去尖炒 當歸尾 二兩酒

赤芍藥 一兩 生地 一兩半 川芎 五錢 用水以炭

火慢熬至二鍾入麝少許分作四服空心服如夏

證治大還 醫學近編 卷之十六 癰閉 六 貞白堂

月用涼水換此膏不壞。

滋陰降火湯 治火燥血少氣不得降而淋。

當歸 黃柏 鹽水炒各一錢半 知母 牛膝 生地 各一

白芍 二錢 甘草梢 木通 各八分 水煎食前服

靈苑透膈散 治五種淋疾氣淋熱淋勞淋石淋及

小便不通至甚者。

硝石 一兩雪白 每服二錢各依湯使服。如勞倦

虛損小便不出小腹急痛葵子煎湯下通後更須

服補虛丸藥。如血淋小便不出時下血疼痛並

用冷水調下。如氣淋小腹滿急。尿後常有餘瀝。

木通煎湯下。如石淋莖內痛。尿不能出。引小腹。

膨脹急痛。尿下沙石。令人悶絕。將藥末先入銚子。

內隔紙炒至紙焦爲度。再研令細。溫水調下。如。

小便不通。小麥湯下。卒患諸淋。並以冷水調下。

以上並空心先調藥消散如水。卽服之。更以湯使。

送下。凡服藥未效者。服此立愈。

靈苑方 治卒患諸淋。遺溺不止。小便赤澀疼痛。三。

葉酸漿草。取嫩者搗汁一合。攪勻。空心服之。立通。

證治大還

醫學近編

癰閉

七

貞白堂

酸漿草卽布穀飯。

一方 治血石淋

楊樹炷屑。烏梅一。大棗三。水煎服。

羅太無石燕丸 治石淋。多因憂鬱。氣注下焦。將所。

食鹹物。結成沙石。小便礫痛不可忍。必俟沙石出。

而後小便通。

石燕燒赤水中淬三滑石 石葦去毛瞿麥穗各一

爲末糊丸。梧子大煎燈心。瞿麥湯吞下十九。一日。

三服。

葛粉丸 治男女淋病疼痛效速。勿輕忽之。

沙糖本草云治心葛粉 和丸梧子大井花水化。

開一二九

斗門方 治五淋

苧麻根兩莖。打碎煎頓服。大妙。升溪云苧根

治石淋方

螻蛄一枚鹽二用于新瓦上。鋪蓋焙乾研末。溫酒調。

下一錢七。服下卽愈。

神散 治諸淋急痛

證治大還

醫學近編

癰閉

八

貞白堂

海金沙七錢半滑石五錢爲末每服二錢。木通麥冬。

車前草煎湯入蜜少許調下。

治淋閉便濁神方

五爪龍藤連根一兩土茯苓 杜牛膝根各八錢共。

用酒三碗煎至一碗。空心服三服全愈。又治下。

疳如神。五帖後疳愈。再不發他瘡毒。

腎瀝湯 治胞痺小便不利。小腹急。

麥冬 木通 桔梗 桑白皮 杜仲炒犀角屑

五加皮各一赤芍五水二鍾加羊腎一枚切。

小便不通。小腹脹滿。不可忍。

治諸般沙石淋。琥珀二錢。研細末。空心用葱白頭煎濃湯調下。無

木通 活石 各一兩 黑丑 五錢 每服五錢。燈心十

莖葱白一莖。水煎服。

治氣閉鬱之劑。

芍藥。檳榔散。治五淋。

赤芍藥一兩 檳榔一枚 麩 爲末。每服一錢。七空

心白湯調下。

治諸般沙石淋。

證治大還 醫學近編 癰閉 九 貞白堂

砂仁 三錢 海金沙 紅曲 檀香 各二錢 白豆仁

木香 丁香 各一錢 分五帖。研桃仁十四枚。入生

氣藥。

治諸般沙石淋。

琥珀二錢。研細末。空心用葱白頭煎濃湯調下。無

問諸般淋疾。一二服神效。本草云。琥珀

治卒淋急痛方。

益元散 二錢 尚香 一錢 微 木香 檳榔 各二

爲末。水調服。

琥珀散 治五淋沙石淋。

滑石 琥珀 各一兩 木通 當歸 木香 鬱金

扁畜 各五錢 爲末。每五錢以蘆葦葉煎湯調服。如

無蘆葦葉。以竹葉煎湯送下。

治肝經氣滯。蘊熱。小便淋痛方。

甘草 枳子 五錢 青皮 黃柏 澤瀉 各一

服效。

補氣血之劑。

治諸般沙石淋。琥珀二錢。研細末。空心用葱白頭煎濃湯調下。無

證治大還 醫學近編 癰閉 十 貞白堂

作淋治。可補血。行肝經滯血自愈。生地 當歸

赤芍 各一錢 川芎 條芩 甘草 枳子 各三

木通 各五錢 黃柏 炒二錢 紅花 一錢 杜牛膝 一

仁泥。研滑石同煎。待淋病退。減桃仁。滑石。杜牛膝

代木通。分兩倍之。

氣虛者。八物湯加杜牛膝。黃芩煎服。

老人氣虛。亦能淋。參朮中加木通。山梔。

治勞苦傷血。脉沈而大。下焦蘊結而淋。

人參 歸尾 白芍 香附 各五錢 條芩 三錢

木通 <small>三錢</small> 山梔仁 <small>炒三錢半</small> 黃芪 <small>甘草梢五分</small>	分四帖煎杜牛膝湯服	清心蓮子飲 治上盛下虛心火炎上。口舌咽乾煩	渴微熱小便赤澀或欲成淋並治之	黃芪 <small>蜜炙</small> 石蓮肉 赤茯苓 人參 <small>各七錢半</small> 甘草 <small>炙</small>	車前子 地骨皮 麥門冬 黃芩 <small>各五分</small> 每服	七八錢水煎溫服 發熱加薄荷柴胡	治氣虛脾虛消渴淋濁	人參 滑石 <small>各一錢</small> 白朮 <small>一錢</small> 赤茯苓 澤瀉 <small>各七錢半</small>	證治大還 <small>醫學近編 癰閉 卷之十六</small> 土 貞白堂	麥門冬 甘草 <small>各五分</small> 竹葉 <small>三十片</small> 加燈心二十根	水煎服	治寒之劑	千金茯苓丸 治胞痺小便內痛	赤茯苓 防風 細辛 白朮 澤瀉 <small>各五錢</small>	紫苑 天花粉 牛膝 黃芪 芍藥 甘草 <small>各錢</small>	三 山藥 山茱萸肉 獨活 半夏 <small>各一錢</small>	附子 炮 官桂 <small>各二錢</small> 煉蜜丸梧子大每服五六	十丸空心溫酒下
--	-----------	-----------------------	----------------	---	--------------------------------------	-----------------	-----------	--	--	--	-----	------	---------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------

腎著湯 治胞痺小便不通	赤茯苓 白朮 <small>各四兩</small> 甘草 <small>炙三兩</small> 乾薑 <small>炮一兩</small> 每服	五七錢水煎一日三服	巴戟丸 治胞痺臍腹痛小便不利	巴戟 <small>去心一兩半</small> 桑螵蛸 <small>炙炒</small> 遠志 <small>去心</small> 生地黃	山藥 附子 炮 肉苁蓉 <small>酒浸</small> 續斷 <small>各一兩</small> 杜仲 <small>炒</small>	鹿茸 <small>酥炙</small> 石斛 兔絲子 五味子 山茱萸	官桂 龍骨 <small>各三錢</small> 煉蜜丸梧子大空心溫酒下	三十丸	證治大還 <small>醫學近編 癰閉 卷之十六</small> 土 貞白堂
-------------	--	-----------	----------------	--	---	-------------------------------------	--------------------------------------	-----	--

雲間陳 治三農甫述 男

杖璣先 師柴羔愚 參

毘陵鄒言正仲衡甫閣 門人

范 崧壽民 校 王 顥贊皇

痞症 十二

寸沈關浮而弦者痞關前洪緩者痞

劉宗厚云痞與否同不通泰也內覺飽悶而外無脹急之形蓋由陰伏陽蓄血氣不運痞塞於心下皆

證治大遺

醫學近編 卷之十七 痞

一 貞白堂

土邪之所為也東垣云痞者心下滿而不痛也太陰者濕土也主壅塞乃土乘心下為痞滿也前人俱指誤下所致蓋傷寒誤下則裡氣虛表邪乘虛而入於心之分故致痞滿雜病則所受之邪氣亦乘虛蓄於心下因以致痞也亦有不因誤下或因中氣虛不能運化精微而痞者有飲食痰積不能施化而痞者有濕熱太甚土乘心下為痞者有七情所傷鬱結心胸而痞者治痞須分虛實隨其病之所在以調之如實痞能食而大便閉以黃連厚

朴苦以泄之虛痞不能食而大便利以芍藥陳皮

酸以收之濕者四肢困重小便短少以蒼朮茯苓

澤瀉滑石以滲之鬱者留滯不通食難消化以撫

芎香附蒼朮枳實以開之厚朴生薑半夏之辛以

散之熱則煩熱溺赤用芩連枳實以清之葛根升

麻發之便結者即利之痰則胸中窒塞用半夏

瓜蒌枳實黃連白芥子以豁之痰吐者因而越之

飲食後因胃風寒不消而痞宜吳茱萸砂仁草豆

蔻香溫以化之脾胃弱轉運不調而痞宜人參

證治大遺

醫學近編 卷之十七 痞

二 貞白堂

甘艸白朮茯苓甘以補之飲食過傷腹飽噯氣而痞用青皮枳實厚朴山查麴蘖以消之痰挾血成窠囊而痞用桃仁紅花香附莢朮大黃以逐之胃弱脾虛濕熱不運食已而痞平胃枳朮丸以調之脾胃虛寒運化不及食後倒飽六君子加麴蘖砂仁以助之右關脉弦肝木乘脾結聚痰涎閉於臟腑氣不舒而痞六君子加木香柴胡青皮疎而暢之大病後元氣未復胸滿短氣或清陽不升濁陰不降填塞胸中而痞補中益氣湯加半夏茯苓以

升降之七情所傷結滯成疾痞塞滿悶四七湯

紫蘇 朴乾 加木香香附枳殼調而越之下多亡陰而

痞四物加參朮升麻少佐以陳皮枳殼以監制之

全在詳脈症而施治也

東垣云傷寒雜症候下而痞者以下多則亡陰亡陰

者謂脾胃水穀之陰亡也胸中之氣因陰虛而下

陷於心之分理宜升補胃氣以血藥兼之若全用

氣藥則痞益甚苟復下之則氣虛下降必變中滿

等症矣

證治太還

醫學近編

痞

二

貞白堂

世治要訣云諸痞塞及噎膈乃是痰為氣所激而上

氣為痰所隔而滯痰氣相搏不能流通並用二陳

湯加順氣之藥若痞塞脹滿胸膈不利或氣上逆

或腹疼痛並宜木香流氣飲凡邪氣作痞宜用疎

利若氣不歸源而為痞此乃虛痞愈疎愈痞宜收

補之中微加疎通之劑慎不可全用通利之藥

薛立齋云心膈痞滿屬脾胃虛痞者宜六君子湯

脾胃虛寒者宜理中湯結傷脾者歸脾湯肝木

侮脾土者六君子湯加柴胡芍藥脾氣壅滯者平

胃散肺氣壅滯者紫蘇飲宿食壅滯者養胃湯

血虛痞者四物加參朮

按痞病壅塞滿悶人皆知氣之不運也獨東垣指血

病言之可謂闢病機之微矣然清陽不升濁陰不

降而為痞塞此氣虛痞也下多亡陰邪氣乘虛停

蓄心下而為痞滿此陰虛痞也勞役傷脾轉運不

調而為痞悶此脾虛痞也世人不審此意一遇痞

塞即行疎利實實虛虛愈疎愈痞病益滋甚矣

木香消痞湯東垣 治因憂氣積復食濕麵致結中

證治太還

醫學近編

痞

因

貞白堂

脫腹皮微痛心下痞滿不思飲食

柴胡 陳皮 半夏 甘州 歸尾 紅花

枳實 木香 草豆蔻 生薑

大消痞飲丹溪 治一切心下痞悶及濕土作痞

黃連 黃芩 枳實 厚朴 薑黃

半夏辛以散之 人參 白朮 甘州甘以補之

澤瀉 茯苓淡以滲之 砂仁 神麴 乾生薑

橘皮溫以消之 煎丸任意

豁痰消痞飲丹溪 治熱痰壅滯痞悶

黃連 半夏 瓜蒌 枳實 桔梗

木香寬中帶 治七情傷脾致胸膈痞悶停痰氣逆

青皮 陳皮 丁香 香附 砂仁 木香

厚朴 甘艸 半夏 白豆蔻

沈香丸 治血痞

沈香 血竭 辰砂 各二錢 木香 一錢 真麝香 一錢

分琥珀 五分 歸尾 二錢 丹皮 二錢 延胡索 一錢 五分

為末用磁器煎甘艸湯打元米糊為丸凡氣痛酒

磨葱湯亦可產後血塊酒磨服

證治大選 醫學近編 卷之十七 五 貞白堂

胸腹脹飽 用蘿蔔子炒黃濃姜湯下五錢立效

胸腹痞悶 用陳酒麴一兩炒黃水煎取清汁飲之

妙

鼓脹 十三

時而起 目下腫足先腫後腹大背腫新及四肢按之隨起為水止腹膨脹按之頃

脈大堅以瀉者脹洪而滑盛而緊大而瀉者脈弦而

遲必心下堅洪數為熱遲為陰洪緩沉弦為濕熱

弦數為氣結滑為血聚浮者易治虛者難治

鼓者以其中空無物皮急如鼓張則排臟腑廓胸脇

形皮膚也經曰夫脹者皆在於臟腑之外有熱

經曰諸腹脹大皆屬於熱是也有寒脹經曰胃中

寒則脹滿是也有濕脹經曰諸濕腫滿皆屬脾土

是也然七情氣滯食積死血悉能為脹治必詳審

更分虛實虛脹時滿時減按之虛軟不痛實脹

常滿不減按之堅硬而痛積滯胸中有塊血虛

朝寬暮急氣虛朝急暮寬氣血俱虛朝暮皆

急初起因食積痰氣暴脹或大滿大實氣滯

悶飲食不減脈浮洪實者非疎利不可利後宜

證治大選 醫學近編 卷之十七 六 貞白堂

調養若補之太早邪氣愈盛脹滿漸加雖欲攻利

邪不能伏而反有所助矣經曰中滿者瀉之於內

又曰下之則脹已宜厚朴七物湯本加積柳姜黃

木香小便不利者分消湯本氣鬱滯者木香

順氣湯本有積滯者廣茂瀉堅湯本濕熱者

大橘皮湯分消散本或升降或分利或消導或

散堅乘其未虛而藥之東垣云大實大滿小便不

利從權以寒熱藥下之是也丹溪曰灼知不虛病

淺胃壯有積滯者亦當下之若久病反脾虛中

滿或服通利藥過多或瘧痢後因虛致脹者此

正氣已衰脾氣已竭大宜補中溫胃用參苓白朮

為君蒼朮乾薑肉桂砂仁吳茱萸木香以運氣佐

以炒麴荀子以清膨代化少加青皮以制肝氣鬱

滯加沉香下陷加升麻柴胡小便不利加車前子

澤瀉有痰加半夏虛甚者加熟附子或香參散

一切疎風散堅滲泄之藥如厚朴腹皮澤瀉車前

子山查麴蘖皆在所禁也此治實脹虛脹之大法

若飲食停滯噯氣痞悶胸腹有塊而脹者木香

醫治大選

醫學近編

鼓脹

七

真白堂

檳榔丸

香檳青陳蓬壳連

傷酒麴厚味或膏梁

之人食已便臥使濕熱之氣不得施化致令腹脹

右關脉洪緩沉弦此濕熱鬱而為脹也宜大橘皮

湯本加姜炒黃連姜黃或中滿分消散本飲食

傷脾脾氣虛弱致水穀聚而不化此寒濕鬱遏而

脹也香砂調中湯香砂二皮白朮朴檳榔仲

智草果木香勞倦傷脾不能運化而脹補中益

氣湯參芪朮升加砂仁炒麴大怒而脹分心氣

飲陳青牛桑皮大腹皮蘇葉憂思過度而脹柴

黃子相攻或痰或脹初起七氣消聚

散本或黃連堅湯本日久脾胃衰弱者參朮健

脾湯本加木香香附青皮腹脹大四肢瘦削腹

中有塊唇紅腹痛多嗜肥甘此虫蠱也宜投以阿

魏消積殺虫之藥瘀蓄死血而脹者皮上見素

紫筋絞小水反利大便秘結肚腹痛腹中有塊

面黃黑瘦蛭虫丸本虛弱不可下者且以當歸治

血散本加沒藥調治濁氣在上干擾清陽之

苑而不伸致生填脹本香順氣湯本大病後飲

醫治大選

醫學近編

鼓脹

八

真白堂

食不調脾胃受傷運化不及而脹者先用化滯調

中湯白朮枳實半夏陳皮茯苓砂仁次以參苓白

朮散參苓朮蓮肉扁豆薏若時減時滿此脾虛氣

散而不收也四君子湯加陳皮芍藥五味子若

太病後小腹重墜脹滿此清氣下陷也補中益氣

湯切忌散氣降氣之藥瀉痢後或過服通利藥致

脾虛中滿者參苓白朮散加砂仁木香暑氣滯

伏至秋變瘧肚腹脹滿者交加飲子見瘧

丹溪云脾具坤靜之德而有乾健之運故能使心肺

之陽降胃之陰升而成天地交之泰若七情內傷六淫外感飲食不節房勞致虛脾胃之陰受傷轉輸之官失職胃雖受納不能運化故陽升陰降而成天地不交之否清濁相混墜道壅塞鬱而為熱熱留為濕濕熱相生遂成脹滿理宜補脾行濕又養肺金以制肝木使脾無賊邪之慮滋腎水以制心火俾肺得清化之令却鹽味以防助邪斷妄思以保母氣無有不妥醫不察此喜行利藥得一時之快真氣愈傷腫脹愈甚矣

證治大還

醫學近編 卷之十七

鼓脹 九

貞白堂

東垣云脾濕有餘無陽則不能生化萬物故令腹脹食不化此乃大寒為脹滿也治宜大辛熱之劑如土人在雨水中則為泥不能生化萬物得和風暖日則濕去陽生乃能生長也周慎齋用四君子加薑桂茱萸正此意也

綱目云東垣謂腹脹滿氣不運者用厚朴以破滯氣腹中奔悶者此非脹滿乃散而不收也用芍藥以收之是知實滿不運是氣結而脹也宜散虛病痞悶是氣散而脹也宜收散收之際生死所係也慎

之審之

劉宗厚曰脹滿屬寒或內傷或諸氣或因病數服通利藥脾胃虛而致者為多屬濕熱者為少至積成者亦甚有之皆宜分治大抵大實大滿痞閉氣滯脉洪實者宜下之服下劑過多或瀉利後所致或素脾胃虛弱不能運化而成者皆宜補中行濕蓄血瘀血致者當從血治寒者熱之熱者寒之結者散之清濁混淆者分清之或升降或消導皆宜適事為故也

證治大還

醫學近編 卷之十七

鼓脹 十

貞白堂

陳三農云腫脹有氣腫水腫食積停痰陰陽腫之不同水腫宜胃苓湯二水二苓澤肉桂陳桂氣腫四君子合和中散參朮苓艸乾姜肉桂吳萸食積停痰蝦蟆猪肚丸本門陰陽腫六味丸加牛膝杜仲破故紙小茴香溫而利之蓋此症得之汗下後或房勞太過腎虛所致故宜溫腎而腫始消也又曰病後腹脹切不可下宜四君子加乾薑肉桂吳茱萸極妙恐內有瘀血見溫暖即行病以火為主火乃養命之源也凡遇脹滿白朮亦不宜用恐滯氣難行若不得已要用須用

暑中邪
暑濕邪
暑氣散
暑氣聚
暑氣正
暑氣虛
暑氣實
暑氣寒
暑氣熱

若水汗炒淨身脹痛俱屬陰分血虧大熱亦屬血
分微寒微熱或有熱不退汗至頸而還者俱屬氣
分氣分宜補中益氣湯見症加減血分芎歸湯加
肉桂或四物加麻黃肉桂胸中脹滿四物加蘇梗
單腹脹大法只宜溫中為主用參苓白朮各五分
炙甘草二分白朮用蒼朮煎汁拌炒吳茱萸六分
厘切不可過一分乾薑炒黑五分腰痛加桂服數
劑覺消但小腹重滯不利用補中益氣湯加乾薑
以溫中神麴以消脹三四服後再用前藥以愈為
證治大選

醫學近編
卷之十七

鼓脹

十一

真白堂

東垣曰婦人血分水等症皆屬形氣不足邪滯陰
道也宜椒仁丸本門葶藶丸水腫門加減治之以宜葶
其邪仍佐以補輔元氣之藥庶使藥力有所伏而
行則邪自不能容而真氣亦不至傷矣
臟腑積滯諸腫脹辨

心脹煩心短氣臥不安氣聚其經故也肺脹虛滿喘咳氣聚其經故也
肝脹脇痛引小腹肝與小腹乃肝之部氣聚故痛脾脹
善噦四肢滿體重不勝太臥不安四肢脾土之末脾病故善噦

腎脹引背央央然腰脾痛腎脈循復絡旁之也胃脹腹滿胃脘痛妨食鼻聞焦臭大便難胃脈下廉絡脾挾脾氣聚其經故脹且且痛也焦臭者氣滯其心火也大腸脹腸鳴腹
痛冬寒則飧泄大腸多曲折氣客其經故痛而陽明畏寒則不能腐化也
小腸脹小腹填滿引腰痛小腸為腸之府氣脹小腸為腸之府氣脹小腸為腸之府氣脹小腸為腸之府氣脹
脹小腹氣滿而癢閉小腸為腸之府氣脹小腸為腸之府氣脹小腸為腸之府氣脹小腸為腸之府氣脹
脇痛口苦善太息肝脈貫膈循脇口苦者肝氣結而不舒暢也三焦脹氣滿於膚極極然三焦主氣也
寒氣客於皮中鼓之空空不堅身腹太色不變按之
證治大選

醫學近編
卷之十七

腫脹

十二

真白堂

不起為膚脹寒氣客於腸外與衛氣相應氣不
得榮因而所傷癰而內着其始如雞子至其成如
懷胎按之則堅推之則移月事以時下此為腸覃
因氣聚而濁結成痰也寒氣客於子門子門閉
塞不通惡血當瀉結以留止日以益大如胎月事
不來為石瘕因血壅不流而成積也有肺氣滯於腹外運行不得遍身腫脈浮者有傷寒之
物成積得氣不通腹急氣喘者有脾寒年深不
愈傳為浮腫者有因瀉痢脾虛邪熱乘虛入脾

胸腹急脹。脈數者。有傷風傷濕而腫者。有氣虛中滿者。有氣實中痺者。有氣不順。有餘於上。頸腫。膺腫。胸脹者。有身腫而冷。胸痞不能食。病在骨節。汗之則愈者。有氣為痰飲阻。隔氣不通。利心下堅脹。為氣分者。有婦人經水前斷。血不通利。水亦因之停滯。火之血亦化水為血分者。有先病水。水濕滯於經絡。因經斷為水分者。有胃中風。脾中寒者。有心痺。脾虛者。有脾熱。飲聚者。有女勞瘵者。小腹脹有腎熱者。有三焦虛寒者。有腸癰。女勞瘵者。面腫有肺中風。腎中風。胃寒肺水者。凡此之類。各當分別用藥。不治證。

詠治大還

醫學近編 腫脹 卷之十七

三

貞白堂

面腫白點 掌中無紋 腹脹青筋 臍突 脚眼腫 缺盆平 陰腫 脈絕口張 足跗膝腫 醫按 唇腫齒焦或含黑

抱一翁治一女子腹脹如鼓。四肢骨立。眾或為娠。或為蠱。或為瘵。治罔効。翁診之。脈滑數且弦。弦數為氣結。滑為血聚。此氣搏血室也。日服芍歸積歲月。

非血藥乎。曰。此獨治血而失於順氣也。蓋氣道也。血水也。氣有一息之不運。則血有一息之不行。治血必先順氣。俾經隊得通。而後血可行。以蘇合香丸投之。三日而腰作痛。曰。血欲行矣。急以硝黃逐之。下汚血如爪。數十枚愈。

東垣治一婦。因勞役。飲食失節。加以憂思。氣結。病心腹脹滿。且食不能暮食。兩脇刺痛。其脈弦而細。至夜渴陰之氣。當降不降。填脹尤甚。蓋陽主運化。飲食勞役。損傷脾胃。陽虛不能運化。精微聚而不散。

詠治大還

醫學近編 腫脹 卷之十七

南

貞白堂

故為脹滿也。經曰。留者行之。結者散之。遂以柴胡升麻行少陽陽明二經。發散清氣。運行陽分。為君。生薑草豆蔻益智半夏辛熱消散中寒。為臣。厚朴蒼朮木香青皮辛溫通順滯氣。當歸甘州人參甘溫調和榮衛。滋養中氣。濁陰不降。洩以吳茱萸之苦熱。佐以茯苓澤瀉之鹽平。氣薄。引濁陰之氣。自上而下。散之洩之上。之下之。清濁之氣。各安其位而愈。

丹溪治一婦。氣血俱虛。患單腹脹。因氣餒不能運化。

瀕死但手足面目俱腫氣尚行陽分猶可治遂以

參朮芎歸芍藥以欬脹滑石腹皮以欬氣蘇梗荷

子陳皮以泄滿海金沙木通利水木香運氣而愈

又治一人病癰半年患脹手足瘦而腹大如蜘蛛之

狀脉弦澁重則大遂以參朮為君芍藥芎歸為臣

陳皮黃連厚朴為佐茯苓甘草些少日用三劑一

月大汗而瘥愈又半月小便長而脹愈

余治一人嗜酒大便下血春間患脹色黑而腹大脉

數而瀉重似弱以四物加苓連木通白朮陳皮厚

朴甘艸一月而安

孫召治一女子心腹脹痛色不變經曰三焦脹者氣

滿皮膚硬硬然石堅遂以仲景厚朴生薑半夏人

參甘艸湯下保和丸漸愈

王宇泰治一人胸腹身面俱脹滿他醫治療半月不

效診其脉六部皆不出以紫蘇桔梗之類煎服胸

有微汗再服汗出周身六脉俱出而愈

又治一人胸腹脹大煩躁發渴而亦不得臥而足冷

作酒後人肉奪於所用精氣溢下邪氣從之上逆

證治大還

醫學近編

腫脹

五

貞白堂

證治大還

醫學近編

腫脹

共

貞白堂

逆則陰氣在上故為填脹其上焦之陽因下逆之

邪迫塞壅上故煩此因邪從下上而盛於上也

遂用吳茱萸附子人參輩以退陰逆水浸冷飲以

解上焦之浮熱入咽覺爽頃則腹中氣喘如牛吼

泄氣五七次而愈

陳三農治一人患腹脹滿服補中六君其脹減十之

七八候服行積丸遂致食減復脹甚脉細數以補

中湯加乾薑肉桂各五分附子七分吳茱萸一分

薑水煎飲愈

又治一人腹脹時吐小便利則大便秘不通大便利則

小便不通用炒乾薑三錢升麻一錢五分吳茱萸

微炒五分煎服愈

又治一人患單腹脹將愈因惱怒復脹而痛口乾身

熱食減膽中近右作痛按之則止用人參乾薑炒

半夏各七分白朮茯苓蒼朮製各二錢陳皮神麴

各五分炙甘艸肉桂各二分吳茱萸七厘服愈

又治一人頭面四肢浮腫帶黃色行動脚軟此脾胃

虛弱宜健脾固中氣為主用人參白朮茯苓陳

皮甘艸漸愈

分消湯 治痞滿飽悶漸成脹滿

白朮 蒼朮 厚朴 陳皮 砂仁 木香

香附 枳實 茯苓 大腹皮 澤瀉 猪苓

荀子 薑黃

中滿分消散 東垣 治熱脹濕熱脹或傷酒麵及厚

味之物或膏粱之人食已便臥致濕熱之氣不得

施化致令腹脹此亦是熱脹

黃芩 黃連 枳實 半夏 薑黃 白朮

證治大還 醫學近編 腫脹 卷之十七 貞白堂

人參 猪苓 澤瀉 砂仁 茯苓 厚朴

陳皮 甘艸 生乾薑

厚朴七物湯 仲景 治腹滿發熱脉浮數飲食如故

腹脹滿

厚朴 姜汁炒 枳實 炒 大黃 煨 甘艸 炙 肉桂 大棗

生薑 止用上三味各厚朴三物湯治腹脹脉數

大橘皮湯 附餘 治濕熱內甚心腹脹滿小便不利

大便滑泄

橘皮 厚朴 白朮 滑石 檳榔 半夏

山查 蒼朮 茯苓 猪苓 澤瀉 藿香

木香 生薑

紫蘇子湯 治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹喘促

煩悶大小便不利

蘇子 草果 厚朴 半夏 陳皮 腹皮

枳實 木通 人參 白朮 甘艸 木香

生薑

木香順氣湯 東垣 治濁氣在上干擾清陽之氣宛

而不伸為脹

證治大還 醫學近編 腫脹 卷之十七 貞白堂

草豆蔻 吳茱萸 益智仁 木香 青皮

陳皮 厚朴 蒼朮 當歸 半夏 茯苓

澤瀉 升麻 柴胡 乾薑

賈茂濟堅湯 東垣 治中滿腹脹內有積聚堅硬如

石上氣喘促令人坐臥不安

廣茂 紅花 升麻 柴胡 神麴 澤瀉 草

豆蔻 吳茱萸 青皮 陳皮 厚朴 黃芩

黃連 益智 當歸 半夏 薑黃

木香化滯散 破滯氣治心腹痞悶

白豆蔻	大腹皮	橘皮	茯苓	砂仁	人參
白朮	白檀香	青皮	薑黃	木香	檳榔
藿香	桔梗	土艸			
七氣消聚散					
香附	青皮	莪朮	三稜	枳殼	砂仁
木香	厚朴	陳皮	甘艸	薑	
沉香散	治腹脹氣喘坐臥不得				
沉香	木香	各二錢五分	枳殼	麵炒	蘿蔔子
生薑	水煎服				
證治大還	醫學近編 腫脹 卷之十七				
香參散	秘傳 治脾虛脹滿				
人參	一兩	茯苓	橘紅	各五錢	沈香
新瓦上焙為細末每四錢煎服					
參朮健脾湯	貌吉 治胃虛脹及氣虛中滿				
人參	白朮	各二錢	茯苓	陳皮	半夏
仁	各一錢	肉桂	四分	神麴	乾薑
艸	二分	生薑	三片	加木香些少見功尤速即化	
滯調中湯					
香檳散	治大小便不通腹脹喘急畧與疎導即止				

牽牛	檳榔	滑石	大黃	等分	木香
薑湯下四錢					
當歸活血散	貌吉 治瘀血停蓄為脹				
薑黃	沒藥	赤芍	歸尾	桃仁	紅花
川芎	五靈脂	青皮	肉桂	玄胡索	莪朮
烏藥	香附				
單腹脹鼓脹水脹氣蠱藥酒方					
沉香	二錢	茴香	砂仁	各五錢	廣木香
忘憂草根	半斤	白豆蔻	一錢	土牛膝	兩
酒五斤	煮白肚底蝦蟇一個砂仁塞口內鹽泥固濟煨為末煉蜜為丸酒送下				
黑丑散	治氣為痰飲所隔心下堅脹名曰氣分				
黑丑	一個	枳實	陳皮	檳榔	大黃
輕粉	甘遂	各一錢			
蛭虫丸	治血蠱堅脹腹痛不可按				
水蛭	炒烟	蛭虫	沒藥	乾漆	桃仁
歸尾	三稜	莪朮	薑黃	木香	肉桂
黃	醋胡九如梧子大				

香九 治... 腹膨如鼓

沉香 木香 橘紅 甘遂 各三錢 砂仁 五錢 當歸 七錢

共為末。用蝦蟇口中去腸將藥末推滿其腹以線縫口。用大酒砂礮內煮熟去皮骨。搗爛為丸。好酒下一錢。七服愈。忌甘草

人參九 治經脉不利。化為水。流走四肢。惡瘡腫滿。各曰血分。不可作水腫治。

人參 當歸 大黃 紙包飯上蒸 桂心 瞿麥 赤芍

白茯苓 各五錢 草薢 炒一錢 蜜丸 梧子大 每服十錢

證治大還 醫學近編 腫脹 三 貞白膏 卷之十七

九加至二十九飲湯下

石簞九 治鼓脹水腫

石簞 千金子 郁李仁 白丑 黑丑 沉香

木香 枳殼 莢朮 等分 棗肉為丸 酒下二錢

加減椒仁丸 治血分

椒仁 續隨子 甘遂 附子 牽牛 蠶脂

玄胡索 郁李仁 瞿麥穗 赤芍 當歸尾

桂心 葶藶 薑黃 吳茱萸 煉蜜為丸

和中丸 治鼓脹神効

乾薑 四兩 切片冬炒 人參 一兩 煎湯 青皮 二錢

一兩 紫蘇 五錢 煎湯 陳皮 五錢 煎湯 肉桂 二兩 益智

二錢 煎湯 澤瀉 五錢 同小茴香 一錢 同破故紙 五錢

同吳茱萸 一兩 煎湯 薏苡仁 一兩 煎湯 鹽 一錢 同

共為末。紫蘇煎湯打神麴糊為丸。因病輕重隨症

作湯送下

參苓固本湯

人參 白朮 茯苓 蒼朮 陳皮 乾薑

肉桂 吳茱萸 木香 瀉加澤瀉瀉久知升

證治大還 醫學近編 腫脹 三 貞白膏 卷之十七

麻手足冷加熟附

蝦蟇猪肚丸

蝦蟇一個。去腸肚以胡椒一錢。入口內用猪肚包

縫。煮爛留湯半碗。去蝦蟇。取猪肚搗爛為丸。每用

湯一盃送九藥

又方用人參固元氣。不見水葫蘆同煎服。氣即消

治氣壅以西瓜一枚。去頂入蒜瓣一斤。剝淨。插在瓜

內。麝香三分。仍以蓋蓋定。以竹釘銷銷將麝封固

架在鍋內。蒸一炷香。取起食蒜并瓜水。其脹即消

神效。

鼓脹方

蒼朮四兩 附片 大戟二兩 陰陽水各一鍾 半夏姜製

枳實枳殼 金麩 炒 白芥子各三錢 絲瓜筋炒 車前子

各四錢 沈香 木香各二錢 共為末酒下一錢日三

服

胸腹暴脹喘急難臥以草豆蔻一兩蘿蔔子五錢為

末煎服。

五飲湯 治肢腫甚效凡遍身腫脹多有屬支飲證

證治大遺



醫學近編

腫脹

圭

貞白堂

飲者。

旋覆花 赤茯苓 半夏 陳皮各一錢 澤瀉各七

肉桂 厚朴姜汁炒 枳實麩炒 吳茱萸 生甘艸

各三錢 薑水煎不用白朮者恐直補脾以滯氣也

又方以烏柏樹根同東白皮。

傳信示以槐樹根白皮同紅棗肉搗爛燒灰酒下每

服五分神驗。

諸血

脉要曰諸症失血皆見乳脉澁緊血滯洪數血熱脉

貴沉細而緩為易治切忌浮大而數為難治

陳三農曰口鼻出血陽絡受傷二便下血陰絡受傷

須知受傷之理有瘀則暫為消導無瘀亟宜滋其

化源參透虛實二字庶幾乃得治血之道

張三錫曰榮血之行各有常道為人所迫則錯亂沸

騰而吐衄唾溺諸等血症作矣有如火急湯沸勢

不可遏火去斯止善乎丹溪之論曰口鼻出血皆

證治大遺

醫學近編

諸血

一

貞白堂

是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出上竅法當

補陰抑陽氣降則血歸經矣乃論血證三昧語

陽明之脉絡鼻是經火盛迫血妄行從鼻出者曰衄

方書言從肺來非也從口湧出者曰吐血初起洪

大犀角地黃湯按犀角性升散能散一切有餘之

火乃陽明經藥故曰如無犀角以升麻代之今人

不知泥於犀角解乎心熱一句不分其虛實輒與

四物同用若是實火固為得宜陰虛者寧免飛揚

之禍歟

原病式曰衄者陽熱拂鬱於足陽明而上熱則血妄行故鼻衄也。

丹溪曰衄血宜涼血行血為主。

犀角地黃湯加鬱金山茶花蘆汁童便酒調下。

傷寒家得衄為欲解謂熱隨血去俗曰紅汗是也詳

見本門。

一方人中白新瓦上焙乾入麝香少許細酒調下即止。

服犀角不止兼用降藥芩連梔柏丹皮生地玄參側

證治大還

醫學近編 諸血 卷之十七

二

貞白堂

葉赤芍之類選用。

衄血後半月一月每洗面即發是經尚未歸四物加

石菖蒲阿膠蒲黃各半錢煎熟調煨石膏一錢兼

進養正丹

見氣門

失血家須用下劑破血蓋施之于蓄妄之初亡血家

不可下蓋戒之于亡失之後。

一應上溢之證若脾胃氣壯不瀉能食者皆當以大

黃醋製和生地黃汁及桃仁泥牡丹皮之屬引入

血分使血下行轉逆為順也最妙法不知此而徒

事涼藥四物等脾胃反傷今人治此無一生者此也。

捷法

用頭髮皂角水洗淨燒灰竹管吹入鼻內或以酒調

服亦可梔子燒灰亦佳。龍骨細研吹入鼻凡九

竅出血皆效。百草霜吹鼻亦妙。千葉石榴花

末吹亦可。蘿蔔上半段杵汁服又以汁注于鼻

中。薑汁磨墨滴亦效。萱草花根洗淨取汁加

薑汁細細呷之治大熱衄血良。一本本草一注大

證治大還

醫學近編 諸血 卷之十七

三

貞白堂

蒜搗泥隨左右貼足心妙。綱目

麝香散

白礬

枯另

白龍骨

枯舌者

麝香

五分

右三味和勻每用一字先以冷水洗淨鼻中血涕

吹之。

人參

五錢

五錢

五錢

白芍

白芨散 用白芨不拘多少為末冷水調貼鼻梁上

用童便服亦可。

地黃飲 拔粹方治衄血往來久不愈甚効。

生地 熟地 地骨皮 枸杞子 各一錢

右為末每服三錢蜜湯調下日三服

地黃湯 治榮中有熱及肺壅鼻衄一切丹毒

用歸芎生地赤芍白水煎服 衄加蒲黃 瘡加

黃芩 丹毒加防風

伏龍肝半升以新大碗水淘取汁和蜜頓服

芎附散 治服諸藥衄不止用茶調下二錢

川芎 和血通肝三兩 香附 開鬱行氣使火散經絡四兩 二味共為末

寸金散 治鼻衄不止

土馬踪 即墻頭舊草 甘草 各二錢 黃藥 半兩

證治大還 醫學近編 諸血 四 貞白堂 卷之十七

右為末每服二錢新汲水下不止再服

又方 以井水濕紙搭頂上

治衄血不止用緋繩隨左右衄扎中指齊衄俱扎

天衄不止刺少商出血良

胃雨着湯氣所薰或入浴室致衄者及吐者攻清道

則衄攻濁道則吐用腎着湯加川芎妙最止浴室

中衄腎着湯 見濕門

傷寒熱極而衄為欲愈以熱隨血去矣不可遽止升

麻葛根湯仲景日以桂枝湯治衄非治衄也欲散

其藥中熱也

有負重為物所壓或持重遠行忽心口痛口鼻出血

俗名傷力乃內膜及肺胃係傷損擇破也世人藥

用涼藥愈止愈出卒至胃損咳嗽而死良可嘆息

考古方中急宜人參未飛羅麴童便調下最佳或

以白芨末童便調下亦可但不可用涼藥爾褚澄

曰飲涼藥則百不一生服溺溲則百不一死信哉

吐血 屬陽明胃與厥陰肝

初起脈洪大用犀角地黃湯調鬱金黑梔子灰或荆

證治大還 醫學近編 諸血 五 貞白堂 卷之十七

芥穗灰不已三黃補血湯 此湯加五苓散

吐血心口脹懣口中血腥氣用韭汁童便薑汁藕汁

沖飲其血自清勢微者四物用生地加炒梔茅根

汁童便竹瀝

勢盛脈大吐用十灰散遏之次用花蕊石散消之

後用清血藥鬱金丹皮赤芍之類加降火

凡吐血胸中覺氣塞滯吐紫者桃仁承氣湯下之以

膈有瘀也

又方童便二分酒一分搗剉柏葉溫飲之胃弱者除

吐血

吐血有因怒而得者。經曰怒則氣逆。甚則嘔血。宜平

肝降火炒梔子青皮芩連柴胡

一切上焦血症。余以四生丸易為五生飲。大獲奇驗。

用生韭生藕或用鮮荷葉京墨側柏生地各取汁

一盃對童便其生地側柏研爛以童便和方得汁

一方髮灰三錢白湯化阿膠二錢入童便生藕汁刺

薊汁生地汁各一盃好墨汁數匙頓溫服

色白人好色或過勞氣虛不能攝血用人參一味為

證治大還

醫學近編 卷之十七

諸血

六

貞白堂

末雞子清投新汲水調下一錢服之。

諸失血後倦怠昏憤面失色懶于言動濃煎獨參湯

所謂血脫補氣也最妙

大凡吐血須審病因不可遽投涼藥如用力打撲喊

叫內傷經絡口鼻出血是肺胃上脫有損破必以

白芨或飛羅麵米飲調先填注損處次用大補氣

血兼消瘀若悞治必不救

消瘀用韭汁桃仁赤芍芍歸牡丹皮紫金藤大黃滑

石紅花煎湯調降香末白芨末服

傷酒吐後有血是酒毒如胸間作痛是嘔破胃管重
便調白芨末脈數急心不痛只作火治

內損吐血下血或飲酒太過勞傷于內其血妄行出

如湧泉口鼻皆流須臾不收即死用側柏葉蒸焙

兩半荆芥穗燒灰人參各一兩為末加飛羅麵一

錢新汲水調如稀糊不拘時服

千金方云吐血有三有內衄有肺疽有傷胃內衄者

出血如鼻衄但不從鼻孔出是近從心肺間津液

出流入胃中如豆羹汁或如切蠟血凝停胃中因

證治大還

醫學近編 卷之十七

諸血

七

貞白堂

積滿悶偏吐或去數斗或至一石者是也宜清涼

得之於勞倦飲食過常也

肺疽者或飲酒之後酒毒滿悶吐之時血從吐出或

一合半升一升是也宜解毒涼胃

傷胃者因飲食太過涼寒停滯不能消化便煩悶強

吐所傷之物與氣衝上臍破胃脘吐血鮮色小腹

中絞痛自汗出脈沉伏者可治緊數多死急以理

中湯散寒邪和陰陽此則寒為主而血為輕先從

急者理中陽主之理治中院分利陰陽

吐血屬寒者果身受寒氣口受冷物邪入血分血得冷而凝不歸經絡而妄行其血必黑黯面色必白天其脉必微遲其身必清冷不用姜桂而用涼血之劑殆矣。

吐血勢不可遏胸中氣塞上吐紫黑血此瘀血內熱盛也桃仁承氣湯加減下之打撲內損有瘀血者必用見傷寒門

吐血衄血下血雖去多以從胃與大腸肝來也是經氣血俱多身涼脉微不妨咳血咯血最是惡症其

證治大還

醫學近編 卷之十七

諸血

八

貞白堂

初甚微漸至不救以從心肺來也

暴吐紫血或塊脉洪大者屬血熱用生地四物亦解毒牡丹皮調之不止加熟大黃

脉洪實有力精神不倦或覺胸中滿痛或血是紫血血塊者用生地赤芍當歸牡丹皮荊芥阿膠滑石大黃玄明粉桃仁泥之屬從大便秘導之此釜底抽薪法也今人不知徒事苓連梔柏輔四物使氣血兩傷脾胃俱敗百不一生悲哉

大吐不止諸藥不效用乾薑炒黑為末重便調服此

從治之治也

吐血一方用好墨為末以白湯化阿膠清調稀稠得所頓服熱多者尤宜

諸失血脉微弱昏憤氣息厥厥欲絕濃煎獨參湯徐投之每每回生非他藥可比者

血既從大便去後用薏苡仁多用百合麥冬鮮地骨皮嗽湯加枇杷葉五味子桑根白皮有痰加貝母皆氣薄味淡西方兌金之藥因其衰而減之自不再發于虛症尤宜

證治大還

醫學近編 卷之十七

諸血

九

貞白堂

氣虛不能攝血吐血不止身涼脉微弱丹溪法用人參一味為末雞子清投新汲水調下一錢服效一法四君子加芎歸

先惡心血雜痰出嘔多至升許者為嘔血有怒而得者有過飲得者鬱悒人久之氣血凝滯中焦運化失常亦作嘔痰帶血出宜分治之因怒者肝脉必旺或兩手俱弦數宜平肝降火黃連炒梔子青皮香附柴胡甘草歸芍甚者龍香丸或用赤茯苓心湯乃實者瀉其子也

過飲酒脉必弦細而滑右寸口脉必洪滑或斃解酒
毒降火和中二陳加芩連山梔牡丹皮選用。

鬱結脉必沉結或弦數宜舒鬱越鞠去蒼朮加牡丹
皮赤芍歸尾主之或加荊芥汁亦妙。

嘔血脉大發熱喉中痛者屬氣虛此方主之

人參 黃芪 蜜炙 黃柏 荊芥 當歸 生地黃

又方 用荊芥童便磨鬱金飲之其血自清如無鬱

金以山茶花代之

因怒嘔血服梔子等平肝不應用瓜蒌子當歸生地

證治大還

醫學近編 諸血 十一 貞白堂
卷之十七 三〇七

桔梗通荊牡丹皮煎服。

脾統血肺主氣勞神多言脾肺致傷血妄行忌涼劑

必用補中益氣加減遇勞即發心肺受傷其血必

散補中益氣湯加麥冬五味山藥熟地茯神遠志

佳有多言神勞用此。

內虛挾熱吐血不止厚黃柏以蜜塗炙乾爲末麥門

冬煎湯調下二錢立止

思慮傷脾不能統攝心血因而妄行或吐或下歸脾

湯主之及治神不歸舍不眠方用參朮芪草酸棗

茯神龍眼木香少許薑棗煎服。

因醉飽低頭擲重損傷血從口鼻中湧出忌涼藥急

以百草霜研細三錢米飲調下衄不止以少許吹

鼻中紗不可殫即鄉間鍋底煤也一切皮肉破處

灸瘡血百法不應擦少許即止

血見黑即止藥末及汁百草霜炮薑諸灰是也。

咳血

咳血熱壅於肺者易治不過涼之而已損於肺者難

治漸以成勞也。

證治大還

醫學近編 諸血 十一 貞白堂
卷之十七 三〇七

因咳而出多從肺胃二經急早治久即成勞

血未止五汁飲最妙多飲童便爲上。

初起脉實宜酒芩黃連梔子生地牡丹皮歸芍橘紅

貝母花粉童便薑汁茅根之類清之或加犀角亦

可多用舟楫之劑。

瘦人有此脉細數多成勞宜二母二門紫苑花粉四

物用生地牡丹皮竹瀝童便薑汁選用

勞傷肺經咳嗽有血雞蘇散最驗功在阿膠炒蒲黃

勞嗽服阿膠不止無藥用矣詳見咳嗽門

一方服藥血不止。是肺上有竅也。用白芨末猪肺煮熟。蘸食。日三四次。妙不可言。余常治回回人用牛羊肺。殊驗。喉有竅。則咳血殺人。薏米為末。蘸食亦可。

試血法 吐在水碗內。浮者肺血也。沉者肝血也。半浮半沉者。心血也。各隨所見。以羊肺羊肝。羊心煮熟。蘸白芨末。日日食之。

肥盛或酒客。羶痰中有血。滾痰丸佳。方見痰門

咳血痰盛身熱。多是血虛。用青黛瓜蒌仁。柯子貝母。

證治大還 醫學近編 諸血 卷之十七 主 貞白堂

海石山樞為末。薑汁蜜丸。喻化。嗽多加杏仁。後用

八物調理。

痰涎中有血。不嗽。或時喉中吐出。古方謂出于脾。用

葛根黃芪黃連芍藥當歸甘草沉香末。主之。藕以

為必胃熱所致者多。其若四物用生地牡丹皮黃

連梔子花粉之類。加重便竹瀝為當。實者滾痰丸

肺家有熱。稍實者。白部膏妙。虛人清化膏。

咳血非靜養絕慾。不可與治。諸病皆然。此尤當慎者。

先咳嗽。後見紅。多是積熱。痰盛清痰降火為急。先見

紅後痰盛。多是陰虛火逆。痰不下降。四物加滋陰化痰藥。

咳血胸間脹。是肺家火盛。諸藥不效。用生蘿蔔汁半

盞。入鹽少許。服之立效。如無蘿蔔。用子一錢。蘇葉

一錢。同煎服。次用雞蘇散加阿膠。

咳血胸中痛。腥臭異常。肺脉數而虛。是肺痿。見本門

丹溪七傷散中。有黃藥子白藥子。乳沒血竭等。亦是

清肺熱。活血行氣之意。或因負重勞傷。咳嗽痰血

大獲奇功。不可忽畧。

證治大還 醫學近編 諸血 卷之十七 主 貞白堂

七傷散 治勞嗽吐血痰。

黃藥子 白藥子 本草言治肺熱各兩半 知母 玄胡索 各

兩五錢 鬱金 二錢 當歸 五錢 山藥 乳香 沒藥

血竭 各二錢 赤芍 七錢 共為末。每服二錢。茶湯調下。

虛勞久嗽。咳血咯血。五倍子一味。為末。每服一錢。用

溫茶一大口。調勻。食遠米飲下。乃飲而降之法也。

花蕊散 見虛損門 十灰散 見虛損門 龍椅丸 見肺病門

赤茯苓心湯 見火損門 蒲中益氣湯 見內傷門

升麻葛根湯 見傷寒門 百部膏 以百部一味煎膏

花蕊石散

見虛損門

清化膏

見咳嗽門

諸失血過多體倦食少及血不止。扶正氣為急。人參一錢。黃芪二錢。五味子十三粒。芍藥。麥門冬。甘艸。歸身各五分。加鬱金末亦可。

唾血

平時津唾中有血為唾血。一屬腎虛有熱。一屬上焦實火。有餘則瀉。加減涼膈。加牡丹皮。藕節之類。不足則補。滋腎坎離。或以四物加鹽酒炒。梔子。黃柏。肉桂。一公許。瀉腎火。或加二門二母。

諸治入選

醫學近編 卷之十七

諸血

貞白堂

咯血

咯血不嗽而咳出血也。咯與唾少異。唾出于氣上無所阻。咯出于痰氣鬱于喉嚨之下。滯不得出。咯而乃出。求其所屬。唾咯同出于腎也。治咯血之方宜用童便。青黛以寫手足少陽三焦胆經之相火。而薑汁為佐。用四物地黃牛膝輩以補陰。安其血也。櫻寧生曰。咯血為病最重。且難治者。以肺手太陰之經氣多血少。又肺為金象。為清肅之藏。為火所燥。迫血上行。以為咯血。逆之甚矣。上氣見血下聞病。

音謂喘而見血且咳嗽也。

初起宜白扁豆散。去半夏。加貝母。入生地黃。藕節。尤佳。及磨京墨調黑神散各一錢。或生地洗滌搗汁。加薑汁少許。一法用生薑一片。蘸百草霜。薑淡再蘸。如薑無味。再易粉之。黑神散方見于後

勞嗽咯血。七珍散加阿膠。當歸各半錢。惡甜人更加百藥煎。仍調鍾乳粉。尤佳。一味鍾乳粉。糯米飲調。吐血嗽血俱佳。七珍散見虛損門

用力屈身傷肺。咯吐血者。白芨。枇杷丸。或白芨蓮鬚。諸治大選。醫學近編 卷之十七

諸血

五

貞白堂

散。方用白芨一兩。蓮花鬚。側柏葉。沙參各五錢。右為極細末。入藕汁地黃汁。磨墨令黑。調下一錢。喉中咯出小血塊。或血點。為咯血。亦分虛實。瘦人最忌。大法四物入童便。薑汁。青黛服之。或加牛膝膏。地黃膏尤妙。與咳血大同小異。

聖餅子。治咯血殊驗。用青黛一錢。杏仁四十粒。去皮尖。以黃蠟煎黃色。研細入青黛。捏作餅子。用時以柿一枚。破開。以餅置其中。合定濕紙煨。研飲。余常以二門冬生地煉膏。和貝母阿膠杏仁桔梗百藥

煎青黛末喻化治咳唾咯大有奇驗

上焦一切血症稍止即服六味地黃丸最不可緩庶

絕病根有血症者終身不可脫妙在澤瀉茯苓淺

見者謂瀉腎殊可恨詳見本方下

丹溪方 用白芨一兩藕節半兩共為末每服一錢

白湯調下神効

白芨治上焦諸血大獲奇驗昔人謂芨下咽至血竅

則竅為芨末與而血止非欺我也有驗即有此理

詳見本草綱目白芨下一法取末加二錢于粥

證治大還 醫學近編 諸血 卷之十七 貞白堂

中吃妙

荷葉一味為末米飲下咯血妙槐花炒為末糯米湯

化下亦可 青黛末入升麻中煨服白芨

舌衄

舌上無故出血不止名舌衄用槐花末搽上立止得

無心火自灼之故用麥冬煎湯調妙香散香薷汁

服一二碗佳髮灰二錢米醋調下更付出血處

妙香散 見顛癇門

文蛤散 治熱壅舌上出血如線五倍子白膠香壯

礪粉等分為末每用少許搽患處或燒熱鐵烙孔

上

齒衄

齒衄有二一則腎虛虛火泛上服涼藥不愈宜鹽湯

下安腎丸外用青鹽黑香附擦牙一則胃火崩落

口臭用清胃散甘露飲外用大黃米泔浸軟生地

黃二味旋切二片合定貼所患牙上一夜即止

腎虛血渴胃火血緊而痛亦用此法

胃明氣血俱多火旺則血如潮湧腎虛血出必點流

證治大還 醫學近編 諸血 卷之十七 貞白堂

而出齒亦隱隱而痛不如此之暴酒客多此惟大

黃酒煮者妙

白扁豆散 見內傷門

清胃散 見齒門 甘露飲 見齒門

齒縫中出血如注或如細線名齒衄世傳用銀簪脚

燒紅以尖脚于血孔中烙之即止後服清胃散加

熟大黃準繩法屢用去黑屎二三塊効一法用

鹽湯嗽立止又能益齒鹹走血之驗

丹溪方 齒衄出血夜以鹽厚傅斷上有涎漚盡乃

臥涎出時即齒勿動

千金方 用枯礬煎湯先拭齒乃含之。

齒搖動出血牙斷痛癢骨碎補二兩細挫炒黑杵末
依常鹽漱畢楷齒斷良久吐或嚥下。

耳中出血龍骨燒灰吹入即止

兩關弦數飲酒多怒人屬肝火柴胡清肝散見腸痛門

尺脉弱或躁屬陰虛六味地黃丸。

溺血

小便痛者為血淋不痛為溺血宜分新久虛實不可

倒用寒涼。

證治大還

醫學近編 卷之十七

諸血

太

自白

壯盛人關尺弦急或數屬肝火宜龍膽瀉肝湯加牡

丹皮等清血藥不已當歸龍薈丸俱見腸痛門

一法生料五苓散和四物湯若服藥不効素多色者

五苓和膠艾湯吞鹿茸丸或八味地黃丸或鹿角

膠丸或辰砂妙香散。

多慾之人腎陰虧損血隨溺出脉必洪數無力宜滋

陰四物加知母黃柏或加牛膝膏久血溺不止牛

膝一味煎湯代茶屢驗說見本草牛膝下

初起脉洪數有力屢下焦血熱山梔炒水煎服或加

小蘗琥珀實者入正散利之。亦有如砂石而色

紅却無石淋之痛亦屬虛症。入正散見淋門

髮灰散溺血絕妙方。用無病人髮肥皂水洗淨燒灰

每服二錢醋湯下或用茅根車前煎湯下尤妙

一方用側柏葉汁調糯米粉打糊和髮灰丸白湯

下或四物湯兼治肺疽心衄內崩吐血二口舌

上出血一切血症。

丹溪曰髮補陰甚捷本草曰髮灰能消瘀血通閉格

利水道破癰疽血衄平常溺血四物加牛膝山梔

證治大還

醫學近編 卷之十七

諸血

太

自白

或加黃連棕灰不應番而治之。

一方用生地小蘗滑石通草蒲黃淡竹葉藕節當歸

山梔甘艸水煎服効亦治血淋。

有氣虛不能攝血玉屑膏最妙并治沙淋痛不可忍

者用黃芪人參等分為末用蘿蔔大者切一指厚

三指大四五片蜜醃少時蘸蜜炙乾再蘸盡蜜二

兩為度勿令乾焦至熟蘸黃芪人參末吃不以時

仍以鹽湯送下。宜虛火宜補宜緩之意歟。

澀可去脫日久不止龍骨火煨為末水調方寸七

汚血結于胸中。溺多紫黑。以鬱金搗爲末。葱白一握。相和水煎服二三次。

老年有此。多是陰虛。亦有過服助陽藥而致者。多致不救。遵生者。當知此苦。

一法用車前草汁。藕汁。小薊汁。調炒黑蒲黃末。空心服。

丹溪冬用散。治溺血下血。亦有至理。用夏枯草。燒

灰存性。研細。空心米飲。或涼水調。本草言此草活血行氣。有補養厥陰血氣之功。前陰屬厥陰。故也。

醫治大遺

醫學近編

諸血

下血

貞白堂

下血

脈法。腸澼下血。脈小留連者生。急疾且大。身熱者死。

下血。雖曰大腸積熱。亦當分虛實。不可純用寒涼藥。

必加辛散爲佐。久之不愈。宜理胃氣。兼升舉藥。酒

炒酒煮黃連之類。

下血色清而鮮者。爲腸風。屬胃與大腸積熱。條芩升

麻。牡丹皮。黃連。槐角。青黛。秦艽之類。凡下血必加

地榆爲使。在上防風。在中黃連。在下地榆。乃治血

三使也。

二說。酒毒厚味動血。連蒲散吞黃連阿膠丸。及香蓮丸。或一味黃連煎湯。二九方金

腸澼下血。其血另作一派。瀉出。有力而遠射。四散如

篩。腹中大痛。乃陽明熱毒所作也。升陽除濕湯主

之。見泄瀉門

血見愁草。搗汁。加薑汁少許。側柏葉汁。頓溫服。妙。暑

毒入腸胃下血者。黃連一味煎湯妙。

熱而濁者。爲臟毒。脈實便秘。勢盛者。黃連解毒湯。加

熟大黃。輕者解毒涼血。見傷寒門

醫治大遺

醫學近編

諸血

下血

貞白堂

濕毒下血。脈必洪濡。四肢沉重。大便滑瀉。宜升麻二

陳。二朮。芩連。或加風藥。以風能勝濕也。此酒麪炙

酪厚味所釀之濕。非外感濕。

下血亦有寒者。或飲冷水漿瓜果血爲寒所凝而下

紫黑血。或鮮血。腹中必隱隱痛。用理中湯。及平胃

五苓散。不效。黑神散。或膠艾湯。加米湯煎。吞震靈

丸。黑神散用黑豆炒熟。地歸芍肉桂炮薑甘草蒲黃。共爲末。童便酒下二錢。

東垣升陽除濕和胃湯。治腸澼下血方。用四物去

川芎。加生地。牡丹皮。蒼朮。黃芪。升麻。秦艽。陳皮。生

炙甘草肉桂三分。臨時加減亦妙。

去血過多。以四物加黑乾薑升麻。

結陰便血。羅謙甫用平胃地榆湯。溫中散寒。除濕和

胃。外炙中脘。必飲冷酒中寒乃可用。以中有附子

也。方用炮附子。蒼朮升麻。蒼朮陳朴。乾薑葛根。歸芍。人參甘草。益智神麴。薑棗煎服。

仁齋直指曰。血遇熱則流通。故止血多涼劑。然亦有

氣虛挾寒。陰陽不相為守。勞氣虛散。血亦妄走。所

謂陽虛陰必散是耳。外症必有虛寒之狀。法當溫

中。使血自歸經絡。理中湯加南木香。或局方七氣

證治大還

醫學近編 諸血 卷之十七

重

貞白堂

湯加川芎。古方用炮薑亦是此義。脉微弱。或右

手虛大無力。此虛血兩虧也。補中益氣加減。日久

面黃神方。

肛門射如線者。重痔也。或肛內外作痛。俱是痔血。宜

從痔門。

一切下血痔血。臟連丸常服佳。槐角丸亦妙。血虛者

或加四物槐角于臟連丸內。妙甚。

打撲內損惡血入腸胃。下出濁物。如瘀血者。不可用

涼藥。且黑神散加老黃茄為末酒服。

諸下血。銀杏四十九箇搗爛。加白藥煎丸。彈子大。每

空心細嚼。兩三丸米飲下。

下血服涼藥不止。必中氣虛。不能攝血。非補中升陽

不愈。切忌寒涼。

血症。不斷酒色厚味。縱止必發。終成痼疾。

虞氏曰。精氣血氣。皆生于穀氣。大便下血。多以胃藥

收功。徒用苦寒。而不理脾胃。治標不治本。是絕氣

危生之下工矣。

諸灰能止血。百藥煎燒灰存性。研細飯丸。每三四十

醫學近編 諸血 卷之十七

重

貞白堂

九。或以米湯調末。服二三錢亦妙。

三農治下血。先用敗毒散。解散腸胃風邪。大抵因濕

熱酒麵厚味者多。風能勝濕。久之必固腸胃。補養

升舉。敗毒散見 瘟症門

烏梅丸

烏梅三兩。燒灰存性為末。醋糊為丸。梧子大。每服

七十丸。空心米飲下。

腸癖者。水穀與血。另作一派。如泔桶出也。夏月濕熱

太甚。客氣盛而主氣弱。故腸癖甚也。以涼血地黃

湯主黃柏知母炒一錢青皮炒槐花炒當歸熟地各五分水一盞煎七分溫服如二便前後重調木香檳榔末各五分空心服仍後重者須下

香梅丸

烏梅連核燒存性皆白芷生百藥煎燒存性右等分爲末麵糊丸米湯下三五十丸

一方

五倍子爲末鹽梅搗膏爲丸空心下三五十丸此皆酸以收之之意

第大還

醫學近編 卷之十七

諸血

毒

貞白堂

拈曰側柏加礬煮棕間下火燒大黃煨半熟枳殼炒須焦黑墨槐花末黃連酒共調腸風金下血痔漏

一齊消

依法修治淡酒調成膏置舌上仍以酒送下乃治標妙方屢驗者

大下不止一來升碗煮猪肚一枚男雄女雌洗淨入荊芥四兩當歸一兩黃連一兩紅花五錢地榆三錢皮硝一錢共爲細末入肚中兩頭扎定勿使水進用水淹過肚二三指以盆覆定勿令泄氣斂極

燭取起去藥淨肚就以原汁下二三仙肚全愈下血勢盛脉洪數有力或酒客膏粱家尋常藥不應黃連貫衆大黃烏梅肉各一兩炙甘草七錢枳殼荊芥各一兩共末每服二錢溫米飲下

夏月伏暑絕下鮮血黃連香薷飲主之

風熱入大腸下血不止脉浮有表熱者敗毒散散之有風濕乘虛入于腸胃或下瘀血者胃風湯加枳殼

荊芥槐花煎服

第治大還

醫學近編 卷之十七

諸血

毒

貞白堂

藥前者名近血出自大腸四物加檳榔槐花枳實條芩之類以瀉大腸糞後來者名遠血出自小腸四物加水通黃連以瀉小腸

槐皮散 治下血及血痢已經下後不止此藥能除

根

槐根白皮二兩槐角仁四兩枯白礬二兩甘草炙

右爲細末每服三錢清米飲調下

閩廣嶺南多蠱毒中之者下血如鷄肝或臟腑俱壞惟心未傷用馬蘭根末水服方寸七隨吐毒極神用法用白蠟荷蜜置病人席下勿令知病者自呼蠱

者姓名愈

百一方蠱毒下血如爛肝取蚯蚓十四條以苦酒漬之炒死但服其汁自愈

思傷心脾不能攝血歸源或下血或出汗或發熱或惡寒歸脾湯加減

丹溪方厥毒下血車前草連根一握生薑一小塊新磁研碎去渣候血欲下時腰間必覺重便服此一

盞少坐漸覺冷下腹中登側已不見血矣

正傳一方大小便血用簞竹葉燒灰存性米糊丸桐

葉治大遺

醫學近編 諸血

妄

貞白堂

子大每服七八十丸空心米飲下

臟毒腹中微痛濁血兼花紅膿肛門腫脹或肛突出

大便難先用板毒疎利之劑追出惡膿血後乃涼

血內托祛風虛人兼芩朮參苓助養胃氣詳見心

法

九竅出血南天竺飲主之或用血餘灰自已髮為佳

無卽用父子一氣者次則亂髮次則頭胎男髮肥

皂水洗淨燒灰二錢以茅根車前草或搗汁下或

煎湯亦可

病人汗出 血汗因大喜傷心喜則氣散血隨

氣上婦人產後多此治以葶草汁

葶草不拘多少俗名葛勒蔓是蔓生葉似草麻而

小薄有細刺花黃白子如麻子

右一味搗汁加醋空心服一盞或煮濃汁服

酒煮黃連丸

黃連去鬚毛好酒醃過二指砂礪內煮酒乾為

度曬乾為細末桐子大糊丸每服三十丸空心下

犀角地黃湯

醫治大遺

醫學近編 諸血

妄

貞白堂

犀角磨生地 白芍 牡丹皮各等分 水煎服

血從毛孔出各曰肥皯人中白不拘多少尾上用火

逼乾研令極細每服二錢入麝少許溫酒下外以

髮灰過之末効鬱金末水調鷺羽掃之卽愈

三黃補血湯血見多及初見面宜用

黃芪錢半生地二錢熟地 柴胡 川芎各錢半

芍藥三錢牡丹皮 升麻各五分 白水煎血不止

加桃仁半錢大黃斟酌加減去柴胡升麻

雞蘇散

鷄蘇薄荷 蘇州者 黃芪 生地 阿膠 貝母

白茅根 各一錢 桔梗 蒲黃 炒黑 麥冬 甘草 各半錢

細切水煎

槐角丸 治下血痔血

槐角 二兩 地榆 黃芩 當歸 防風 枳殼

共爲末糊丸桐子大每服五十丸空心下

飲酒人下血日二三大四物加條芩防風荆芥白芷

槐花升麻不應加橡斗灰二三錢煎成藥中調服

佳

醫治大還

醫學近編 卷之十七

諸血

元

貞白堂

臍連丸 用宣州肥大黃連不拘多少去毛洗淨爲

末篩過如麵以雄猪大腸一段將末入腸中塞滿

兩頭扎定入鍋內蒸爛取出入木杓內杵爲丸桐

子大早晚每服三十丸白湯下能滌腸胃火毒

九竅出血皆可用墻頭苔蘚可以塞車前草汁可以

滴火燒連房用水調鍋底黑煤可以喫石榴花片

可以塞生萊菔汁可以滴火燒龍骨可以吹

胃風湯 治風濕入于腸胃下血不止色清是風如

豆汁者是濕酌量用之

人參 白朮 炒 茯苓 川芎 當歸 酒炒 白芍 炒

桂各等分 水煎服

失血後大熱大渴發熱症似白虎惟脈虛大不長實

爲異耳候用涼劑必死當歸補血湯主之方用

黃芪一兩當歸二錢

世傳經驗方 下血用乳香沒藥血竭兒茶各一錢

巴豆霜五分九菴豆大空心酒下神妙不可言

丹溪曰下血久不止涼藥不應當用溫劑面色痿黃

肌瘦濟生方剪紅丸藥用側柏鹿茸附子續斷黃

醫治大還

醫學近編 卷之十七

諸血

元

貞白堂

芪阿膠白朮當歸醋糊丸米飲下不若補中益氣

湯加減妙

大凡病後咳嗽吐血脈大而亂屬上焦陽絡傷下血

弱血爲陰絡傷俱危

丹溪曰一切血症皆是陽盛陰虛君相二火亢盛煎

迫其血而出諸竅悉以四物湯爲主看出自何經

以本經瀉火引經藥佐之今詳其藥品川芎血中

氣藥也通肝經味辛注散能行血滯于氣使歸于

肝地黃血中血藥也通腎經味甘性寒能生真陰

血症用生者是。當歸分三治。身頭補。尾破。全和。血中主也。能使氣血各有所歸。味辛性溫。考藥陰分主藥也。通肝脾。味酸性寒。能和血飲血。皆純陰之藥。陰血不足。而陽火旺者。必取則于此。

貞子曰。四物體瘦多火者宜之。若脾胃食少體倦。一切失血後。須大補脾胃。當遵長沙血脫補氣之法。多用人參為主。或補中益氣湯。增損陽旺則能生陰。氣旺則能生血。乃至妙大經大法。昧者毋得妄議。若不熟讀本草綱目。而泥於言肺熱傷肺之說。

聖治大還

醫學近編 卷之十七

諸血

手

貞白堂

定候人矣。若四物者。獨能主血分受傷。為氣不虛者立也。輔佐之屬。若桃仁紅花蘇木血竭牡丹皮。血滯所宜。蒲黃阿膠地榆百草霜棕灰。為血妄崩所宜。乳沒玄胡靈脂凌霄花。為血痛所宜。乳沒玄胡靈脂凌霄花。為血痛所宜。牛膝枸杞菴蓉瑣陽敗龜板。為血虛所宜。乳酪血液之物。血燥所宜。乾薑桂枝桂肉。血寒所宜。生地苦參。血熱所宜。此特取其正治大畧耳。若觸類而長之。則應變無窮矣。牡丹皮茅根藕節側柏。俱能清血分中火。血藥須

之。

韭汁鬱金梔子。能清上焦之血。

血見黑即止。水能制火也。古法用棕閭烏梅香附髮等燒灰。皆本此。

血不歸元。責之胃寒。涼藥屢用不效。甘草炙炮乾薑等分。每服三錢。引血歸元妙。

失血者。必先以快藥下之。或問失血復虛。何以當。曰。血既妄行。迷失故道。不去蓄。利瘀。則以妄為常。易以禦之。

聖治大還

醫學近編 卷之十七

諸血

手

貞白堂

諸失血及崩產後發熱潮熱咳嗽脉數。乃是元氣虛弱。假熱之脉。即東垣所謂內傷。右寸關大而無力。為虛火乘元氣之脉是也。須主以人參。然血必由于脾胃先損而患。故脉大而洪。但察其中有胃氣。受補可救。設用寒涼之藥。復傷脾胃生氣。使血反不歸源。去死不遠矣。諸失血後渴者。為血竭。十全大補或黃芪人參五味地黃麥冬葛根枇杷葉。量胃氣虛實用之。胸前有一孔。常出血水。名曰心漏。用嫩鹿茸去毛酥

炙附子炮去皮尖鹽花共末斑肉丸每服三十九
空心酒下兼治腎虛腰痛

五竅出血不止用水嚥其面使驚而神收血止

一童子年十四歲發熱吐血余謂宜補中氣以滋化
源不信謂童子未室何腎得虛因述丹溪云腎主

閉藏肝主疎泄二臟俱有相火而其係上屬于心

心為君火為物所感則易于動心動則相火翕然

而隨雖不交會其精亦暗耗矣又精血篇云男子

精未通而御女以通其精則五體有不滿之處異

證治大遠 醫學近編 諸血 主 貞白堂
卷之十七

日有難狀之疾與補中益氣湯及六味丸而愈

男子咳嗽吐血熱渴痰盛盜汗遺精用地黃丸料

加麥冬五味子治之而愈後因勞怒吐血紫血塊先

與花膠石散及獨參湯漸愈每勞則咳血脾肺腎

三脉俱虛大洪數投補中益氣湯及六味丸全愈

陳氏醫學近編 卷之十八

雲間陳 治三農甫述 男

栻璣先 校
師柴羔愚

毘陵鄒言正仲衡甫叅

門人 范 崧壽民 閱
王 顯贊皇

飲證

弦微沈滑者飲偏弦者飲浮而細滑者傷飲沈弦者

懸飲弦數寒飲經曰色鮮明者有留飲色澤者病

溢飲飲有六痰飲懸飲溢飲支飲留飲伏飲者因

證治大遠 醫學近編 飲 主 貞白堂
卷之十八

病之形狀以命名也總曰痰飲者以水飲停久則

氣道閉塞津液鬱滯必變而成痰是飲乃痰之漸

也 其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲為痰飲

當以溫藥和之宜消飲也本加澤瀉 水飲流注

脇下令脇間懸痛咳吐引疼為懸飲宜十棗湯本

下之 暴渴多飲水流四肢當汗出而不汗水氣

溢於皮膚腸胃之外身腫重痛為溢飲宜大青龍

湯 麻黃桂枝杏 汗之 水飲停積於胸膈之間支

乘於心令人咳逆倚息短氣不得臥其形如腫為

支飲宜金沸艸散又當隨症汗下若飲在心下

人眩冒者澤瀉湯門本分消之若飲在胸腹令人腹

滿者厚朴大黃湯門本下之其人背寒如手大短

氣而渴四肢歷節痛脇下痛引缺盆咳嗽則轉甚

此心胸有留飲也控涎丹門本痰門半夏甘遂湯門本其

人膈滿嘔吐喘咳寒熱腰疼背痛淚出振振惡寒

身瞤動此胃中有伏飲也輕則消飲尤甚則開結

枳實丸門本心下有痰飲胸滿目眩苓桂朮甘湯

本嘔吐惡心頭眩心悸或惡風不快或為寒熱此

證治大還

醫學近編

二

真白堂

痰飲也二陳湯加前胡旋覆花嘔吐心下痛眩

悸者胸膈間有飲也半夏加茯苓湯門本嘔家本

渴今反不渴心下有支飲也小半夏湯門上病人

一臂不遂時復移一臂非風也屬飲在上焦也虛

則茯苓丸不虛控涎丹

按飲在心則心下堅築短氣入肺則喘咳吐沫入

脾則少氣身重入肝則脇下支滿噎痛入腎則心

悸為湧水入大腸則泄在太陽為支飲在左脇同

肥氣在右脇同息奔在上則面浮在下則腑腫在

中則支滿痞隔在陽不去久則化氣在陰不去久

則成形治法在表者汗之在裡者下之在胸膈者

吐之畱者攻之濕者分利之虛弱者燥脾土以運

化之寒熱溫涼各因其屬此善於治飲者

醫按

一貴婦患溢飲遍身虛腫用金沸艸散一劑汗出腫

減繼以澤瀉湯加枳實旋覆花前胡四劑安

一婦時疫飲水過多胸膈堅痞欬逆倚息短氣不臥

湯飲入而吐出諸藥罔効作停飲治以五苓散一

證治大還

醫學近編

三

真白堂

劑愈

一婦患霍亂飲陰陽水左腹堅硬痛極作畱飲治以

半夏旋覆花各三錢澤瀉枳實青皮白朮乾薑各

一錢吳茱萸二分一劑愈

小青龍湯仲景治溢飲用此發汗

麻黃 桂枝 細辛 乾薑 附子 半夏

芍藥 五味子 甘艸

金沸艸散無擇治支飲欬逆倚息短氣不得臥其

形如腫用此取汗

<p>麻黃 細辛 荊芥 前胡 半夏 赤芍</p>	<p>茯苓 甘艸 金沸艸</p>	<p>十棗湯 <small>仲景</small> 治懸飲用此攻下</p>	<p>芫花 大戟 甘遂 <small>等分</small> 大棗十枚水一鍾煎取汁調藥末五分平旦服</p>	<p>半夏甘遂湯 <small>仲景</small> 治兩飲雖自利心下續堅滿</p>	<p>半夏 <small>三錢</small> 甘遂 <small>四分</small> 芍藥 <small>二錢</small> 水一鍾煎沸入蜜再煎至七分服</p>	<p>厚朴大黃湯 <small>仲景</small> 治支飲胸滿用此攻下</p>	<p>證治大還 <small>醫學近編 飲證 四 貞白堂</small></p>	<p>厚朴 大黃 枳實</p>	<p>澤瀉湯 <small>仲景</small> 治支飲在心下令人眩冒嘔吐心悸用此分利</p>	<p>澤瀉 <small>五錢</small> 白朮 <small>二錢五分</small> 蒼朮 半夏 茯苓 <small>各一錢</small></p>	<p>生薑 <small>五片</small></p>	<p>葶藶大棗湯 <small>仲景</small> 治支飲不得息大腹喘促不定</p>	<p>宜瀉肺</p>	<p>葶藶 <small>炒黃色搗丸如彈子大</small> 大棗 <small>二十枚</small> 水一碗煮棗至一碗納葶藶煮八分服</p>
--------------------------	------------------	--------------------------------------	--	--	---	--	--	-----------------	---	--	-----------------------------	---	------------	--

<p>苓桂朮甘湯 <small>仲景</small> 治痰飲在心下令人胸脇支滿目眩</p>	<p>茯苓 <small>四錢</small> 桂枝 <small>三錢</small> 白朮 <small>三錢</small> 甘艸 <small>二錢</small></p>	<p>大半夏湯 <small>仲景</small> 治卒嘔吐膈間有水心下痞悶</p>	<p>半夏 <small>一兩</small> 生薑 <small>一兩</small> 茯苓 <small>五錢</small></p>	<p>半夏加茯苓湯 <small>即小半夏湯</small> 治心下支飲嘔吐不渴</p>	<p>半夏 <small>一兩</small> 生薑 <small>各一兩</small></p>	<p>防己湯 治膈間支飲其人喘滿心下堅痞面色黧黑其脉沈緊得之數十日醫吐下之不能愈</p>	<p>證治大還 <small>醫學近編 飲證 五 貞白堂</small></p>	<p>防己 <small>人參各三錢</small> 石羔 <small>八錢</small> 桂枝 <small>二錢</small> 虛者即</p>	<p>愈實者三日後復發復與服不愈者去石羔加茯苓芒硝</p>	<p>枳朮湯 治心中堅大如盤水飲所作</p>	<p>枳實 <small>五錢</small> 白朮 <small>二兩</small> 水五升煮三升分溫服</p>	<p>茱萸飲 <small>秘方</small> 治溢飲遍身浮腫醫用滲泄發汗之藥不能愈因腎氣弱不能決瀆宜此湯補腎以運動之</p>	<p>肉苁蓉 山茱萸 白茯苓 車前子 防己</p>
---	--	--	---	--	---	--	--	--	-------------------------------	------------------------	--	--	---------------------------

葶藶 澤瀉 肉桂 沉香 沒藥

蠲飲枳實丸 東垣 逐痰飲導積滯

枳實 半夏 橘紅 各二兩 牽牛 三兩 麴糊為丸 姜湯下

開結枳實丸 東垣 消導滯氣消化痰飲通行三焦

調暢百脉

枳實 白朮 半夏 南星 枯礬 葶藶 炒

大黃 青皮各五錢 木香 三錢 牽牛 皂莢 酥炙去皮各

一兩 薑汁糊丸

消飲丸 東垣 治停飲胸滿嘔逆腹中水聲不思飲食

證治大還 醫學近編 卷之十八 六 貞白堂

白朮 二兩 茯苓 枳實 炒 乾姜 各七錢 蜜為丸

丁香半夏丸 東垣 治心下停飲飲寒痰

檳榔 丁香 細辛 乾薑 半夏 旋覆花

人參 薑汁糊丸

腎氣丸 仲景 治積飲傷脾而目身體浮腫氣

虛有飲宜補而逐之

白茯苓 三兩 熟地黃 四兩 山茱萸 牡丹皮 山

藥 澤瀉 車前子 肉桂 各一兩 附子 五錢

蜜丸梧子大每服七八十九

破飲丸 機要 治五飲停蓄結為癥癖支滿胸脇痞

心疼痛

華撥 丁香 胡椒 砂仁 青皮 烏梅 巴

豆 木香 蜣螂 等分 以青皮同巴豆漿水浸

一宿漉出同炒去巴豆將所浸青皮漿水浸烏梅

肉炊一熟飯細研為膏丸如梧子大每薑湯下

五七丸

飲症効方

半夏 四兩 姜汁 明凡浸透 廣陳皮 四兩 白茯苓 四兩

證治大還 醫學近編 卷之十八 七 貞白堂

猪苓 二兩 澤瀉 米泔浸炒二兩 旋覆花 三兩 厚朴 一兩半

白朮 土炒二兩 枳實 炒一兩 人參 一兩 酒濕者加川連

一兩木香五錢 寒濕者加蒼朮二兩木香五錢

白豆蔻五錢 因鬱者加紫蘇四兩去蒼朮

喘證

寸口緊促者喘逆右寸沉實而緊者風寒六部俱沉

伏者宜發散右寸沉實為實左尺大為虛喘逆上

氣脉數身熱不得臥者難治上氣而浮冒息脉浮

大者危上氣喘息低昂者死手足溫者生脉滿手

足寒者死

肺主氣其用呼吸其體清虛若調養失宜為風寒暑濕痰火水氣所乘或脾胃氣虛金失所養或陰虛血虛火氣上逆則肺氣脹滿氣道不利所以作喘治者必究所因更詳虛實用藥苟實實虛虛生反掌間矣

經曰火氣逆上上滿胸中憤膈肩息喘渴坐伏餒不得息取手太陽經天容咳逆上氣窮訕胸痛取

任脉泉廉由是觀之則喘逆上氣又不獨在肺經

證治大還

醫學近編 喘證 八 貞白堂

矣按仲景云太陽症脉浮無汗而喘麻黃湯

仁 陽明腹滿汗出喘而潮熱承氣湯

惡寒發熱表邪未解喘促汗出葛根黃芩湯

汗出而喘麻黃杏仁甘肅石羔湯 感寒伏熱而

喘九寶湯 氣鬱痰盛喘促四七湯

寒熱而喘棗膏丸 上氣喘促神授湯

盛下虛而喘黑錫丹 四肢逆冷脉

沈細胸脹冷汗大便頻數上氣喘促此虛極扶寒

八味丸

丹溪云實喘者氣實肺盛呼吸不利肺竅壅塞中氣

逆如嘔狀自汗右寸沈實宜桑皮葶藶杏仁麻黃

之類瀉之 虛喘者先覺呼吸短氣兩脇脹滿咽

乾無津少氣不足以息左尺大而虛宜人參阿膠

五味子之類補之 久喘未發以扶正氣為主已

發以攻邪為主 喘急甚者不可用苦寒藥以火

盛故也宜先溫劫之後因痰治痰因火治火 婁

全善云嘗治喘未發時用人參半夏丸已發時用

證治大還

醫學近編 喘證 九 貞白堂

沈香滾痰丸

證治要訣云風寒外鬱者脉沈緊而實喉鳴腹響鼻

流清涕宜九寶湯 痰喘者一喘便有痰聲時

時唾濁痰起坐不眠宜降氣化痰湯 或四磨湯

使氣降而痰自下風痰上逆而喘者千縉湯 熱

痰暴喘將死者大黃牽牛檳榔膩粉丸服 陰虛

火動其痰者補陰平肺飲 火炎上者乍進乍

退得食則減食已則喘降火清金湯 薛立

齋云右手脉洪滑肺經熱也瀉白湯 杏仁桔梗知

右寸關脉洪數遲緩脾熱傷肺也瀉白散

右關脉緩而滑面熱如醉

胃熱上冲也白虎湯加瓜蒌枳實黃芩右寸脉

洪數心火剋肺金也人參平肺散

五味左寸關脉洪數而弦者心肝二經有熱也

柴胡清肝飲

鎮陽光氣虛喘者呼吸少氣或短氣不足以息

或自汗而喘益氣養肺湯

喘者擡肩擗肚喘而不休調中益氣湯

證治大還

右寸關脉浮緩遲弱者脾肺氣虛也六君

子湯加黃芪桔梗右尺脉微弱者命門火衰而

脾肺虛也人參理中湯陰虛者其脉浮按之虛

澹或左尺數而無力或病人自覺火從臍下起逆

上喘不得臥補陰平肺飲

奔者四物倍人參五味子以收之蓋諸陽氣浮無

所依從故逆上喘急也或獨參湯尺脉微細手

足逆冷此下元虛寒腎氣不歸源也八味丸氣

虛命門火炎上而喘黑錫丹後以補中益氣湯

求神歸柴升姜棗小便不利者為害尤甚非八味丸不

能救水氣乘肺者喘不得臥臥則喘甚以臥則

水平得以上乘於肺肺得水而浮使氣不宜通也

神秘湯澤漆湯

症宜九寶湯

大腸也

綱目云凡下痰定喘諸方施之於形實有痰者效若

喘而不得臥其脉浮大按之虛澹者此為陰虛不

可下下之者死又喘正發時無痰愈後卻吐痰者

證治大還

乃痰於已發時閉塞而不出所以作喘當於發時

開其痰路則易安宜桔梗枳殼蘇葉前胡杏仁瓜

蒌開其痰俟喘定卻調其虛實

東垣云凡肺盛有餘令人喘逆煩心胸滿短氣皆冲

脉之火逆行胸中而作喘係在於下焦非屬上焦

也仲景云氣喘而躁者越脾湯加半夏

丹溪云咳喘遇冬則發此寒包熱也解表熱自除用

麻黃防風蘇葉杏仁枳桔片苓半夏甘州前胡

醫按

羅謙甫治一人形肥日飲酒及潼乳八月霖雨忽腹滿喘急聲聞舍外不得安臥大小便澀滯氣口大於人迎兩倍關脉沈緩有力此霖雨之濕飲食之熱濕熱盛而攻肺神氣躁亂故爲喘也邪氣盛則實實者宜下以白牽牛苦寒瀉氣分濕熱上攻爲喘故以爲君陳皮理肺氣枳殼泄肺中滯氣爲臣檳榔性沈重下氣降痰大黃苦寒治實滿爲使一服減半再服喘定止胸膈不利口乾煩熱時欲咳嗽以瀉白散加知母黃芩而愈

證治大還

醫學近編 喘證

主

貞白堂

卷之十八

丹溪治一人喘不得臥病主於肺以麻黃石膏各二錢黃芩一錢半桑皮柴胡各一錢甘草五分一汗而安

婁全善治一人平居則氣息如常行動則喘急氣促用滋腎丸知柏桂空腹服之喘即隨定由黃柏知母能瀉衝脉之火也

瀘東治一人九月間病發熱惡寒喘急脉洪大而似實衆作傷寒治勿效此火盛之脉非真實也止視其短氣不足以息即當作虛治以補中益氣湯加

麥門冬五味子熟附子三分六劑愈

綱目治一人素咳嗽忽一日大喘痰出如湧汗出如油脉浮而濇急用人參二錢五味子錢半煎服喘定汗止更加瓜蒌歸芍白朮黃芩而安

薛立齋治一人命門火虛不能生土用補中益氣湯其喘即止後復發治以前藥勿效用黑錫丹二服喘止仍用前藥而安

周仁齋治一孕婦痰喘用生半夏錢半肉桂乾薑各五分五味子三分麻黃二分先以水煎後下藥勿

證治大還

醫學近編 喘證

主

貞白堂

卷之十八

今太熟熱服其喘即止

三農治一人每勞或怒即喘急吐痰不臥衆以降火化痰理氣清肺之劑不效脉浮數而虛澀此陰虛火動其痰也用補陰平肺飲下咽喘即定而愈又治一人喘不得臥肺脉沈而濇此外寒遏內熱氣不得舒而然以麻黃桂枝各一錢黃芩木通各錢半陳皮一錢黃連乾薑甘草各五分服之愈

又一人體虛感寒發喘難臥以蒼白朮麻黃防風片苓各五分半夏枳殼各一錢桂枝木通甘草各三

分研杏仁七枚服之愈

千得湯 十介 治風痰上壅喘急不臥

南星 半夏 枳實 皂莢 甘艸 生薑

降氣化痰湯 統旨

蘇子 前胡 半夏 茯苓 橘紅 桑皮 瓜

薤仁 杏仁 皂莢 甘艸

定喘湯

白果 二十一枚去殼打碎炒 麻黃 欬冬花 各三錢 蘇子 二錢

桑皮 蜜炙 杏仁 黃芩 各錢半 半夏 三錢 甘艸 一錢

證治大還 醫學近編 喘證 卷之十八 貞白堂

水三鍾煎二鍾分二服

人參定喘湯 治肺氣上逆喘急有聲坐臥不安胸

膈緊痛

人參 麻黃 阿膠 蛤粉炒 半夏 麴 五味子 各一錢

甘艸 一錢 鷓鴣菜 蜜炙 桑皮 二錢 生薑

補陰平肺散 統旨 治陰虛火自濟下逆上作喘

黃柏 炒 知母 當歸 白芍 麥門冬 茯苓

五味子 山茱萸 瓜蒌仁 生地 地骨皮

丹皮 橘紅 桑皮 半夏

益氣養肺湯 統旨 治氣虛而喘

人參 黃芪 白朮 阿膠 麥門冬 五味子

茯苓 陳皮 半夏

神秘湯 三因 治水氣逆行乘肺臥則喘甚

桑皮 茯苓 橘紅 紫蘇 人參 木青

生薑

澤漆湯 治水氣乘肺不得臥

澤漆 二兩東流水三碗黃至二碗入下藥 半夏 紫參 白前

人參 黃芩 肉桂 甘艸 各三錢 生薑

證治大還 醫學近編 喘證 卷之十八 貞白堂

定喘丹 治稠痰壅盛體實肥而喘

半夏 二兩 杏仁 麴 瓜蒌仁 各一兩 甘艸 炙 黃芩 酒炒

各五錢 皂莢 去皮弦子燒灰三錢 蒸餅以淡薑湯化開為丸

每服一錢

痰嗽兼喘五味子白礬等分為末猪肺蒸熟蘸藥

食之白湯送下 肺熱氣喘茅根一握煎飲小

兒風痰壅不語氣促喘悶訶子半生半煨大腹皮

等分水煎服

哮喘證

哮喘以聲響名。喘以氣息言。哮則專主於痰。無痰不能作。哮因痰得。氣道氣息不利。故咽喉喘吼如水聲。甚則牽引胸背。肺脹胸滿。或惡寒肢冷。背曲身跢。坐臥不安也。病者夙有此根。因感風寒。或作勞氣。惱一時暴發。三五日方寧。治法專以祛痰為主。壯實者。先以瓜蒂散湧其痰涎。繼以治痰九。本奪命丹。削其痰積。因風寒鬱熱。喘哮脈浮緊者。先以九寶湯解其外邪。仍用涼膈散。
龜板。冬。薄荷。竹。葉。清。甘。州。大。黃。芒。硝。
其內熱。熱痰客於胸膈。喘哮。脈細數者。涼膈散加。
醫學近編 哮喘 卷之十八 朱 貞白堂

證治大還

醫學近編 哮喘 卷之十八

朱

貞白堂

前胡枳殼半夏瓜蒌桑皮杏仁。因風痰上逆喘哮者。五虎湯合千縉湯。喘門。因食積厚味者。蘿蔔子為君。加白礬皂莢甘遂神麴糊丸。因勞倦即發者。以攻邪為主。未發以補正為主。凡喘哮宜薄滋味。亦不可純用寒涼藥。必兼解散。大便秘結服定喘藥不效者。宜利導之。

醫按

丹溪治一男哮。十日一發。此疾在上焦。不得汗洩。正當十月。遂以麻黃黃芩各二錢。炙薑汁煎服。臨臥

逆小胃丹

聖濟治一人。便閉喉喘。喘不止。用粉艸二兩。去皮破開。以猪胆六七枚。取汁。浸三日。炙乾。為末。蜜丸。清茶下。三四十丸。漸愈。

王宇泰治一人。鹹哮。用白麵二錢。沙糖搜和。以糖餅灰汁。捏作餅子。放在爐內。烘熱。刻出。切作四塊。以輕粉四錢。另炒。摻在餅內。食之。吐痰而愈。

三農治一小兒。鹽哮。遇陰雨即發。聲如曳鋸。以白砒一錢。入精猪肉四兩內。以鹽泥固濟。火煨出清。

證治大還

醫學近編 哮喘 卷之十八

七

貞白堂

烟。取出研細。入江西淡豆豉一兩。搗和。為丸。如黍米大。白水。下二三十九。忌油膩葷腥。一月而愈。

九寶丹 局方 治寒包熱作喘哮

麻黃 杏仁 蘇葉 桑皮 前胡 半夏

陳皮 大腹皮 石膏

又寒包熱方

鹽蚕 一斤 生薑 一斤 搗汁 漸炒乾為度 為末 每服三錢 臨臥白滾湯下

定喘飲 秘方

蘇子 二錢 麻黃 欵花 桑皮 蜜炙 半夏 各三錢

杏仁 甘艸 各錢半 白果 二十一枚炒 水三鍾煎至二

鍾徐徐服

五虎湯 局方

麻黃 杏仁 石膏 細茶 甘艸

治痰丸 玉機

南星 半夏 滑石 江子 蛤粉 以皂莢浸

濃水爲丸

奪命丹 附餘

治肺受火邪氣從火化有升無降加

證治大還

醫學近編 卷之十 太 貞白堂

以脾濕生痰上湧而爲喘哮滿悶不得安臥宜此

丸却之病安之後卽用知母茯苓湯調補

南星 半夏 杏仁 各四錢 白附子 三錢 白礬 二錢

信石 一錢 非麝胎不可用信加枳實牙皂瓜麝

信同白礬石器中煅黃色爲度不可犯鉄同諸藥

爲末薑汁麪糊爲丸如黍米大硃砂爲衣新汲水

下七九小兒減半

治小兒鹹哮喘 用柿餅切開入白礬三分厚紙裝水

浸濕透慢火煨令礬化入柿餅外紙取出乘熱

食三枚一次

又治哮喘 榆白皮陰乾焙爲末每日曉以水一鍾

煎二錢如膠服 定麝用青皮半開者入巴豆一

粒鉄線縛之燒存性薑汁酒各半調服

治鹽哮喘 用蜥蜴燒灰摻豆腐上食之 鹽哮喘

木鱉子三四枚水磨飲隨以雪糕壓下卽吐痰涎

而愈 鹽哮喘喘柏樹皮去粗皮搗汁拌飛麵作

餅烘熟早晨食之吐下痰涎乃佳如不行以熱茶

催之飛療遍身暴腫

證治大還

醫學近編 卷之十八 丸 貞白堂

一人極言痰氣作楚喘急而不能食遍體作痛服

清氣化痰藥無異服水何也余曰豈止無益反受

害矣肥人氣居于表中氣必虛脾弱不能勝濕氣

虛不能健運是以多痰而喘以四君子加南星半

夏佐以薑汁數劑而愈

眩暈

丹溪曰眩言其黑暈言其轉林氏曰眩者玄也謂忽然眼見黑花昏亂少頃方定暈者運也謂頭目若坐舟車而旋轉運也

丹溪又曰此症屬痰者多蓋無痰不能作眩雖因于風亦必有痰痰在上火在下火炎上而動其痰則作眩也治宜二陳湯加黃芩蒼朮羌活挾氣虛者亦治痰為主兼補氣降火如東垣白朮半夏天麻湯之類傷濕者降濕湯加川芎左脉數熱多脉澀有死血右脉實有痰積脉大久病眩運不可當者以大黃酒炒為末茶湯調下甚效

證治大還

醫學近編 眩暈 卷之十八

頁白堂

原病式曰諸風掉眩皆屬肝木風主動故也所謂風氣甚而頭目眩暈者由金虛不能制木而復生火風火皆屬陽陽主動兩動相搏則為之旋轉也成無已曰傷寒頭暈與眩目者皆發汗吐下後所致由陽虛也

嚴用和曰眩暈之症經雖云皆屬于肝風上攻然體虛之人外感六淫內傷七情皆能眩暈當以脉症

別之風則脉浮有汗項強不仁寒則脉緊無汗筋攣掣痛暑則脉虛煩悶濕則脉沉重則吐逆及其七情所感遂使臟氣不平鬱而生涎結而為飲隨氣上逆令人眩暈眉稜骨痛眼不可開寸脉多沉此為異耳若疲勞過度下虛上實金匱吐衄便利及婦人崩傷產後去血過多皆令人眩暈當隨其因治之

證治大還

醫學近編 眩暈 卷之十八

頁白堂

劉宗厚曰眩暈一症人皆稱為上盛下虛所致而不明言其所以然之故所謂虛者血與氣也所謂實者痰涎風火也原病之由有氣虛者乃清氣不能上或多汗亡陽當升陽補氣有血虛者乃因亡血過多陽無所附當益陰補血此皆不足之症也有因痰涎鬱遏者宜導痰開鬱重則吐下有因風火所動者宜導痰開鬱重則吐下有因風火所動者宜清上降火又有外感而得者嚴氏雖分四氣之異皆當散邪為主此皆有餘之症也世所謂氣不歸元而用丹藥鎮墜沉香降氣之法蓋香竅散氣丹藥助火其不歸之氣豈能因此而復耶內經所

謂治病必求其本。氣之不歸，求其本而用藥，則善矣。

林氏曰：淫慾過度，腎家不能納氣歸元，使清氣逆奔而上。此眩暈出于氣虛也。吐衄崩漏，肝家不能收攝榮氣，使諸血失道妄行。此眩暈生于血虛也。氣虛者，宜益氣補腎湯；血虛者，宜補肝養榮湯。若專用濕熱鎮墜丹藥，多致飛越之亢，其害有不可勝言者矣。

二農曰：按劉林二公慎丹劑戒燥熱，俱為保金水二

證治大還

醫學近編 眩暈

三

貞白堂

臟真陰而言也。木之有餘，則挾火勢而侮肺金。金受火侮，津液枯涸，降令不行，生化之源絕矣。沉斲喪枯燥之腎，曷能為其母復仇耶？由是假藥餌以相濟也。既知其腎虛不能納氣歸元矣，寧復以燥熱傷其母可乎？都緣滯于溫補下元之說，不體認夫真陰真陽之虛實，以故相循習俗而為流弊也。凡物各有屬也。肺出氣，腎納氣。今氣不歸元，是腎之真陰不足。當益腎陰以全其職可也。腎雖屬陰臟，而用藥亦自有氣血之分焉。氣虛則用補骨脂

杜仲、熟地黃之類，如安腎丸之謂也。若血虛則以山藥、黃熟地黃之類，如六味地黃丸之謂也。

氣是無形者，至清，所以能走空竅而施精明。非有形之丹石所能鎮墜。二公辨之允矣。或曰：經云：形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。吾子以溫補為謬可乎？予曰：前人已註之矣。溫是溫存之溫，非專指溫煖之藥而言也。味是味之厚者，乃陰中之至陰。本乎天造，非偏厚出于人為之味也。是皆不以溫熱為補明矣。前症若果屬腎虛木旺火亢，金衰，則當從東方實，西方虛，瀉南方補北方之治，則其氣自平，而無偏倚之患也矣。

證治大還

醫學近編 眩暈

四

貞白堂

眩運悉屬痰火，但分虛實多少而治。肥人脈沉滑，屬濕痰，白朮半夏麻湯妙。瘦人脈弦數，乃陰虛相火上炎也，宜滋陰降火如兩手脈伏，面色痿黃憔悴，屬氣虛生涎，濁氣泛上其涎亦令頭眩，恆見於鬱悒之人及婦女輩，最宜舒

中年之人，大病初起，元氣未復，起則眩倒，脈必後弱。

或右手寸關大而無力宜補中益氣倍參芪加大麻有痰加二陳有火加炒黃柏

夏月頭眩偶冒暑勞形脉虛細煩悶口渴渴傷暑先以六一散後用大劑生脉散加黃柏

劉宗厚曰眩運上實下虛所致所謂下虛者血與氣也所謂上實者痰火泛上也急則治痰火緩則補元氣

脉弦實有力口煩渴壯盛之人頭眩者屬實痰實火或過飲恣口所致宜降火化痰酒芩梔子二陳枳

證治大選

醫學近編 眩暈 卷之十八

五

貞白堂

桔薄荷荆芩花粉出入不惡心加酒煮大黃三二錢妙

丹溪法眩運不可當者大黃酒煮二次為末茶調下每一錢至二錢

中宮濕痰盛壅塞清道因而頭眩脉必緩弱宜平胃滲濕

產後血暈悉屬虛清魂散加重便甚者獨參湯加重便一大盃薑汁三茶匙

正傳云人肥白而作眩運者治宜清痰降火為先而

兼神氣之藥人黑瘦而作眩運者治宜滋陰降火為要而帶抑肝之劑

風痰眩運頭痛惡心吐酸水半夏南星白附子生為末滴水丸桐子大以生麵為衣陰乾每服十九至二十九薑湯下

痰盛氣虛六君子加黃芪少佐炮附子煎成入竹瀝薑汁童便

如體瘦陰虛兼痰火盛者二陳四物加片芩薄荷入竹瀝薑汁童便

證治大選

醫學近編 眩暈 卷之十八

六

貞白堂

天麻荆穗乃消上焦風熱妙品非治本藥也因痰治痰因火治火或補氣或補血或滋陰要在變而通之

古方芎朮湯治冒雨中濕眩運嘔逆頭暈嘔逆不食等症殊效用川芎半夏白朮各一錢二分甘草六分薑七片煎服

亡血家作眩芎歸湯胸中有死血飲非汁酒良上焦風熱作眩脉浮數兼頭痛眼赤作寒熱者防風通聖散出入

諸失血崩漏。肝虛不能收攝榮氣而上逆。補肝養榮湯。方用四物加陳菊甘草煎服。

嚴氏玉液湯。治七情感動氣鬱生涎。隨氣上衝。頭目眩運。心忪怔忡。眉稜骨痛。用大半夏泡七次。去皮臍。薄切四錢。薑十片。煎入沉香。水磨一呷。服大効。兩手脈緩大無力。飲食減而微渴。大便三四日一行。亡血人。乃大虛証。參芪歸朮芍藥作大劑。濃煎。下連柏丸三十粒。連榮皆薑汁炒。冬加乾薑少許。更以薑汁煮糊丸。

證治大還

醫學近編 眩暈 七 頁白堂 卷之十八 三

冬月冒寒。鼓激痰涎。亦作眩運。宜從寒治。

一老婦白帶眩運。專治帶而安。

早起眩暈。須臾自定。乃胃中老痰使然。古方用黑錫丹劫之。藥用桂附沉硫黑錫蘆巴故紙茴香陽起金鈴木香。大辛大熱。恐劫不開。轉增病耳。不若礞石鎮墜之藥。徐徐取效。更慎口腹爲佳。

古方用鹿茸五錢。酒煎湯。加麝少許。治元陽虛眩運。必虛而無火者宜之。

嚴氏曰。外感六淫。內傷七情。皆能眩運。脈則脈浮有

汗。頭強不仁。消風散都梁九。青州白丸子。與此脈緊無汗。筋掣掣痛。不換金正氣散。加川芎白芍。

暑則脈虛大。自汗煩悶。十味香薷飲。濕則脈沈細。體重節痛。吐逆涎沫。腎着湯除濕濁。肝家風熱。用鈎藤散。七情相干。眩運欲倒。十四友丸。安腎丸。二藥夾和。七氣湯送下。仍間用乳香泡湯下。汗多亡陽。或中氣虛。大劑補中益氣加菊花。痰結胸中。眩運惡心。獨聖散吐之。或以鹽湯探吐。亦可吐定。用導痰藥。二便結滯。搜風順氣丸佳。

證治大還

醫學近編 眩暈 八 頁白堂 卷之十八 三

鈎藤散

鈎藤 陳皮 半夏 麥冬 茯苓 石膏

人參 甘菊 防風 各等分 甘草 減半 加薑煎服

有因虛致暈。雖暈定。面常欲近火。欲得暖。手按之。蓋頭爲諸陽之會。陽氣不足故耳。

診法 左手脈數熱多 脈澀有死血 右手脈實痰積 肝大是久病

大安腎丸 治腎經久積陰寒。膀胱虛冷。下元衰憊。耳重唇倦。腰腿腫疼。臍腹脹痛。兩脇刺痛。小腹堅

痛下部濕癢夜夢遺精恍惚多驚皮膚乾癢面無
光澤口淡無味不思飲食大便澀泄小便滑數精
氣不爽事多健忘常服補元陽益腎氣

肉桂去麤皮川烏頭去皮臍炮桃仁麤炒巴戟去心

白蒺藜 山藥 茯苓 石斛去根 肉苁蓉

草薢 白朮 破故紙各四十兩

右末煉蜜丸桐子大每空心鹽湯下三十九丸小腸

氣茴香湯下

益氣補腎湯

證治大遺

醫學近編 眩暈 九 貞白堂

人參 黃芪各一錢二分 白朮 二錢 白茯苓 一錢 甘草

冬五 山藥 山茱萸各一錢五分 水煎服

半夏白朮天麻湯見頭痛 清魂散見產門

消風散見斑疹 十四友丸見癰門

都梁丸見頭痛 青州白丸子見風門

補中益氣湯見內傷門 益氣補腎湯

腎着湯

厥症

世以卒然昏愈不省人事為厥方書以手足逆冷為
厥不可不辨

有陽厥陰厥氣厥痰厥

熱厥素有積熱或酒客輩或傷寒過經不解熱極忽

時昏冒手足逆冷脉沉數有力為陽厥苓連二陳

白虎解毒湯下症者大柴承氣增損用之厥深熱

亦深厥微熱亦微

寒厥內有伏陰或過食冷物或食後着寒或吐或瀉

證治大遺 醫學近編 厥症 一 貞白堂

面青白手足逆冷上過乎肘下過乎膝或昏冒不

知人脉沉遲無力乃陰經自中寒邪為陰厥當從

陰治理中五積薑附等審輕重用

氣厥脉沉或弦口中吐沫或時氣急為氣厥乃暴怒

所致審明用藥烏藥順氣木香流氣加減挾痰加

痰藥

痰厥脉沉滑忽然昏倒體肥素有痰火不因暴怒為

痰厥即類中風也二陳導痰加竹瀝薑汁有火加

解鬱一二味

痰涎壅盛必吐。和緩散以碧霞散。揀上好石綠研

細。水飛。再研。二三錢。同冰片三四豆許研勻。以

鮮薄荷汁。全酒調下。不大嘔吐。但口角涎流出

自醒。若見虛症。遺尿自汗。不可吐速隨虛治。

活人書曰。陽厥。脉滑而沉。陰厥。脉沉而細欲伏。

丹溪曰。厥因氣虛者多。氣虛。脉細微。或氣口反大。血

虛。脉芤大如慈管。熱厥。脉數。外感。脉浮。而實有痰

者。脉必弦滑。熱用承氣。解毒痰用白朮竹瀝。外感

宜解散藥中加薑汁。

證治大還

醫學近編

厥症

二

貞白堂

活人書云。初病身熱頭痛。稍久大便秘小便澀。或畏

熱喜冷水。或揚手擲足。煩躁不得寧謚。語昏憤而

厥。此陽厥也。大小承氣。大柴胡看微甚而下之。煩

渴舌燥。白虎湯。

手足厥逆。脉乍伏結。若心下煩滿。饑不欲食。瓜蒂散

吐之。

寒熱而厥。面色不澤。胃脉兩手忽手無。或一手無脉。

必是有正汗也。多用綿衣包手足。服五味子湯。或

兼與桂枝麻黃各半湯。須臾大汗而解。

傷寒逆心下怔忡。而厥宜先治水。茯苓甘草湯主之。

如得病後。四肢厥冷。脉沉而細。手足攣。而惡寒引衣。

蓋覆。不欲水。或下利清穀。而厥逆者。陰也。四逆湯

白通湯。厥逆脉不至者。通脉四逆湯。

手足指頭微寒者。謂之清里。中湯無熱症。而厥當歸

四逆湯。加茱萸生薑。喘促脉伏。而厥五味子湯。吐

利手足厥冷。煩躁欲死。吳茱萸湯。

一種尸厥。即中惡之候。因觸犯不正之氣。忽然手足

證治大還

醫學近編

厥症

主

貞白堂

厥冷。肌膚粟起。頭面有黑。精神不守。或錯言妄語。

牙關緊急。或昏不知人。頭面旋倒。此是卒厥客忤。

飛尸鬼擊。凡吊死問喪入廟。登塚為陰邪所逼。多

有此病。急以蘇合丸灌之。稍醒却投調氣散。和平

胃散。服秦承祖灸鬼法。妙。

蛇厥。吐出蛇虫。胃中有寒。則蛇上入膈。宜理中湯。

加烏梅川椒。蛇聞酸則靜。見苦則安。亦有內傷食

填。太陰往往痛。而吐蛇。溫中化滯為主。詳見食門。

厥症多因飲食醉飽之後。或感風寒。或着氣惱。而得

飲食填塞胃氣不行。乃致卒然昏迷。須先以鹽薑湯吐之一吐。便醒。後投以和中理氣化痰藥。若候作中風治。禍不旋踵。

諸中或醒或未醒。或初病或久病。忽吐出紫紅色者。死。

口開手撒等五臟絕症。已見一二不全見者。速煎參芪膏灸臍下。亦有得生者。

調氣散

白豆蔻 丁香 檀香 木香 藿香 甘草

證治大選

醫學近編 厥症 四 貞白堂

八錢 砂仁 四錢 為末每服二錢入鹽少許沸湯調下

五味子湯 治陰厥脉伏手足逆冷脉微欲絕氣虛之症

五味子 一人參 麥門冬 杏仁 陳皮

右薑一片棗一枚煎服即生脉散加陳皮杏仁

茯苓甘草湯 治陽厥怔忡手足冷心下有水氣

茯苓 桂枝 甘草 生薑 三片水煎溫服

通脉四逆湯 治陰厥下利清穀四肢逆冷心下水氣

甘草 六錢 附子 大者 乾薑 一兩

若面赤加葱九草。嘔加生薑咽痛加桔梗瀉止脉不出加人參。

凡用此丸治卒厥不省人事未定風痰氣厥先與此藥開竅極妙。

每用一丸以湯調下。灌之即醒醒後審脉察症用藥。

蘇合香丸 張三錫曰此丸開竅劫痰一切氣滯有餘痰火急驚初起用之無不獲効虛人慎用立危

證治大選

醫學近編 厥症 五 貞白堂

白朮 青木香 烏犀角 香附 硃砂 白檀

訶黎勒 安息香 另研無灰 沉香 麝香 華撥

蘇合油 入安息 薰陸香 龍腦 俱各一兩

右末研勻入香膏加煉蜜丸桐子大井花水下每服四丸或總作一丸蠟包收之

吳茱萸湯 治陰厥吐瀉煩躁欲死

吳茱萸 生薑 各五錢 人參 二錢 棗 三枚水煎服

丹溪曰熱厥四肢煩熱蒸濕熱鬱於脾土之中治用

東垣升陽散火湯火鬱湯之類

寒厥手足逆冷者多是氣血兩虛補氣血藥中加附子。

飲酒人或肥人手足熱者濕痰鬱火盛也。二陳加平連梔子之類若忽然手足逆冷卒厥不知人者多屬痰火亦有陰先虧而陽亢暴熱者宜多用參膏點竹瀝薑汁與之人瘦弱者雖無痰火必盛竹瀝最妙以性能養血清金降火。

傳心方云男女涎潮於心卒然中倒當即扶入暖室中扶策正坐當面作好醋炭燻之令醋氣衝入鼻

證治大選

醫學近編 卷之十八

厥症

六

貞白堂

良久其涎潮於心者自下輕者即時醒重者亦知人事唯不可灌一點湯水入喉也灌則涎永繫於心包絡不能去必成廢人。

初厥用生半夏末吹鼻或細辛皂角石菖蒲末吹入鼻取嚏有嚏可治此可以驗其死生及受病深淺也。

脈浮而滑沉而滑微而虛皆虛與痰。

大小承氣湯

大柴胡湯

白虎湯

白通湯

四逆湯

理中湯

蘇合香丸 方俱見寒門

稀涎散 見中風門

蘇合香丸 見脾胃門

平胃散 見脾胃門

順氣散 見氣門

證治大選

醫學近編 卷之十八

厥症

七

貞白堂

雲間陳 治三農甫述

三韓張載齡弘度甫閱

夢遺精滑

夢交媾而精遺出為夢遺。責之心。不交流出。相火

妄動所致。當清心制火。

不因夢時。時流出者。為精滑。屬氣虛。不能約束。精妄

走所致。當澁精滋腎。下部濕熱盛。白液時時粘糊。

此非精。乃濕熱蒸蒸而成。肝脉必弦數。當瀉肝。滲

證治六還 醫學近編 夢遺 一 貞白堂 卷之十九

濕解熱。當歸龍薈丸。龍膽瀉肝湯佳。古方治精滑。

用局方青州白丸子。辰砂為衣。大驗。濕熱明矣。

治法曰。夢遺者。治其心。精滑者。固其真。滿而溢者。舒

其情。濁而赤者。調其經。養其神。心安神寧。火來坎

戶。水到離宮。水火交養。遺濁皆清。

壯年未偶時。夜遺為精氣溢泄。不必治。

心有所思。夜見于夢。乃心火動而相火隨之也。黃連

清心飲主之。安神丸或用補心丹。

恣慾太過。精滑不禁。當大補。加澁藥。芪參牡蠣五味

金櫻膏之類。或煎入物湯吞檮根丸。

五味。金櫻山茱萸。蓮實俱酸。以收之藥。

勞心太過。亦令夢遺。乃神妄越火動所致。宜補心丹。

熱則流通。酒客輩不夢而遺。當滋陰降火。陰虛勞瘵

同。

若用心太過而得之。宜遠志丸。用交感丹。加蓮米五

味子吞下。仍佐以靈砂丹。審是思色慾不遂得

之。且以四七湯吞白丸子。甚者耳聞目見其精即

出。名曰白淫。妙香散。吞玉華白丹。

證治六還 醫學近編 夢遺 二 貞白堂 卷之十九

若審是色慾過度。下元虛憊。泄滑無禁。宜正元侯。加

牡蠣粉。肉蓯蓉。各半錢。吞養正丹。仍佐以鹿茸丸。

大兔絲子丸。固陽丸之類。按此等太僭燥。若妄用

則陰水耗竭。壯火獨炎。枯脂消肉。骨立筋痿。而成

不救之疾。用者審之。若審是壯年滿溢者。清心

丸。夢遺俗謂之鬼交。宜溫膽去竹茹。加人參遠

志蓮肉棗仁炒茯苓。各半錢。吞玉華白丹。固陽丸

夢遺亦備四症。宜審其所感用前藥。

玉華白丹 清上實下助養根元扶衰救危補益臟

肺治虛損大便不固小便滑數夢遺精滑

鍾乳粉煅白石脂煅赤陽起石煅赤酒淬陰乾各五錢

左顧牡蠣七錢洗用薑汁鹽泥固濟火煨取白者

右四味研細糯米粉煮糊九芡實大入地坑出火

毒一宿每服一粒空心人參湯下忌葷豆豬羊血

昔一人攻書至四鼓臥間玉莖但着被與腿即夢遺

空則不夢飲食漸減倦怠少氣此用心太過二火

俱起夜不得睡血不歸肝腎水不足火盛陰虛入

客下焦鼓其精房則精不得聚藏而欲走因玉莖

醫治大選醫學近編 卷之十九 三 貞白堂

着物猶厭氣客之故作接內之夢於是上補心安

神中調脾胃升舉其陽下用益精生陰固陽之劑

不三月而病安矣

邪祟附着於人似夢非夢而泄亦是氣血不足邪因

血襲理或有之惟宜補養為主外燒安息及辟邪

丹紫金錠以禁之

固陽丸

黑附子炮三兩川烏頭炮二兩白龍骨一兩補骨脂

舶上茴香各一兩川練子各一兩右爲末酒糊丸如

桐子大每服五十九空心酒下

鹿茸丸

川牛膝去蘆酒浸鹿茸去毛酒蒸五昧子各二兩石斛去根

棘刺杜仲去皮炒陽起石煅川巴戟去心山藥炒

兔絲子酒蒸附子炮去皮尖川練子炒取肉磁石煅

官桂不見火澤瀉各一兩沉香半兩另研

右爲末酒糊丸如梧子大每七十九空心酒服

黃連清心飲

黃連酒洗生地酒洗甘草炙茯神遠志

醫治大選醫學近編 卷之十九 四 貞白堂

人參炒酸棗仁炒石蓮肉即蓮肉水煎服

樗根丸

樗根白皮性涼而酒炒爲末酒糊丸或加青黛海

石黃柏九煎入物湯下

蛤粉丸治虛熱遺滑主和者代加珍珠母珍珠丸

黃柏炒知母蛤粉各一青黛飛爲右粥丸服

小兒絲子丸治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜

夢遺精

石蓮肉二兩兔絲子酒煮白茯苓二兩山藥二兩錢打糊

右爲末。山藥丸、桐子大。每服五十九。空心溫酒鹽湯任下。如脚無力木瓜湯下。

金櫻丸 治精滑夢遺及小便後遺瀝。

金櫻子 雞頭實 各一兩 白蓮花蕊 龍骨 各半兩

右爲末。糊丸。桐子大。每服八十九。空心鹽湯下。

金櫻煎 經霜後以竹篦子劈開於木臼中杵去刺

勿損之。擘爲兩片去毛。以水淘洗淨。爛搗于砂鍋

中。以水煎。不得絕火。煎約水耗半。取出濾過。將汁

仍煎似稀餡。每取一二匙。空心暖酒一盞調服。其

證治大還

醫學近編 夢遺 五 貞白堂
卷之十九

功不可殫

戴氏曰。遺精有四。有勞心過度。心不攝腎。以致失精者。有思色慾不遂。致精失位。輸泄而出者。有色慾太過。滑泄不禁者。有年壯氣盛。久無色慾。精氣滿溢者。然其狀不一。或小便後多出。不可禁者。或小便便而自出。或莖中出而癢痛。常如欲小便者。並宜先用辰砂妙香散。吞玉華白丸。佐以威喜丸。或分清飲。別以龍骨絲綿裹同煎。或分清飲半貼。加五倍牡蠣白茯苓五味子各五分。

失精夢遺。多有經絡虛熱而得者。本事方滑心丸。用黃蘗腦子者良。

水陸二仙丹 芡實粉同金櫻膏。相和爲丸。每服七

八十九。空心鹽酒下。

威喜丸 治丈夫陽虛精氣不固。小便白濁。五淋常

流。夢寐多驚。頻遺泄。婦人白帶。夢遺並皆治之。

黃蠟 白茯苓去皮四兩切塊。用豬苓一兩同煮

二十餘沸。去豬苓。將苓曬乾爲末。溶黃蠟爲丸。彈

子大。每服一丸。空心細嚼。津液嚥下。小便清爲度。

證治大還

醫學近編 夢遺 六 貞白堂
卷之十九

忌醋

五味膏 北五味子一斤洗淨水浸一宿。研爛。用以手援去核。將核研爛。再加水瀝。去渣同置砂鍋內。入好蜜二斤。炭火慢熬成膏。待數日去火毒。再服一二茶匙。空心白湯調。火候最難適中。先將砂鍋秤定斤兩。然後秤五味汁。並蜜。大約煮二斤四兩爲度。

遺滑古人治有五法。一用辰砂磁石龍骨之類。是重可去。快鎮神之浮游也。有思想結成痰飲。迷

于心竅而然者。許學士用猪苓丸。是導痰也。思
想傷陰。潔古珍珠粉丸。用蛤粉黃柏。是降火補陰
也。氣血兩虛。形羸睡不寧。睡熟即遺。丹溪用珍
珠粉丸。定志丸。是補心安神也。思想傷陽者。謙甫
從容鬼絲子等補陽是也。

猪苓丸 用半夏一兩。破如豆大。猪苓末二兩。先將
一半炒半夏色黃。不令焦。出火毒。取半夏為末。糊
丸。桐子大。候乾。再以前苓一半炒微裂。入砂瓶養
之。空心溫酒鹽湯下。三四十丸。常服于申未間。酒

求治大選

醫學近編

夢遺

七

貞白堂

三百五

下。意謂半夏燥濕痰。猪苓滲濕熱。乃濕熱盛于下
部。滑白物之治。非夢遺法也。

泄精珍珠粉丸。不應用。五倍子一兩。茯苓二兩。為丸
服妙。五倍澀脫之功。敏于龍骨牡蠣也。

夢遺屬鬱滯者。居大半人多不識。誤用澀藥。愈澀愈
遺。丹溪法用側倉而安。有用神芎丸。大下之而愈
者。不可不知。飲酒厚味痰火之人。多有此疾。腎
雖藏精。其原出于脾。胃中宮濕熱。內鬱所輸。皆濁
氣邪。火擾動。水不安靜。故遺滑也。治以升柴二陳

湯加黃柏。使清升濁降。脾氣健運。遺滑自止。其
有慾心太熾。思想不遂。而致者。從心治。房勞無
度。致腎虛者。必兼怯弱等症。方可用補腎藥。治
有多端。不可一例作腎虛治也。

養正丹

見氣門

安神丸

見內傷門

補心丹

見虛損門

證治大選

醫學近編

遺精

八

貞白堂

一百三

赤白濁

小便混濁或赤如血或白如泔不痛者是痛則為淋

矣屬濕屬熱分虛實治肥白人脉沈滑胸膈不利

小便白濁屬濕痰宜燥中宮之濕面色不澤身倦

脉無力者屬氣虛兼補氣

黑瘦人脉洪數五心煩熱頰赤唇乾小便赤濁或白

者屬相火宜滋陰肝脉弦數有力火盛者宜龍膽

瀉肝湯瀉之

治法 一分滲解熱 一燥濕健脾 一滋陰降火

證治大還

醫學近編 赤白濁 卷之十九

貞白堂

一實下固陽

濁氣下流為赤白濁升柴二朮二陳俱最妙赤者黃

柏當歸知母白芍丹溪曰升柴二朮二陳湯能使

大便潤而小便長屢驗

兩尺脉沉弱足膝痠弱白濁頻數凝白如油光彩不

定旋脚澄下凝如膏糊古方悉指為陽虛亦有虛

而挾相火者不可不辨革解分清飲專主陽虛

靈樞經曰中氣虛渡便為之變也必先補中氣使升

舉之而後分其臟腑氣血赤白虛實以治與夫他

邪所傳者因有濕熱補虛設腎氣虛甚或火熱亢

極者則不宜純用寒涼必反佐治之要在權衡輕

重而已

赤者熱傷血宜滋陰白者濕熱傷氣宜燥濕

白濁不止服珍珠粉丸佳方用檉皮炒黃柏炒褐色

燥熱熱青黛解鬱熱蛤粉鹹寒引下滑石利竅珍

珠寧神定志一方無此用之屢驗久病無火症者

加炒乾薑神麴糊丸氣虛四君湯血虛四物湯

氣血兩虛八物湯下

證治大還

醫學近編 赤白濁 卷之十九

貞白堂

清心蓮子飲 治上盛下虛心火上炎口苦煩渴五

心煩熱小便赤或澀下白濁

石蓮肉即蓮子 赤茯苓 人參 黃芪 地骨皮

麥門冬 黃芩 車前 甘草 空心服

白濁經年不愈或時夢遺形瘦心神不安當作心虛

治珍珠粉丸合定志丸服

定志丸

加珍珠粉丸合定志丸服

遠志 石菖蒲 各二 人參 白茯苓 各二

右為末蜜丸桐子大硃砂為衣每服七丸加至二

十九空...湯下。

一方用炒黃柏生黃柏各一兩滑石三兩神麴半兩
共為末滴水丸空心服

茯苓丸 治思慮太過心腎虛損便溺餘瀝小便白

濁夢寐頻泄。

兔絲子五兩 白茯苓一兩 石蓮肉二兩

酒糊丸桐子大每服三十九空心鹽湯下

草解分清飲

益智仁 川草解 石菖蒲 烏藥 各等 入鹽

證治大還

醫學近編 赤白濁 三 貞白堂

少許水煎服一方加茯苓甘草

小便白濁出髓條經驗方

酸棗仁 白朮 人參 白茯苓 破故紙

益智 大藿香 左顧牡蠣

右為末青鹽酒為丸每服三十九空心酒下

白濁方 香附 炒黑色 酸梅草取汁拌勻溫酒一盞

傾入服之二三服愈 各為湯飯

又方用兔絲子一兩炒黑色滓酒一大碗去渣熱服

立愈

瑞蓮丸 治思慮傷神小便赤濁

石蓮肉 炒去心 白茯苓 龍骨 生用 天冬 洗去心

柏子仁 洗別 麥冬 洗去心 當歸 酒浸 去蘖 酸棗仁

紫石英 火煨 遠志 甘草 湯煮 乳香 龍齒 各一兩

右煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服七十九空心溫

酒下

白淫痿論曰思想無窮所願不遂意淫于外入房太

甚宗筋弛縱帶脉不引發為筋痿及為白淫夫腎

藏天一以慳用事志意內治則精全而瀆若思想

證治大還

醫學近編 赤白濁 四 貞白堂

外淫房室太甚則淫佚不守輒隨洩溺而下也然

本于筋痿者以宗筋弛縱也

白淫責于陽虛當益火之原從菴鹿茸人參之類內

補鹿茸丸主之要在斟酌增損分量

鹿茸 酥炙 兔絲子 酒浸 茯苓 炒 白茯苓 紫苑

肉蓯蓉 蛇床子 酒浸 黃芪 桑螵蛸 陽起石

附子 炮須用肉桂 各等

右為細末煉蜜丸桐子大每服二十九食遠溫酒

下

前陰諸疾

前陰所謂之脈有二。一曰肝脈。二曰督脈。經云。肝足厥陰之脈。入毛中。透陰器。抵小腹。是肝脈所過也。又云。督脈者。起于小腹以下骨中央。女子入繫延孔。循陰器。男子循莖中至纂。與女子等。是督脈所過也。

陰縮陰縱

陰縱謂前陰受寒。縮入腹內也。陰縱謂前陰受熱。挺長不收也。經云。足厥陰之筋傷于寒。則陰縮入傷。證治太選。腎學近編。前陰諸疾。卷之十九。一。貞白堂。熱縱挺不收。治在行水清陰氣是也。

丹溪治鮑兄年二十。玉莖挺長腫而癢。皮塌常潤磨股不能行。兩脇氣上。手足倦弱。先以小柴胡加黃連。大劑行其濕熱。略加黃柏。降其逆上之氣。其挺腫漸收。漸減及半。但莖中有堅塊未消。遂以青皮一味爲君。佐以散風之劑末服。外以絲瓜汁調五倍子末敷而愈。

吳江王氏子年三十。忽陰挺長腫而痛。脈數而實。用朴硝剉碎湯洗。又用三乙承氣湯大下之愈。

內經曰。陰縮而死者皆屬肝傷。又云。悲哀動中則傷魂。魂傷則狂妄不精。不精則不正。當陰縮而擊筋。兩脇骨不舉。毛悴色夭。死于秋。又云。厥陰終者喜溺。舌卷卵上縮是也。

玉莖腫。前陰腫是也。其症不一。有通身水氣癰脰俱腫者。此屬水腫。以治水之法治之。其腎風孤搖成瘡。以致腫者。以治瘡毒之法治之。有妬精蝕瘡腫毒。以乾瘡之藥治之。此緣妬精蘊結。毒氣未散而成腫痛也。有服金石秘澀之藥。精氣壅遏不能宣。證治太選。腎學近編。前陰諸疾。卷之十九。二。貞白堂。揚。或試緊爐之方。取一時之快。熱毒內蘊。俱能爲腫。有血氣凝滯癰間。竅道閉塞。致使莖痛。或由忍溺。致氣結不行而成腫。凡此諸症。並以燈心湯調五苓散服之。以荊芥木通煎湯淋洗。此條出鈞玄。

陰痿陰汗陰冷陰臭

陰痿皆耗散過度。傷于肝筋所致。經云。足厥陰之經其病傷于內。則不起是也。憂鬱氣惱亦主陰痿。玉莖爲宗筋。肝傷則筋不能爲之主也。

東垣陰痿。陰汗。陰臭論。一富者。前陰間常聞臊臭。

夫日飲酒腹中不和求于治之于應之曰夫
前陰者足厥陰之脈絡陰器出其挺末臭者心之
所主散入于五方為臭入肝為燥臭此其一也當
于肝中瀉行間是治其本後于心經瀉少冲以治
其標如惡針當用藥除之治法當求其本連日飲
酒夫酒者氣味俱能生濕熱是風濕熱合于下焦
為邪故經云下焦如瀆又云在下引而竭之酒者
是濕熱之水亦宜決前陰以去之是合下焦二法
治之龍膽瀉肝湯是也

證治大遺

醫學近編
卷之十九

前陰諸疾

三

貞白堂
手書

龍膽瀉肝湯

治陰部時復濕痒有臊臭

柴胡梢

澤瀉

各一錢

車前子

木通

各五分

當歸尾

龍膽草

生地黃

各三錢

水煎空心飢時熱服便

以美膳壓之柴胡入肝為引用澤瀉車前子木通
其淡滲之味利小便亦除臊臭是名在下者引而
竭之生地黃龍膽草之苦寒瀉酒濕熱更兼車前
子之類以徹肝中邪氣肝主血用當歸以滋肝中
血不足也

固真湯

治兩九冷前陰痿弱陰汗如水小便後有

餘瀝臊氣尻臀并前陰冷惡寒而喜熱膝亦冷

升麻

柴胡

羌活

各一錢

甘草

炙

澤瀉

各一錢半

知母

炒

龍膽草

炒各二錢

水煎空心服以美膳壓之

溫腎湯

面色痿黃身黃即軟陰汗陰莖有天色

麻黃

分六

防風根

蒼朮

各一錢半

白朮

猪苓

白茯苓

升麻

黃柏

酒炒各一錢

澤瀉

二錢

柴胡梢

分六

水煎食前服之候一時辰許方食

補肝湯

前陰如冰冷汗兩脚痿弱無力

黃芪

分七

人參

葛根

各三錢

甘草

炙

蒼朮

分五

證治大遺

醫學近編
卷之十九

前陰諸疾

四

貞白堂
手書

升麻

猪苓

各四分

知母

柴胡

羌活

當歸身

陳皮

黃柏

炒

防風

白茯苓

澤瀉

神麴

連翹

各二分

水煎食前熱服忌酒麴

清震湯

治溺黃臊臭淋瀝雨九如冰陰汗浸兩股

陰頭亦冷正值十二月天寒凜冽寒之極矣

澤瀉

升麻

蒼朮

黃芩

各五分

柴胡

當歸身

甘草

炙各二分

羌活

黃柏

酒炒各一錢

防風

麻黃根

藁本

猪苓

各三分

紅花

分一

水煎服忌酒麴

柴胡勝濕湯

兩外腎冷兩髀樞陰汗前陰痿弱陰

囊濕痒腺氣

柴胡 甘草 生各三錢 升麻 羌活 澤瀉 各一錢半 當歸

麻黃 龍膽草 漢防已 各一錢 黃柏 酒炒二錢

五味子 二十粒 紅花 少許 白茯苓 一錢 水煎熱服

忌酒麪房事

仲景八味丸 治陰痿不振。今依前方夏減桂附一

半春秋減三之一。病去全減桂附。

椒粉散 治前陰兩丸濕痒。秋冬尤甚。

麻黃 一錢 狗脊 蛇牀子 各五分 斑猫 二枚 當歸梢

證治大還

醫學近編 前陰諸疾 五 貞白堂 卷之十九

豬苓 小椒 各三分 肉桂 二分 輕粉 紅花 各少許

為細末。摻上避風寒濕冷處坐臥。

又方 治腎囊濕痒

先以吳茱萸湯洗過。後用吳茱萸半兩。寒水石 三錢

黃柏二錢。半樟腦蛇床子 各五錢 輕粉 一錢 白礬 三錢 硫

黃 二錢 檳榔 三錢 白芷 三錢 為末摻之。

千金方云。有人陰冷。漸漸冷氣入陰囊。腫滿。恐死。日

夜痛悶不得眠。取生椒擇之洗淨。以布帛裹着丸

囊。令厚半寸。須臾熱氣大通。日再易之。取出瘻。

本事云。曾有人陰冷。漸次冷氣入陰囊。腫滿。晝夜疼

悶不得眠。煮大薊汁服立瘳。

陰腫陰痛陰吹

婦人陰腫腎痛。枳實 半斤 切碎炒熱。布包熨之。冷即易

交接勞復。陰卵痛。是勞復。陰陽易。

仲景云。胃氣下泄。陰吹而正喧。此穀氣之實也。膏髮

煎老導之。其方豬膏 半斤 亂髮如雞子大三枚。以髮

入膏中。煎至髮盡。分再服。病自從小便中出。能治

諸疽症殊效。

證治大還

醫學近編 前陰諸疾 六 貞白堂 卷之十九

雄黃散 陰腫大如斗。人所不能治者。

雄黃 一兩 礬 二兩 甘草 生半兩 以水五升煎洗

荊芥散 治腎腫

荊芥穗 一兩 朴硝 二兩 蘿蔔葱同煎湯洗。

男子陰腫大如升。舉痛甚。搗馬鞭草塗之。

和劑三白散 治小兒膀胱蘊熱。風濕相乘。陰囊腫

脹。大小便不利。

白牽牛 一兩 桑白皮 木通 白朮 橘紅 各五錢

為末薑湯調二錢。

癩風 俗名腎臟風

癩風之症起于下部虛熱或行路體倦及夏月久坐冷地爲風濕所襲乃發爲疾其症覺濕皮厚生水疱瘡疥作痒古方用蛇床子一味煎湯淋洗痒甚者以薑汁入香油數滴攪勻塗上自愈

沐浴長春散 治下元陰濕久冷陰囊夜痒抓之則喜手住則痛成瘡流水爲患甚苦及治婦人下部陰濕子胞久冷並效

牡蠣 蛇床子 破故紙 紫梢花 官桂

治大遺 醫學近編 前庭諸疾 七 貞白堂 卷之十九

薄荷葉 各等分每用一兩半入葱白數莖水煎一小鍋先薰後洗再用津調散搽之全安

津調散 治婦精瘡膿汁淋漓臭爛

黃連 欬冬花 等分 射香 少許 爲末洗過或以地

骨皮蛇床子煎湯洗帛拭乾津調敷忌生冷生湯洗一方無射

又方 治外腎及兩腿風濕瘡

全蝎 檳榔 蛇床子 硫黃 各一 爲末麻油調

入手心擦熱吸三口用手抱囊一頃次擦兩股上

小便不通門

東垣謂小便不通有在氣在血之異夫小便者足太陽膀胱所主長生于申申者西方金也金能生水金者肺也肺中伏熱水不能生是絕小便之源也人法象天地膀胱之源自頭項下至于足故曰陽中之陰如渴而小便不通者肺不能降是也治法者用清燥金之正化氣味薄之藥茯苓猪苓澤瀉琥珀燈心通草車前子瞿麥扁蓄之類皆爲淡滲之藥能瀉肺火而清肺金滋水之化源也若不渴熱在下焦是絕其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰中之陰藥治之二者之病一居上焦在氣分而必渴一居下焦在血分而不渴血中有濕故不渴也二者之殊至易分別耳

綱目云氣鬱于下微者香以散之甚者吐以提之血鬱于下微者輕劑行之甚者峻劑破之

丹溪云小便不通有氣虛血虛有實熱有痰氣閉塞皆宜吐之以提其氣氣升則水自降蓋氣乘載其水也先哲譬之如滴水之器必使上竅通而後下

治大遺 醫學近編 小便不通 一 貞白堂 卷之十九

竅之不出。氣虛。參朮升麻先服。後吐血虛。四物湯。先服。後吐。痰氣閉塞者。二陳加木通。香附。探吐。實熱。當分利之。或八正散。大便動則小便自通。老人氣短者。四物加參芪。吞滋腎丸。下焦血氣乾者死。

羅太無曰。小便利有三。不可概論。若津液偏滲于腸胃。大便泄瀉。而小便澀少者。一也。宜利而已。若熱搏下焦。津液則濕熱不能行者。二也。必滲泄則愈。若脾胃氣澀。不能通調水道。下輸膀胱而化者。

證治大還

醫學近編 小便不通 卷之十九 二 貞白堂

三也可順氣。令施化而出。

丹溪云。諸淋皆屬于熱。余每用黃柏滋腎丸。每百丸。用四物湯加甘草。稍杜牛膝。木通。桃仁。活石。木香。煎湯。空心吞服。兼灸三陰交。如鼓應桴。累試累效。保命集云。淋閉者。涼膈散加滑石四兩。茯苓一兩。

治熱在氣分之劑。

東垣清肺飲 治渴而小便閉。或黃澀。邪熱在氣分。

茯苓 錢二 澤瀉 錢各三 琥珀 瞿麥 桂 各五分

通草 燈心 各二分 木通 扁蓄 各七分 車前子 錢一

每服五錢。水煎。熱服。五苓散。八正散。亦宜。

仲景猪苓湯 治脉浮發熱。渴而小便不利。

猪苓 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉 各一兩

水 升煎四升。去渣。內膠。煎。滾。溫服。一日三服。

茯苓戎鹽湯

茯苓 兩八 白朮 兩二 戎鹽 彈丸大 為末。白湯送下。

清肺飲 治肺燥而小便不通。

黃芩 錢一 山梔子 三枚 鹽豉 二十粒 長流水煎服。

治熱在血分之劑

證治大還

醫學近編 小便不通 卷之十九 三 貞白堂

東垣滋腎丸 治下焦陰虛。脚膝軟無力。陰汗陰痿。

足熱不能履地。不渴而小便閉者。邪熱在血分也。

黃柏 知母 俱酒洗焙 各二兩 肉桂 錢二 滾水為丸。梧子

大。每百丸。加至二百丸。煎百沸湯。空心服。

潔古黃連丸 治因服熱藥過。小便不利。諸藥莫能

效者。或臍下痛不可忍。

黃連 妙 黃柏 妙 甘草 各等分 水煎服 如再不通

加知母。此藥助氣。使氣得化。則通矣。

羅太無白花散 治小便不通。膀胱有熱。

朴硝爲末。每服二錢煎茴香湯調下。

東垣導氣除燥湯 小便不通。乃血濕致氣不通。而

竅澀。

知母酒洗澤瀉各三分黃柏四錢滑石炒茯苓各二錢

水煎不拘時服

小便不通。腹下狀如覆碗。痛悶難忍者。乃腸胃乾涸。

胆中氣不下。則便不化。啟玄子謂胞器。若得氣海

之氣施化。則溲便下。氣海之氣不及。則隱秘不通。

故不得便利也。先用木香沉香各三錢酒調下。令

證治大還醫學近編 小便不通 四 貞白堂 卷之十九

氣通達。便自通利。

又方 煎陳皮茯苓湯。調木香沉香末服之。上三

方。正綱目所謂氣鬱于下。微者香以散之。是也。

丹溪治氣鬱于下。甚者以吐法提之。

血鬱于下。小便不利。微者。輕劑行之。如蒲灰散。滑石

白魚散。茯苓戎鹽湯。皆主之。

仲景蒲灰散

蒲黃粉七分滑石三分爲細末。白湯調。一日三服。

滑石白魚散

滑石 亂髮灰 白魚各二分 乃衣魚也

共爲末。米飲服五分。一日三服。

羅太無髮灰散。治臍下急滿。小便不通。

髮灰二錢米醋二合調服。一法與葵子等分爲

末。米飲服二錢。訖。卽炒黑豆葉蓋其上。卽通。

右滑石能逐汚血。蒲黃髮灰能消汚血。丹溪謂髮

髮補陰之功。甚捷。

本事桃仁煎。治婦人積血。小便不通。臍腹脹疼。不

可忍。衆醫皆作淋治。如八正散之類。數種皆治不

證治大還醫學近編 小便不通 五 貞白堂 卷之十九

效。診之。乃知血瘀也。非瞋眩藥不可去。予用此藥

得愈。

桃仁 大黃 朴硝各一兩蜜虫半兩 炒黑 四味爲末。

先以醇醋二升半。銀石器內慢火煎。取一升五合。

下大黃桃仁蜜虫等。不住手攪良久。出。丸如梧子

大。前一日不晚食。五更初溫酒吞下。五九至日午

腹大痛不可忍。臥少頃。下血塊如拳者。數枚。小便

如黑豆汁。或如雞肝蝦蟆衣狀。其痛止。此藥極峻。

氣虛血弱者。不可輕用。凡用宜少服之。漸加可也。

如見鮮血印此藥續以補藥調理此方出千金方

倒換散 治癰開大小便不通小腹急痛肛門腫痛

大黃小便不通減半 荆芥穗大便不通半 爲末每服二錢溫水

調下

朴硝牛膝湯 治小便不通或血淋

杜牛膝二兩 以雪水二碗煎至一碗調朴硝一兩

空心服立通

小便不通薰洗方

用甘遂甘草等分牙皂蔥頭亦等分煎濃湯薰洗

證治大還

醫學近編 小便不通 卷之十九 六 貞白堂

數遍即通

雜方

治小便閉 用大田螺生去壳搗細封臍上即通

治傷寒後小便不通

生薑八九塊

杵碎水十碗麻布五六尺同煎數沸

用桶盛候可通手以布頻熨小腹良久恰用紅豆

末一錢江茶二錢井花水調服神效小便如注

本事方 治小便難小腹脹急不速治即死

葱白一斤 細切炒令熱以帕子裹分兩處更替熨

臍下即通

聖通方 治小便難腹滿悶不急療即死

秦光一兩去蘆 以水一大碗煎七分食分二服之瘥

濟世方 治小便不通

杏仁二十枚 研碎水調分作二服效

千金方 治婦人卒不得小便用紫菀末以井水調

服三撮便通如小便血五撮立止

灸小便淋瀝法 炒鹽不拘多少熱填滿病人臍中

是神關穴也却用筋頭大艾炷灸七壯良驗或灸

證治大還

醫學近編 小便不通 卷之十九 七 貞白堂

三陰交穴

又法 治小水秘澀

猪膽連汁籠套玉莖少刻汁入即通婦人用藥末

貯袋子安入玉戶中必通

玄珠經云陰陽關格前後不通利小水自行中有轉

胞之症諸藥不效無救則脹滿悶亂而死曾以甘

遂末水調敷臍上內以甘草節湯飲之藥汁至臍

二藥相反而胞自轉小水來如湧泉此救急良方

一法 治小便不通諸藥無效或轉胞至死

用豬尿泡一箇底頭出箇小竅用翎筒通過放在

竅內、根底細線繫定筒口子細杖子堵定上用黃

蠟封死腔口頭吹滿氣七分繫定了再用手捻定

翎筒根頭放了黃蠟堵塞其翎筒放在小便頭放

開翎筒根頭手其氣透入裡自然小便下神效

瓜蒌散 治腹脹小便不通

黃蜀葵子 赤茯苓 各三錢 水煎服

雞蘇散 治小便不通 一云用雞蘇子炒研

雞蘇子 生地 通草 各四兩 滑石 石葦 炒去毛 各一兩

證治大還 醫學近編 小便不通 人 貞白堂 卷之十九

冬葵子 一兩 以水六碗煎至三碗分三服空心

進一服約人行五里路又進一服

治小便不通垂死者

玄明粉 一兩 淡竹葉 三十片 燈心 五分 煎湯徐徐調

服即通

王海藏云：脬轉小便不通非膀胱小腸厥陰之氣也

蓋因強力房事或過忍小便以致此疾非可利之

藥所能利之法當利氣宜以沈香湯主之 沈香

木香 各三錢 爲細末煎陳皮茯苓湯空心食前調服

腳氣

陳三農曰：腳氣之疾積受風濕脈洪兼浮者風多濕少脈洪兼緩者濕重風輕

初起發寒熱殊煩傷寒第脚膝痛或腫是也均屬濕

熱雖因坐臥濕地涉水履水久必變而爲熱初必

發散後兼分利與濕同治大法二朮以去濕黃柏

知母條芩山梔之類以清熱歸芍生地之類以調

血木瓜檳榔之類行其氣一活利關節兼散風濕

佐以木通防己川牛膝之類以引藥下行及消腫

證治大還 醫學近編 腳氣 一 貞白堂 卷之十九

去濕氣虛肥白人加入參兼化痰二陳瘦人脈弦

澀大便燥者忌燥藥兼補陰坎離加減

丹溪曰：腳氣濕流于下須提起其濕隨氣血入心

則恍惚謬妄嘔吐不食眠臥不安左寸大乍小

或乍有乍無死不治 方書以腫者名濕腳氣不

腫爲乾腳氣雖曰濕盛則腫亦當分新久虛實

入腎則腰脚腫小便不通呻吟目與額皆黑氣衝

而喘尺絕死

肥人腿痛多是濕痰氣弱宜燥濕化痰兼補氣脈必

沉滑久之必加補養八味丸

瘦人腿痛多是血虛有火宜養血滋陰脉必弦數六

味丸

腳氣衝心丹溪用四物加炒藥以附子末津調傅湧

泉穴以艾灸引泄其毒金匱八味丸治脚氣上

攻虛者宜之檳榔末三錢童便調下五子五

皮散意苡仁散俱實者宜之

腳氣上氣喘促初起有表邪者小青龍加檳榔實者

五子五皮散或蘇葉三兩製桑皮二兩前胡去蘆

證治大還

醫學近編

脚氣

二

貞白堂

一兩檳榔二枚杏仁去皮尖二十枚薑五片水二

盞煎一盞溫服已經攻泄分利致不得眠上喘屬

虛八味丸料作大劑煎冷服脾胃虛用參朮初

攻胃嘔逆二陳平胃加木瓜小便不通初起實

者五苓加木瓜虛者八味丸加車前牛膝

腳氣發熱有表症者五積散發之有裏症不大便者

大黃左經湯下之

五子五皮散

見服門

平胃散

見濕門

意苡仁散

薏苡仁一兩當歸 川芎 乾薑 茵芋 甘草

官桂 川烏 防風 人參 羌活 白朮 麻

黃 獨活 各半 為細末每空心臨臥服酒下二

錢日三服

外臺曰第一忌噀嚏則心煩煩則腳氣發第二禁大

語大語則傷肺肺傷亦發又不得露足當風入水

兩足猶不宜冷雖暑月當須着綿襪令常股出微

汗佳子寅丑日去手足指甲去氣夏月勿追涼常

宜按按勿使邪氣留數勞動關節常令通暢此並

證治大還

醫學近編

脚氣

三

貞白堂

養生之要拒風邪之法也

治濕熱脚氣方

紫蘇 黃柏 鹽酒 枳殼 黃柏 枳殼 芍藥 木瓜 澤瀉 木通

枳殼 黃柏 枳殼 芍藥 木瓜 澤瀉 木通

防已 加木香 腫甚加大腹皮發熱加大黃黃

芩

防已飲 防已大傷脾胃弱者忌之

黃柏 酒 蒼朮 鹽水 白朮 防已 各七 生地 檳榔

川芎 各半 木通 犀角屑 甘草節 黃連 各三

水煎服有熱加黃芩痰加竹瀝薑汁南星小便澀
加牛膝如常腫者專主濕熱肥人加痰藥。

邪客二陽屬表見寒熱拘急宜汗邪客三陰屬裏見
二便阻澀宜滲利。

健步丸有二皆下行分滲除濕風藥當審氣血方妙
食積流注方

蒼朮 防己 黃柏酒炒 南星 川芎 白芷
犀角 檳榔 血虛加川牛膝龜板酒糊丸服

羌活導滯湯 治腳氣初發一身盡痛或肢節腫痛
證治大還 醫學近編 腳氣 四 貞白堂

便溺阻滯先以此藥導之後用當歸拈痛湯
羌活 獨活 各一錢 防己 當歸尾 各七分 枳實 五分

大黃 二錢 右細切水煎空心服
五積散 治寒濕流注經絡腳膝腫痛方見中寒門

導水丸 治腳氣跗腫疼痛或發熱惡寒濕熱大盛
大黃 黃芩 各二兩 黑丑 取頭末 滑石 各四兩

右爲細末調水丸桐子大每服四五十丸溫水送
下以利爲度。

除濕丹 治諸濕病腰膝腫痛足脛浮腫筋脉勁急

津液凝澀便溺不利等症。

檳榔 甘遂 赤芍 澤瀉 威靈仙 葶藶子
各二兩 乳香 沒藥 各一兩 黑丑 兩 大戟 兩 陳皮 兩

右細末麴糊丸桐子大每服五十丸溫水下以利
爲度

三花神祐丸 治濕熱流注足膝浮腫肢節煩疼行
步重墜等症方見痰門

杉木飲 治腳氣發熱兩足腫大心煩體痛欲死者
杉木節 兩 檳榔 七枚 大腹皮 洗 青橘葉 四十片如

證治大還 醫學近編 腳氣 五 貞白堂
長流水三碗煎一碗分三服一日服盡如大便通

利見黃水其病除根未愈過數日再煎一劑服之
病根去爲度外以杉木橘葉煎湯洗之神効一方

用童便煎更佳。
勝濕餅子 治遠年腳氣足脛腫如瓜者

黑丑 一兩取頭末 白丑 一兩取頭末 甘遂 連珠末半兩 五錢

右三味再同研極細外用舊麥麴兩半連末藥和
勻水調捏爲餅子如折三錢大放飯上蒸熟每服
一餅空心嚼茶清下以利爲度未利再服一餅忌

甘草松朮生冷油膩魚腥

腳氣隱痛行步艱難用平胃散加赤麴同煎服最妙

鷄鳴散亦佳。腳氣兩脛腫滿是為壅疾。南方

多見兩足蠱大與疾偕老者初起宜重劑宣通壅

滯或砭惡血而去其重勢後以藥治素問曰畜則

腫熱砭射之也。

足少陰腳氣入腹疼痛上氣喘促欲死八味丸佳陽

衰腎虛有寒之人多此乃腎乘心水尅火最篤。

大凡濕痰濕熱死血流注關節非辛溫之劑開發

諸治大還

醫學近編 卷之十九

腳氣

六

貞白堂

膝理流通隧道使氣行血和焉能得愈須佐以辛

涼毋大熱耳草烏肉桂黃柏蒼朮俱不可少甚者

加附子要在臨用斟酌。

平胃散

見脾胃門

鷄鳴散 治腳氣腫痛不問男女皆可服如人感寒

濕流注腳走痛不可忍筋脉浮腫宜服。

檳榔

七枚 陳皮 去白木瓜 各一兩

吳茱萸

紫蘇葉

各三錢

桔梗

去生薑 和皮各半兩

右咬咀用水三大碗慢火煎

至碗半將粗再煎一碗共一處鷄鳴時服冬月

稍溫作三五次服完以乾物壓下天明去大便見

黑糞水是濕毒下也此原非峻劑。

一膝腫痛不消防生鶴膝風以膝腫如鶴足脛細脉

多弦緊乃三陰經虛寒濕流注為患須用大防風

湯若用尋常攻毒之藥禍不旋踵。

一環跳穴

在膝

及腿根微痛不已外皮如故脉沉數

或滑防生附骨疽乃毒氣附着于骨而成人多悞

為濕熱及至膿成氣血大虧已不可救矣不知鶴

膝風與附骨疽腎虛者多患之因真氣虛弱邪氣

證治大還

醫學近編 卷之十九

腳氣

七

貞白堂

得以淡襲若真氣壯實邪氣焉能為患前人用附

子者以溫補腎氣而又能行藥勢散寒邪也亦有

體虛之人秋夏露臥為冷氣所襲寒熱伏結多成

此症不能轉動乍寒乍熱而無汗按之痛應骨者

是也若經久不消極陰生陽寒化為熱而潰也若

被賊風傷患處不甚熱而洒淅惡寒不時汗出熨

之痛少止須大防風湯及火龍膏治之若失于早

治用寒涼必成廢疾或攣曲偏枯或痿弱不起或

堅硬如石或為石疽日久始潰皮肉俱腐為緩疽

大抵下部道遠非桂附不能下達藥性沉腎主骨而腎以下俱屬腎桂附乃腎經藥也學者不可不知詳見外科發揮腎癱下少壯酒客痰火濕毒盛而不得開活絡丹妙不可拘泥引風入骨之說筋攣痺終兩腿無力不能步履三因勝驗丸

河間曰脚氣由腎虛而生然婦人亦有病脚氣者由血海虛而得與男子腎虛類也男女用藥固無異更當兼七情治之無不効也

嗜酒人患脚氣腫痛實而初起者以巴戟半兩同糯

證治大還

醫學近編 脚氣 八 貞白堂 卷之十九

米炒米熟去米淨加酒蒸大黃一兩爲末熟蜜丸溫水下五七十九仍禁酒脾家酒毒濕痰遇仙丹佳虛者禁用

脚氣生瘡腫痛用漏蘆白欽槐白皮五加皮甘草各七錢半羨蔡子二兩煎湯于無風處淋洗

脚氣跟注一孔深半寸許每下午痛甚乃脚氣下注成漏也以人中白于火上煨中有水出滴入瘡口脚心痛用大聖散二錢入木瓜末一錢豆淋酒調仍用川椒香白芷草烏煎湯洗

大聖散用芍歸參芪麥冬炙草白茯苓香俱養氣血藥也脚心痛多屬電不用尅伐

脚氣內熱鬱甚二便阻塞右開脉數乃足陽明濕熱下注也大黃左經湯主之

脉滿微或弦數腿酸痛似痺屬血虛不能養筋加味四斤丸妙脚氣嘔惡不食痞悶吞酸胃虛有痰先化痰正胃百病皆然

外應散 治脚氣用此薰蒸

石楠葉 矮樟葉 杉片 紫荊皮 藿香

證治大還

醫學近編 脚氣 九 貞白堂 卷之十九

藥本 獨活 大蓼 白芷 紫蘇 羌活 加大椒五十粒葱一握煎水二斗置盆內令病者以足加其上用厚衣蓋覆薰蒸痛處候可下手時令人淋洗

一方用草麻升七粒去殼研蘇合香丸和勻貼脚心即止痛又法用草烏末以麴酒糟搗勻貼患處如無糟薑汁亦可

大防風湯 治三陰之氣不足風邪乘之兩膝作痛久則膝大腿愈細因名曰鶴膝風乃敗症也非此

方不能治痢後腳痛緩弱不能行步或腿膝腫痛

附子一錢 白朮炒 羌活 人參各二錢 川芎一錢五分

防風二錢 甘草二錢 牛膝酒浸一錢 當歸酒拌二錢 黃芪二錢

白芍二錢 杜仲二錢 薑製生地酒拌蒸半日忌鐵 水二鍾薑

三片煎八分空心服愈後尤宜謹攝更服還少丹

或加桂以行地黃之滯若脾胃虛寒之人宜服八

冰丸

火龍膏 治風寒濕毒所襲筋攣骨痛或肢節疼痛

及濕痰流注經絡作痛或不能行走治鶴膝風痛

諸治大還 醫學近編 腳氣 卷之十九 十 貞白堂

尤効

生薑八兩 乳香為末各五錢 麝香為末一錢 真牛皮

膠二兩切碎 先將薑汁并膠鎔化方下乳沒調

勻待少溫下麝即成膏矣攤貼患處更服五積散

如鶴膝風須用大防風湯

大黃左經湯 治四氣流注足陽明經致腰腳腫痛

不可行二便秘或惡食氣喘滿自汗

細辛 茯苓 防己 羌活 大黃煨 甘草炙

前胡 枳殼 厚朴薑汁 黃芩 杏仁去皮尖

薑棗煎水一鍾煎八分食前服

當歸拈痛湯 見腰痛門

開結導引丸 治腳氣飲食不消心下痞悶

白朮 橘紅 澤瀉 茯苓 神曲炒 麥芽炒

半夏炮七次 枳實炒 巴豆霜各三錢五分 青皮五錢

乾薑五錢 蒸餅九棗豆大每服二三十丸白湯下

予按腳氣多屬脾家濕氣鬱積之久痞悶之餘下注

足脛為腫為痛如脉沉緩兼痞悶而大便雖軟不

暢者可用此以運脾下結脉數口乾兼火症者須

諸治大還 醫學近編 腳氣 卷之十九 十二 貞白堂

前除羌活導滯湯以宜之學者固不可執一法于

胸中 蘇州西門外加功外附子末浸酒於作餅上貼湯溫

麻黃左經湯 治風寒濕流注足太陽經腰腳痺痺

關節腫痛增寒壯熱無汗惡汗或自汗惡風頭痛

腳軟等症並皆治之宜于寒令

麻黃 乾葛 細辛 白朮 茯苓 防己

肉桂 羌活各五分 甘草 防風去蘆各三分半 薑棗煎服

半夏左經湯 治少陽經為風寒濕流注發熱腰脇

疼痛頭目眩暈嘔吐不食熱悶煩心腿髀緩縱不

能行步

半夏 乾葛 細辛 白朮 茯苓 麥冬

肉桂 防風 乾薑 黃芩各五分 甘草 甘草

柴胡各三分 薑棗煎服

六物附子湯 治四氣流注于足太陰經骨節煩疼

四肢拘急自汗短氣小便秘手足腫

附子炮 肉桂 防已各一錢 甘草炙五分 白朮七分

茯苓七分 薑三片煎服

局方換腿丸 治足三陰經為四氣所乘發為攣痺

證治大還 醫學近編 腳氣 卷之十九 主 貞白堂

緩縱上攻背脇下注脚膝酸痛足心熱行步艱難

老年足不任地最妙

薏苡 南星 石斛 檳榔 石南葉 草薢

羌活 防風 川牛膝酒洗 木瓜各四兩 黃芪 歸尾

天麻 續斷各一兩 右細末糊丸梧桐子大每服五

十九空心鹽湯下

八味丸 治命門火衰不能上生脾土致脾胃虛弱

飲食少思或食不化日漸瘦及虛勞渴欲飲水腰

重疼痛小腹急痛小便不利及腎氣虛寒臍腹作

痛夜多旋溺脚膝無力肢體倦怠 卽腎氣丸加

肉桂附子各一兩其附子每日用新童便數碗浸

五六日切作四塊再浸數日以草紙包裹水濕火

炮半日去皮臍切作大片以無白星為度凡用俱

照此法每服五十丸空心鹽湯下

虎骨四斤丸 治肝腎氣血不足足膝酸痛步履不

隨如受風濕致脚氣者

虎鹿骨一兩 沒藥另研 乳香各五錢 附子炮去皮尖

肉苁蓉淨洗 川牛膝 木瓜去穢 天麻各一兩 餘為末

證治大還 醫學近編 腳氣 卷之十九 主 貞白堂

將木瓜苁蓉搗如膏加酒糊丸桐子大每服七八

十九空心鹽湯下

三因勝駿丸 治元氣不足為寒濕所襲腰足攣拳

或脚面連指走痛無筋脉不伸行步不隨常服益

氣壯筋骨

附子炮 歸身 天麻 牛膝 木香 棗仁各五錢

乳香半兩 麝香二錢 全蠍炒 沒藥 甘草炙各一錢 木瓜

羌活 防風 右為末用生地三斤無灰酒四升

煮乾杵爛如膏和末杵勻每兩作十丸每嚼一丸 空心酒下

內傷酒食。脾胃營運之氣有虧。不能上升。下注為腳氣。其症心下痞悶。腿腳腫痛。用巴豆等丸。先推逐之。開結導引丸佳。

白朮炒 陳皮炒 澤瀉 茯苓 神麴炒 麥芽炒

半夏鹽製各一兩 枳實炒 巴霜各一錢半 青皮 乾薑各五錢

右為末。湯浸蒸餅丸。桐子大。每服五六丸。或十丸。溫水下。此藥能引水下。行運脾中濁氣。

脾家濕熱壅遏不通。面目手足作痛。導滯通經湯佳。

即五苓散減猪苓。官桂。加木香。陳皮。每服三錢。滾

證治大還 醫學近編 腳氣 西 貞白堂 卷之十九

湯調下。此是末子妙。

診

脈浮弦為虛。濡細為濕。洪數為熱。遲瀯為寒。微滑為虛。堅牢為實。浮表沉裏。沉緊為寒。沉細為濕。入心則恍惚謬妄。嘔吐食不入。眠不安。脈左寸乍大乍小。乍有乍無者不治。入腎則腰腳皆腫。小便不通。呻吟口額黑。衝胸而喘。左尺絕者不治。但見心下急。氣喘不停。或自汗數出。或乍寒乍熱。其脈促而數。嘔吐不止者死。

足跟痛

有痰有濕熱。有陰虛。飲酒人有此。悉屬濕熱。當歸枯痛湯佳。

脈滑。肥人屬濕痰。二陳二妙。加木瓜。有表症作寒熱者。先以五積發之。

瘦人脈數。屬陰虛坎離。加牛膝。

平人腳轉筋。屬肝熱。松節一兩。剉碎乳香一錢。砂鍋中炒焦。研細末。木瓜酒下。

又方。赤蓼莖水酒煎服。外以大蒜磨腳心。桃柳楮

證治大還 醫學近編 腳氣足跟 圭 貞白堂 卷之十九

桑槐五枝。煎湯洗亦佳。外捷法。樟木煎湯浴先

燻。又法。荊條葉燒烟燻湧泉穴。出汗妙。

薛氏醫案。一人每勞。則肢體痛。用清痰理氣藥益甚。

加導濕滋陰轉腫。形體倦怠。內熱盜汗。脈浮大。按

之微細。此陽虛寒。用補中益氣加附子一錢。人參

五錢。腫痛悉愈。又以十全大補百餘劑而康。計服

過人參一十三斤。薑附各斤餘。

瘕癥

瘕者筋脉拘急也。癥者筋脉張縱也。俗謂之瘕是也。

小兒吐瀉之後，脾胃虧損，津液耗散，故筋急而瘕，為

慢驚也。俗不知風乃虛象，因名誤實，反投牛黃抱

龍等祛風藥。天枉者不知其幾。大抵產後血後病

後，癰疽出膿後，氣血津液過傷，不能養筋，而然與

筋惕肉瞤頭振，大抵相同。補養為先。分氣血孰緩

孰急，以治庶有生理。經曰：肝主筋而藏血，蓋肝

氣為陽為火，肝血為陰為水。產後陰血去多，陽火

證治大還

醫學近編

卷之十九

癩瘕癰疽

貞白堂

熾盛筋無所養，故癰瘕癰疽，膿水過多，金瘡出血

過多，及嘔血衄血下血後，或傷寒邪在表，誤發其

汗，或虛弱人，誤汗誤下，氣血津液受虧，而致此者，

輕則加味逍遙散，或八珍散，加丹皮鈎藤以生陰

血，則陽火自退，諸症自愈。不應，四君子加芎歸丹

皮鈎藤以補脾土。蓋血生于至陰，至陰者脾土也。

故小兒慢驚，當大補脾土為急。若陽氣脫陷者，補

中益氣加薑桂。陽氣虛敗者，十全大補加桂附，亦

有復生者。然筋抽搐頭掉，肢體惡寒，脉微細人皆

知為虛也。是為真象。至于脉大發熱，煩渴，是為假

象。嗚呼！粗工不知而誤認，有餘復瀉之者多矣。若

抽搐，戴眼反折，汗綴如珠，俱不治。

加味逍遙散。

四君子湯。

補中益氣湯。

十全大補湯。

俱見產門。

證治大還

醫學近編

卷之十九

癩瘕癰疽

貞白堂

學 謂手足拘攣而不和也

內經言學皆屬肝主身之筋故也有熱有寒有虛有實

熱學者經所謂肝氣熱則筋膜乾筋膜乾則筋急而攣又曰因于濕首如裹濕熱不攘大筋攣短小筋弛長經短為拘弛長為痿是也筋膜乾者生地當歸之屬濡之犬筋經短者薏仁散主之暴感寒則筋攣拳骨痛發表兼和血五積之類經曰虛邪搏于筋則筋攣又云脉弗榮則筋急仲景曰血虛

經治大遺

醫學近編

脚氣學

卷之十九

頁白雲

則筋急四物增減實學者濕熱挾痰鬱于四肢大便秘結即痛風初起症也分表裏治如戴人用煨腎散上吐下瀉而愈東垣法用桂枝甘草以却其寒邪而緩其急植黃柏之苦寒滑瀉實而潤急救腎水用升麻葛根以升陽氣人參補元氣為輔佐當歸去裏急而和血潤燥名曰活血通經湯更暖室中近火按摩為佳

陳之症多由腸內有積而清氣不升如痢疾急後重而下脫也治當從帶下門先推去積滯然後升補積滯去而清氣自升不復脫下其或因下血及痢疾之後脫而不收者為虛升補之藥看氣血孰重脫之已久當以澀劑收之腸胃有風脫而下血者以風藥舉之脫久亦有虛寒者當溫藥微洗內服大補之劑

丹溪曰有氣虛氣熱血虛血熱氣熱者條芩升麻一為末麵糊為丸服一其症肛脫紅腫者是也氣虛者參芪升麻或加白朮訶子有熱加條芩其症多于勞倦房慾而發者也血熱者四物湯加炒黃柏其症多于好酒及辛辣之物而發及便血也血虛者四物湯加升麻荆芥其症下血過多而色痿黃者是也

經治大遺

醫學近編

脫肛

卷之十九

頁白雲

下痢脫肛 痢門參治

截腸病 其症大腸頭出痛苦乾又落落又出腸盡則死初出寸餘時治之以芝麻油一盞以聲坐之

飲大麻子汁數升愈。

脫肛之症。前人以爲肺氣虛寒。蓋肺與大腸爲表裡。

肺藏蘊熱。則閉結。虛寒則脫。婦人有此疾者。多由

產育用力過多。小兒有此疾。皆因久痢。大腸虛冷

所爲也。有腸頭作痒者。此係腸中有虫。

黃桂峰云。親見一人。裡急後重。肛脫紅腫。百藥皆試。

乃有虫在肛故也。

濟世方。治男女脫肛。用五倍子。小便煎濃。洗之。

聖惠方。治脫肛不收。蝸牛燒灰。豬脂調敷之。

證治大還

醫學近編

脫肛

二

貞白堂

砂仁湯 治大腸虛脫肛挾熱紅腫者。

砂仁 黃連 木賊 等分爲末。每服二錢。米飲

下。

支蛤散 大腸虛寒。肛門脫出不收。或用力太過。及

小兒叫呼。久痢後重者。五倍子爲末。水煎汁浸

洗。更用白礬蛇床子尤佳。後用赤石脂爲末。少許

摻在芭蕉葉上。頻用托入。或有脫出尺許者。亦用

此湯溫浸。頻換藥水。以縮爲度。

倍榆散 治小兒脫肛

五倍子 地榆分爲末每五分或一錢。米飲調下。

治老人脫肛 防風蘆 蒼朮 黃柏 五倍子

煎湯薰洗。內服清涼大腸之藥而愈。

治脫肛下血 韭菜一大握。搗碎。瓦罐煎熟。再用生

韭菜汁。冲在湯內。將肛門坐在瓶口。薰一二次。神

妙。

槐角丸 五種腸風下血。痔漏脫肛並治。

槐角三兩 地榆 黃芩 當歸 防風 枳殼炒

兩 右酒糊丸。梧子大。每七十九丸。空心米飲下。

證治大還

醫學近編

脫肛

三

貞白堂

涼血清腸散

生地 當歸 芍藥各一錢 防風 升麻 荆芥

各一錢 黃芩炒 黃連 香附炒 川芎各八分 甘草五分

水煎服。

秦艽湯 治腸胃濕熱。及有風而脫肛不收。

秦艽去蘆酒炒七錢 水煎。空心服。服後安臥一時。查再煎

補中益氣湯 治勞倦脫肛效。

二靈散 治久痢腸胃俱虛。肛門脫下。

龍骨煅五錢 木賊燒存性二錢半 爲末。搽上托之。

黑聖散 治瀉多時脫肛疼痛

大蜘蛛一枚 瓠葉重裹線札定合于內燒存性研入

黃丹少許同研凡有上件疾即先用白礬葱椒湯

洗拭乾後搽藥以手托上

千金方 治脫肛歷年不愈

鰾頭一枚燒令烟盡爲末付上手按按之

丹溪方 治脫肛 葫荻燒烟薰之立入

海上方 諸般痔脫肛

死蛇一條如指大濕者掘地坑燒之有孔板子

證治大選

醫學近編

脫肛

四

貞白堂

蓋之坐其上以肛受烟薰之烟盡爲止大效

濟世方 治肛出

皂角薰次用蛭蚰一條入蜜浸去蛭蚰將蜜調土

硃付上即入

一女子脫肛用糯米一勺濃煎飲去米洗肛溫柔先

以磚一片火燒通紅用醋沃濕以青布鋪磚上坐

肛于青布上如太熱加布令厚其肛煖自收入

治肛門腫痛 木别子去壳取油四五枚研如泥入

水盥中以滾湯泡之乘熱洗另用少許爲末付上

肛門腫痒 杏仁搗膏敷上亦治穀道痛蝕

外臺秘要治下部虫齧 桃葉一斛蒸之令極熱納

小口器中以下部坐上受熏其虫盡死

脉經云愿蝕陰脫其脉虛小者生緊急者死余見怯

咳嗽之人穀口腫

痛不旬日即死腸內熱

證治大選

醫學近編

脫肛

五

貞白堂

雲間陳 治三農甫述

三韓張載齡弘度甫開

癘風

薛新甫曰大抵此症多由勞傷氣血腠理不密或醉飽房勞沐浴或登山涉水外邪所乘衛氣相搏濕熱相火血隨火化而致故淮揚閩廣間多患之眉毛先落者毒在肺面發紫泡者毒在肝脚氣先痛或穿者毒在腎偏身如癱者毒在脾目先損者毒

證治大要

醫學近編 癘風 卷之二十

真白堂

在心此五臟受病之重者也一曰皮死麻木不仁二曰肉死針刺不痛三曰血死潰爛四曰筋死脂脫五曰骨死鼻柱壞此五臟受傷不可治也若聲啞目盲尤為難治治當辨本證兼證變證類證陰陽虛實而斟酌焉若妄投燥熱之劑膿水淋漓則肝血愈燥風熱愈熾腎水愈枯相火愈旺反成壞矣

活法機要云先樨皮散從少至多服五七日灸承漿穴七壯灸瘡愈再灸再愈三灸之後服二聖散

熱祛血之風邪戒房室三年病愈此先治其衛後

治其榮也試效方治段庫使用補氣鴻榮湯此治

榮多于治衛也丹溪云須分在上在下在上者以

醉仙散取臭惡血於齒縫中出在下者以通天再

造散取惡物蛭虫於穀道中出所出雖有上下道

路之異然皆不外于陽明一經而已看其疙瘩上

先見在上體多者病在上也下先見在下體多者

病在下也上下同得者病在上復在下也再造

散治其病在陰者用皂角刺出風毒於榮血中肝

證治大要

醫學近編 癘風 卷之二十

二

真白堂

主血惡血留止屬肝也蟲亦生于厥陰風木所化必用是治其臟氣殺蟲為主以大黄引入腸胃榮血之分利出瘀血蟲物醉僂散治其病在陽者用鼠粘子出風毒偏身惡瘡胡麻逐風補肺潤皮膚蒺藜主惡血身體風痒通鼻氣防風治諸風括萎根治瘀血消熱肘腫枸杞消風熱散瘡毒蔓荊子主賊風苦參治熱毒風皮膚煩燥生瘡赤癩眉脫八味藥治功固至矣然必銀粉為使銀粉乃是下膈通大腸之要劑所以用其驅諸藥入陽明經開

其風熱怫鬱病隔，遂出惡風臭物之毒，殺所生之蟲，循經上行，至牙齒輒薄之分，而出其臭毒之涎水。服此藥，若有傷于齒，則以黃連汁搗之，或先固濟，以解銀粉之毒。銀粉在醉仙散有奪旗斬將之功，遂成此方之妙用。并他方可企及，故丹溪取二分分用之，如破敵之先鋒。至于餘邪未除者，但調和榮衛藥中，少加驅逐之劑爾。

本證治法

癰瘍所患，非止一臟，然其氣血無有弗傷，兼症無有弗雜。况積歲而發，現于外，須分經絡

證治大還

醫學近編

癰風

三

貞白堂

之上下，病勢之虛實，不可輕施攻毒之藥。當先助壯胃氣，使根本堅固，而後治其瘡可也。癰瘍當知有變有類之不同，而治法有汗，有下，有砭刺，攻補之不一。蓋兼症當審輕重，變症當察先後。類症當詳真偽，而汗下砭刺攻補之法，又當量其人之虛實，究其病之源委，而施治焉。蓋虛者，形氣虛也。實者，病氣實，而形氣則虛也。癰瘍砭刺之法，于和張先生謂一汗抵千針，蓋以砭血不如發汗之周備也。然發汗即出血，出血即發汗，二者一律。若

惡血鬱滯，在肌膚經絡者，宜汗宜刺，取毒中出血。則毒若惡毒，雖結于臟，非蕩滌其肉，則不能差。若毒在外者，非砭刺偏身患處，及兩臂腿腕兩手足指縫，各出血，其毒必不能散。若表裏俱受毒者，非外砭內泄，其毒決不能退。若上體患多，宜用醉仙散，取其內蓄惡血于齒縫中出，及刺手指縫，并臂腕，以去肌表毒血。下體患多，宜用再造散，令惡血陳于穀道中出，仍針足指縫，并腿腕，隔一二日更刺之，以血赤為度。如有寒熱頭疼等症，當大補

證治大還

醫學近編

癰風

四

貞白堂

血氣。癰瘍服輕粉之劑，若腹痛去後，兼有膿穢之物，不可用藥止之。若口舌腫痛，穢水時流，作渴發熱喜冷，此為上焦熱毒，宜用瀉黃散。若寒熱往來，宜用小柴胡湯。加知母。若口齒縫出血，發熱而大便秘結，此為熱毒內淫，宜用黃連解毒湯。若大便調和，用濟生犀角地黃湯。若穢水雖盡，口舌不愈，或發熱作渴，而不飲冷，此為虛熱也，宜用七味白朮散。癰瘍手足或腿臂，或各指拳攣者，由陰火熾盛，虧損氣血，當用加味逍遙散，加生地黃，及

換服散藥服 癰瘍生蟲者五方風邪令合相火
 制金木盛所化內食五臟而證見于外也宜用升
 麻湯送瀉青丸或辟皮散以清肝肺之邪外炙和
 漿以疏陽明任脈則風熱息而蟲不生矣肝經虛
 熱者佐以加味逍遙散六味地黃丸
 一貧婦無雜食用醉仙法外又服百餘貼加減四物
 湯半年之上月經行十分安愈
 加減大造苦參丸 治大風癢及諸瘡赤白癩風
 苦參一斤 白芷兩 胡麻半升 防風 荆芥 蒼耳子
 謹治太還 醫學近編 癩風 五 貞白堂
 皂角刺 各十 蔓荊子 牛旁子 黃荊子
 枸杞子 何首烏 禹餘糧 蛇床子 各三兩
 右為細末皂角搗爛熬膏和丸桐子大每服五十
 丸茶下
 醉僊散 須量人大小虛實用之症候重而急者須
 先以再造散下之候補得氣壯乃投此藥須斷厚
 味鹽醋椒果煎炒燒炙等物止食淡物淡粥及煮
 淡熟菜茄子亦忌或烏梢白花蛇以淡酒煮熟食
 之以助藥力也

胡麻子 牛旁子 蔓荊子 枸杞子 四味俱炒
 兩 白茯苓 瓜蒌根 苦參 防風 各五錢
 右為細末每一兩入輕粉一錢伴勻每服一錢茶
 清調晨午夕各一服服後五七日先於牙縫內出
 臭涎渾身痛昏痛悶如醉後利下惡物臭積為效
 通天再造散
 鬱金 半兩 皂角刺 一兩獨生 大黃兩 白丑 頭末
 半熟 右為末每服五錢日未出時以無灰酒
 調面東服之當日必利下惡物或臭膿或蟲如蟲
 謹治太還 醫學近編 癩風 六 貞白堂
 口黑色乃是年深者赤色是近日者數日後進一
 服無蟲積乃止
 愈風丹 治癰疾手足麻木毛落眉脫遍身瘡疹皮
 膚瘙癢爬之成瘡及一切疥癬風積皆效
 苦參一斤切取 土蝮蛇一條酒浸 烏梢蛇
 白花蛇 如上製 各一條
 右為末先以皂角一斤剉碎無灰酒浸一宿去酒
 以新汲水揉取濃汁去渣銀石器內熬膏和前丸
 桐子大每服六七十丸煎防風通聖散下以粥壓

之虛者煎玉屏風散下日三服三日一浴以大汗出為應三浴乃安

浴法 用桃柳桑槐楮五枝濃煎湯大缸坐沒頸一日湯如油為效

又法 紫背浮萍煎湯浸妙

一方荆芥大黃梔子鬱金地黃杜仲防風二活白蒺藜等分為末以大楓油入熟蜜丸桐子大每服茶清下四五十丸一日二服須守戒三五年日誦觀音千萬聲以攝其心禁忌乃安

證治大還

醫學近編

癩風

七

貞白堂

一法苦參五斤好酒三斗漬一月每服一合日二服

常與不絕覺脾既安為末服之亦良尤治癰疹陶

隱居以酒浸飲治惡瘡久服輕身日華子以為殺

蟲本草除伏熱養肝膽氣子嘗以蒼耳葉為君以

此物為佐更以酒煮烏鰻魚代蛇細研糊丸桐子

大每服五六十丸加至七八十丸熱茶清下日三

服一二月而安入紫萍尤捷紫萍多水蛭須寒月

於山沼取之淨洗去泥略蒸透乾用

一法治手指彎曲節間痛甚至漸落用草麻子去殼

黃連拌如豌豆大各一兩水一升小瓶浸春夏三秋冬五日取麻脈破平旦面東以浸藥水服一粒漸加至四五粒微利不妨忌豬肉魚腥宜茹淡果驗已上皆丹溪法

一法先服防風通聖散大瀉惡毒穢積又用三稜針看肉黑處及委中紫脈刺出血不可令出太多恐損真氣後服神仙紫花丸

防風五錢連翹三錢川芎五錢白芍三錢當歸三錢酒浸各

薄荷二錢荊芥穗五錢麻黃三錢炮梔子三錢桔梗五錢

證治大還

醫學近編

癩風

八

貞白堂

枳殼去穢石膏各五錢甘草五錢滑石各三錢黃芩各三錢

柴胡五錢黃連五錢黃柏三錢生地三錢酒浸熟地三錢牛

羌活五錢芒硝一兩錦紋大黃六兩皂角刺一兩獨生者去尖

右細切分八服每服用水碗半煎至一碗空心服

日進二服五六日久進二服待補養元又行二次

然後服後丸

神仙紫花丸 治癰風及諸般惡瘡風瘡甚效如神

但要藥真無不效者

白花蛇一兩具真州者去頭尾各四五寸約有兩段取中段兩半新鮮不蛀者良

何首烏 荆芥穗 葦靈仙各四錢 麻黃連相節一錢

胡麻子一錢 蛇床子二錢

右六味同蛇用無灰酒一大碗浸一宿去蛇床子

通晒乾仍入原酒內再浸再晒酒盡爲度晒乾極

細爲末另包。

木香 沈香各二錢半 人參一兩 當歸七錢 胡麻

猪牙皂角各五錢 麝錢半 鼻塞錢半 乳香錢半 沒藥各一錢

明雄黃 辰砂各五分 肉豆蔻一枚 定風草二錢

即天還瞳子即草

證治大選 醫學近編 癰疽 九 貞白堂 卷之二十

右麝並雄黃五味另研極細不見火其餘藥另研

爲末合一處另包。

防風去蘆 羌活 甘草 細辛 蒼朮酒浸 川芎

獨活 白芍 枇杷葉去節 白蒺藜 金銀花

五加皮 香白芷 苦參各五錢 胡麻子 白附子

米泔麻黃 川牛膝 草烏頭米泔 川烏頭同上

石菖蒲各二錢半 右爲末另包

總合法用大楓子三斤新鮮者發油黃色不用去殼

以磁罐一個盛之入無灰酒以皮紙箬葉重重封

固勿令氣泄頻滾湯中勿令沒確口外以盆覆鍋

文武火蒸黑爛爲度杵成泥分作三分每一分入

第二號藥八錢第一號藥六錢第三號藥一兩五

錢和勻加糯米飯搗極膠粘丸如桐子大晒乾勿

見火每服二十九漸加至五六十雞鳴時午餉

臨臥各一服茶清送下忌房勞鹹酸酒醋醃糟猪

羊雞魚鱸馬肉煎炒水果五辛薑椒大料辛辣熱

物蕎麥菜豆之類若不思口斷慾則藥無功雖愈

再發其餘肉味病愈後一年可食但猪羊雞肉終

證治大選 醫學近編 癰疽 十 貞白堂 卷之二十

身忌用此法乃治癰之神方也不可輕忽。

風起于八方應其時則物生違其時則殺物人之稟

受有殺氣者則感而受之如持虛受物後又因起

居飲食男女游成鬱氣二氣聚于厥躬先受之

則爲濕病濕病之久火氣出焉火氣滋漫氣濁血

汚伏鬱生蟲以次傳歷臟腑必死之病而有可救

之理其始病者胃氣微傷脾主肌肉流行甚緩傳

變以漸尚可藉藥之功而免謂之必死非惟醫不

知藥悉是不知禁忌可哀也太近見粗工用藥佐

以大楓子油。殊不知此藥熱有燥痰之功而傷血。病未痊而先失明也。宋洞虛大風有五不治餘皆。可救。黑色多凶。蟲食。唇眉落。食。鼻。鼻。啞。食。心。足底穿。膝。腫。食。耳。鳴。啞。耳。生。瘡。或。痺。或。痛。如針刺狀。食身則皮痒。如蟲行。自頭面來為順風。自足心起者為逆風。由濕熱之毒。汚結而成。先以再造散下之。稀粥調理。勿妄動作。後以醉仙散中間。或吐或利。不必怕怯。但腮喉頭面腫。腫吞不得。下。漩。出。惡。水。或。齒。縫。中。出。臭。水。血。絲。或。言。不。得。諸治大風

諸治大風

醫學近編

癰風

土

貞白堂

崩壞服此不踰月驗

黑花蛇

白花蛇

皆斬黃來者俱酒浸一宿去頭尾

地盤法土各三兩

當歸

細辛

白芷

各一兩

天麻

蔓荊子

威靈仙

荊芥穗

甘菊花

苦參

紫參

沙參

木賊

不灰木

炙甘草

白蒺藜

天門冬

定風草

何首烏

石菖蒲

胡麻子

炒赤芍

草烏頭

去皮尖

蒼朮

米泔浸

川芎

木鱉子肉

各一兩

右為細末。每服五錢。溫酒調下。

一法用白花蛇一條。先蒸糯米一斗。缸底先放麵。次將蛇。以絹袋盛之。放麵上。後鋪飯在袋上。用紙封缸口。候三七開。取酒澄淨。罈中將蛇去骨焙乾。為末。每服溫酒一盞。蛇末少許服之。仍以酒脚等糟。做餅食之。

蒼耳草苦參治大風之熱有效。

用蒼耳草。于五月五月六月六日五更時。帶露採。

諸治大風

醫學近編

癰風

土

貞白堂

搗汁。熬膏作錠子。取一斤半重。鯉魚一尾。剖開連肚腸入藥在內。以線縫之。用酒二碗。慢火煮乾。為度。令患人吃盡。魚不過四五尾。即愈。忌鹽百日。輕者疎風解熱。二聖散佳。

大黃

五錢

皂角刺

三錢

燒灰

先將皂角刺一二個燒灰。研細。用大黃半兩煎湯。調下二錢。早服。樺皮散中以升麻湯下。瀉青丸。晚服。二聖散。

柏葉湯。用東南枝上柏葉一秤。水一桶。煎三沸。去

杏、薤白、旋花、熬、蜜、沙、調服。初服甚苦，滿三五日後，甜。十日四肢沈重，便赤白痢。一月後發出瘡，死瘡破，用烏龍散搽之。

烏龍散

烏龍尾

即倒手灰

烏雞子皮

梓皮散

治肺壅風遍身癢疹

荆芥穗

二兩

枳殼

梓皮

各四兩

甘草

炙半兩

杏仁

研一兩去皮尖水煮另研一碗水減半為度

右為末每服二錢

食後溫酒調下

證治大還

醫學近編

瘧風

主

真白堂

凌霄散

治癩風神效

蟬殼

地龍

炒

僵蚕

全蝎

各七個炒

凌霄花

半兩

右為末每服二錢

熱酒調下無時於浴室中蹲藥湯中一時許服藥妙

祛風丸

治疥久成癩

黃芪

枳殼

防風

芍藥

甘草

熟地

地骨皮

枸杞子

生地

右九味為末煉蜜為丸桐子大白湯下五十丸

袖珍方

嫩蒼耳、荷葉、各等分為末每服二錢溫酒下。本草云治風熱大效。

風癢癢疹身癢不止蒼耳莖葉子等分為末每服二錢豆淋酒下。

錢豆淋酒下。

月落且痒或周身痒乃血熱之極宜出血毒後服補氣瀉榮湯。

氣瀉榮湯。

大風神方

苦參

三斤

羌活

各四兩

獨活

各四兩

當歸

半斤

白蒺藜

各四兩

皂角刺

煨灰存性半斤

天花粉

何首烏

四兩

證治大還

醫學近編

瘧風

主

真白堂

共為末聽用。

另以皂角五斤切碎溫水浸五日去查砂鍋熬成膏和上丸桐子大每百丸空心酒下。

補氣瀉榮湯。

補氣瀉榮東垣治癰之妙旨也衛氣虛邪襲故用參芪甘草以補氣榮血壞而為癰故亟蠱水蛭桃

仁蘇木以消瘀全蝎地龍引至諸風濕結聚之處

內有麝取其利開竅升麻連翹桔梗取其入氣而

解其熱芩入臟而清其氣歸地入血而調新若用

子 49-449

桐淚者性溫味甘又能殺蟲癰除頑腫

經驗方

消風散 第一日服

香白芷 全蝎 人參 各一兩

右為細末先一日午時吃蔬粥忌葷蒜辛熱晚間不用飲食次日空心酒調下覺身漸潰為妙

通風散 第二日服

大黃 錦紋者佳 鬱金 小者一兩 皂角 剉兩

右為末初服六錢或七錢大楓油錢半淨朴硝少

證治大要

醫學近編 癰疽 卷之二十

主

真白堂

許入內好酒一碗調化空心溫服至待凝時又如

前調一服入熟物少許令患人知先以水與患

人盥漱淨然後服藥必以蜜解口忌人不可與患

者同坐臥良久腹中痛為妙候瀉十數次以薄粥

補之中年以後不治少壯者可治體質者十日三

服 初一日服消風散 初二日服追風散 初

三日服磨風丸弱者十日內一次強者十日內三

次須記定日數不可漏亂

磨風丸 第三日服日進二次

川芎 獨活 川芎 天麻 細辛

防風 荆芥 葶藶仙 麻黃 何首烏

石京子 牛蒡子 車前子 雞地草 即地松

蒼耳子 各一兩

共為末酒煮麴糊丸桐子大每服三十九食前溫

酒下服後煎藥薰洗

洗藥

地骨皮 荆芥 苦參 細辛 各四兩

水煎先薰後洗遍身出血為效如洗務要湯寬浸

證治大要

醫學近編 癰疽 卷之二十

去

真白堂

洗良久乃佳

敷藥 第四日治身大爛遍身塗之

黑狗脊二兩 若無以杜仲代之 硫黃 寒水石

白礬 格各二兩 蛇床子 一兩 朴硝 少許

右為細末豬脂油或香油調敷不爛不必敷

破傷

身體偶有微傷或風從瘡口入名破傷風多死最急症也其症身體抽搐口噤自汗身熱如火執急非常藥可治者必以防風全蝎為主口不能開用十個為末酒調下破傷風汚血凝心鴉翎燒灰存性研末細酒調下一錢

已汗而身熱不清用瓜蒌錢九滑石南星蒼朮

赤芍陳皮錢一黃柏炒黃芩白芷五錢甘草

薑一片煎服

證治大還

醫學近編 破傷 卷之二十 貞白堂

防風湯 治破傷風同傷寒未傳入裏宜急服

防風羌活獨活川芎各等分水煎不時服

甚者加葉本細辛或調蜈蚣散大效

蜈蚣散

蜈蚣一錢江鰮五錢左盤龍五錢為末每服二錢

用防風湯調下如前藥解不已覺轉入裏當服左

盤龍丸服之看臟腑軟硬加巴豆霜

左盤龍丸 治風毒在裏直視

左盤龍 殭蚕炒江鰮炒雄黃錢一為末燒餅

丸桐子大每服十丸酒下如裏不減將末一半入巴豆霜五分如前丸每左盤龍一服加一丸漸加至利為度如拘不止再服羌活湯

羌活湯

羌活獨活地榆防風各二錢水煎服如熱

加黃芩有痰加半夏

若病久氣血漸虛脾胃受邪宜養脾祛邪為主

養血當歸地黃湯

四物湯加葉本細辛防風白芷水煎服

證治大還

醫學近編 破傷 卷之二十 貞白堂

如汗不止或服發散藥後不止服白朮防風湯即二

味加黃芪是也

破傷臟腑秘小便赤用表藥汗不休宜速下二先用

用芍黃湯不已用大芍黃湯

芍黃湯

川芎三錢黃芩二錢甘草一錢溫服

大芍黃湯

川芎二錢羌活黃芩大黃各五錢煎服取利為度

羌活湯 治半在表半在裏者

羌活 川芎 菊花 麻黃 白茯苓 防風

石膏 前胡 黃芩 細辛 甘草 枳殼

薄荷 白芷 蔓荊子 水煎通口服

白朮散 治破傷風大汗不止筋攣摘搦

白朮 葛根 芍藥 升麻 黃芩 甘草

水煎溫服 治破傷風及金瘡冒風

玉真散 治破傷風及金瘡冒風

天南星 防風 等 爲末破傷風以藥敷瘡口

後以溫酒調下一錢如牙關緊急角弓反張以二

證治大遠 醫學近編 破傷 三 貞白堂 卷之二十

錢調下毆打欲死內損以溫酒下如已昏絕心口

尚溫者童便灌下二錢連進二服然南星爲防風

所製服之不麻衛生寶鑑名定風散治風狗咬破

先以口噙漿洗淨用綿乾貼再不發

如聖散 治破傷風止血定痛

蒼朮 六兩 川烏頭 炮去皮 防風 草烏頭 炮去皮

細辛 各二兩 兩頭尖 炮去皮 天麻 川芎

白芷 各兩 損骨加乳香

右爲細末每服一錢酒調下

經驗方 治破傷風極效

初覺有風腫急取熟糞堆內蟻螞蟥二個用手拍

住待蟲口中吐些小水就抹在破傷處身痒稍厚

衣裳待片時瘡口覺麻兩脇微汗風出立效

如風緊急速取此蟲三五個剪去尾將肚內黃水

塗瘡口再滴些水入熱酒內飲之汗出立效

四惡症不可治一頭目青黑二額上汗珠不流三眼

小目瞪四出汗如油又痛不在瘡處者傷經絡死

症也

證治大遠 醫學近編 破傷 四 貞白堂 卷之二十

外治初覺瘡腫起白痢身寒熱急用玉真散傳之或

用杏仁去皮細嚼和雄黃飛羅麴傳之腫消爲度

若腰脊反張四肢強直牙緊口噤用鼠一頭和尾燒

灰細研臘猪脂和傳

牙關緊不能開用蜈蚣一條焙乾擦牙吐涎立愈

狗咬破傷風人參不拘多少桑火上燒烟盡用蓋

子合研爲末摻瘡上仍以魚鰾煨封固

跌撲損傷

肢體全仗血氣。傷損必加補養。最忌惡血。一絲攻心。卽斃。初治消瘀和血爲急。在上先消瘀血。在下先補養。更審胃氣。去血過多。脉微欲死。獨參湯加童便服。接住元氣再處。大法傷損及金瘡去血過多。與產婦同。脉來和緩者生。急疾扎者死。宜虛細不宜數實。

氣血凝滯。肌肉傷損則腫。或紫或青。痛不可忍。宜活血行氣。乳香沒藥歸芍紅花蘇木爲主。乳沒通滯。

證治大還

醫學近編

跌撲

真白堂

血傷損疼痛。皆以酒化服。血滯則氣塞。瘀則經絡滿。經絡滿故痛。且腫。導而行之。則痛腫消矣。

自然銅爲接骨要藥。性散而燥。須佐補氣血藥。不可多服。逐瘀血。須分輕重。輕者芍歸桃仁紅花蘇木赤芍酒水煎。加童便服。甚者加大黃芒硝。

打撲跌傷。內損經絡。吐血不止。童便調白芨末服。

折傷最忌者。惡血攻心。與破傷風二症。凡血上逆者。

卽以逐瘀爲急。口噤牙關緊。卽是胃風。切須仔細。

慎之慎之。傷損着寒。痛不可忍。用葱杵爛入鹽。

少許。炒熱。卷上。其痛立止。冷則溫之。昔一人傷指。甲裂。痛不可忍。用葱炮灰火中劈破。取其間有涕者。卷痛處。續續換之。遂止。

惡血上攻。韭汁和童便飲半盞。佳。

又法。出血不止。薑汁香油各四兩。酒調服之。

傷骨出血。用益元散人參湯調服。外用生薑自然汁。

一盞米醋。一盞獨核肥皂。四個敲碎。接薑汁米醋。

中。紗片摵過去。查入牛皮膠煎成膏藥貼之。

接骨散

證治大還

醫學近編

跌撲

真白堂

沒藥 乳香 各五錢 自然銅 一兩 碎滑石 一兩 龍骨 三錢

赤石脂 三錢 麝香 一錢 另研 爲末 好醋浸洗 煮乾 就焙

燥。入麝香。每以一茶匙。抄舌上。溫酒下。分上下。

爲食前後。如骨已接。去龍骨赤石脂。

又方

冬瓜皮 阿膠 等分 炒乾爲末。以酒調下。

加味芎歸湯 治打撲傷損。敗血流入胃脘。嘔黑血。

如豆汁。

當歸 白芍 芎藭 荆芥穗 百合 水浸半日 各等分

加酒煎服。

紫金散 治打撲傷折內損肺肝嘔血不止或有瘀血停積於內心腹脹。

紫金藤皮二兩降真香 續斷 補骨脂 無名異

琥珀研 蒲黃 牛膝 沒當歸 桃仁 去皮尖 各一兩

大黃 紙煨 朴硝 另研各 兩五錢

右爲末每服二錢濃煎蘇木當歸酒下連進二服妙利去惡血。

復元活血湯 治從高墜下惡血留于腸胃兩脇痛

證治大還 醫學近編 跌撲 三 貞白堂 卷之二十 二方

不可忍。

柴胡 花粉 當歸 紅花 甘草 大黃

桃仁 研 川山甲 酒水煎服以利爲度

當歸導滯湯 治瘀血脹悶

大黃 一兩 當歸 錢半 麝香 少許

右爲末每服三錢熱酒下

雞鳴散 治同上

熟大黃 一兩 當歸尾 五錢 桃仁 七粒

右爲末酒一碗雞鳴時煎服利下惡物爲愈

從高墜下一切損傷氣欲絕不能言急以熱小便灌之即醒。

奪命丹 治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血

凝積心腹疼痛二便不通。

大黃 黑牽牛 各二兩 紅蛭 用石灰慢火炒 今乾黃色半兩

共爲末每服三錢熱酒調下如人行四五里再用熱酒下牽牛末二錢催下惡物爲佳。

花蕊石散 治一切金刃所傷打撲傷損身體出血

者急于傷處搽藥其血自化爲黃水如有內損血

證治大還 醫學近編 跌撲 四 貞白堂 卷之二十 二方

入臟腑熱酒童便入酒少許調一錢服立效若牛

觸腸出不損者急送入用細絲桑白皮尖緝爲線

縫合肚皮縫上搽藥立活如無桑白皮用生麻縷

亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液

潤之後搽藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死

腹中胎衣不下並用童子小便調服

硫黃 上色明淨者四兩 花蕊石 一兩 同上

右二件和勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦礫子一個

候泥乾入藥在內用泥封口候乾安在四方磚石

上書八日行字用炭一秤籠疊周匝自巳午時
從下管入漸漸上較直至經宿火冷炭銷又放經
宿待冷取出細研以細絹羅了羅極細磁盒內盛
依前法用

沒藥降聖丹 治打撲閃肭筋斷骨折鑿急痛腫不
能屈伸及榮衛虛弱外受風邪內傷經絡筋骨緩
縱皮內刺痛肩背拘急

川烏頭生去皮 骨碎補去毛 白芍 沒藥 乳香另研
自然銅火煅醋淬十二次 當歸洗焙各一錢 生地

證治大還

醫學近編 跌撲 卷之二十 五 貞白堂

川芎各半錢 共為末生薑自然汁和蜜丸每一丸
二錢五分每用一丸槌碎水酒各半盞蘇木少許
同煎去蘇木熱服

內傷筋骨疼不可忍

沒藥 乳香 芍藥 川芎 川椒去目及開口者
當歸各半兩 自然銅三錢半炭火燒

右為末黃蠟二兩溶化入藥末不住手攪勻丸彈
子大每服一九好酒煎乘熱服之連進二服

乳香定痛散 治打撲傷損落馬墜車一切痛腫

乳香 沒藥 川芎 白芷 芍藥 甘草
生地 牡丹皮

右為末每服二錢溫酒並童便調下

沒藥乳香散

白朮製五錢 當歸焙 白芷 沒藥另研 肉桂去皮 乳香另研
甘草炒各一兩 為末每服二錢溫酒調下

經驗方 治打撲傷損服之自頂心尋病至下兩手

遍身遇受病處則蜩蟬有聲覺藥力習習往來則
愈矣

證治大還

醫學近編 跌撲 卷之二十 六 貞白堂

乳香 沒藥 蘇木 降真香 松明節

川烏去皮 自然銅火煅醋沒七次各一兩 龍骨半兩

地龍半兩 水蛭油炒 血竭三錢 土狗十個油浸焙
貼 右為末每服五錢無灰酒調下隨上下進藥

又方 狗絲薑研爛取汁酒煎服渣傳患處

接骨散 並治惡瘡

金頭蜈蚣一個 金色自然銅半兩燒紅 乳香一錢

銅錢重半兩者或二文或三文 金絲水蛭錢半每個作

去氣道 右為末如瘡腫處津調半錢塗之即止

痛如見膿。先用粗藥末少許麻油小半匙同打勻。再入半匙再打勻。又用前藥接骨散半錢以釵腳打成膏子。用雞翎掃在瘡上瘡處立止痛。天明一宿自破。

如打破骨頭并損傷。可用前項接骨散半錢加馬兜鈴末半錢同好酒一盞熬調連渣溫服。如骨折損以接定不疼。未折但痛服後即止神效。

神聖接骨丹 治同上

水蛭用糯米于砂鍋內炒黃三錢 鬼絲子 好綿灰 髮灰

證治大遠

醫學近編 跌撲 七 貞白堂 卷之二十

沒藥 乳香 血竭 各一錢 半兩錢一文燒七次醋

射香一錢 另研

右研勻。每服三錢。熱酒調下。隨上下食前後用。約人行六七里。聞骨作聲。忌聽鐘鼓聲。柳砧聲。恐震動生蘆節。忌鹽肉。一服見效。

續股散 治折傷筋骨

半兩錢七個。以桑柴火燒紅。好醋淬之。取錢上碎末。再入珍珠末一分。乳香沒藥少許。同研極細。酒調下。

止痛散

黃麻燒灰 二兩 頭髮燒灰 一兩 乳香五錢

右為末。每服三錢。溫酒調下。

茴香酒 治打撲肢體凝滯瘀血肢體疼痛。

破故紙炒 茴香 疎桂 各一錢

每服二錢。食前熱酒調下。

南京下浮橋梁回回丹藥。每用二三厘。瓜仁搗包酒。

下極驗。遠近患損傷者。競覓之。要皆不外土鱉自。

然銅。第製法精爾。

證治大遠

醫學近編 跌撲 八 貞白堂 卷之二十

諸哽

不幸而誤哽于喉。當察明是何物。以所勝能制者治之。如魚畏鰕。鰕刺哽用之。無則用核磨水服。狗涎治骨哽。鵝涎治稻芒哽。鴨涎治螺螄哽。磁石治鐵哽。水銀治金銀哽。要在變而通之。諸法不若咒由妙。金陵林陵鄉中一人姓李。號守泉符水絕妙。遠近求無不立效。其法命哽者坐自己佛堂中。佛前放一盂淨水。令親屬往求燒符用法。訖徐以小筊卜之。云已愈矣。其人歸家。看淨水中所哽之物。在內隨愈。乃親見者。

證治大還

醫學近編 卷之二十

諸哽

一

貞白堂

本草云。楮實軟骨。諸骨哽者。搗自然汁服。或用乾者為末。和水取汁亦可。楮皮亦效。

玉簪花根爛骨。研細取汁。用竹管灌喉中。不可着齒。犯之齒酥。萱草根亦治骨哽。

又法。槿樹葉油。馬尾勃沙糖。三味熬膏。為丸。噙化屢驗。

又法。水牛尿上生草。晒花為末。用沙糖為丸。徐徐噙吞下。仍以沙糖為衣。不然損齒。

金鳳子。爛噙化。無子用根。極能爛骨。

又法。用野苧根洗淨。搗泥。每用龍眼大。如被雞骨傷。以雞糞化下。魚則魚湯。雞骨哽。用水蘼草搗汁飲之。骨自下。

魚骨在肚中刺痛。煎萊菔湯一盞飲之。骨軟而出。魚哽。有法不應。傷糖丸雞子大。吞之立下。

誤吞錢及環。傷糖一斤。漸漸食之。自出。

錢哽。艾一把。水五升。煎至一升。頓服便下。丹溪法。

又法。南竹根燒灰湯調下。

證治太還

醫學近編 卷之二十

諸哽

二

貞白堂

又法。百部根煮酒下。

相傳錢銅哽。勃薺生嚼。莖山居方。用加茱萸汁。

誤吞錢及金銀物。以胡粉一兩。搗調之。分再服。如在腹中。不銷。服水銀自化。又法。服砂仁湯自下。

諸哽。用薤白煮半熟。以線縛定。手執線頭。少嚼薤白。

噉之。度薤至哽處。便牽引。哽即隨出。又法。用絲

綿一小塊。如上法亦妙。

骨哽。外宜燒乳香。或用皂角末取嚏出。

又法人指甲燒灰。吹入喉中。更噙珊瑚砂亦可。

予和法。一小兒誤吞一錢在喉中不下。諸醫不能出。亦不能出。亦不能下。乃命戴人戴人熟思之。忽得一策。以淨白表紙。令卷實如筋。以刀縱橫剖其端。作筋鬆之狀。又別取一筋。縛鐵線釣于其端。令不可脫。先下咽中。輕提輕。抑探之。覺釣入錢眼中。然後以紙納咽中。與釣尖相抵。覺釣子入紙卷之端。不礙肌肉。提之而出。

一人誤吞一針。刺于喉中。不得出。想得一法。用磁石能吸鐵者。磨光小棗。大打一服。線繫定。嚥入咽。少

證治大還

醫學近編 諸便 卷之二十

三 貞白堂

三

頃提出針在石上

竹木刺哽不下。用多年陳籬笆片煎湯下。

祝由科

咒水治諸哽

以淨器盛新汲水一盞。捧之。面東默念云。謹請太上東流順水。急急如南方火帝律令。勅。一氣念遍。即吹一口氣入水中。如此七次。以水與病者立下。或用此水。可以吞竹筋針刺。

治咽中刺塞

以左手屈中指及無名指。作三山印。坐水盞于其上。右手捏金鈴印。脚踏丁字。立望太陽。或燈火。取氣一口。在淨水盞中。咒曰。吾取太上老君東流順水。老君奉勅。攝去毒水。吾托太帝尊。所到稱吾者。各現帝身。急急如律令。攝念七遍。吹在盞中。虛攪卓。三次為定。即與水飲之。即愈。

取諸骨哽神符

龍 龜 雞 豬 黿 鰐 鰐 鰐 鰐

龍 龜 雞 豬 黿 鰐 鰐 鰐 鰐

證治大還

醫學近編 諸便 卷之二十

四 貞白堂

②③ 咒水此碗化為東洋大海。咽喉化為萬丈龍潭。

龍歸洞。吾奉

太上老君急急如律令。奉勅。吸東方生氣三口。吹入碗中。每行此法。正面朝東。用淨水大碗放桌上。左手執拳在胸前。右手執劍訣。于碗中書前符號。假如魚哽。就書上龍字。除龍龍二字勿書。再書下八符。餘倣此。

湯火傷

凡湯火傷急向火灸雖極痛強忍半時即不痛慎不可以冷物搗之及井底泥傅之使熱氣不出爛入見肉

火燒以好酒洗之又以鹽傅其上如皮塌以酒熬牛皮膠傅之如湯傷以淋過二次灰查傅上立安熱酒傷糯米粉炒黑末調傅之

治湯火灼未成瘡者用艾白根燒灰雞子黃和傅之如成瘡白蜜封以竹中膜貼上日三

證治大選

醫學近編 湯火傷 一 貞白堂 卷之二十

經驗方 湯火瘡麴皮炒黑灰爲末傅神妙此方有補性始終皆可用

千金方 火瘡未起搥子仁燒灰麻油和封之厚乃佳已成瘡燒白糖灰傅之燥即瘥

冰霜散 治火燒皮爛大痛

寒水石

生 牡蠣 燒 朴硝 青黛 輕粉 各等分

共末井水調搽

治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂 寒水石 大黃

右爲末以新汲水調塗

丹溪方火燒用桐油水銀等分二件以桐油不住手攪成膏再入大黃石膏末和以牛皮膠入少水溶開外用貓兒肚底毛細剪摻上貼之 苦參末油調搽亦佳 又方火瘡痛不可忍用屎坑底下泥加老薑汁麻油十分之一研勻貼傷處立愈 青黛敷亦可

火瘡爛者以黃蜀葵花落者淨器收之入水些少待爛成水傅上神妙

證治大選

醫學近編 湯火傷 二 貞白堂 卷之二十

熱油傷蜜搽佳 火瘡敗壞雲母粉同生羊髓和塗之 湯火瘡先以酒洗次以楊梅樹皮爲末香油調敷

又方用髮一束香油煎以髮盡爲度放冷搽患處

又方熱油及火傷定痛將丹參細挫水調和羊脂煎

三上三下敷瘡立愈

又方雞子十數個石器中熬自然油敷之

竹木刺肉

凡諸竹木刺入肉中不出。用蟾蜍研敷立出。一方
白茅根搗傅亦妙。一方嚼牛膝根卷之。又方
竹木刺入深不得出。烏羊屎研爛。卷傷處。蘆葦
刺入肉。細嚼栗子查盒患處。諸刺已出而痛不
止。蟻蛭研傅。針入肉不出。用蟻蛭腦子同硫黃
研細調敷。以紙花貼。定如覺痒時其針自出。又
方。車脂攤紙上如錢厚。二日一換。三五次其針自
出。又方用烏鴉翎三五枝。炙黃色研末。好醋
證治太遲

證治太遲

醫學近編

竹木刺

一

貞白堂

卷之二十

調膏塗瘡上。一二時針出效。又方。雙仁杏仁搗
爛。以車脂調勻貼有出。已出而痛不減。黃泥卷
之。諸骨刺入肉不出。水煮白梅肉。研調象牙末
傅自軟。咽中刺。象牙水調飲之。牙梳爲末亦可。
魚骨在肉中不出者。嚼吳茱萸封之。
破傷風。血凝心針入肉。三症如神方。烏鴉翎燒灰存
性細研服。一錢滾湯下。

箭頭入肉

箭鏃入骨不可拔。已豆去殼研爛。蟻蛭共研勻。塗所

傷處。須臾痛定。漸痒。不可忍。使撼動拔之。

又法。蟻蛭不拘多少。麝香共末。搽箭瘡上。

萬全神應丹。出箭頭。魚骨針。麥芒等。遠近皆治之用。
荻若科。卽天仙子苗也。於端午前一日。持不語。飛
於野中。尋得棟科根實全者。口念先生。爾却在這
里。卽以柴炭。自東南頭圍了。用木篋擡起。週圍土。
次日端午。日未出時。依前持不語。用木篋只一擡。
取出。水洗淨。不令婦人雞犬見。淨室中。石臼內。搗
爲泥丸。如彈子大。以黃丹爲衣。以紙袋封。懸在高
處陰乾。若遇箭不出者。以緋帛絹袋盛此藥。一丸
放瘡中。綿束肚緊。先以象牙末貼瘡上。後用此藥。
若箭瘡口小。卽用刀刮開。以象牙末貼之。
孫真人治箭頭在咽喉胸膈不出。以蟻蛭搗汁。滴三
五度妙。

證治太遲

醫學近編

竹木刺

二

貞白堂

卷之二十

瓜蒌根搗傅亦妙。

筋斷

丹溪法。按筋用旋覆花根。榨汁滴傷處。將渣封。上
半月。筋有續。即金沸草根。

接耳鼻法

治擦落耳鼻。用髮入礮子。鹽泥固濟。煨過為末。乘急
以所落耳鼻。蘸灰緩定。以軟絹縛定。效。昔一僧
為驢咬下鼻。用之效。

肩破

負重肩破者。剪猫兒頭上毛。不語睡貼之。

論治大還

醫學近編 筋斷 一 貞白堂

卷之二十

五十六

還行。打破脚起。泡調生麴糊。貼過夜。即乾。不可擦破。
又法。用飯粘貼過夜。以紙蓋之。次日平復。

從高墜下。惡血流于脇下。痛不可忍。復元活血湯主
之。脇乃肝膽之位。故以柴胡為君。當歸三錢活血。
肝苦急。甘草二錢緩之。炮川山甲。瓜蒌。紅花。桃仁
各三錢。行血化滯。酒大黃。蕩滌敗血。水酒煎服。方
大有理。

從高墜下。惡血在骨節間。疼不可忍。芸薹散主之。

荆芥

藕節 各二兩

芸薹子

破脂

馬齒莧 各一兩

除乾

右為末。用蘇子半兩。酒一大盞。煎七分。調下二錢。
隨上下同。

傷損愈後。肌膚青腫。用茄子種。連黃極大者。切片一
指厚。瓦上焙乾為末。酒調二錢。臨睡服。一夜消盡。
無痕。

四脫白。急用手法。拏上。遲則惡血填滿。白中難上矣。

論治大還

醫學近編 筋斷 二 貞白堂

卷之二十

五十八

循衣摸床

循衣摸空摸床多是大虛之候。乃精神耗散不能主持也。不問雜病傷寒以大劑補之。多有生者。

海藏云婦人血風因大脫血崩漏或前後失血因而枯燥其熱不除循衣撮空摸床閉目不醒揚手擲足搖動不寧錯語失神脈浮弦而虛內燥熱之極也。氣虛身乾不潤上下通燥此為難治宜生地黃黃連湯傷寒熱邪傳裏有此症而脈實者大承氣湯。

診治大還

醫學近編 循衣

一 貞白堂

診法 病人循衣縫謔語者不治。病人陰陽俱絕。

掣衣撮空妄言者死。

笑不休

內經曰神有餘則笑不休所謂神者心火是也。火得

風而焰笑之象也。黃連解毒湯加半夏竹葉竹瀝

薑汁戴人用滄鹽成塊者二兩火燒赤放冷細研

以河水煎服探吐出痰而愈。

悲

仲景曰婦人臟燥喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠

伸甘麥大棗湯主之。甘草三兩小麥一升大棗十枚煮三升溫分三服

診治大還

醫學近編

循衣

二

貞白堂

邪祟

病者見神見鬼皆自己精神懸感非真有神鬼也如
果山居野處宅近古廟神堂氣血虛者感而作祟
正人君子神旺者無有也丹溪曰血氣養心之神
神既虛乏邪因而入理或有之若夫氣血兩虛痰
滯心竅妨碍升降不得運行以致十二官各失其
職視聽言動皆為虛妄以邪治之其人必死
脈乍疎乍數乍大乍小祟也

丹溪曰俗云衝惡者謂衝斥邪祟而病也如病此者

證治大遺

醫學近編 邪祟
卷之二十

貞白堂

未有不由血氣先虧而致者焉

病人自見五色鬼屬五臟元神神不守舍實非有神
也當詢之旁人如不見即是乃元氣極虛之病肺
虛見白鬼兼見面青唇青酒浙等肺家病參芪大
補肺氣自安舉此他臟可類推矣

屍症即邪祟其狀面色時五色如含愧赧語言不倫
動搖跳躍時見異症脈來乍大乍小是為邪鬼所
憑而然古方用死人枕煎湯飲之則鬼邪觸類而
出大瀉數行即愈仍以其枕送還原處

秦承祖灸鬼法用排繩將兩手大拇指相繫去

甲一莖葉肉與甲要四處着艾灸七壯神效

經驗辟邪丹 治衝惡怪及九尾狐精為患

人參 茯神 遠志 鬼箭羽 白朮

九節菖蒲 蒼朮 各一兩 當歸 一兩 桃奴 焙乾 五錢

雄黃 辰砂 各三錢 甘草 一個 金箔 二十片 另研

或加麝香

右共為末以酒調米粉打糊丸龍眼大金箔為衣

臥時木香湯化下一丸諸邪迴避更以絳紗盛五

證治大遺

醫學近編 邪祟
卷之二十

貞白堂

六九懸之帳中尤妙

翻花瘡方

川芎 枳殼 乾松 雄黃 石砂

射香 為餅丸酒下一方降了於二候

蠱毒

多于飲食內行之中其毒者心腹絞痛或吐下如爛肉或喜暗惡明或心性反常或四肢沈重百節酸疼或面目青黃甚者十指皆黑急則數日便死緩者遲延歲月

凡見門限屋梁潔淨無塵其家有蠱如不得已而吃其飲食初下筋時收藏一片在手儘吃不妨却將此片埋于人行十字路口則于本家作鬧主必來求物在胸中急食升麻吐之在腹急服鬱金下之

證治大還

醫學近編 蠱毒 一 貞白堂 卷之二十

神仙解毒萬病丹

即紫 金錠 治一切蠱毒藥金石草木

蛇虫中邪毒

山茨菰 洗淨二兩 五倍子 搗破洗 焙二兩 千金子 去殼揀極 包換紙研數十次紙 煉去血毛皮壳 上無油為度淨一兩 麝香 研細淨三錢 紫大戟 去根洗淨焙 各研細末和勻糯粥為丸每料分作 乾一兩五錢

四十粒端午日合之勿令婦人孝子不具手足人及雞犬見之 癰未破外塗內服 中鬼邪酒服 縊死溺死水磨灌之 蛇犬虫蜈蚣傷水磨塗之 瘡疾桃柳枝煎湯下 跌撲傷酒下 頭風用酒

入薄荷葉磨貼太陽穴 一方加硃砂雄黃各一兩或加山豆根全蝎各兩許

中砒毒

黑鉛磨水灌 刺羊血或雞鴨血乘熱服 菜油三碗灌之 或用藍根砂糖二味相和搗水服 米醋吐之 或金汁 麻油 或萊豆半升搗去渣新汲水調通口服

輕粉毒

黑鉛打壺浸酒日服 金器煮水服并入枕中 黃

證治大還

醫學近編 蠱毒 一 貞白堂 卷之二十

連貫衆 醬汁

縊死

自旦至暮可治自暮至旦難治心上微溫者一日以上猶可治 當徐徐抱解不可截斷繩子安放坐之 一人以脚踏其兩肩手挽其髮常令弦急一人手摩其胸一人摩其臂屈伸之得氣轉眼開照前法勿傷亦勿勞之少與薑湯及粥清含與之更令二人以筆管吹其兩耳 又法揉其項痕尾角木槌其鼻氣回乃止若泄氣則不救 或口接氣

搐鼻煎木香細辛湯灌之。

摧壓死

心頭溫可救扶坐皂角末搐鼻其汁熱小便灌之如惡回攻心炒黑荷葉加童便送三錢。

溺死

將病人橫伏牛背兩人扶之如無牛以凳控去水將後墊起五六寸冬用綿被圍之皂角搗之薑汁灌之上下以炒薑擦之若五孔有血者死。臘鹽茶之待水自出勿倒提出水。或皂角末綿裹納下。

部須臾水出。

夜臥斃死

皂角末搐鼻灌蘇合丸身動者活否則死不可近前喚但痛咬其脚跟或足大指甲際及唾其面更不醒移動些臥處徐徐喚之若原有燈則存無燈切不可點。

刀斧斫死

髮灰或油塵帽灰止血止痛收口如神。蟹黃及腳中肉焙乾爲末納傷處筋斷亦續外以膏歸骨。

證治大還序

余聞之唐人許允宗善醫學或勸其著書傳世則答曰醫者意也思精則得其神理非徒事著書爲也旨哉斯言其殆以軒岐之術可以神會不僅以言傳乎

王序二

惟在好學潛修之士深思遠慮而得之耳且上古靈樞素問為三墳之典精其藝者如史記之扁鵲金匱之長沙所著之書亦代有其人矣雖狀醫以寄死生非小道也有傳心即有傳言但

立言成書務得洞悉其源流探
索其精微得心應手百試百驗
而後可以養生濟世堪與靈樞
素問諸書垂之永久余求其人
每不多覩乃有五茸陳氏家世
業醫名聞江左而三農則尤博

王序二

涉經史貫串百家故於醫道尤
得此中三昧因念有家傳各種
名曰證治大還此卽所謂得心
應手百發百驗者不忍私秘願
付剞劂以公同好已為

兩粵總制公所鑒賞序而行之

矣乃陳子復問序於余上非越
人惡知醫道哉然思許子昔善
醫而不徒事著書陳言者使人
精思於理而實有活人利濟之
事也今陳子亦善醫欲人則倣
其已驗之法不得不專精於考

王序三


究以貽後世此意仍兩不相妨
也古稱醫有良相功卽稽之國
語所載醫和有曰上醫：國其
次醫人益以醫審天時察水土
悉人情通陰陽於以功叅變理
壽國壽民不難矣倘世有知陳

子者其即以證治大還一書應之也可是為序

肯

康熙三十六年歲次丁丑閏三月下浣王國泰題于粵東之清宴堂

王序



有序

余家世業儒以續書香由宋而元迄於今以科目名世者亦比比矣自先高祖霞山公肄業之暇兼治岐黃遂窺堂奧洎乎宦遊江右荆湘間凡上臺與僚友抱病者皆投之劑無不立起又廣施藥餌楚豫之民賴以全活者無算既而解組歸里門治傷寒止一劑治癆瘵僅兩月里閭之賴以全活者尤無算視史飲上池水而洞垣見腹不少遜云所著有內經纂病緣諸雜症傷寒女科幼科外科諸書此余家醫道之始

證治大還

有序

貞白堂

也閱曾大父而至於治蓋已五世於茲矣遂崑公有璜溪醫約解完朴公則有醫歸寤言荅城公有外臺秘典脉藥驪珠所著各書斟酌盡善試無不驗洵為醫家寶筏余念祖功宗德濟世利人胥在於是私為帳中之秘次第擇其近要者謀付梨棗以公宇內曩歲入都會以此意質之大宗伯龔公中堂吳公大司寇徐公蒙諸先生極為憇慰錫以敍言奈緣風塵奔走未遑從事茲遊粵東又請之總制石公方伯張公參憲張公亦各稱善并蒙賜

序捐資鐫刻則將五世之傳浸浸乎有大行之機矣
今而後字內之老幼男婦之疾不復致有悞經而枉
斃者皆 制府 方伯再造之殊恩矣而余更有私
幸焉夫有先高祖以迄於今一百五十餘年其間滄
桑兵燹時慮遺失以致先人怨恫何幸遺書無恙手
澤猶存復得流傳字內俾先高祖一片苦心垂諸不
朽書云父肯堂子弗肯構治知免矣此又非 制府
方伯之所賜哉治不敢忘所自也謹叙

五世孫 治書于羊城之越秀山房時

證治大要

自序

二 貞白堂

康熙戊寅孟夏中浣二日也

經絡診視

自飲上池水洞垣見腹之後乃有望聞問切四者而
望聞又不可多得則問切之功居多矣無如經絡之
介止爭毫末出乎此即入乎彼辨之不審其不致於
悞人者幾希則是生死關頭惟在經絡而病在某經
絡惟在診視者三指之下危乎微乎可不慎歟因列
經絡門爲診視者指南

證治大要

經絡診視

貞白堂

幼幼近編小敘

人我一體天地同生長懷茲意俯仰移情何分胞與
此重彼輕人之有疾若已身承幼人之幼關切惟誠
書云保赤賢聖咸稱寒涼溫煥內外虛盈痘疹痧痘
急慢痛驚證分表裏治切準繩音聲形脉纖悉詳明
兢兢毋忽實濟生靈守之不輟必有令名

證治大還

幼幼近編
小敘

貞白堂
白雲

陳氏幼幼近編 卷之一

雲間陳 治三農甫述

男 師 柴 璣 先 訂

長白石文燦右容甫叅

門人 范 松 壽 民 全 纂
外孫 周 繩 羽 斯 閱

痘原

夫痘者痘也。象其形而名之也。順其形則吉。逆其形則凶。可見古人命名之義。凡人生必患痘疹者。以形體必得父母精血以成。然男女交構。無慾不行。無火不動。恣情肆意。而淫火遺於精血之間。中於有形之先。必發於有生之後。火之微甚。毒之輕重。係焉。此不易之論也。錢氏謂惡血留於命門。夫兒賴母血以成形。分娩之血。何惡之甚。况血嚥下必歸腸胃。而成污穢。亦何有留於腎經之理也。

或問予曰。痘疹看耳後紅紋何也。曰。兒由父母淫火以有生。然天一生水。此火伏於腎中。痘疹由腎而出。耳乃腎竅。故見於本部也。由是而腎傳心。心主火。故發熱。心傳肺。主皮毛。故點見於肌膚。肺傳肝。肝藏血。故沸血而為起脹。肝傳脾。脾主肌肉。故化

證治大還

幼幼近編
卷之一

痘原

貞白堂
白雲

肌肉而為漿脾傳腎腎主閉藏故收斂而為痂死也。有謂腎無症者非也。經曰間傳者死故毒盛者易傷人也。

發熱辨痘輕重

夫痘非熱不發亦非熱不損故熱之輕重可以辨痘之吉凶蓋毒盛則熱盛毒輕則熱輕由毒即火故也所以身熱和緩達於外者必輕熱甚煩燥彰於外者必重又毒輕則難以感動必連熱數日痘始得出出必稀疏如盃水難流灼火難燎也毒甚則

證治大還

幼幼近編

痘原

二

貞白堂

易於感動故發熱一日即便發出出必稠密如烈火易燎長河易決也然又有當熱者有不當熱者當熱者痘未出之前宜溫熱以逐其毒非熱則毒何能達表苟痘未出之際卻乃頭溫足冷不能盡發其毒必致內攻矣不當熱者痘既出齊則當表裏和平長養氣血助毒成漿若反大熱則氣血煎熬不能拘制其毒毒無出路甚則氣泄血失變生他症矣

宋杏庄云太過則正不勝邪愈期則氣血凝滯

予心崖云當熱反不熱者宜如聖養元湯加蓮桂助氣血以逐其毒不當熱而熱者宜紫草如聖散以解利其熱毒然亦當分前後虛實熱發於痘未足之前為實熱發於痘足之後為虛發於結痂之後為餘毒

看面部耳後筋紋預知輕重

凡兒未曾出痘疹一遇發熱即當看面部若兩額有紅花紋見眼目麻搭烏輪紅色隨看耳後筋紋左耳可以驗疹右耳可以驗痘若紅紋嫩起單紋細

證治大還

幼幼近編

痘原

三

貞白堂

直而無分枝透上者輕粗曲分枝而向下者重淡紅者輕深紅重紫黑者死紋離髮際而見耳輪外者即出尚在髮際內者未出仍將燈於暗處照看面部四肢若非痘疹則皮肉無紅點若是疹則紅點見於皮外肉內無根若是痘則紅點見於肉裏其根甚深紅點稀疏者輕深紅麻密者重紫黑成塊者死初見標時先發於唇之四圍者佳先見於兩額兩腮者次之如見正額是毒犯清陽之分及兩頰胸背手足者逆也見標三日即看印堂若此

處光榮起聳雖周身麻密重必變輕若遍身雖好而印堂灰慘不起輕必變重蓋印堂下應心胸準頭下應肩背兩額應兩臂兩頤應兩腿如左額上有數點焦紫左臂上必有黑疔也六七日後又看舌上無黃白二胎雖重不妨若舌胎黃白雖輕必重也

心虛看面目耳後預知痘神訣

初熱面紫色乾紅者凶。稍上先見者吉。太陽先見者吉。風池骨間先見者凶。氣池成串者凶。

證治大遺

幼幼近編

痘原

四

真白堂

兩額初出如芝蔴色紅者三日後作瀉作痒搔破而死。兩腮灰白色必發熱泄瀉凶。兩額深紅主痒塌搔破。兩太陽石空地者吉。兩間成串無根窠者凶。兩腮下三五成串者凶。若左右腮有四五箇黑陷腰間必有黑疔一二枚。山相連串至太陽不治。兩臉隱隱不起者凶。初發熱腰疼者凶。初發熱手足痛不妨。初見時三五相連者必密各自分窠者必稀。兩間有黑班主元氣不足痘難起脹。太陽稠密主枯陷乾紫。

方廣見紅紋紫色主毒參陽位凶。初發水痘不紅後必脾虛泄瀉。兩鬢時見紫黑紋痘必先見

兩鬢後主紫泡斑疔因火盛水衰也。山根青主

先驚見痘吉紫紋主驚搐凶。面四圍白色中見

微黃此金寒土弱必脾胃虛弱後泄瀉喘渴。黑

睛黃色痘出細碎必先見左腮不吉。眼胞下見

青氣主木來尅土痘必三日方出紅密疔爛死。黑

睛少白睛多金來尅木壯熱一日即見痘後變紫

疔灰陷死。眼下胞見黑氣放點先見於右太陽

證治大遺

幼幼近編

痘原

五

真白堂

為逆。眼上胞多紅亂紋主熱蒸二日即見痘必變紫泡赤斑而死。白睛見黃色此金木相刑土受尅痘先見右腮後必白陷不起泄瀉白睛見紅色心火刑肺主虛泡咳嗽痰涎咽痛咽啞。耳後紅紋如栢葉必先見於兩脅痘必稀朗如珠紅活。耳後紅紋如弓形心經好痘色青者險黑者死。耳後紅紋如碎絲痘必先見於兩脅上及印堂必稀疏紅活。耳後紅紋如披稀髮肌肉分明熱蒸四日方出必稀疏。耳後紅紋如梅枝樣大紅

證治大選

幼幼近編

痘原

六

貞白堂

兼紫有黑必先見於耳輪上後變焦黑陷
內。耳後人字紫黑主熱蒸一日即出。頤間稠密
遍身無空死。耳後十字紋青黑熱蒸三日而出
先見兩鬢痘雖稀少後必作渴飲水而卒。耳後
黑紋頭大尾小痘出先紅後必變白此因氣血相
亂發疔七日而亡。夾鼻六府紫紅色主出疹
見標火庭印堂有地根紅頂白者吉如地紅根紅
頂紅後必黑陷焦枯凶。若天庭印堂密而黃根
雖紅後必變白陷伏若二處稠密如蚕種頭有針孔
後必黑陷而死若二處成串大而不起後必空窠
痒塌泄瀉寒戰而死若三四日即成串者不治
風池天庭印堂疎朗雖周身稠密不妨若此處稠
密不起就遍身稀朗起脹後必咬牙寒戰而死

因期施治法

夫人有強弱痘有重輕日有多寡症有變遷用藥勿
可執泥須因期變通為妙以其常而言之發熱三日
而後見標出齊三日而後起脹蒸長三日而後貫
膿漿滿三日而後收靨發熱之初耳尻中指俱冷

證治大選

幼幼近編

痘原

七

貞白堂

耳後起紅絲呵欠噴嚏眼目困倦兩頤之間有花
紋見其脈洪大而弦數診脈間身微戰動者預知
其為痘也發熱三日當用參蘇飲輕清發散疎利
肌表使其易出亦有氣弱而不能出者當微補其
氣氣和則出快初不可用葭恐腠理益密則痘難
出也四五六日以清涼解毒為主清涼則無血熱
枯燥之患解毒則無壅滯黑陷之害亦不可過用
清涼痘未盡而清涼則痘得寒而凝滯矣亦不可
遽用溫補毒未解而溫補則痘蘊蓄而不能化漿
矣尤不可擅用燥熱恐黨邪助毒致痘焦枯若見
焦枯黑陷二便秘結燥渴悶亂不可妄用毒物過
用發散恐痘窠大後難漿足也七八九日在貫
膿治當溫補氣血氣血流行而成漿自易不可更
用寒涼此時元氣已虛過用寒涼傷胃必致泄瀉
倒陷十與十一二日主收斂大和氣血補脾利水
則自然結靨矣此特語其常也蓋常者可必而變
者不可必當隨候參詳凡見紅點之時如痘輕少
不可過表在後恐成斑爛或乾紅紫色急宜疎利

不然在後必成黑陷四五日之內痘出至足爲齊
苟未盡出於解毒之中宜兼發散若專於寒涼則
痘遲滯不出七八日之間毒未盡解於溫補之中
又兼解毒若偏於燥劑則毒盛不能化漿矣十一
二日之間漿未滿足必大補氣血畧兼解毒不
然恐有癰毒瘟疤之患此變通之妙要在隨時致
宜也

論形色輕重

夫痘全在形色上辨其輕重故顏色貴潤澤而嫌昏
暗貴光彩而嫌枯澁貴淡紅而嫌黑滯貴圓淨而
嫌破碎貴高聳而嫌平塌皮貴結實而嫌虛薄貴
稀疎而嫌稠密根窠收緊痘分陰陽見點活動更
忌浮腫出要參差血宜歸附耳後頸項心胸少於
他處爲佳若校兩額額前不滯爲妙若一發便出
盡者必重也瘡夾痘者半輕半重也裏外微紅者
輕也外黑裏赤者微重也外白裏黑者太重也瘡
內黑點如針孔者勢極也青乾紫陷昏睡汗出煩
燥熱渴腹脹喘喘大小便秘者困也痘色光明者

證治大還

幼幼近編

痘原

八

貞白堂

氣血則也。若熱毒盛也色紅者毒始出也白
者毒未解也黃者毒將解也乾黃者毒盡解也灰
白者血衰而氣滯也焦褐者氣血枯也黑者毒滯
而血熱也紅變白白變黃者生紅變紫紫變黑者
死善治者於其形色而辨之於其輕重而分之則
輕者可以獲安而重者亦能取効矣

論根窠脚地

痘疹須看根窠脚地根欲其活窠欲其起脚欲其固
地欲其寬根窠不立脚地俱無此死症也根在外
證治大還

幼幼近編

痘原

九

貞白堂

圈而紅者是也窠者中透而起者是也紅暈之處
謂之脚空隙之所謂之地根之紅否可以驗毒氣
之出沒窠之起否可以驗氣血之盈虧脚之界根
分明則毒有拘制地之窠穴廣濶則毒有定位故
也

宋杏庄云凡看痘必先看元氣蓋元氣本也形色末
也故形色初善而終變惡者元氣內竭也形色初
內而終善者元氣內強也

部位論

痘瘡見點之初察部位可知吉凶右臉屬肺左屬肝

額上屬心鼻屬脾上正額者太陽脈之所會唇口

者陽明脈之所經耳後兩旁少陽脈之所過痘為

陽毒故隨陽而先見于面部但陽明乃胃與大腸

積穢受汚之所且氣血俱多故口鼻兩旁人中上

下年壽之間先見者吉其起漿收靨亦如是若太

陽乃水火交戰之處少陽為氣血俱不足之經若

於此處先見者凶頭額多者謂之毒乘陽位而不

得下降也下身多者謂之毒滯三陰而不得上升

證治大還

幼幼近編

部位論

十

貞白堂

也頭項多者謂之鎖項是毒壅於陰陽交會之處

氣滯而不得升降也胸前多者恐毒氣乘心兩臉

兩頤多成片如塗朱則肝盛剋脾八九日當滑泄

瀉青不食而為惡候胸前稠密者為填胸心經毒

盛也喉下稠密者為鎖喉肺經毒盛也腰間稠密

者為鎖腰腎經毒盛也面部俱稀而鼻梁左右密

如蚕種者名曰抱鼻此毒聚於脾胃也面部俱稀

而口角兩頭有一粒黑痘較諸痘獨大者名曰鎖

口遍身俱稀惟項下稠密一片以至頤者名曰鎖

項托頤俱凶症也當額地閣額骨胸背耳後手足

皆有一二箇黑陷名曰九焦痘皆不治症也

宋杏生云凡看痘面部最為喫緊以面為諸陽之會

然天庭印堂尤面部之最喫緊者以二處乃元神

所歸宿之地也此處先見先起先瀉先靨或麻密

或條暗皆死

辨症賦一

初發悠悠身熱尤宜氣息和平二便如常面赤不改

兼之睡臥安寧便見痘來順候肌色青而脫白精

證治大還

幼幼近編

辨症賦

士

貞白堂

神少而倦怠此症斷作泄者痘出決然不振再見

便瀉乳只須補益為先若還熱盛而氣粗煩躁

而不寧諸語狂言均為內熱如加喘滿腹膨便

秘須知熱擁肌膚燥而毛髮焦口氣熱而身燔灼

此則蓄熱鬱遏兩症固重兩外症尤烈腹脹口張

而喘急啼聲不絕而嘔嘔五數不通須防失血點

來隱隱出恐復瀉吐乳更兼刺眼面青又見搖頭

狂亂不生發驚先兆是故熱盛者只宜清涼發散

不宜峻用苦寒發散則毒得外出而熱自解苦寒

則毒反冰伏。而出愈難。故發散之劑。輕則如升麻。乾葛以疎其熱。而煩躁壯盛者。非此何以定其標。重則有麻黃以開其權。而喘急腹脹者。非此何以救其危。未萌先泄有熱症。莫作虛看。無熱症便爲虛論。止熱泄以清涼。重加發散。治虛瀉以溫補。仍用開提。內虛誤用寒涼。必令作瀉。實熱如投補劑。轉增躁煩。安靜而能食。勿謂便實而可下。泄瀉而煩渴。莫言熱症以投涼。

宋杏庄云。一發熱即唇裂舌坑。煩躁狂亂。口渴惡寒。證治大還

幼幼近編 辨症賦 圭 貞白堂

耳熱睛紅。便秘於升發藥內。加玄明粉。或大黃下之。以胎減爲度。不可拘執。初起當發之說。如唇舌滋潤。雖見急症。切不可妄下。

辨症賦

痘初見點。便觀顏色榮枯。一來遂覺粗肥。稀疎可必。初發如還鎖屑。繁密堪知。見點身涼。稀疎症少。現形躁熱。毒盛變多。帶熱敷瘡。陸續出來。雖甚密尤爲可救。一齊湧出。焮紅皮薄。縱稀疎未必全生。細細白頭如瘡。乾枯後作內攻形。啾啾紅點如丹焦。

麥定成。惟悍勢粗肥。蓬頂點子不紅。終白陷頭尖。

皮薄。未黃紋起。空定漿。肌嫩則皮薄。嬌紅黃瘦。則

痘成褐色。人黑皮脆。瘡色必然慘暗。故嬰童肌肉

不同。未可一例而斷。只要綻凸有神。不喜煩紅乾

燥。色澤神安。見點如珠如粟。毛焦皮燥。敷瘡或紫

或焦。是雖帶熱齊出。只恐密似針頭。縱然陸續出

來。尤忌形如蚕種。如麤如瘡。如疹如疥。根窠不立

脚地俱無。犯此數端。皆云莫救。夾班如同蚊咬。惡

烈勝似蛇傷。乃或螺螄雲電。此際差爲可救。未熱

證治大還

幼幼近編 辨症賦 圭 貞白堂

先敷數點。俗名報痘。若還熱久不退。便作疔看。先發塊而後發瘡。塊名痴毒。而必生。先發瘡而後發塊。塊名鬼腫。以難差避痘。避於隱僻。眼胞唇內必多凶。問痘問於要處。舌喉胸背而不吉。順不憎多。逆嫌一點。冷疔先見。諸瘡誰敢彰形。賊痘若生。諸痘不能灌汁。辨認若真。急宜剔破。裏症未平。痘雖出而毒尤在內。透肌發散。尤加解毒爲良。便調人靜。身雖熱而毒已在表。補兼發散。仍以安表爲先。設使內外症平。此候不須過治。再看精神勇怯審。

詳表補何如

宋杏庄云、見點頭焦或紫、此血分有熱也、用滿天秋治之、若唇燥舌胎黃色、卽用千里馬下之、蓋焦紫雖由血熱、未有不因內熱者、審之於舌、治斯不差、六日以前、專看唇舌、六日以後、亦專看唇舌、此看痘密諦也、

辨症賦 三

三日四日、痘出當齊、點至足心、勢方安定、尤有陸續不出之狀、或隱隱於皮膚之內、不見不起者、古名

證治大還

幼幼近編

辨症賦

齒

貞白堂

不快、若非風寒壅遏之因、必有氣虛不振之過、是以四日已前、痘毒方出身、表宜涼、四日已後、毒出已定、身表宜溫、涼則氣血和平、痘色必然潤澤、溫則腠理開通、其毒易以成漿、故至此而身不微熱、雖未必至於冰伏、而痘瘡斷乎弗長、四五日來、血胞已成、候當微六、而粗頂宜發光而白、故根紅而頂白者、已具行漿之勢、若還赤色過頭、雖見嬌紅可愛、延綿六日、依然到頭空殼、虛花皮薄光亮如燈、內含是水、頂尖而根脚不紅、行漿勿實、是以毒

勢盛而未解、則爲紫爲黑、壅而不起、則爲塌爲陷、

滯而不榮、則爲乾爲枯、爲青爲灰、怯而不振、則爲不快、爲停漿、或有肉先腫脹、而痘反不起者、漿則滯而不行、面已虛浮、而痘反退伏者、毒則遏而不進、故身不熱、而痘不起、已成冰硬之形、赤色若還不變、溫之可興、氣血弱而不振、遂成不快之狀、紅潤依然、如舊補之可生、紫色乾枯、切忌溫中帶補、只宜活血鬆肌、爲壅爲滯、烈藥雖然可發、透肌尤是良方、溼泄惟於溫補、爲甚佐以升提、

證治大還

幼幼近編

辨症賦

圭

貞白堂

周慎齋云、初出宜滋陰解毒、不使火土乾涸、若一出暗昧、神昏氣促、色焦腰痛、皆血被火涸也、蓋心賴血被火耗、心神失守、故病入腎、所以六日之前、宜清涼解毒、六日之後、當作虛治也、

辨症賦 四

六七日之際、順候漿行半足、虛瘡方見分光、毒重而擁遏者、乾枯退爛、氣盛而欲發者、飽滿光榮、頭面行漿、而四肢未起、見之切莫慌張、腿膝發泡、而臉額焦枯、見之、不歡喜、既已想其發、陰又且慮其

喘急飲食不多必致臟虛而內陷水漿頻進恐來
泄瀉而復顛調理失宜倒戈反掌熱盛渴煩到此
休依實論再加清泄此時只作虛看黑紫乾枯急
攻發而或生氣虛塌陷重溫補而幸活發瘡愈其失
聲喘急恐其腹脹瘡或白而少神根雖紅而莫治
皮不起而離窠脚雖赤而難生淡白而塌滿此內
必無漿汁皮薄而嬌紅有漿亦是清稀犯此四端
八九日必然發瘡若還壯熱燎人不痒定行乾燥
紫黑乾枯不須看眼中疑血迹或可幸成漿既行

證治大還

幼幼近編

辨症賦

去

貞白堂

而半足時則未宜收斂忽爾一齊紫黑古名爲倒
靨切莫認爲結痂攻發若得其宜此症尤堪復活
傷生血點再行漿危症也當又治若見氣急而腹
脹黃泉在邇失聲而嘔嘔陽數無幾

辨症賦 五

痘出八九日來已結乾紅而危如或少生不順至此
方作膿窠行漿飽滿是宜次第收成若遇身重發
熱停漿不易結痂此則陽亢陰虛引以清涼收斂
漿足氣促恐因痰壅而然兩發驚或乃小便秘

結再見氣虛而塌陷倒靨而黑焦一則溫補可與
一則攻發可活泄瀉安寧大虛少毒肺寒則下膿
粘臟毒必然便血挫喉聲啞漿將飽滿亦無妨塌
痒咬牙便實聲清尤可治靨來痂硬變症終無死
脫如焚須愁餘毒蒸發或致太過潰爛難行收拾
身熱燎人泡發療漿可畏空遺痘殼不成痂只爲
漿清熱重腹脹喘呼而塌靨皆因毒入內攻出來
不灌黃漿痂危尤如血赤若曾解毒於先此症斷
之極美胃氣絕則口唇硬腫肝熱盛則目睛吊白

證治大還

幼幼近編

辨症賦

去

貞白堂

喘急發於瀉後總是氣虛便泄繼以渴煩豈爲實
熱泄瀉而煩渴不止宜升提而補氣好飲而發渴
愈甚急益陰以鎮陽氣虛寒戰痘瘡無恙即溫經
漿足難收便實熱蒸須解利進清涼以助結痂此
補法而防過益斟酌合宜庶無後悔

辨症賦 六

痘成痂危雖云生意已成其八九餘毒變遷尤未得
爲結痂而可喜是故眼合腹脹猶蹈危机虛浮不
退尚懼內谷痂或成而反致失聲前死恐爲黑靨

證治大還

幼幼近編 辨症賦 卷之一 大 貞白堂

腫未消而眼已先開眼開疑是內攻陽氣極而狂
叫喘呼腸胃傷而嘔嘔不寧風冷入胃則利下膿
粘熱滲膀胱小便尿血熱毒逗遛不化結痂而
壯熱增寒經絡各遺餘毒日晡而潮熱往來發在
午前為實症煩渴腮紅申過方作是陰虛便調滅
食他如撮唇弄舌心經熱盛何疑扶肚擡胸肺胃
毒中有准身熱燎人便秘恐成暴急驚風攸攸潮
熱便澹久變慢脾風搐騖喪明於眼合羞明辨口
疳於唇焦眼黑實熱下注大腸必有秘結之禍虛
寒客留臟內乃成泄瀉之病喘渴須分虛實驗症
切勿差訛欲觀痂落之餘再審痂痕之色桃紅光
澤榮衛俱安黑紫乾焦尚留風熱粉白為氣血之
虛過過也應深逝走馬狀牙疳之烈月餘亦見長
驅遍體赤班乃是失於解利渾身青紫恐因冒於
風寒餘毒未消不特為疽為癰見風太早猶防復
發瘡痍

按痂紅而平者氣血順序紅而陷下者氣不足也
後必為麻子紅而高起者氣中有火也紫者氣血

雖腫片而火毒尤存也紫而痒者痂落後感風寒
也粉紅者血不足也粉白者氣血俱不足也

辨疑賦

胎毒蓄積發為痘瘡傳染由於外感輕重過於內傷
初起太陽壬水尅乎丙丁後歸陽明血水化為膿
漿勢若燃者變即反障歟知表裏虛實須明寒熱
溫涼症候殊形臟腑異狀肝火激成水泡肺主涕
而膿漿心班紅紫脾疹赤黃腎經居下不受汚濁
故耳聾俱涼觀其外症可知內臟阿欠煩悶令肝

證治大還

幼幼近編 辨疑賦 卷之一 大 貞白堂

木之因咳嗽噴嚏今肺金之象面目滯朱令心火
炎於胸膈手足厥冷而昏睡今脾土困於中央耳
尻屬腎溫暖如常二處灼熱痘症垂張先分部位
次察災祥陽明從目落鼻太陽形于頭上心火炎
熱則鼻乾面赤肺金鬱結則胸膈先傷手足事為
脾胃肝膽主脇肋之傷頸項三陽交會腰背統乎
膀胱外症分明用心想像泄瀉者邪甚於下嘔吐
者邪甚於上氣逆而腹脹隱隱毒甚而腰痛惶惶
心熱盛而驚搐胃邪實而顛狂口燥咽乾肺受火

邪毒之熱，便秘溺，腎因火旺而津亡，欲識痘之
輕重，當察熱與形狀。毒盛兮熱如炎火，勢微兮內
外清涼。寒熱往來，神氣爽定，知痘出必微祥。數番
漸出兮，春回寒谷，一齊湧出兮，火烈崑岡。蚤種蚤
班，刻期而歸陰府。蛇皮蟬脫，引日而返泉鄉。雖怕
紫紅，更兼灰白，最宜淡紅滋潤。切忌黑陷乾紅，色
要明潤兮，猶恐薄嫩之易破。痘貴乾結兮，又愁痒
塌之難當。面頰稀而磊落，清安可保。胸膈密而連
串，吉凶難量。頂要尖圓，不宜平陷。漿宜飽滿，切忌
證治大還

證治大還

幼幼近編 辨疑賦

子

真白堂

空瘡皮喜老而愁嫩，膚愛活而怕光。結實高聳，始
終無慮。丹浮皮肉，必主形傷。唇面預腫兮，八九如
何可過。腰痛潰爛兮，七定受災。殃瘡堆口舌，毒
纏頸項，咽喉腫，飲食難進。瀉痢膿血，毒甚無漿。
痘瘡焦落，辨別陰陽。人中上下，先靨為長。若是足
腰先靨黑，多凶少吉。要隄防。

金鏡賦

痘毒未出之初，宜開和解之門。既出之後，當泄走塞
之路。是故壯熱惡紅，須投升葛，而情神優，急進參

初出治

三日內

黃藥時
治法

蘇氣粗熱，擁身煩躁，便秘急須和解。升甘葛芍，散
前羌防芷，柴苓絕勝。喘呼腹脹，眼胞浮，肌燥便宜
疎散。麻黃乾葛芍升麻，桔甘鼠粘最宜。及夫痘出
之門既開，則熱蒸之毒自解。未見點前，惟茲一法。
既敷瘡後，別有奇方。稀疎而氣血和平，須知安表
和中之理。歸芍芍藥朮苓甘腹芷，益元湯。緊密而
不勝重任，當識內外分消之妙。荆翹歸地芍紅芎
通用。小連翹飲，瘡來赤色或焦枯，須用清涼而解
毒。紅班赤紫，連犀栢同施。身熱燎人，乾葛前胡
證治大還

幼幼近編 金鏡賦

子

真白堂

並用。氣粗而腹脹膨，蟬退枳腹木通。若遇色來
紅潤，便宜徹去。荆翹如見二便清泄，縱是生歸俱
免。便用白朮茯苓，精神倦而飲食少，進以人參，出
不快而痘不振，兼乎查脫。初覺繁紅稠密，紫草用
之無疑。如見毒盛色掀，鼠粘進之何害。是故三日
以前，即許遵斯而用。循是以往，不可一例而施。瘡
端放白，勢若行漿，參看內外虛實之異，酌以溫平
表補之宜。若神壯而氣盛，能食而便實者，痘雖繁
密，只用中和表發。防甘芍桔歸芪，催膿而已。若精

證治大還

幼幼近編 金匱篇

圭

貞白堂

倦而神衰、減食而痘陷者、毒則繁多、卻用重崇補
益、參、芪、甘、草、芎、歸、桂、桔、爲、先、立、此、二、方、乃、作、醃、膿
之、具、膿、胞、未、滿、不、可、輕、易、其、方、痘、或、變、遷、不、一、另
設、便、宜、妙、用、至、於、漿、或、饒、足、毒、已、盡、行、拘、化、洪、當
漸、進、於、清、涼、氣、血、回、元、復、位、不、可、重、崇、乎、表、補、參
芪、切、勿、多、食、胖、甚、恐、難、收、拾、故、便、實、而、能、食、壯、熱
而、不、退、者、便、宜、疎、利、爲、先、升、麻、乾、葛、四、順、清、涼、便
溲、而、減、食、壯、熱、而、不、渴、者、則、以、健、脾、爲、貴、求、茯、通
歸、防、風、芷、芍、如、還、內、外、症、平、不、必、過、令、服、餌、直、至
結、痂、以、後、再、觀、餘、毒、有、無、當、疎、利、便、宜、疎、利、當、調
補、急、宜、調、補、身、熱、煩、渴、便、赤、者、大、連、翹、飲、氣、粗、壯
熱、秘、結、者、四、順、清、涼、泄、瀉、則、益、黃、理、中、瘡、淡、則、升
麻、乾、葛、如、若、別、無、餘、症、安、養、氣、血、而、已

節制賦

夫病深而藥淺、終見無功、病淺而藥深、反增他劇、勢
緩而投急劑、急則拂亂其經、病劇須用劫藥、緩則
授生不及、以本藥而治本病、病去便當行別議、防
變症而用變藥、變症難逆、將來故偏行補法、未

證治大還

幼幼近編 節制賦

圭

貞白堂

必盡爲怯弱、執用辛溫、豈應藥是虛寒、只宜因病
立方、不可製方待病、升麻進於未點之先、他非瀉
甚、而莫投黃芪用於內托之症、一見毒盛而即止
身無壯熱、休加乾葛柴胡、臉不煩紅、勿進大連翹
芥、擁遏只許疎通、投補劑而胸膈食減、內熱便宜
清利、多發藥而表爛瘡疼、熱鬱心煩、丁桂須知患
目、便溲胃弱、大連誤用天亡、傷食吐酸、先宜消導
不食乾嘔、須與和中、糞焦熱瀉、溫補豈其所宜、溲
泄清稀、涼藥甚爲不合、胃虛弱而補陰、恐增泄瀉
三焦擁而益陽、慮發狂煩、喘滿便清、雖虛煩而可
補、氣粗腹脹、加秘結而可通、咳嗽有痰、切勿亂投
半夏、熱冲作嘔、且教慢入乾薑、氣虛不振、參芪奏
捷、脾胃虛寒、桂附成功、設使渴煩喘秘、用此反生
跋扈、大連解熱、毒於未胖、荆翹清血、熱於血胞、若
還勢在行漿、此輩皆爲所叱、是故六七日內不起
保元十奇無禁、八九日外變生、木香異攻何遲、補
法不宜早加、溫藥必須在後、發散乃作先鋒、溫補
總爲截陣、遵斯節制、庶不誤人、識此玄机、用無窮

盡

權宜賦

痘有緩急治須變通且如紅紫掀腫兮涼血爲上灰
 白平陷兮補氣最良出不快兮爲表實而發散可
 用二便秘兮是裏實而疎利何妨毒不能以速散
 毒甚者令微汗之發越熱不能以盡除熱劇者使
 小便之清長三陰甚而多寒必投辛熱三陽數而
 多熱無過苦涼是故補元氣參芪白朮養榮血歸
 芍地黃發散表邪重柴葛而輕桂枝疎通實熱微
 證治大還

幼幼近編

權宜賦

五

貞白堂

枳殼而甚大黃解熱毒芩連梔子快班疹紫草荆
 防牛旁連翹瘡中之要領甘草乃藥中之君王玄
 參桔梗能治咽痛木通車前利其膀胱氣逆兮陳
 皮青皮胃寒兮丁香木香泄瀉兮訶子豆蔻嘔吐
 今砂仁藿香祛風熱今蟬退白芷定驚搐今天麻
 礞蠶頭痛今川芎藁本蔓荊可用腰痛今杜仲牛
 膝玄胡堪當麥門乾葛清心而止煩渴厚朴腹皮
 療水腫而消腹脹五味杏仁潤肺止嗽而定喘山
 查枳實消食行滯氣爲良痰實半夏南星貝母汗

秘差獨紫蘇麻黃紅花牡丹皮可除血熱鹿茸穿

山甲能起痘瘡食積神麴麥芽草果後重枳殼枳

榔木香犀角羚羊解乎心肺之熱秦艽香附退乎

脾胃之黃乳香沒藥止痛乾薑附子回陽前胡蘇

子能消痰嗽猪苓澤瀉茯苓清利小腸此乃藥味

加減之權宜若病之輕重各有主方

宋杏庄云凡服補劑覺氣急宜加涼藥服涼藥覺熱

退宜加補劑蓋熱能助火涼能滯血火旺則焦枯

乾黑血滯則燥痒癢遲

證治大還

幼幼近編

指南賦

五

貞白堂

指南賦

人參益內甘草和中用黃芪而實腠得蟬脫以開肌
 紅花有活血養血之功生地有涼血行血之効痘
 若乾紅便宜加入紫草滑肌通竅毒擁堪行熱症
 賴之而有益虛寒誤用以瀉便山查苦逼瘡疥能
 消食積兼理滯氣於補益方中且解鬱結於透肌
 湯內輕其表而涼其內功在荊翹疎其肌而發其
 擁妙存蟬水利咽喉而清氣道能發散而善開提
 功必資於桔梗分清濁而利小便消痘毒而去膨

證治大還

幼幼近編 指南賦

美

貞白堂

脹効莫大於腹皮。川芎引清陽而達表，勿缺於未滿之先。芍藥斂陰氣以濟陽，可多於漿足之後。牡丹皮去血中之毒，壯熱煩紅爲聖藥。地骨皮去氣中之毒，毛焦熱甚是良工。官桂有鼓動陽氣之能，神倦而不振者，用之以收實効。丁香有贊助元陽之力，內虛而不起者，得之以奏奇功。木香順氣而理脾寒，泄瀉湯中必用。乾葛療肌而退胃熱，煩渴方內須加。白朮茯苓能健胃，佐參芪而益氣。當歸生地補陰虛，君枳殼而潤堅。解蘊毒於犀角黃連，惟熱甚則前後堪用。定心煩於麥門五味，有渴症則始終宜加。大附子反本回元，能理虛寒而戰慄。天花粉消痰清胃，且收肺氣以發聲音。白芷疎風痘毒，憑之而發散。紫蘇流氣，實邪賴以驅除。羌活有運毒走表之功，防風有散邪逐毒之妙。蠶只利於肌膚，捐風定痒如神。枳殼能平乎胸膈，下氣寬中最速。開嗽定喘於麻黃，擁遏憑之而發散。平胃溫中於厚朴，腹脹用是以消磨。龍骨枯礬權行澁泄，猪苓澤瀉暫用安便。乾薑溫中氣而止嘔吐。

證治大還

幼幼近編 指南賦

毛

貞白堂

是以胃寒而虛瀉者，宜用則用。大黃蕩腸胃而潤燥堅，是以熱擁而便秘者，當加卽加。鼠粘清利咽喉，透肌解毒。升麻升發元陽，堪散瘡瘍。柴胡前胡解肌安表，黃芩黃柏退熱消斑。止嗽開痰於貝母，清便降熱於山梔。人中黃化風熱而療顛癇，誠扶危救急之効。龍腦片涼心血而起黑陷，有撥亂反正之才。麝香通竅於毫毛，亦能發汗。雄黃解毒於臟腑，兼可消痰。辰砂鎮心定志，而有養血涼血之能。珍珠透裏入堅，而解骨中髓中之熱。詞梨勒飲肺氣而澀腸，肉豆蔻溫脾胃而止瀉。天靈人齒俱能發鬆肌肉，過用則內裂皮崩。蟾脫穿山實可振揚痘毒，多施則虛擡空殼。藥味不求於異人，取効每存乎常品。明此一篇，思惟過半。

陳三農云：人參止渴生津，固元氣。黃芪固表補肺，灌膿。甘艸和中除大熱。肉桂行血周流而無滯。當歸活血，見肉桂無處不到。川芎行血而上行，同芍藥瀉肝。木香理滯氣，能助參芪之功。芍藥斂血，居巢在五六月之用。白芷升胃厚皮，有八九日之功。黃

芩涼血清肺、蟬脫退疹、解毒沙參退熱、補陽中之陰、無前後、前胡治內外之痰實、解毒起痘不可缺、石膏去胃中之火、治痰涎壅盛、狂言、荆芥疎表滅痘、使熱邪不鬱、羌活能開關節、引諸藥而無滯、防風乃風熱之用、亦佐參芪、山查行內外之氣、補瀉皆宜、又去參芪之滯、木通導火下行、不使耗心血、前三三日皆宜、犀角治心亂失血、紅花涼血解毒、能生新血、生地涼血、紫陷可用、胃虛斟酌、山豆根治口內喉舌瘡、水穀不下、肉蕘五倍、止瀉五六之

證治大還

幼幼近編 指南賦 天 貞白堂
 卷之一

論表裏寒熱虛實

凡痘未見點之先、如壯熱腮紅臉赤、毛竅森聳、皮色乾枯、煩悶不寧、此血熱表實之重症也、惟毒重、故熱重、宜用輕清發散之劑、疎利肌表、如壯熱氣粗喘滿、腹脹煩躁、譫語煩渴、睡臥不寧、大小便秘、此血熱裏實之重症也、即當下之、灰白不紅綻不起

血熱表
 定
 血熱裏
 定
 表寒而
 虛
 裏寒而
 虛

發出不快、昏暗陷頂、皆表寒而虛、二便清涼、手足口氣俱冷、神思倦怠、不渴少食、唇白涕清、體靜、飲食不化、皆裏寒而虛、此表裏虛寒之症、急宜溫脾胃、補氣血、當用參芪芍歸木香薑桂等藥、以助胃、膿收靨、且補氣、使脾胃自壯、胃氣隨暢、在後必無陷伏之患、補血、則氣血周流、送毒出盡、不致凝滯、在後必無痒塌之憂、見標時、紅紫乾滿、黑陷焦枯、面赤唇紅、毛焦膚燥者、皆表熱而實、大便秘結、小便赤澀、身熱鼻乾、氣熱唇燥、煩渴痰壅、喘促驚悸

證治大還

幼幼近編 論寒熱虛實 天 貞白堂
 卷之一

諸語狂亂腹脹、或上下失血者、皆裏熱而實、此表裏實熱之症、急用涼血解毒、當用化毒湯、加紅花紫艸丹皮、玄知石翹力子荆升骨皮甘竹葉、或四順飲、及辰砂益元散、蟬退黃連荊芥之類、如表熱者、則宜清涼解表、而分利次之、裏熱者、則重於解毒、而兼清涼、或在二三日之前、熱毒盛者、微下之、亦可蓋涼血不至紅紫、解毒則免黑陷、故表虛不補、則成外剝裏虛不補、則成內攻、表實過補、則不結靨、裏實過補、則發癰毒、所以痘症變遷無常、若色一轉、又當變

通不可拘於一定也。雖然表者裏之發也，裏者表之基也。裏虛則表虛，裏實則表實。裏寒則表寒，裏熱則表熱。是裏可以該表，而表不可以該裏也。所以欲治其表，先治其裏，欲治其裏，而表在其中矣。若治表而遺裏，非理也。至於實若虛，熱反寒，此又亢則害，承乃制，而出於常理之外者。又當審之也。
朱本庄云：表虛自汗，裏虛自泄，表實難出，裏實難便。表實宜汗，裏實宜下，吐瀉陷伏，表裏皆虛，紅紫熱盛，淡白虛寒，氣盛稠密，陽毒易治，血盛稠密，陰毒難治。
證治大還 幼幼近編 論氣血實 手 貞白堂 卷之一
難調，實熱不解，變黑焦枯，虛寒不補，灰白痒塌，毒盛熱結，當下則下，影而不出，當汗則汗，妄汗成斑，妄下成陷。

論氣血虛實

痘疹之輕重，由氣血之盛衰。蓋氣血者痘之主也，必使氣血中和，無過與不及。斯痘毒得以發揚於外，而化漿收斂矣。蓋血賴氣以運行，氣須血以融化，故氣不可虧，虧則陽會不及，而痘之圓暈之形不成；血不可少，少則融化無基，而痘疹無漿之禍立。

至大抵氣行虛，熱為實，氣虛則宜溫補，氣實熱則宜清涼。血虛則宜補血，血實熱則宜解毒。何謂氣血虛實？且如氣熱則泡，血熱則斑，氣熱則喘促悶亂，血熱則昏黯色焦，氣不及頂陷不起，血不及漿毒不附，氣虛則項陷，氣散則塌陷，血虛則其暈必枯，血離則其根必散，灰白而頂不陷，是為血虛，頂陷而色不白，是為氣弱，自汗聲不出，灰白陷塌，枯澁不榮，氣血俱虛也。治法：色淡白頂不堅實，不得手不起脹，或皮皺皆屬氣虛，大宜保元，倍加酒炒黃芪、肉桂、丁香、川芎、人乳、好酒同服，根窠不紅，或紅而散亂，以手摸過，即轉白，痘上如寒毛隆起，枯澁不活者，皆血虛也，宜保元加川芎，當歸酒洗紅花，及下山查以消參芪之滯，再下木香數分，以行滯氣，而血自活也。凡用黃芪，當在痘盡出之後，凡用熱藥，當在毒盡解之時，又察氣血虛實而治之，則藥無不効矣。凡補血首尾用地黃防滯氣，必用薑製，用芍藥，恐酸寒伐胃氣，必用酒炒。
朱杏庄云：氣虛不起，血虛不漿，氣虛發戰，血虛咬牙。

氣虛內攻血虛外剝氣虛空泡氣熱水泡血實紫泡血虛白泡

三法治例

凡氣虛之症初發身熱手足厥冷乍涼乍熱精神倦怠肌肉眈白飲食減少四肢怠惰睡臥安靜便清自調虛症無疑未見點前用參茸飲加輕劑發散如紫蘇防風白芷見點之後用參茸飲加輕劑如川芎桔梗見點四日之後重用參茸飲隨病加減處治七八日漿足之後保嬰百補湯調養氣血而證治入選

幼幼近編 三法治例 卷之一 頁白堂

血虛治法

凡血熱之症初發身熱壯盛腮紅臉赤毛焦色枯煩渴飲水日夜啼哭睡臥不寧好睡冷處小便赤澀熱症無疑未出之前用十神解毒湯見點三四日後熱症悉平勢將行漿從太乙保和湯加減八九日漿足之後則有保嬰百補湯調養之此症七八日間有紫黑乾枯及青灰乾黑陷者則有奪命丸

證治大遠 證治大遠 一字金或百祥牛李猪尾獨神等方皆可審用惟經泄瀉之後有黑陷乾紅者則從本和異攻散治之此萬試萬中者也

熱毒極過治法

凡熱毒擁遏之症初發身熱壯盛腮紅臉赤毛焦皮燥氣粗喘滿腹脹煩躁狂言譫語睡臥不寧大便秘結小便赤澀面浮眼張多啼多怒的係熱毒擁遏未見點時先須升麻芍州葛根湯一服隨服羌活散鬱湯防羌芷荆桔地骨腹芎翹甘紫粘至見點三日之內諸症悉平勢將行漿則服益元透肌散加減

幼幼近編 三法治例 卷之一 頁白堂

虛症調護論

痘症以元氣為主元氣充實則毒易出易化故善治痘者惟保元氣於虛弱之前使不至于耗散為貴耳然其治法惟何一曰實腠理而固肌表二曰節

證治大還

幼幼近編

虛損諸

論

貞白堂

飲食而保脾土。肌表固則外陷之患不足慮。脾土實則下陷之患不足憂。更加以參芪補益之功。則元氣自然充實。而痘之出也。自然易以成漿。變症不生。而結靨順候矣。是以禁用寒涼蕩滌之劑。如大黃滑石車前生地鼠粘紫草枳殼之類。恐其蕩滌潤下。遂傷脾胃。傷則元氣由此而下陷。氣脫內攻而死。勢所必至。是則藥殺之也。禁用滑潤發散之劑。如鼠粘人牙。蟬退麻黃乾葛升麻紫草桔梗。羌防荆芥之類。恐其發散太過。遂致表虛。表一虛。則元氣由此而外耗。場痒外刺。命因此喪。誰之過歟。

丁心崖云。痘資乳穀以養其內。毋令過飽失飢。損其胃氣。謹避風寒以護其外。毋令外邪惡氣得以侵襲。常燒棗檀。令氣調暢運行。蓋榮衛遇香則行。遇臭則止。又宜斟酌時宜。時值盛暑。則明窓淨榻。但防卒暴風寒。時值嚴寒。又常當溫煖也。然經水臭穢。葱蒜酒醋亦宜禁之。

虛症補氣不補血

證治太還

幼幼近編

補氣不補血

論

貞白堂

虛弱痘症。精神倦怠。面青晄白。蓋氣不充。則精神倦怠。血不榮。則面青晄白。今治虛症。補氣不補血者。何也。氣有神而無形。補之則易充。血有形而無神。雖補難速効。况氣陽而血陰。陰從陽。血從氣者。理也。故補氣不補血。使氣盛而充。則血自隨而亦盛矣。况補血之劑。如當歸生地。皆能潤燥滑下。多用恐致溏泄。然虛症痘疹。亦有白陷不榮。不得已而用當歸芍藥補血之劑。亦有虛火外浮。痘點煩紅。而類於血熱之症。不得已而用紫草紅花生地。活血涼血之藥。並用酒炒。以折其潤下之性。借酒力而行之。達表。則補血活血之中。而有升發達表之妙。庶無潤腸溏泄之患矣。

虛症壞勢必至辨

氣虛痘症初發。身熱悠悠。乍熱乍涼。肌慢神倦。面青晄白。飲食減少。手足時冷時熱。嘔吐便瀉。痘點方見。隱隱不振。淡紅皮薄。三四日陸續不齊。不易長大。五六日不易成漿。少食氣餒。傷食易泄。七八日場陷灰白不起。自汗微渴。或腹脹喘渴。泄瀉場瘡。

悶亂咬牙寒戰頭溫足冷勢所必致故治虛痘初發之際不宜投參蘇飲人參敗毒散黃連解毒湯升麻葛根湯紫草三豆飲當用參芪飲氣粗皮燥無潤色亦忌之只以四君子減人參少加桔梗川芎腹皮補益之中畧佐以升提之法為妙點子出齊重用參芪及至八九日之間無他凶症用法如常若或頂陷灰白不起漿清自汗微渴大補湯加桂陷塌灰白腹脹泄瀉水香散塌痒悶亂腹脹渴瀉喘嗽頭溫足冷寒戰咬牙者急進異攻散救之

證治大還

幼幼近編 卷之一 癩癩必至 眞白堂

虛症變實辨

氣虛痘症父母能守禁忌及用藥不誤調養順候則元氣充實腠理堅固脾胃強健飲食如常二便清調矣若補益太過漿足之後重用參芪容亦有腹脹喘急之患用枳殼湯亮陳朴 枯艸誤用五苓木香多則有大便秘塞之患用寬中散便實而渴梨門冬湯門生歸 芎艸過用丁桂辛熱之劑則亦有咽喉腫痛煩躁閉渴之變滋陰潤燥湯施冬 趙制 薄芎 生花 粉歸 通粘蓋喘急腹脹大便秘堅煩渴咽痛皆類實症也然而氣

虛變實者非真實也是病淺而用藥過深之失也只宜斟酌不宜疎通重治疎利太過則方生之氣復虛而脫症將至矣

虛症似實辨

氣虛痘症或為飲食生冷調理失宜致傷脾胃遂成泄瀉津液下陷虛火上盛必發而為渴元氣下陷則虛陽上擁下氣不續必發而為喘夫渴與喘實症也起於泄瀉之後則津液暴亡而渴氣虛而喘豈有實熱而渴氣擁而喘生於泄瀉之後哉故治

證治大還

幼幼近編 卷之一 癩癩必至 眞白堂

瀉則用參苓白朮木香散參苓 朮 木香 薏 藥蓮肉 砂 桔渴瀉不止異攻散喘則用人參定喘湯參 朮 黃 阿 膠 牛 夏 桑皮 獨參 杏仁 湯 喘 渴 而 泄 木 香 異 攻 散 悶 亂 腹 脹 毒 成 內 攻 眼 合 自 語 已 名 失 志 謬 認 為 實 醫 何 愚 哉

擁熱實症似虛辨

身發壯熱毛直皮燥睡臥不寧腮紅睛赤氣粗煩渴腹脹便秘喘急皆實症也此熱盛毒重擁遏之故而又見嘔吐之症嘔吐似虛也然未知熱毒在內

吐 泄 瀉 痢 嘔 噎 食 不 欲 食 嘔 吐 泄 瀉 痢 嘔 噎 食 不 欲 食

不得伸越，則上逆攻冲而吐。經曰：諸逆攻冲皆屬於火。是也。或為寒，或為熱，或因乳食不節，致傷脾胃，則使內熱不得發越，冷煖相拒而吐。毒不得伸越者，從升陽發散為最相拒而吐者，引之在下。如苓澤瀉、橘皮之類。又有泄瀉之症，兼見者，泄瀉似虛也。然因熱毒鬱盛，熾灸脾胃，不得外達，則毒從下陷，尋數而泄。所謂熱毒下注者，是也。古云：未出而瀉者生，既出而瀉者死。槩可見矣。治法以升提發散，引毒達表，毒得外解，則內泄自止。兼傷食而證治大還。
幼幼近編 實錄錄解 卷之一 貞白堂

瀉者，輕則加消化之劑，重則從之。又有不思飲食，書云：不思飲食皆屬內虛者是矣。然不知鬱熱之症，蓋因毒氣在內，不得伸越於肌表。二便秘結，腠理阻塞，熱毒擁盛，腹脹滿急，不思飲食者，必然之勢也。治法以升提發散，引毒達表，則熱氣有所伸越，而臟腑和平，飲食自進矣。若誤用丁香、半夏等熱藥於嘔吐不食之症，是以熱攻熱，而轉增煩劇。用參芪、苓朮等補於腹脹不思飲食之症，則邪得補而愈盛矣。他如龍骨、豆蔻雖能止泄，神瀉、麥牙

雖能助脾化食，皆不當用於擁熱不食之症也。
熱症變虛辨
血熱痼症，只宜清涼發散，不宜酸用苦寒。若過投寒劑，如升麻、本連、及滑泄之藥，必致內傷脾胃，外水肌肉，脾胃傷輕，則飲食減而滑泄重，則洞泄無度，而遂致虛寒。肌肉水，則熱蒸內行，腠理開泄，痘不肥大，不起發，不行漿，而遂成伏陷。此熱症變虛之驗。虛証既明，便從虛治。參芪、丁桂，亦所不忌。五六日後見之，則本香異攻，在所宜施。惟在審症而斟酌之也。
幼幼近編 熱症變虛辨 卷之一 貞白堂

證治大還
幼幼近編 實錄錄解 卷之一 貞白堂

擁熱變虛辨
毒盛擁遏，固宜升提發散為主，而佐以清涼解毒為善。又宜得平乃止。若發散太過，必致肌表空虛，元氣耗散，內貫清漿，或虛擡空殼，或痒塌外剝，或潰爛不收，百變皆至。見此數端，皆成表虛。表既虛，則元氣從此耗泄，而內氣亦不能以自守。畧傷飲食，或生冷，則成泄瀉。泄瀉不止，遂成虛寒，而氣脫煩渴，悶亂寒戰咬牙，無所不至矣。既知虛症，治從虛

例參芪白朮丁桂薑附亦所不忌六七日後見之雖木香異攻亦宜急進在察症而酌量之也

實熱擁遏痘症用木香異攻散辨

實熱擁遏之症多用寒涼致水泄瀉發散太過或成表虛既成冰硬藥宜溫和薑桂之熱亦所不忌泄瀉之後熱氣自散真氣自虛既成氣虛藥宜補益氣虛必寒虛寒既明藥宜溫補是以始出之時雖為血熱擁遏至於三四日後身反不熱肌膚冰冷痘瘡不長焉得不進以溫和之劑如官桂乾薑川

證治入選

幼幼近編 實熱擁遏 聖 貞白堂 卷之一

芎之類使內氣一緩則外氣自和泄瀉之後其內必虛雖有腹脹煩渴喘急焉得復為實熱不過內虛伏陷毒成內攻而然故實熱之症七八日曾經泄瀉皆從虛治有木香異攻症便進木香異攻為貴如無冰硬之症切勿悞投溫劑無泄瀉之症勿得悞投木香異攻等蓋塌陷倒靨乾枯而無冰硬泄瀉之患者多因熱毒內攻而然故宜百祥猪尾等方以治之可也

治虛弱痘症有二法

小兒痘症的係氣虛則宜補氣氣虛易寒又宜溫之溫補一法之中酌量輕重處治方為妙用

治血熱擁遏有五法

表熱盛則痘必乾枯表太涼則冰伏內熱盛則秘結內太涼則泄瀉氣擁盛則腹脹喘滿熱毒為所抑而不伸越則腹脹狂亂毒氣彌盛則表裏受重而嬰童難任是故治痘之法在安表和中勻氣透肌解毒五者而已安其表使無乾枯冰伏之患和其

證治大選

幼幼近編 治虛弱痘症 聖 貞白堂 卷之一

中使無便結泄瀉之變勻其氣使無擁盛喘滿之過透其肌使熱毒得以伸越而達表解其毒使內外有所分消五者不失則血熱擁遏之症勢雖綿密亦不足憂矣

痘有當微汗下者

治痘有云非微汗則表不解非微下則裏不解曰微者恐其過也此言表熱方熾紅點未見之先影而不出煩躁壯熱面赤唇裂喘促而浮身體疼痛肉腫瘡不腫或停毒不成漿或外冒風寒毛竅森聳腠理閉塞起不活動或痘色乾紫若此宜以輕揚

之劑微開腠理不致毒氣離於皮膚之間使痘易

出然或滅其盛勢也如惺惺散與升麻湯

參蘇飲之類蘇葛前杏桔亮桑橘依半神姜曰既出紅點忌乾葛

悉其表虛故也表實者用亦無妨亦有當下之症

而不下者後成紫黑擁毒熱結血枯又為失下之

患張煥曰痘未出時脈數洪大小便秘赤大便秘氣

粗腹脹唇燥煩渴語睡臥不寧或痘色紫赤此

是毒氣擁鬱而不得洩宜微下之使內無阻滯衛

升降痘出順矣血分熱六一順氣湯大黃枳朴硝紫苓芍艸

證治大還幼幼近編 卷之一 痘疹下者 望 貞白堂

氣分熱宜風散荆防羌活參芎朴藿陳甘加玄明粉之類大

抵痘疹首尾無急症慎不可汗下恐元氣一耗漿

無自而成後必為患矣

朱杏庄云發熱之初紅點未見之先表熱壅盛非微

汗則表不解裏熱壅盛非微下則裏熱不解六日

之前正好用功此痘家之要訣也

丁心崖云若熱而不躁大便雖三四日不行小便雖

赤澀而腹不脹止宜用紫草水通使小便利而熱

泄大便自潤矣甚不可妄下

痘不可妄表妄下

錢氏論痘疹一症發散轉下皆稱不可妄者恐其用

之不當也有痘本稀疎原無閉塞表熱不快之症

即發散之藥亦不敢輕用苟妄用重藥以汗之則

在後必成斑爛音嘶皮薄痒塌而為虛脫者多矣

有氣血本和原無便秘熱毒紫黑之症即寒涼之

味亦所不宜苟妄用重藥以下之則在後必成陷

伏不起胃弱灰白而變虛羸腹脹者多矣此妄表

妄下之過也醫者可不審其表裏輕重之宜而輒

證治大還幼幼近編 卷之一 痘疹下者 望 貞白堂

施汗下哉

宋杏庄云痘有可吐者吐中即有發散意如滴水不

入毒氣氣逆也宜吐食飲痰停形色生變陽氣壅

遏也宜吐惟氣虛多汗者禁之吐法用細藥升麻梔子豆豉煎服探

陳氏幼幼近編 卷之二

雲間陳 治三農甫述 男

師 栢幾先 全訂

三韓張載齡弘度甫閣

門人

范 欽民纂
當潮高 廷東

時熱四臟形症

夫痘之發也藏於內者有各臟所屬不同彰於外者有時熱形症之異何以見之夫寅卯辰時潮熱阿欠煩悶者屬肝之液為淚淚出於水其瘡之色青而小日午未時潮熱時作驚悸者屬心主血其瘡多斑色赤而小申酉戌時潮熱面赤咳嗽噴嚏者屬肺之液為涕涕濁而淡其瘡色微白而大亥子丑時潮熱乍涼乍熱手足冷多睡者屬脾統血所發為疹其瘡色多黃而淺獨腎在腑下不受穢濁故無症耳然就冷耳冷腎之平証也故已上五臟之症獨見多者即於其臟之毒特甚治之醫者要識此意

證治大選

幼幼近編 卷之二

時熱四臟形症

貞白堂

五臟屬陰然痘瘡出五臟面部先見稀少者為佳六腑屬陽然痘疹出六腑頭面成粒淡多者為妙順症

凡痘順者始出必自口鼻腮耳年壽之間尤見幾點

淡紅潤澤如珠三日內陸續而出大小不等頭面

稀疏胸背或少或無四肢溫煖神氣清爽乳食如

常二便通利不吐不瀉睡臥安穩身涼脈靜痘與

肉色紅白分明依期長貫肥滿光澤皮厚堅硬摸

之碍手根有紅暈雜症俱無此為氣血依附表裏

和平之順症也不治自愈但宜適其寒溫節其乳

食而已

逆症

證治大選

幼幼近編 卷之二

順逆症

二

貞白堂

凡痘逆者多起於天庭司空太陽印堂方廣之處齊湧掀發密如蚕種中有黑點如針孔黑紫乾枯色如赭石形如蚊咬青點如痣紅斑似錦面腫唇焦聲音預變痘與肉色不分壯熱煩躁喘渴悶亂乳食不進上下失血肚腹脹滿腰腿酸疼此實熱極重之症細如痞子形若水珠皮膚軟薄灰白陷頂慘暗不明平塌不起色如紙白吐瀉不寧乳食不下四肢逆冷神思昏沉此為虛寒極重之症是二症雖有虛實之殊而要皆凶逆之候也

險症

夫順痘不必治，逆痘則難治。其可治者在介於順逆之間而為險症也。發熱之時，或鼻塞聲重，或身痛頭疼，或吐瀉作渴，或手足俱冷，或驚悸不寧，或痰涎壅盛，此發熱之險也。或熱未透而即見苗，或痘出齊而熱不退，或出而不快，或快而不紅，紅而太赤，赤而微紫，此則見苗之險也。或當長不長，或方長忽定，或痘長而肉不腫，或肉腫而痘不長，或雖長而頂不尖，或頂尖而色不順，此則長發之險也。

證治大還

幼幼近編

險症

三

貞白堂

或當貫而不貫，或貫而不滿，或滿而漿清，或漿清而皮薄，或將成就而色白，或將成就而色紫，此則貫漿之險也。或當靨不靨，或自頭以下先靨，而頭面不靨，或自頭面先靨，而遍身不靨，或為外剝而膿血不乾，或為內攻而臟腑不調，或形如豆殼，而俗呼為倒靨，或身如火熱，而誤以為蒸疤，此又收靨之險也。危急存亡之際，頓轉移挽回之者，何如耳。

死症

初出紅紫紫發斑，五日死。初出滿頂連肉俱紅者，八

九日死。斑如錦紋，及頭面一片如胭脂者，六日死。

痘初如綿摸不得手，如湯泡火燒者，十日後痒塌

而死。痘出腰痛不止者死，煩躁紫黑口臭者死。肉

面腫而痘不腫者死，未出而聲先啞者死，聲啞氣

急者死，舌卷囊縮，目無魂者死，吐瀉不止，蛔虫出

者死。痘出三四日，根窠全不起者死，痘未見而肌

肉中有紅腫如瓜者死，頂陷有眼，如針孔紫黑者

死，陷伏腹脹，神氣昏迷者死，皮薄漿清，八九日孤

證治大還

幼幼近編

死症

四

貞白堂

或者死，痘與皮肉一般紅者死，腹脹滿肌肉黑者死，乾枯痒塌空瘡者死，泄瀉便血，乳食不進，痘爛者死。二便通，目閉聲啞者死，痘後驚者死，當靨不靨，痒塌無膿，皮如血殼者死，寒戰咬牙，口，手足戰掉者死，手足厥冷，上過肘膝者死，痘雖起，根窠毫無紅色者死。

驗形察色

形乃氣之充，色乃血之華。痘之輕重，由於氣血之盛衰，而氣血之虛實，則由形色之善惡以辨之也。初

證治大還

幼幼近編 卷之二

驗形察色

五

貞白堂

出之時點若蚊咬滯而不起雖起塌潤皮薄而軟斜視若無面唇先腫小者稠密而大者平陷此皆氣虛形重也小而高聳根欽圓淨先出先長日見活動光潤不燥堅實碍指頭面稀疏飲不減此皆氣旺形輕也見點之初頂若火刺紅而乾枯紫而昏暗夾斑帶疹白而枯澁黑若塵鋪此皆毒滯色重也初出淡紅漸覺明亮四五日之間頂若水白根窠紅潤此皆血活色輕也然則治痘者豈不因其形色之輕重而藥之哉雖然色固以紅活為貴

然淡紅一線緊附於根下而無走散之勢者吉血雖依附根脚紅色隱隱出部者險痘色於肉不分平鋪散漫者凶陸氏云氣虛則頂陷氣散則塌陷血虛則其暈必枯血離則其根必散李時中云根窠者血之暈膿者血之腐六日以前專看根窠若無根窠必不貫漿六日以後專看膿色若無膿色必難收靨

宋杏庄云頂白根紅氣血分也在四五日之間不分後必作痒頂充根附氣血交也在六七日之間不

證治大還

幼幼近編 卷之二

驗形察色

六

貞白堂

交後必有變深紅壯熱疔將發也四五日前宜清五六日後宜補氣血之分清濁之本乎上下也氣血之交陰陽之互為依附也當分不分毒結之也當交不交毒隔之也知升陽散鬱何不分之患知清熱解毒何不交之憂

王抱真云夫痘色以紅活為美若太淡而灰白此血衰氣滯也急宜補血行氣若太紅而乾枯此血熱毒盛也急宜涼血解毒若失於清利必變焦枯黑紫而成氣血凝滯之症血一凝滯將何物化水成漿乎一見焦紫黑陷須用湧泡飲右本連梔蘆根知通亮柴犀若肚腹膨脹大渴大熱煩躁發狂五六日不大便此表裏實熱也非下之不放

寒熱

夫火動則熱火鬱則寒寒極則熱熱極則寒此陰極陽生之理也惟痘之寒熱多主於內虛者然痘未見時或出不快而寒熱者此或因風寒外束腠理閉密毒火內鬱也七日以後而寒熱者為氣血虛弱不能領載其毒毒火內鬱亦毒盛之過也凡治

此者實則發散以清氣道虛則補益以固其元而已
風寒

瘡出不振或已出而熱不退須看其身若皮膚粟起
毫毛直豎氣粗熱盛身體戰動腹痛身疼有惡風
畏寒之意委曲避風處先見先長者此風寒外束
也未出宜用發散升提之劑已出看虛實而佐以
升發之藥貫漿時宜水楊湯以浴之也

丁氏云風寒外襲致發熱熾盛晝夜不減或惡寒頭
痛鼻流清涕或煩躁喘滿出而復隱急宜發散升

證治大還

幼幼近編 卷之二

寒熱

七

貞白堂

提失而不治致陰陽壅閉壯實者夾班斑爛虛弱
者肢厥面青倒靨白陷表不得散毒必內攻急用
如聖養元湯薑桂等溫藥

痘已見點反加壯熱煩躁渴悶復隱而不出此由毒

氣彌盛榮衛受其蒸熱壅滯不行也此症最惡急

用加味消毒飲倍紫草木通失而不治則先出者

不能起發後者為之愈難因而失血或紫陷煩躁

悶亂而死矣

痘疹驚搐

痘疹驚搐皆由心火熱盛肺金受尅不能制伏肝木

熱則生風風火相搏神氣不安故發驚搐實非驚

症不可妄投涼心之藥而藥以驚劑治之致心寒

而肌飲毒氣內陷痘無由而出也治當平肝木利

小便為切要瀉肝則風去利小便則心熱退風熱

既定則痘隨出而驚搐自愈用透斑散使痘疹一

出歸胃劑脫甘竭白附
鈞紫通葛防芷芍 則火力分解而驚搐自定

矣然痘前驚者多吉痘後驚者多凶蓋痘未出之

先熱蘊於內故作驚搐痘出驚止而內無凝滯故

證治大還

幼幼近編 卷之二

痘疹驚搐

八

貞白堂

吉痘出之後氣血虛弱復感風寒熱毒反滯又毋

敢輕易發散故凶外有發熱之初忽手足腰項強

急直視牽引口張舌強狀如中風此熱極生風也

宜參蘇飲加柴胡蟬退牛蒡子紫草防風
桑橘 杏桔 使痘苗一見則火力分而風自息矣有痰加

玄明粉若痘後見此症者危由氣血虛極使然也

用九劑參州芪飲加熟附竹瀝

用九劑參州芪飲加熟附竹瀝

撮唇弄舌

撮唇弄舌乃心脾二經熱盛所致舌乃心之苗唇乃

脾之絡邪毒太盛不得發越攻擊心脾故也宜十
神解毒湯加犀角荆芥紫艸歸尾生紅丹赤芍枯通翹芎腹使火
毒出而心脾安唇舌自寧矣見於貫漿及痘後者
此虛熱生風也四君子加熟附

狂呼喘呼

痘出有狂呼喘呼由臟腑熱盛津液耗消無陰氣以
濟之也此症多大小便不利宜芎歸湯加紫草木
通瞿麥燈心枳殼粘子麥門冬葛根發出其毒使
胃熱散而諸症自無矣

證治大選

幼幼近編
卷之二

痘毒

九

貞白堂

痘出啼哭

痘出啼哭者須察虛實用藥若壯熱面赤飲水尿赤
便秘腹脹此熱毒壅滯也宜消毒飲加紫草木通
枳殼粘子防若大小便如常身熱不甚偃僕而啼者
此腸胃虛寒腹痛故也宜理中湯參朮姜

變黑腰疼

夫變黑與腰疼之痘俱屬火盛熱極而然經所謂亢
則害承乃制之意也外火灼於皮膚之間故其色
黑火熱亢極腎水枯竭故腰疼耳獨不觀腰疼而

後出者其色乾枯非紅則紫非紫則黑是變黑腰

疼之症其屬火也明矣宜黑龍散或涼血消積飲

或用清涼解毒於見點之初斟酌下之亦可赤芍歸尾

丹紅茅根查紫使熱毒得解然後調理氣血如此

治之庶可挽回於萬一不然束手待斃悔無及矣

虛廉夫云黑紫乾枯固症之逆也若紫黑而未至

於乾枯點不稠密色尤明潤依期長貫如無雜症

此又為血熱氣實之症治宜涼血活血勻氣解毒

若是純黑色此血熱太甚熱毒凝滯也可用活血

證治大選

幼幼近編
卷之二

變黑腰疼

十

貞白堂

透斑散若黑如炭者此為血死不可治也

丁心崖云痘瘡變黑歸腎之說甚無謂也蓋血載毒

出上參陽位因氣弱不能復歸本位血失氣以榮

養故枯萎而黑也宜保元湯加芎歸肉桂紅花使

氣旺則血流行而自變黃色矣

灰白平塌

痘有灰白平塌者乃氣血虧弱而變為虛寒也蓋充
發者氣華色者血氣血無虧則起發紅活而飽滿
光榮今氣虛則不能起脹血虛則不能華色故為

灰白平塌也宜十全大補湯加木香參朮苓艸熟地歸芍芩芪桂

宜發氣血助痘成漿內有熱者加清利解毒之劑

使血活氣行白可變紅塌可起聳苟單補氣而不

補血則氣燥血熱恐增發痒也不應用萬靈丹甚

妙山甲辰砂若灰白而頂不陷是為血虛宜四物

加黃芪紅花人參頂陷而色不灰白是為氣弱宜

保元湯加河車官桂參朮艸陳姜棗

發痒

痘瘡發痒皆熱之所使也蓋微熱則痒甚熱則痛丹

證治大還幼幼近編 發痒 上 貞白堂 卷之二

溪云痒塌以實表之劑加涼血藥不可遽謂虛寒

而用溫補之劑須當以形色外症別之若痘色灰

白陷塌精神虛弱小便利大便溏此氣血脾胃俱

虛虛火遊行無制而痒也宜四君子加黃芪酒炒

芍藥白芷肉桂蟬退何首烏或木香散若痘色紅

紫煩躁大小便秘渴欲飲湯此氣虛血熱毒盛而

血行氣分陰血盛而乘於陽宜實表涼血用荆芥

丹皮生地酒炒芍藥當歸連翹白芷蟬退木通人

參或以一味白芍藥酒炒煎服若發熱遍身痒甚

瘡破者此風熱乘肺也蟬退散加何首烏山甲

黃若腐落時發痒者由血化成漿血虛不能榮養

腠理也宜四物加黃芪紅花荆芥外俱用荆芥穗

為帚掃之

宋杏庄云搔破有血復貫成漿微渴微痒不瀉莫慌

不塌而痒有膿可治不痒而渴便實可醫無膿痒

塌忌瀉聲啞

啞啞作瘡

咽喉作瘡由心胃有熱大腸秘結熱毒上攻也宜甘

蜜湯合消毒飲加紫草粘荆 甘防若咽喉則有虛實之

殊焉咽以嚥物而通於胃喉以候氣而通於肺肺

體清虛不欲窒碍今毒滯於喉管簫窄狹故咽啞

也若初出未出之先而啞者因風寒外束腠理閉

密實熱壅遏不得達表上薰肺金而啞也宜用發

散升提佐以和解透肌之法如甘桔湯加防風蘇

葉荆芥紫草川芎蟬退有氣拘血載熱毒上行熱

能生痰痰碍氣道其毒不能盡行肌表而啞者宜

甘桔湯加荆芥地骨皮陳皮貝母苦痘出紅紫而

肺 大 功 乘 後 症 喉 成 痰 加 起 非 聲 聲 咽 喉 生 紅

見此症者此火氣上炎熱毒壅塞氣道也宜用涼

血解毒佐以升提清氣之劑宜甘神解毒湯生紅

升赤芍枯通起非聲加甘草鼠粘子荆芥若痘色灰白不

起而見此症者乃氣血虛弱脾肺受傷也宜大補

氣血畧佐以升提宜保元湯參朮州 陳姜棗加芎歸桔荆

若七日已後而見此症者此咽喉之痘起脹以致

氣道窄狹也不治自愈若屬後而見此症者此因

氣虛火炎上餘毒乘於肺也宜甘桔湯加地骨

皮知母參門冬人參荆芥鼠粘子兼咳嗽聲啞身

證治大還 幼幼近編 發奔吟 圭 貞白堂

熱此風寒乘虛入客於肺也宜參蘇飲加杏仁蘇

前林亮若倦怠嗜臥而咽啞者喉舌必腐蝕也痘

後咽啞者腎經虛熱也六味地黃丸熟黃藥 茯苓

水噎

水噎者火氣上炎毒擁厭門不易進納乃溢入氣喉

氣喉不受物故發噎也然進穀食而不噎者以食

有渣滓能自入其門非若水溢而犯氣道也不因

飲食而噎者為乾噎皆熱毒壅塞於肺不得盡行

肌表故也七日以前宜升提清氣解毒之劑用甘

桔湯加麥冬玄參荆芥鼠粘子酒蒸蒸脹之時不

必治善治者當觀毒成之痘於其咽喉乾燥之先

即用前方以清氣道不使熱毒有犯自能免此矣

而唇預腫

大頭面乃諸陽之會有痘至五六日頭面預先腫者

此因氣虛而毒乘諸陽之分也弱則受其制吸須

大補元陽兼解毒勻氣不然八九日必內攻而死

矣至於唇舌者口為脾之竅舌乃心之苗痘未出

時宜紅活如常不宜燥烈如見黃白赤紫而不潤

證治大還 幼幼近編 面唇預腫 圭 貞白堂

澤或氣粗熱盛舌白至唇淫處皆熱毒內傷脾胃

也急用十神解毒湯歸尾生紅丹赤芍 枯通翅芍腹荆加蘆根山

梔又如唇上痘出相連諸痘未漿而此痘先為黃

熟則其毒已內攻使痘亦難化漿俱為不治之症

間有氣血下陷毒攻唇口糜爛成疳而有黃白膿

水者此又差為可治也若痘未宜膿而唇口結乾

紅渣滓頰紅唇紫此乃欲成肺癰之候治宜大連

翹飲解毒清肺翹歸芍防滑柴通 本荆梔車芎脫神若痰喘作嗽又

宜參蘇飲注之也蘇葛前杏枯 亮桑橘茯苓唇裂腫慎齋用紫

草膏或石磨水塗之。

寒戰咬牙

夫痘症有寒戰咬牙者或謂心火熱其亢極而戰反兼水化制之此為病熱或曰俱屬於寒如嚴冬之氣伏陽在內不勝其寒手足戰慄而齒自動也此陳氏以水香異攻而取效非寒而何偏熱皆未得其病之旨也斯症有先後之序用藥有緩急之宜七日以前寒戰者乃毒火亢極蘊蓄於內而未遂其發揚之性故戰慄動搖也當以表熱治之七日證治大還

幼幼近編 寒戰咬牙 圭 貞白堂 卷之二

以前咬牙者乃陽明胃經主之陽明主肌肉其經走上下齒齦邪併陽明故咬牙也主胃熱宜清之七日以後寒戰者乃陰凝於陽陽分虛則陰入氣道而作寒戰也宜以氣虛治之大用參芪加薑桂木香丁香河車附子以溫陽分七日以後咬牙者陽陷於陰陰分虛則陽入血道而作咬牙也作氣血俱虛補之大用參芪加當歸川芎黑薑以實陰虛若寒戰咬牙泄瀉齊見者用異功散去厚朴加黃芪

木香桂歸參茯苓陳朴丁香果腹附子半

或解命丹七日以前有此

症者屬熱七日以後有此症者屬虛須兼痘色而辨其吉凶然此二症多發於痘後泄瀉無漿者則屬虛無疑雖有少熱亦餘熱耳

乾枯紫陷黑陷

夫痘有乾枯紫陷黑陷者皆血熱乾燥而氣不運行也蓋氣虛則為陷為塌血熱則為乾為燥痘出乾紅紅必變紫紫必變黑黑必枯陷此內熱漸變一定之機也治者當於乾紅之時急宜解散涼血退熱清利頂雖平陷不可以氣虛一例而用參芪補證治大還

幼幼近編 乾枯紫陷黑陷 圭 貞白堂 卷之二

劑補則氣愈盛而血愈乾涸矣丹溪云瘡乾者宜退火止用輕劑荆芥升麻葛根之類至於紫陷黑陷則熱勢已極宜用湯泡飲烏龍散

石岑連根蘆根知通亮柴

犀角回生散歸芍芍藥生升紅奪命五毒丹

歸尾生紅丹赤芍枯通翹芎腹荊加犀角石膏蟬退蘆根荆芥亦

當以唇舌滋潤燥胎分別用藥

陷伏倒陷

陷伏倒陷者其形畧似其症不同未滿而陷塌者陷伏也已滿而復陷者倒陷也陷伏者因氣血虛不

能充發故平塌而不起其痘色必白其人必不能

食或倦怠或肢冷或吐瀉此內虛而不能出故為

陷伏也當此宜用辛溫之劑令其胃暖而榮衛無

滯必自然起發矣宜復甦散補靈丹木香異攻之

類參芪朮艸附子丁倒陷者痘已起脹或被風寒

所感使肌竅復閉或被惡氣所觸使氣凝滯而不

行故滿而復陷也風寒者其身必痛肌膚粟起觸

冒者痘色昏滯或忽然紫黑此為外邪觸冒而倒

陷也風寒者宜溫肌發散如參蘇飲加紫草蘇葛

證治大還幼幼近編 陷伏倒陷 古 貞白堂

枯壳桑 橘茯苓蟬退僵蚕或用麻黃五分去節水煎去沫

服之穢氣所觸者平和湯加木香山查使氣流通

而痘必復長矣若因吐瀉而倒陷者補中益氣湯

參朮芪艸 歸柴升加肉果茯苓或補靈丹河車參鹿茸 靈山柴丁桂

宋杏庄云痘陷有五有白陷灰陷紅陷紫陷黑陷桂

岩皆責氣虛而執用補悞矣蓋灰白陷而唇舌滋

潤身不壯熱曾經吐瀉痘色變遷而陷此氣虛也

若唇舌胎燥壯熱燎人痘色焦紫此熱毒壅滯也

外實則解之內實則清之下之內外無症則平調

之

周慎齋云四五日其痘紅紫四物湯加荆翹牛蒡子

紫草疎毒全在前胡熱盛必用沙參過用寒涼反

逼邪內傳而不救矣

煩躁啼哭

夫發痘之時五臟熱毒自裏達外有煩躁悶亂不眠

譫語發狂啼叫者皆由熱毒蘊蓄於中而不得發

越故也宜透斑散發越其邪熱歸芎荆蟬甘竭白 附約紫通為並防

考則火力自分而狂煩自止若遽用涼劑決不能

證治大還幼幼近編 煩躁啼哭 古 貞白堂

發越而為害矣大小便秘者當清利之煩躁厥冷

者吳茱萸湯貫膿之時煩躁者蓋因諸痘起脹窒

塞鼻孔氣難呼吸故也不必治痘後煩躁者蓋因

氣血虛弱餘熱積於內也宜大補氣血為主佐以

麥門冬五味子之類而煩躁自定矣或用牛黃一

二分冷水下

宋杏庄云發熱時煩躁譫語顛狂是熱甚矣表外邪

內毒兩相激搏也重發之即愈倘舌見黃胎非下

不可

口乾發渴

渴皆火盛水竭之故。但有虛實之殊耳。出不快而渴

者。此熱毒壅遏。不得達表。薰蒸臟腑。津液耗消而

然也。宜升提解毒。利水清金。用十神解毒湯。歸尾

丹赤芍通加荊芥葛根。使熱毒外達。而渴自止矣。

痘已出齊。其色灰白。或泄瀉而渴者。此元氣極虛

不能生津液也。保元湯。參朮加麥門冬五味子

或參苓白朮散。參朮若痘色煩紅。乾燥

而渴者。此熱毒盛也。宜退火解毒。加味消毒飲。粘

證治大還

幼幼近編 口乾發渴 卷之二 元 貞白堂

甘防脫通去升麻。加葛根。便實燥渴者。麥門冬湯

查紫翹升歸芍。屬後渴屬氣虛者。參苓白朮散。加五味子麥

門冬。屬陰虛者。六味丸。熟黃藥加五味子肉桂

周慎齋云。屬後乾燥。發熱渴甚。即與之水。以防絕陰

咳嗽痰涎

痘疹咳嗽。在欲出未出之際。乃熱毒上薰清道。肺氣

不利。宜惺惺散。已出之後。則元氣虛弱。不能固衛

腠理。風邪乘虛而襲。宜五味異功散。加桔梗。亦有

痘後咳嗽脇痛者。經曰。左右者。陰陽之道路。兩脇

之謂也。由餘毒在中。陰陽之氣不能升降。故作脇

痛。治宜小柴胡湯。加赤茯苓五味枳殼桔梗之類。使

二氣流行而痛自定矣。有痘疹痰涎膠固。因毒氣

閉塞。而有碍於津液。不能流通。故作痰涎。正氣被

塞於胸膈。或喘或嗽。喉中作聲。如拽鋸。乳食湯液

入口。即嗽吐出者。此毒氣停積於肺胃也。當升發

解毒。若用半夏等治。非其法矣。滴藥不受者死。

痘內夾班

夫班者。乃血之餘也。有點而無頭粒。然痘隨臟而出

證治大還

幼幼近編 痘內夾班 卷之二 元 貞白堂

其勢迅速。血熱毒盛之痘。煎熱血分。逼血外溢。故

太過之血。夾毒上浮。乘其痘之熱。而發為班也。如

痘毒起齊。內必虛矣。內虛則班從內解。如不解。當

散其火邪。兼活血解毒之藥。用玄參升麻湯。加紫

草黃芩荊芥芍歸芎犀。若青黑紫班。乃毒氣不能

發泄之故。須防發疔。死生在反掌間也。大便秘急

與四順清涼飲利之。大黃赤大便不秘。急與涼血

解毒湯。紫丹生翹赤芍牛在初多用表散。在後多

用解利。伺其班退血附。隨即用補藥。以防其損陷

之患用四君子。參朮加黃芪薑棗煎服結痂之後

而發班者餘毒煎熬肉分其班必爛宜解毒湯。石中黃升大青菊下竹葉芎歸黃芩石膏紅班易退紫班稍

難藍班不必治。

陳三農云痘瘡有發班發泡者氣血之盈於常也蓋

毒壅於氣則發泡泡者氣過甚也火搏於血則班

班者血有餘也血熱發班失於解利耳。邵公用升麻葛根湯

加紫草蟬退犀角水

痘夾丹疹與麻疹不同

證治大還 幼幼近編 痘疹 圭 貞白堂

夫痘毒麻毒各有不同蓋痘毒出於臟腑出於臟腑

屬陰陰主血故痘有形而有汁腑屬陽陽主氣故

疹有形而無汁此皆中於有生之淫火本非尋常

並發者惟痘出之時或風寒閉塞腠理或熱毒壅

遏不得發越熱氣擊動臟腑故並出耳此亦不順

之症也錢氏云痘只出一般者善凡痘已見形其

間碎密若瘡子者夾疹也此由火毒薰灼於中故

使疹夾出於外也痘當從外解疹當從內解如痘

內夾出丹疹不必治之當以托痘為主痘出而疹

自發矣若疹重者亦急宜解毒使疹子消散痘亦
早得單宜消毒飲加升麻玄參酒茶。粘荆若疹
不退者凶。

周慎齋云痘夾班疹是表實風熱鬱於血分宜蘇葛

湯倍前胡桔梗加羌防荆芥蟬紅花連翹牛蒡

子使邪從表散若過用寒涼則血凝氣滯陰無陽

生而變黑矣。

邵公云痘夾疹宜麻黃葛根湯解之而疹自退。

水泡

證治大還 幼幼近編 水泡 圭 貞白堂

痘疹發而為水泡者乃毒盛火熾水火相激於皮膚

之間故為水泡若沸釜焉下之火盛則釜內之水

必為之發泡也亦有脾胃虛弱不能制水以致水

溢於皮膚之間而為水泡者治當補脾順氣而虛

泡自實矣凡泡白而空者氣虛有火宜四君子湯

加地骨皮白而有清水者毒擊其水宜潰苡湯。赤茯苓

赤茯苓官桂紅紫者血之熱宜十神湯。歸生紅丹

腹劑皆熱毒未出而賊邪先為之害也。

周慎齋云上身結痂下身水泡宜四君子加山查利

之

予按虛泡者火毒傷肺也宜用參芪生甘草地骨皮麥門冬水泡者火毒上炎搏激其水而泛溢於皮膚也非氣之實也宜前湯加草薢澤瀉二者皆氣虛不能制火火氣上炎傷肺肺主皮腠故也有謂氣位獨盛而為水泡者此不通之論也夫出痘之時氣只有不足所謂氣實者因氣虛而火毒乘於氣分也

失血

證治大遺

幼幼近編

失血

三

貞白堂

卷之二

痘出失血皆由熱毒壅遏於血分之中熾火沸血故錯經妄道流散無統也痘賴血以化漿今驟走失逆之甚血有從口鼻出者有從大小便出者有從瘡毒出者悉皆難治急用犀角地黃湯丹加荆芥生甘草間有從鼻出而得生者由氣盛逐血血載毒奔行週身傳住督脉斬關而出不犯其內故也至於口并大小便出者多凶從痘毒出者則為走泄走泄多肉分空虛毒無定位是皆有犯於內為難治也

薛立齋云心脾熱盛犀角地黃湯心肝熱盛小柴胡加生地大便不通先用四順飲次用犀角地黃湯色赤痲痛二便不通急用活命飲加硝黃若色赤痲痛惡寒發熱活命飲加麻黃便血若痘出四五日倦怠少食此脾虛不能攝血也宜補中益氣湯加白芍身熱煩躁大便下血黃連解毒湯

小便黃赤不利

小便不利有虛有實煩熱作渴是熱毒壅瘀宜紫草

木通湯加粘子瞿麥消毒利水不渴少食是氣虛

證治大遺

幼幼近編

小便黃赤

三

貞白堂

卷之二

不能生水宜補氣養元又小便不利兼腹脹者乃伏熱在胃中有所隔生則心火不能降故小便不利下則陰氣不能升故心腹脹也亦用紫草木通湯發其出毒而胃熱自散矣

大便秘結

痘瘡固不宜泄瀉亦不可久便秘久閉則腸胃壅塞脈絡凝滯毒氣無從發泄則聲啞乾黑不旋踵而至矣然秘結之由有因熱氣燥結於下有因汗多或利小便或血熱血燥皆致大便秘不利凡口乾腹

服身熱煩躁者此熱秘也三日前後用大柴胡湯

紫芩芍藥枳殼前胡紫草涼膈散下之 翹梔芩枳大黃

也宜補氣血為主順腸飲生熟桃麻仁歸紅 條芩壳升大升 麻仁

九今仁麻仁大黃藥 凡秘結當分三部上結則宜

降氣清涼中結則宜行氣活血下結則宜通之以

蜜導可也如起脹貫漿時四五日不大便者乃氣

血成漿又因血熱不須治之只宜清涼活血而便

自通矣若貫漿時以至痂落而尤不通者用真麻

證治大遺 幼幼近編 大便秘結 真白堂 卷之二

油以竹筒灌入穀道中須臾自通不必用峻劑以

致內虛也

陳三農云出一二日大便閉結是血枯腎無濟之義

宜清涼芍歸湯合消毒飲加枳殼紫草不則灌膿

時必喉痛乾陷不起痰涎湧盛狂言加石膏過用

補法必成內攻

痘疹泄瀉

痘疹泄瀉在發熱之初或泄瀉一二次精神不減者

不妨此熱毒從內解也久見則耗元氣氣虛則寒

而變生他症矣三日前後痘點煩紅或出不快而

泄瀉者此因熱毒擁遏不得達表故下尋竅而出

也宜用發散升提佐以和解透肌之法禁用龍骨

豆蔻白朮之類七日以後痘色灰白不起飲食減

少而泄瀉者此因脾胃虛寒不能自任其毒縱毒

下陷也宜補中益氣湯調訶子肉豆蔻白朮木以

止之兼用茯苓以滲溼尚多用升麻以升提痘毒

出於皮毛之間若獨以瀉治惡痘不升發而倒陷

者終不起矣然有飲食過節食傷脾胃者有渴而

過飲脾傷水者二者皆能作瀉尤當審而治之也

宋杏庄云發熱之時吐瀉切莫行止惟瀉酸臭可用

清導藥此傷食也

陳三農治瀉以紅麴炒黑一兩人參肉蔻各五錢為

末服上體結痂下體不至而瀉不必憂此陽復內

回氣血下達之妙

腹痛

腹痛者由毒滯於三陰也當升發解利痘毒兼分利

小便使毒氣上下分清其痛自止矣如痛而面青

手足冷。或自利腸鳴。此脾胃虛寒也。理中湯。痛或面赤作渴。手足熱。或大便秘。此脾胃實熱也。用大黃紫草枳殼當歸厚朴甘草。痛而不思乳食。噯氣。此乳食停滯。保和丸。附查曲荷酒曲砂若氣粗身發戰動而痛者。此感冒風寒也。升麻葛根湯。若加口臭唇舌白胎。此風寒阻遏。陰陽壅塞不通。毒攻臟腑。已成內潰胃爛。不治。腹痛發厥。痘不出者。蟬退去翅足。白湯下一錢。痛止其痘自出矣。

陳氏云。肢冷身腹痛便秘。由熱毒在裏。伏熱深而痘

證治大選

幼幼近編

腹痛脹

三

貞白堂

不能出也。宜紫草如聖散。倍蟬退。

腹脹

腹脹者。由毒聚於腸胃也。治當升發解利。痘毒兼利小便。使毒氣上下分消。則脹自愈。故曰。痛隨利減。脹以利消。俗醫以厚朴行滯氣。而不知升發解利。非其治也。大便燥結。日久不去。而後脹者。四順飲。大黃赤芍歸脾或用紫草生地枳殼當歸。小便不利。而脹者。導赤散。生地木通草有乳食停滯不消化。而脹痛者。當於升發解利藥中。加消食之劑。所傷之物。當審

其寒熱。若熱毒為冷所遏。不得發洩。以致腹中虛鳴。二便自利。脈微手足冷。而飲食不進者。理中湯。參朮加升發之藥。又有數日不大便。煮大便秘行而痛。脹自止。未可驟用硝黃也。若因嘔吐泄瀉。以致毒氣內陷。而令人腹脹者。木香異攻散。若腹中有塊而痛。手足屈冷。者。不可作食治。此熱毒在裏。熱甚發厥。熱伏深而痘不能出也。宜用蟬退荆芥紫草木通鼠粘子山查山甲。

不食

證治大選

幼幼近編

腹脹

天

貞白堂

夫痘瘡。固賴元氣以發之。而元氣之壯。猶藉乳食以養之。自四五日。以至痂落之後。飲食不減。二便如常。雖不起發。不紅綻。或陷塌。用藥得宜。可保無虞。使乳食減少。兼以泄瀉。則元氣自此而日衰。雖無前症。日後必至藥亦難効。去生遠矣。故四五日前。而不食者。此脾胃元氣俱虛。雜症百出。行漿不實。雖藥之。亦無及矣。有痘已痂起。而不食。宜調脾胃。若痘起而倍能食。乃胃中伏熱消穀。能食而大便必。宜四順飲之。類微解之。恐胃熱不盡。為口瘡也。

痘毒

痘毒者因痘瘡毒盛之時失於解利毒氣壅遏肌肉

外不得以泄於肌膚內無由入於臟腑滯於肌肉

故發癰腫也貫漿時發者名痘毒靨後發者名餘

毒痘自唇四圍靨起循序而下必無餘毒若間斷

而靨或靨時痘根尚有一絲紅暈此毒化漿未盡

必發餘毒毒發則氣得以外泄肌表故得保全然

須分虛實調治若精神倦怠飲食不貪宜參芪白

朮甘草金銀花白芷內托之若面赤便秘燥渴壯

證治大還

幼幼近編

痘毒

无

真白堂

熱驚叫宜大連翹飲

歸芍防滑柴連通

人參解毒

湯解利之

參羌獨柴前荆防銀

外用羊脂膏敷之

若毒遊走不定此元氣虛竭不能拘制其毒急宜

內托亦當雷一處出膿以泄其毒他處以藥敷之

若發熱之時即見毒此名報毒切忌敷治痘胖而

毒自消若誤用敷貼之藥毒必復入而痘反重矣

又毒發在骨節間須用移毒神丹移下一二寸不

在骨節間出膿即免殘疾之患矣

邵公云痘後發癰皆當發不發不當補過補致毒壅

滯所致宜分虛實用藥虛者精神倦怠食少微熱

腫處不疼宜內托散加白芷金銀花木香膿流清

水潰瘍不斂大補湯加白芷金銀花外敷生肌散

實者壯熱便燥煩渴叫痛大連翹飲外敷必勝膏

餘毒不止於癰腫

痘有遲延日久而起不圓胖靨既平之際或發癰腫

人固知為餘毒而用大連翹敗毒散

歸陳芷芍甲

防角針人參敗毒湯以解利之矣不知氣高而喘

息作聲掀胸擡肚者餘毒之在肺也痰涎稠粘咬

證治大還

幼幼近編

餘毒不止

辛

真白堂

牙憂齒泄瀉不止口臭者餘毒之在脾胃也盜汗

熱不退渴者餘毒之在心也夢中多驚餘毒之在

肝也耳聾尚熱餘毒之在腎也眼合不開身腫不

消壯熱不清鬱鬱不樂諸經皆有餘毒也豈可獨

以煥發於外為餘毒而於此反慢不加省哉

周慎齋云痘瘡宜補氣血若面上溫疤遍體發毒宜

保元四物加金銀花連翹之類

陳三農云七日前生毒者凡瘡也或瘡未痊或初發

疤處肌肉虛毒受氣血相搏故從虛處發出也其

毒溼潤者。為氣血俱盛。枯燥乾紅。氣血俱弱也。

痘疔

痘疔皆熱毒未解鬱而成者。凡痘中有紫黑枯梗。或陷或高。而無根盤針。撥石硬。手捻有核者。皆疔毒也。見標有此。則諸痘不得宜發。急宜挑破。吮去其血。痛者隔蒜灸之。五壯一易其蒜。不痛或麻木者。即着艾於疔上灸之。以痛為度。後用蟾酥雄黃硃砂。或四聖散。填滿疔中。或用巴豆一粒。硃砂一分。爛研點入。一疔突出。即愈。內服仙方活命飲。山

證治大遺

幼幼近編 痘疔 圭 貞白堂

角針並銀花翹。神節花粉。赤芍防歸尾。乳沒貝陳。加鼠粘子。荆芥連翹。或

解毒散。疔解而諸痘即起發矣。腰背胸前多者。不治。將則見者。何也。痘至於此。氣血脾胃俱虛矣。

解毒。恐元氣益虛。補虛。恐疔毒愈盛。故也。外治以

前法。內服三仙散。地丁。赤白。草歸尾。或解毒散。連。赤。梔。芎。犀。

丁烏龍散。

眼目

痘蘊非常之熱。自內而達於外。擁熱痘瘡。不得宣發。尋竅而出。故痘毒入目也。熱入目。不能開者。瀉

肝散。赤腫痛甚者。歸。芍。防。蒺。荆。甘。連。木。賊。菊。蔓。燈。羚羊角散。升。防。芒。黃。

升防芒黃。翳膜遮睛者。復明散。加草決明。蟬退。膽

草黃連。蒺藜。青箱子。甘菊。或加味兔糞丸。仍用吹

耳丹。或用田雞膽點之。復時常以舌舐之。急治方

妙。若日久翳厚。病深。則難治矣。外點以葶薺散。

護眼法

黃柏末。甘草各一兩。蒙豆半升。水三碗。浸一日一夜。

去豆入紅花二兩。煎二碗。去查熬成膏。塗眼眶四

處。

證治大遺

幼幼近編 口疳 圭 貞白堂

口疳

痘後餘熱不盡。聚于胃中。隨氣上升。故牙根嫩薄而

腫痛出血也。內服加味清胃散。歸。芍。生。升。荆。柴。防。升。秦。獨。連。岑。膏。

外用救生散。奪命散吹之。若毒攻牙根腐爛成疳。

日爛寸許者。名曰走馬疳。急服加味清胃散。兼用

牙疳散。俱。用。府。門。或靈棗散。木鱉散吹之。但鼻梁發紅

點者不治。

痘後吐瀉

痘初出吐瀉者。勿亂治。欲毒從上下出也。行漿時。吐

瀉者宜急治恐傷元氣而致塌陷也至于痘後吐瀉者亦宜急治謂其氣血已傷而真元未復也然有虛熱餘毒之分若倦怠不食脘白身涼此虛寒吐瀉也宜參苓白朮散參朮苓艸散加豆蔻乾薑砂仁若臉赤咽乾煩渴飲冷小便赤澀此餘毒邪熱也宜消毒散甘防加木通赤茯苓使熱毒去而吐瀉自止矣

痘後餘熱

痘後餘熱者皆虛熱也蓋氣血成漿則陰陽俱虛火

證治大遺

幼幼近編 痘後 三 貞白堂 卷之二

從虛起故虛發熱也切不可用寒涼發散之藥惟大補氣血虛回而熱自退矣

痘後發搐

痘後發搐者由餘毒未解心經蘊熱而動肝風風火

相扇故也宜導赤散生地木加全蝎蠲退癰吞南

星硃砂身熱兼受外邪者惺惺散加白芷蟬退熱

盛搐甚痰多者牛黃清心丸煎星連犀辰胃弱多

食不能化食蒸發搐而黃微熱大便酸臭秘泄

不調宜調脾化食或腹痛便閉者四順飲微下之

痘後身生紫癰痲瘰

此皆因血虛毒膜理不密而為外邪所中也宜消風如聖散羌防白附細辛加薄荷薑汁若無力抽搐精神倦怠脈冷皆虛象也宜獨參湯加竹瀝薑汁甚者加熟附候用風藥者死

痘疹切要

痘疹發熱時以指甲括兒頰上及抱手足中指血活者輕血滯者重

發熱聲音遂變者此熱毒擁於肺經也宜甘桔湯加地骨皮

別芥鼠朴子玄參升麻

證治大遺

幼幼近編 痘疹 三 貞白堂 卷之二

發熱不解惡寒頭痛鼻流清涕肌膚粟起此外胃風寒鬱其熱毒也輕則蘇解散甚則如神必勝散使外邪解而痘疹自出矣

初熱即狂言譫妄煩躁悶亂燥渴大便不通此熱極毒盛也消毒飲煎調辰砂六一散

發熱之初未知是痘毒氣方熾候食寒涼水寒鬱

熱致痘不得外達隱隱紅點積于肌肉之間內則

腹痛腹脹外則發熱惡寒名曰水漿宜炮薑官桂苓朮升麻溫

散

發熱之初誤浴冷水或睡臥於冷澤之處外寒鬱

熱不得宣發或手足麻木或四肢冷痛不能舉動

麻木冷痛處痘隱不見委曲避風處痘出如癰疹

名曰寒禁宜芎歸炮薑蘇葉以逐寒邪

一痘出之時因煩熱燥渴過飲寒涼以致腹脹腹痛

下利嘔逆此由熱毒被鬱寒熱相搏熱不得泄則下利腹痛毒

不得達則嘔逆腹脹宜理中湯加肉桂蘇葉木通溫散寒邪諸症退而痘自順矣

一痘發熱一日即遍身如蚊咬者此決非是痘乃熱

毒為風寒所遏不得發越也宜蘇解散或人參敗毒散

一痘發熱二日即遍身稠密如蠶種根紅頂白平軟

證治大還

幼幼近編 痘疹雜收 卷之二 頁一

摸不得手此由熱毒薰蒸皮膚而生勝瘡也宜消

合升麻葛根湯退肌表之熱而疹自退矣

一痘見標二三日而瀉尤不止須急治之不則氣血

起脹而塌陷無漿之症立至矣惟宜保元湯加升

麻以提之不惟泄瀉止而痘亦隨出矣若治以淡

一痘或已出未出出而不快大小便秘澁壯熱煩躁

氣粗譫妄喘急腹脹此裏實毒氣擁瘀不得外泄

也宜少用四順飲微利之

一痘見三四日即根窠無暈者此氣離血散毒乘機

內犯也宜丁桂以內

一痘見標而反加壯熱煩躁渴而復不出此

因於寒邪盛榮衛被其煎熬燥癢不行也急用升

湯

一痘雖身發壯熱卻目白不渴大小便自利倦怠昏

睡飲食減少宜保元湯切忌升發解利

一痘正出卻乃面青不食或肢厥腹冷或青白陷伏

不起此中氣虛寒不能祛毒外達也急用保元湯加炮薑丁桂

以逐其毒

證治大還

幼幼近編 痘疹雜收 卷之二 頁一

一初熱夾疹疹先見不解痘則隱隱不見名停毒宜

升少解毒湯升出其痘而疹自退

一痘見標如白豆殼者因發熱時飲水食冷所致宜

中托

一痘一齊擁出頂陷臍窩中有痘者此腎毒也宜無

一痘標如白水如糠皮肉無根外無漿此氣離血散

也不

一痘焦紫黑陷此六經火毒極盛也宜清涼飲

一痘初出細小至二六日漸見頂陷而後脫白

此氣... 急用保元湯

一痘至... 腹中雷鳴便氣下泄此內虛而毒氣

流行... 急用保元湯加白

痘頭面行漿而頸項下體無漿者此為元氣不能

下達陰分血失其運行之本故不能化漿也宜保

加芍歸本通從陽

一痘頸項下體行漿而頭面四肢無漿者此為陽虛

不能上升宜補中益氣湯加官桂炮薑從陰引陽

火既

證治大還

幼幼近編 痘疹切要

卷之二

真白堂

一痘頂雖起而四圍灰白枯澁者屬血虛宜四物加

黃芪紅花

一痘四圍雖紅暈而頂則陷下者屬氣虛宜保元湯

香酒

一痘頂陷灰白屬氣血虛宜十全大補湯加丁香

一痘雖起而中有黑星者屬血熱宜涼血解毒

一痘外白中黑者屬氣虛血熱宜十神解毒湯加

一痘上有小孔不黑不白名曰蛙痘此因腠理不密

元氣宜保元湯加丁一倍黃

一痘稀... 若色不明潤形不尖圓屬氣血

一痘齊... 期脈滿猶為可治之症

一痘陷伏倒靨皮薄虛軟灰白體靜此表裏虛寒之

症也補靈丹奪命丹異攻散之類

一痘煩紅燥渴齊湧欬發壯熱便秘此表裏實熱之

症也烏龍散散涼血消毒飲之類

一諸痘未起而其中有先起虛大色如金黃者名曰

賊痘急以銀簪刺破捏去惡

證治大還

幼幼近編 痘疹切要

卷之二

真白堂

一痘既出而譫語驚搐尚不止者隨以手摸腹若腹

一痘時唇口啞啞有聲此火毒入脾經也宜消毒飲

膏木通

一痘色純紅光潤員綻而不焦乾此為奇痘不必

一痘稀少根窠全無四五日起胖如棗豆大按之虛

軟毫無血色此氣離血散也

一痘貫漿時痛不止者此氣滯也宜芍歸木通山查

一痘貫膿時頂平脚潤而漿不足者此氣血虛而不

振發也。宜十全大補湯加丁香炮薑

一痘成窠皮膚空處赤腫者因氣血虛不能拘制其毒故毒氣散逸也。宜解毒湯加酒炒芍藥連翹參芪

一出痘時目露睛白者由元氣虛督脈緊急致睛吊上也。宜保元湯加黃米

一痘有紫黑斑疔不能下手者。曲池委中刺出血脈氣

一痘雖有紫黑色未乾枯尚然明潤依期長貫此為血熱氣實之症。宜活血涼血芍藥歸脾草丹皮紅花山查生地犀角荷葉

證治大還。幼幼近編痘疹要

荆芥酒炒芍藥

一痘已起脈漸漸脚闊平塌者由初起慢與毒物發之虛撥空鼓藥過而氣不能續故復沒也。急用補湯加熟附

一痘當醫不醫此濕氣盛而血不歸經也。宜夜冬白芍藥以

收之

一痘痂當落不落乃火盛也。用柴胡湯辰砂六一散外以蜜水調滑石塗之

一痘後聲音不出者心腎氣虛也。調以蓮散

一痘後榮衛弱不能榮養筋脈致手足攣拳不能屈

伸。以牛旁子湯汁入酒一盞服之

一痘後遍身腫大便秘瀉腹脹如鼓皆由飲食不節致傷脾胃脾虛濕熱拂鬱不得通暢故也。宜六君子

加大腹皮神曲木香砂仁

一痘疤高於皮膚紅潤不白是為實熱之候。宜芍歸查蟬退荆芥丹皮順正陰陽

痘疤下陷皮膚色白不紅是為虛寒之候。宜四君芍肉桂

發熱四五日七孔出血。用犀角地黃湯如無犀角加升麻葛根重用紫蘇

證治大還。幼幼近編痘疹要

以其能發未透之表故也。

一發熱時腹腰四肢俱痛。此皆重症解散後痛止者吉

一發熱即唇裂口坑煩躁狂亂口渴惡熱耳熱睛紅便閉即於升發藥中。加玄明粉或大黃下之以舌胎減為度

一發熱時即頭溫足冷便澀面色皎白嘔食不化即

以虛症治之。

白或兼吐瀉此虛症也。若白起則色唇舌赤或赤虛也三日後漸變紅紫便是候矣。

一痘見兩三日大便尚閉舌上無胎乃是血燥非毒準也。若歸湯加枳殼玄明粉不則恐貫漿時咽痛作痒。

一見點時大小不一有色點如癰者名夾痧。於解散清利藥中加升發痧疹之藥。

一點見身熱毒未盡也但有寒邪外鬱者有毒熱內鬱者。均當解散之。

一起脹時色焦紫者毒盛也形大皮薄而起縐紋毒盛氣虛也滿頂紅者血滯也。滯者清之焦者清之氣虛毒盛補而兼解之。

證治大遺

幼幼近編 痘疹切要 聖 貞白堂 卷之二

一痘至五日內外症平不起發不退紅正氣虛也。多參芪甘草其紅即轉此為候漿法。

一痘四日起發太快表虛毒盛也。七日後須防倒陷。

一起脹時有一等光亮嬌嫩艷觀手捺即破此表虛假脹也。急當救裏表不則痒塌而死。

一痘五日即見黃漿但無神彩此假漿也。或補或瀉看百為準則。

一六七日見土黃色血暈全無者死。

一六日後無漿而根脚不紅或連肉灰紅作痒煩躁目閉復開作瀉不食此氣不能拘血化毒也。急救補之。

一貫漿而四肢減少者此胃氣虛也。後必食減生變之末。

一結靨時身忽發熱此蒸漿作靨也。

一時靨盡者火毒燥也急解之若聲啞煩悶。喘促不食者色偏發癰毒者生。

一痘至九日十日半靨時作瀉者此陽氣內回也非

證治大遺

幼幼近編 痘疹切要 聖 貞白堂 卷之二

貫漿時比也。用白朮芍藥補脾利水。

一靨頭足遲者獨陰獨陽也。不妨頭足尤者陰陽反悖也。

一痘發痒不已者。用銀管挑開內有蛆者此元氣弱肉絲所化用梨蘆貫衆白欬末香油調敷。

一痘初發熱胃氣虛弱泄瀉因而腫消毒陷。宜大劑加肉蔻升麻瀉止仍用保元湯以助養氣血成漿。

陳氏幼幼近編 卷之三

華亭陳 治三農父述 男

杖幾先祭
師柴羔愚

三韓張 鏞元峰父閱 門人

范
松壽民校
顯贊皇

虛症禁用藥性

雖蛇能開通肌竅恐成表虛耗泄元氣 鼠粘子通
肌滑竅外致表虛內動中氣恐成泄脫 人牙性
烈發表太過內動中氣外增潰爛 紫艸性寒慢
用溲便 白朮多用恐能燥濕使潤下之氣不行
則痘難成漿 茯苓猪苓燥濕滲泄能令水氣下
證治大還 幼幼近編 一 貞白堂
卷之三

行小便多用恐津液耗散外不行漿內防發渴
訶子龍骨枯禁皆能阻塞肌竅氣虛之症用此毒
愈不能進前雖能澁泄甚不可施治虛症之泄瀉
只以補益為善 車前滑石性猛利水極速易傷
脾胃脾土一傷則中氣必敗而塌陷繼之內攻外
剝百變俱生 山梔性寒降火虛症便赤必非實
熱 大黃蕩滌污穢耗削胃氣性寒潤下雖熱渴
便實皆不可用 生地性寒涼血亦能潤腸 枳
殼下氣寬腸多用則瀉 乾葛療表熱性涼外防

表虛山查散血解結多用則內虛 半夏性
悍多用則消渴麻黃開竅走泄恐成表虛氣脫

麻疹附餘

天癘即疹也以疹出如麻成朵痘出如豈成粒皆象
其形而名之也麻疹之與痘瘡始似而終殊形同
而症異痘瘡發於五臟麻疹發於六腑屬陽陰
主血故痘有形而有汁腑屬陽陽主氣故疹有形
而無漿然陽熱太盛則陰分受其煎熬故血多虛
耗所以治法先發散行氣而後滋陰補血凡動氣
燥悍之藥皆不可下也

證治大還

幼幼近編 卷之三

一 貞白堂

凡看麻疹之法多於耳後項上腰眼先見其頂尖而
不長其形小而勻淨其色紅亮者吉若色紫紅乾
燥暗晦乃火盛毒熾宜六一散解之後以四物換
生地加柴胡黃芩乾葛紅花牛蒡連翹之類滋陰
涼血而熱自除所謂養陰退陽之義也色黑者熱
毒尤甚乃十死一生之症也用解毒湯合梔子仁
湯

之症。

證治大遺

幼幼近編
卷之三

三

貞白堂

一 疹屬陽乃六腑之毒惟重于脾肺二經以肺主皮毛脾主肌肉故發熱時即見咳嗽聲重鼻涕者肺之毒散也泄瀉者脾經之毒去也如無上症者重發熱之初憎寒壯熱鼻流清涕身體疼痛嘔吐泄瀉咳嗽氣急腮紅眼倦眼泡與面俱腫其淚汪汪烏輪紅色夾鼻六府部分色見紅紫即是麻候宜謹避風寒用升麻葛根湯加紫蘇表汗之得汗則皮膚通暢腠理開豁而疹易出也于發散藥中加葱白生薑使孔竅中微汗潤澤庶免熱閉發搐

二 疹用藥必先明其歲氣如時令溫暖以辛涼之藥發之暄熱以辛寒發之犬寒以辛熱發之時寒時熱以辛平發之

一 發熱咳嗽之時既明麻疹有出不快者用麻黃湯越活湯消毒飲發散解毒之劑外以芫荽酒糟蒸熱擦之自頭上至足為齊頭面愈多者為佳若遲延日久而不能出則腹脹氣喘悶亂煩躁而死矣

一 凡麻疹出後見風沒早未清爽者宜消毒飲合升

證治大遺

幼幼近編
卷之三

四

貞白堂

芩梔子犀角

一 發熱之時或吐或瀉此皆火邪內逼毒氣上行則吐下行則瀉也不可遽止所謂邪從吐解毒以利鬆也吐甚者二陳湯加石膏竹茹瀉甚者升麻葛根湯加茯苓滑石

一 麻疹出時咽喉腫痛不能飲食此毒火拂鬱上薰咽喉也宜甘桔湯加連翹牛旁子玄參荆芥

一 疹已出反沒由外感風寒內傷生冷抑鬱毒氣變為渾身青紫煩躁悶亂喘急腹痛毒成內攻急用

加減麻黃湯連則不救

一疹止出肚疼泄瀉若氣喘腹脹此毒未盡而鬱於

三陰也宜升麻葛根湯加荊芥木通滑石或發熱

時過飲寒涼多食冷物而致者宜平胃散加砂仁

白朮

一疹初見欲發不發隱隱欲伏熱盛煩躁疹色乾紅

焦紫此因邪抑鬱毒將內攻也急用升麻葛根湯

加荊芥蟬退蘇葉防風粘子木通

一疹遍身既出而尤怫怫煩熱頻作嘔吐者此毒熱

證治大還

幼幼近編
卷之三

五

貞白堂

未盡留連於肺胃間也宜消毒飲加連翹升麻地

骨皮知母石膏大便秘微加大黃

一疹已收反渾身發熱晝夜不止此毒未盡解而陰

血傷也消毒飲合四物湯加玄參連翹丹皮知母

滑石甘州

一疹發熱咳嗽三五日不出者用化毒湯外以胡荽

子炒熱以薄絹包熨之

一疹熱盛語謇小便赤澀者導赤散生通煩躁多渴

者犀角化斑湯荆防甘玄
桔翹石知

一疹狀如蚊蚤皮膚色黑者此毒盛也宜山梔子湯

一疹毒氣入胃變黑眼赤喉痛口舌生瘡泄瀉宜黃

連杏湯陳麻黃
元葛

一疹出後聲啞不出或喘或咳或身熱不退致日久

不愈者此熱毒未盡解肺金受傷也宜清金降火

用知母貝母天門冬麥門冬骨皮丹皮生地芍藥

當歸玄參連翹片苓瓜蒌仁

一疹收後餘毒未盡日夜煩躁狂亂譫妄者乃餘毒

蓄心包也辰砂益元散燈心黃連湯下

證治大還

幼幼近編
卷之三

六

貞白堂

一麻後瀉痢者乃積熱移於大腸宜益元散加生地

木通苓連白芍或香連丸之類

一麻後牙疳紅腫者清胃湯合甘桔湯加牛旁荊芥

玄參胃爛者不治之症也

一麻後痰嗽不止乃痰熱留于心胸四物合二陳加

瓜蒌桔梗五味子渴加麥門冬枳殼喘加蘇子桑

皮

一孕婦出麻以四物湯加白朮條芩艾葉砂仁以安

胎清熱為主則胎不動而麻疹自愈矣若正出之

時不進飲食者、但得麻色、淡紅潤澤、亦無害也、乃
熱毒未解、內蘊實熱、故不食耳、麻退不食者、用四
物湯、加神麴砂仁一二劑、自能食矣。
凡出麻疹之時、大忌葷腥生冷、宜避風寒水溼、苟有
不謹、最爲淺患、戒之慎之。

麻疹辨疑賦

麻疹胎毒多帶、時行氣候、暄熱傳染而成、其發也、與
痘相類、其變也、比痘匪輕、先起于陽、後歸于陰、毒
盛于脾、熱流于心、臟腑之傷、肺則尤甚、始終之變

證治大還

幼幼近編
卷之三

七

貞白堂

腎則無症、初則發熱、有類傷寒、眼胞困倦、而難起
鼻流清涕、而不乾、夾鼻脉紫、烏輪火搏、遍身俱熱、
惟耳獨寒、咳嗽少食、煩渴難安、邪目視之、隱隱皮
膚之下、以手摸之、磊磊肌肉之間、其形若疥、其色
若丹、出見三日、漸沒爲安、隨出隨沒、喘急須防、根
窠若腫、疹面兼癰、皮膚如赤、疹尤夾斑、似錦
而明、今不藥而愈、如煤而黑、今百無一痊、瘡疹既
出、調理甚難、坐臥欲暖、飲食宜淡、咳嗽涎沫、不禁
酸鹹、忽生喘急、肺受風寒、心脾火灼、口舌生瘡、肺

麻疹輕重不治要訣

胃熱熱津液長乾、有此變症、治法不同、微汗毒解、
熱勢少、內二便清、調氣行無滯、腰理拂鬱、分即當
發散、腸胃秘結、今急與疎通、鼻衄者、不必憂治、邪
從衄解、自利者、不必遽止、毒以利鬆、麻後多痢、分
熱毒移于大腸、咳嗽喉痛、今痰熱滯于心胸、口渴
心煩、法在生津養血、飲食減少、治宜調胃和中、餘
症無常、臨期變通、此則麻之大旨、妙用在乎神通

證治大還

幼幼近編
卷之三

八

貞白堂

淨而多者輕、發透三日、而漸沒者輕、頭面不
出者重、紅紫暗燥者重、咽喉腫痛不食者重、
冒風沒早者重、後熱大腸變痢者重、黑暗乾
枯一出即沒者不治、鼻扇口張、目無神者不治、
鼻清糞黑者不治、氣喘心前吸者不治、麻後
牙疳臭爛者不治。
參芪飲 治元氣虛弱、精神倦怠、肌肉柔慢、面青
眇白、飲食減少、睡臥安靜、而不振者、不分已出未
出皆治。

人參 二錢 甘艸 五分 初熱生用 出定須用

楊仁齋謂其能補益元氣更名保元湯蓋為元氣虛弱者立也後世治痘者多主之不分元氣虛實之異藥用於血熱毒擁之症是為實實豈不誤哉右用水一鍾薑一片煎服

參氏飲加減禁忌法 如前虛症辨認不差以此方為主前後始終皆不可易中間雜症兼見雖或不同要皆氣虛所致則以本方斟酌加減之毋得過投發散苦寒之劑初熱未出之際只可少濟以開證治大還 幼幼近編 卷之三 九 貞白堂

提勻氣之功如桔梗川芎之類漿足之後助以收斂如白朮芍藥茯苓焉耳 陳三農云痘症發熱即用蘇葛湯令其表和見點後用消毒飲血藥隨症加減實漿時行補法血藥不用膿後消毒飲可用但前不用人參後則人參可用唇破裂口乾不渴此係血燥胃熱湯加連翹或四物湯加蓮子 大便秘結只宜養血為主痘因表藥太過遂至不發宜理中湯溫補其痘自然盡出

證治大還 幼幼近編 卷之三 十 貞白堂

藥六七日後或從泄瀉而後氣喘者虛之極也加人參則喘自止腹脹加腹皮厚朴兼發散開胃枳殼藟子寬中下氣等藥藥用仍視小便秘與傷食否亦有傷于生冷或寒氣鬱遏而然從內傷外感而治 內傷用丁桂神麴木香 外感用防風等藥發散治之當熱不熱四五日間手足厥冷水硬不起加丁香官桂炙黃芪川芎夏月減丁香四肢不起加防風減川芎 頭面不起加升麻 漿不足加白朮當歸川芎木香官桂 灌水泡加白

求防風白芷茯苓芍藥去黃芪。灌清漿加白朮
茯苓官桂。喘嗽加麥門冬五味子杏仁。禁用花
粉棠皮。表虛倍黃芪。內虛倍人參。虛寒及
血虛俱加桂。脚潤加芍藥。血滯加陳皮。餘
熱不退加金銀花連翹。瀉不止加炒焦紅麴
發痒加芍歸芍藥朮茯苓。禁用蠶桑葉。痒甚用茵
陳燒烟薰之。禁沐浴。發散藥。恐成氣脫。

凡痘出不快。禁用以毒攻毒之物。蓋毒藥入腹。攻
臟。搗臍。一時雖驅毒併氣血衝達肌表。痘亦隨而
起。發少。頃則中氣歸復。不相接續。藥氣少歇。則毒
反攻于內。痘亦隨而內陷矣。再將何藥以療之哉。
若不得已而用毒藥。可急服參芪甘艸肉桂以內
托之。慎勿令其既陷而後藥也。

十神解毒湯。專治身發壯熱。腮紅臉赤。毛焦色枯
已出未出。三日已前。痘點煩紅。燥渴欲飲。睡臥不
寧。小便赤澀者。此熱盛也。金皆治之。

歸尾 生地 紅花 丹皮 赤芍 桔梗 大
腹皮 木通 連翹 川芎 荊芥

證治大選

幼幼近編
卷之三

十一

貞白堂

耳

此方治血熱痘疹。以涼血行血為主。佐以桔梗川
芎。有開提發散之功。引以腹皮木通。有疎利熱毒
之効。臣以連翹丹皮。有解毒之良。用此以治血熱
痘疹。則內外分消。熱毒雖盛。庶幾解散。表裏自然
和平矣。古人用黃連解毒湯。恐驟用寒涼。不惟冰
伏熱毒。反出不快。抑且熱毒為其所逼。則鬱于臟
腑。或肚腹脹痛。內潰而死者有之。豈若此方用之
為當。若不得已而用黃連芩柏。亦須酒炒。以制
其寒涼之性。二以助其上行之勢。借連柏以解毒

證治大選

幼幼近編
卷之三

十二

貞白堂

十神解毒湯加減法

身熱壯盛加葛根。毒盛綿密加荊芥。渴加花粉。竹
小便赤加山梔。小便尿血加犀角。大便黑加犀角。黃
吐血乾嘔加犀角。連。小便短澀加犀角。小便秘加
滑石。大便秘加枳殼。蘇。發紅斑加犀角。參。煩躁
加麥門冬。大便秘。喘。加枳殼。前。煩渴狂亂。譫語。加
知母。麥。嘔吐加黃芩。咽喉痛加甘艸。鼠粘。泄瀉
加猪澤。嘔加橘皮。腰痛加羌活。腹脹喘滿。目赤。面

浮毛山查牛加麻黃唇裂舌胎秘結加人果出

不快加山查牛腹脹加山查牛腹痛因毒氣攻冲

加去生地已上盆用燈心十四根水煎服。

血熱痘症禁忌

血熱痘症熱毒彌盛然毒氣無所分消只宜重用升提發散使毒得以達表而從外解引以滲泄使熱得以潤下而從內消佐以清涼消毒行血涼血之劑則痘雖稠密亦能消散自易漿而易化也所謂輕其表而涼其內此方益得安表和中解毒三法

證治大還

幼幼近編

三

貞白堂

盡善誠痘科之神方也丹溪曰熱者消之實者平之其此方之謂歟是故發熱至見點之後三日以前毒氣未盡達表內外彌盛血熱之症悉具辨認不差並只以本方處治之切不可下參芪朮茯苓氣之藥于熱症未漿之前如悞而用之是為以實攻實腹脹氣喘狂亂譫語咽喉腫痛口舌生瘡變症百出所謂邪得補而愈盛也嘔吐泄瀉慎不得用半夏丁桂乾薑木香藿香訶子肉果如悞而用之是以熱助熱氣得熱而愈亢也原症必至咽痛

狂亂尖血便秘無所不至矣至于龍骨枯槁澀滯

之物且能使氣道阻塞是欲其出而閉之門也腹

脹喘急之勢必至尤宜戒之及至血包已成氣血

定位頭頂白光勢將行漿又宜易方另行別議

羌活散鬱湯 治實熱擁盛鬱遏不得達表氣粗

喘滿腹脹煩躁狂言譫語睡臥不寧大小便秘毛

豎面浮眼張若怒並效并風寒外搏出不快者

防風 羌活 白芷 荊芥 桔梗 地骨皮

大腹皮 川芎 連翹 甘艸 紫艸 鼠粘子

證治大還

幼幼近編

南

貞白堂

右為粗散水一鍾燈心十四根煎服

身發熱及見點之際毒氣壯盛外為風寒所抑或肌肉粗厚腠理堅閉肌竅不通經絡阻塞使清氣不得引毒達表循竅而出則熱毒壅遏於內為腹脹為喘急為秘結為狂煩為驚搐為失血皮燥毛直而急眼張睡臥不寧驚啼多哭此熱毒擁遏之症辨認不差急用發散開提之劑佐以和解透肌之法則熱毒不擁而其出易矣羌活白芷防風有升提發散解毒之長桔梗有開提勻氣之能荊芥連

翹鼠粘善解鬱熱地骨皮消擁熱於筋骨之間且能肅清臟腑紫草滑肌通竅腹皮引熱下行使內外有所分消用此以治擁熱之症最有功效若驟用寒涼如芩連升麻之類則熱為寒氣所抑不得伸越還遇經絡為疽為癰者有之冰伏硬閉者有之至于參芪朮茯溫補之劑誤用則其擁盛禍不旋踵他如丁香桂木香蓋附之類以熱攻熱殺人立至尤宜戒慎故發熱之初至見點之後並宜以不方處治依後法加減

證治大還

幼幼近編卷之三

五

貞白堂

活散鬱湯加減法 初發身熱壯盛腮紅而赤毛
焦皮燥咳嗽喘急者加升麻煩渴加花粉腹脹喘
急鼻塞面赤若怒毛直及枯加麻黃便秘加枳殼
秘甚加大黃嘔吐加橘皮禁用生薑丁香夏瀉加升
禁用白朮茯苓喘急惡風加桑葉失血加犀角地
發斑加山梔鼻衄加犀角小便赤澀加滑石山梔
驚悸加山梔通加青皮弄舌加犀角不思飲食加
山傷食加山查神見點三日間出不快利加山查
透肌散煩紅赤色加生地丹皮去白皮急肉緊身

熱壯甚加葛根麻黃前胡

見點三日之內並依本方加減及三日之後痘疹
出齊血包已成而前症悉平不得復用此方恐發
散太過難于行漿另有方藥在後其禁用藥劑並
從血熱痘症法而裁治之

蘇葛散 霞山

紫蘇 葛根 桔梗 前胡 各二 甘艸 五分 疎表

加荆芥便秘加枳殼見標蘇葛熱盛加連翹小便
不利加水通大便不利加黃芩一二次不効渴加

證治大還

幼幼近編卷之三

六

貞白堂

石瀉加升麻吐不用升陳皮心煩加連翹喉
痛加牛旁血熱加紅花微紫便秘加生地身痛加
羌活頭痛加川芎腹痛加山查前胡有起發之功前
不可缺渴甚辰砂六一散燈心湯下
紫艸透肌湯 專治血熱痘症服十神解毒後熱症
悉去內外和平見點三日之後不易長大粗肥者
用之則能保和元氣活血解毒助痘成漿易痂易
落也

桔梗 紫草 川芎 山查 木通 人參

紅花 生地 白芷 甘艸 元米

燈心七根薑一片水一鍾煎服

便澁腹脹加 腹皮 繁紅不潤加 當歸清血山不快

加 鼠精 痒加 白朮陷塌加 酒炒痛加 白芷 不勻加

風水泡加 白朮嗽加 五味子 麥門冬 湯加 冬 七八日後

漿足身復壯熱便秘煩渴腹脹喘急前胡枳殼湯

漿足禁用此方另立湯飲在後

益元透肌散 專治擁熱痘症服羌活散鬱後擁症

悉開氣血和平見點三四日不肥大不成漿者用

證治大還 幼幼近編 卷之三 七 貞白堂

之則能勻氣解毒透肌達表領出元陽助痘成漿

而易結膿痂加減與紫艸透肌湯同漿足之後另

有保嬰百補湯

桔梗 紫艸 川芎 山查 木通 鼠粘子

人參 甘艸 蟬退 陳皮 元米 水一鍾燈

心十四根棗二枚煎服

保嬰百補湯 專治痘瘡八九日漿足之後別無他

症並以此方調理氣血滋養脾胃不拘實熱二症

皆可服之惟氣虛痘八九日後本方加黃芪二錢

官桂少許若有別症在審虛實隨症加減而已

當歸 芍藥 地黃 白朮 人參 茯苓

山藥 甘艸 水一鍾棗二枚煎六分溫服

異攻散 陳氏 治痘表虛塌瘵內虛泄瀉腹脹喘嗽

悶亂煩渴寒戰咬牙頭溫足冷者急宜治之

木香 官桂 當歸 人參 茯苓 陳皮

厚朴 丁香 肉果 各七錢 白朮 附子 寒戰倍

半夏 各五 每服五錢薑三片棗二枚水一大鍾煎

至六分溫服

證治大還 幼幼近編 卷之三 大 貞白堂

木香散 陳氏 治痘灰白表虛內虛泄瀉腹脹其効

如神若無灰白泄瀉等疾勿用

木香 丁香 半夏 桂心 大腹皮 青皮

赤茯苓 訶子 人參 前胡 甘艸

每服五錢薑三片水一大鍾煎六分服

托理補漿湯 治實熱之症過用寒涼而變冰硬吐

瀉皮薄漿清塌陷血色不活搔痒煩渴

人參 黃芪 甘艸 當歸 芍藥 白芷

肉桂 山藥 臨服時加人乳酒釀 作嘔加炮

蘇丁香 腹痛加煨薑神麴 水泡加白朮防風

寒戰咬牙四肢逆冷唇淡白加附子

禹靈丹 王氏 治痘不起發一服即起

呵皮 三錢 人牙 二錢 穿山甲 二錢 辰砂 一錢

酒醱或人乳調下四分

胃靈丹 王氏 治泄瀉自汗

蓮肉 一兩 鴉片 二錢 每服五分白湯下 宋氏加

橡斗子五倍子枯礬龍骨訶子肉豆蔻白茯苓

公車 一方用炒元米赤石脂枯礬龍骨訶子肉

蘇治大還 幼幼近編 卷之三 丸 貞白堂

菟五倍乾薑木香砂仁粟殼蜜水泡

補靈丹 王氏 治氣血虛不能行漿起脹

紫河車 人參 各三錢 鹿茸 酥炙 靈山柴 各錢 官桂

丁香 各五錢 酒醱加人乳調下五分隨兒大小減加

宋氏有骨餘用韭汁煨淬淫羊藿羊油拌炒更加

熟地枸杞子山萸補益腎水以端本源 一方止

用紫河車鹿茸等分煎參芪湯入酒醱調服

補丹 周氏 治痘不能起脹實凝服此甚妙

人參 三錢 附子 尖一元 米 二錢 炒黃 二錢 炒黃 二錢 炒黃 二錢

乳香 去油 穿山甲 五分 妙各 荷尖 山查湯下一錢

復甦飲 張氏 治元氣虛寒痘出復沒

人參 黃芪 白朮 甘艸 附子 白芍 酒炒

丁香 官桂 防風 菖蒲 落花生 水煎服

奪命丹 王氏 治表裏虛寒寒戰咬牙泄瀉

附子 乾薑 各五錢 丁香 官桂 木香 各三錢 人參

黃芪 白朮 各二錢 山藥 茯苓 補骨脂 各八錢

防風 訶子 肉果 各五錢 菖蒲 五分 紅花 一分 水煎服

烏龍散 秘傳出 治痘乾枯紫陷黑陷血熱實熱

蘇治大還 幼幼近編 卷之三 丸 貞白堂

餘之神劑能起死回生

人糞 乾者曬乾 蜜水調下一錢

滂沱飲 王氏 治痘色紫黑焦枯壯熱煩躁發狂

石膏 黃芩 胡黃連 山梔 蘆根 知母

木通 枳殼 銀柴胡 犀角 羚羊角

奪命五毒丹 治痘黑陷倒靨乾枯不起者神驗

蟾酥 少許 牛黃 二分 硃砂 一錢 雄黃 三分 冰片 二分

五味用獺猪尾血爲丸如麻子大薄荷湯下一丸

移時活動凡用以毒攻毒劑若毒氣外發則當調

補氣血使中氣實則無內攻之患不然中氣歸復氣血不外旺藥氣少歇必內攻矣慎之

解毒散鬱湯

宋名醫春留

治痘集紫或因風寒不起發

或內熱壅甚痘鬱不起凡熱症至七日前者服皆可

連翹 牛蒡子 麻黃 紫艸茸各一兩 白附子

甘艸 蠶蛻酒洗各五錢 全蝎酒洗五錢 穿山甲土炒 蟬退成珠

黃各一兩水酒各一鍾熬膏再下煉蜜一二兩為丸彈子大燈心湯下

謹治大還

卷之三

幼近編

三

貞白堂

清涼消毒飲

宋名滿天秋

治七日前一切熱症

滑石二兩 石膏煨一兩 寒水石五錢 生甘艸四錢

紫艸茸 茜根酒洗 人中白 紅麴各三錢 辰砂

鬱金各二錢 共為細末燈心湯下

毒見消

宋名熱見愁

治唇燥唇裂舌胎痘集紫

燒人尿一兩本連梔柏俱酒炒各五錢升麻三錢

共為末服

一字金丹 治痘黑陷倒靨乾枯不起

紫花地丁 金線重樓 山慈菴

一粒金丹 治痘灰陷塌陷色白不起虛症雖死老可立活

照肺癆二 雅片三 冰二 麝一 原娥蚕二

猪尾膏 治痘倒靨心神不寧

小猪尾尖刺血二三點入冰片少許辰砂末一錢

研成膏木香湯化下用猪尾血者取其常動發散

於外故也

加味人牙散 秘傳 治痘不起發咬牙寒戰灰白

人牙煨存性韭菜汁製一錢 雄黃 珍珠 牛黃各五分 麝香

謹治大還

卷之三

幼近編

三

貞白堂

二紅麴三分 雞冠血調成膏好酒半盞入葱白一

根煎湯調下

蘇解散 丁氏 發熱二三日用此疎利肌表使其易

紫蘇 葛根 荊芥 防風 桔梗 川芎

木通 甘艸

加減升麻湯 用於一日後善能發痘

蟬脫 升麻 桔梗 川芎 木通 鼠粘子

常歸 紅花 陳皮 甘艸 燈心 生薑

加減紫艸湯 用於二日後善去集紫

白芷	芍藥	酒洗	煎法用芫荽葱白
白附子	釣藤	紫草	木通 葛根 防風
當歸	川芎	荊芥	蟬退 甘艸 全蝎
驚搐自定矣。			
火擊癰發爲驚搐但令痘疹一出則火力分解而			
透肌散 <small>張氏</small> 治內外熱邪拂鬱擁遏熱甚生風風			
甘艸			
荊芥 葛根 木通 紅花 蟬退 桔梗			
紫艸 丹皮 生地 連翹 赤芍 牛旁子			
證治大遺 <small>幼幼近編 卷之三</small> 重 <small>貞白堂</small>			
涼血解毒湯 治煩紅紫黑焦枯			
乾葛 木通 甘艸			
連翹 黃芩 玄參 骨皮 柴胡 牛旁子			
清熱退火湯 治放標乾枯紫黑熱不退			
黃芪 當歸			
鼠粘子散 治熱極稠密服之以防焦紫			
鼠粘 連翹 黃芩 地骨皮 柴胡 甘艸			
升麻 甘艸 木通 燈心 薑			
蟬脫 鼠粘子 紫艸 生地 紅花 赤芍			

紫艸膏	保赤	治痘色紅紫黑陷
防風	犀角	
甘艸	桔梗	牛旁子 麥門冬 玄參 荊芥
如聖飲 治痰嗽風熱聲啞喉痛		
紫艸 麻黃 蟬退 木通 芍藥 <small>酒炒</small> 陳皮		
喘滿腹脹狂言或出不快或出而復隱		
加神心勝散 <small>丁氏</small> 治外感風寒致壯熱煩躁氣粗		
連翹 升麻 葛根 麥門冬 犀角 紫艸		
證治大遺 <small>幼幼近編 卷之三</small> 重 <small>貞白堂</small>		
表而涼其內		
連翹升麻湯 治痘一發密如針孔形勢重者輕其		
湯		
紫艸 連翹 升麻 加羌防乾葛解毒透肌		
加味消毒飲		
鼠粘子 荊芥 甘艸 蟬退 木通 山查		
加升麻		
鼠粘子 <small>錢炒二錢</small> 荊芥 <small>一錢</small> 甘艸 <small>五分</small> 防風 <small>五分</small> 生薑 <small>一錢</small>		
消毒飲 治咽喉腫痛上膈		

紫草 荊芥 升麻 白芷 蟬脫 通草

清涼散 王氏 治貫漿時水泡多者。

人參 黃芪 白朮 白茯苓 山查 官桂

大腹皮 猪苓 澤瀉 草薢

桃仁活血散 張氏 治痘後熱入血分勝氣者鼻中

衄血氣弱者口中吐血。

生地 歸尾 紅花 陳皮 荊芥 赤芍

山梔 川芎 栝葉 鬱金 桃仁 貝母

桔梗 官桂

證治大還

幼幼近編卷之三

毛

貞白堂

解毒散

保赤

治黑疔

黃連 黃芩 山梔 牛旁子 連翹 甘艸節

犀角 紫花地丁

辰砂益元散 治裡熱小便赤或譫語。

滑石

九錢

甘艸

一錢

辰砂

二錢

涼水調下

一二

匙。加片腦五分各退火回生散。治瘡熱甚發渴

紅紫黑陷。加雄黃一錢名大比六一散治熱毒

太甚驚狂譫語紅紫黑陷。加雄黃青黛冰片犀

角。各萬勝散治口渴狂言亂語如見鬼神。

加味導赤散 治小便黃赤口乾煩渴。

人參 麥門冬 生地 木通 甘草 淡竹葉

燈心

二神散 治痘灰白不起無漿。

丁香 乾薑 每五分白湯送下。被蓋片時返陰

迴陽痘變紅潤矣。

消風如聖散

丁氏

治痘後忽遍身青腫癢癢痰吼

防風 白附子 羌活 細辛 川芎 蟬脫

陳皮 南星 僵蚕 麻黃 氣虛去麻黃防風

證治大還

幼幼近編卷之三

毛

貞白堂

加黃芪水煎臨服入薄荷汁薑汁竹瀝。

麥門冬湯 治便實燥渴津液下耗血虛不榮

麥門冬 生地 當歸 芍藥

滋陰潤燥湯 治誤服辛熱之藥致熱冲咽喉腫痛

生瘡眼赤疼痛

山梔 黃芩 連翹 荊芥 薄荷 芍藥

生地 天花粉 當歸 木通 鼠粘

玄明粉散 治血熱便秘

玄明粉

三錢

歸尾煎湯冷調服

三仁膏 治痘疹大便堅實不宜下者用此潤之

麻仁 炒研去殼一兩 松子 研去皮七錢 桃仁 炒去皮五錢 芝蔴 一合

研細蜜水調瀝去渣服

猪胆膏 治屬後臭爛深坑

輕粉 黃丹 五倍 少各一錢 冰片 三分 胆汁調搽

移毒神丹 王氏 治痘毒發於節飲用此搽半截毒

即移下

白芨 一兩六錢 紅藥子 一兩如無以紫花地丁代 烏骨雞骨 煨成灰一錢

硃砂 雄黃 輕粉 各一錢 大黃 五倍 少各二錢

證治大還 幼幼近編卷之三 素 貞白堂

牙皂 七分 共為末醋調搽之

羊脂膏 秘傳 治痘毒

陳羊油 一錢 巴豆 三錢 同熬至豆黑去豆入香油

一二滴塗腫上濕爛處用三稜白果肉搗敷

一方用葱白搗爛入蜜和勻作薄餅縛腫處名必

勝膏

糯草灰散 治痘後餘毒神效

用糯草灰不拘多少將滾湯淋去鹹水以淡灰罨

患處

如金散 錢中 治痘已出而復癰其勢甚危者

紫背荷葉 霜後搭水者 白殭蚕 炒去絲各等分 為細末每服

五分胡委汁冲酒調下

如神湯 治腰痛

當歸 桂皮 玄胡索 為末酒下

三仙散 治痘疔

紫花地丁 番白草 歸尾 水一鍾酒二盞煎服

四聖散 治痘疔

珍珠 七粒 豌豆 燒灰四粒 胎髮灰 一錢 冰片 半分

證治大還 幼幼近編卷之三 手 貞白堂

為末用油胭脂調成膏將銀簪撥開瘡口將藥填

入 宋杏庄加雄黃八分紫草茸錢半

周慎齋用牛黃一錢二分硃砂八分珍珠三分為

末口嚼胭脂汁調搽

大連翹飲 治痘後腫毒蘊熱

連翹 當歸 白芍 各一錢 防風 滑石 紫胡

木通 黃芩 各八分 荊芥 梔子 車前 牛勞子

各五分 蟬退 三分 甘艸 三分 生薑

敗毒散 治痘腫毒

當歸 陳皮 白芷 赤芍 穿山甲 乳香

沒藥 金銀花 貝母 皂角針 天花粉 風防

水酒各半鍾煎服

三豆漿 治痘毒初起

黑豆 萊豆 赤小豆 醋浸研漿時時以鵝翎

刷之

金華散 治痘後肥瘡疳瘡疥癬能收水涼肌解毒

黃丹 黃柏 黃芪 黃連 大黃 輕粉 等分

麝香 少許 爲末瘡溼乾糝燥用蠟猪油熬化調搽

證治大還

幼幼近編 卷之三

圭

貞白堂

生肌散 治疳蝕不斂并痘後膿血雜流不收等瘡

地骨皮 黃連 黃柏 五倍 甘艸 爲細末

乾糝 一方用大貝母二錢白芷赤石脂白芨各

一錢龍骨五分猪骨髓調貼亦名生肌散

生肌散 趙氏 治癰潰成坑見骨

赤石脂 伏龍肝 輕粉 杭粉 黃柏 血竭

各一錢 蜜陀僧 二錢 黃丹 八分 乳香 沒藥 各三分

髮灰 五分 冰片 三釐 共爲細末敷糝

瀉肝散 治痘後肝經蘊熱目痛

當歸 川芎 白芍 防風 白蒺藜 荊芥

甘艸 黃連 木賊 菊花 蔓荊子 燈心

一方有柴胡胆草密蒙花蟬退加猪肝一兩煎無

木賊蔓荊蒺藜荊芥 有翳膜加夜明砂谷精艸

羚羊角散 治痘後餘毒不解上攻眼目生翳羞明

眵淚俱多紅赤腫閉

羚羊角 黃芩 黃芪 草決明 車前子

升麻 防風 大黃 芒硝 等分 水煎稍熱服

此方以羚羊角主明目爲君升麻補足太陰以實

證治大還

幼幼近編 卷之三

圭

貞白堂

內逐其毒也黃芪補手太陰以實外禦其邪也爲

臣防風升清陽車前瀉濁陰草決明療赤腫淚出

黃芩大黃芒硝用以攻其固熱爲使然硝黃乃苦

寒之藥當量見加減之

羌活散 治痘疹眼中翳膜

羌活 防風 荊芥 蟬退 蛇脫 木賊 谷

精草 蒙花 萊豆皮 白菊 雞子內白皮

每一錢茶清下若痘出時眼虛腫流膿赤紫翳膜

用萊豆皮谷精草防風三味煎湯時時飲之

復明散 治痘後日痛紅絲翳膜

當歸 川芎 白芍 地黃 防風 蔓荊子

柴胡 白芷 水煎服

退翳散 治痘瘡入目神效

人參 牛旁子 等分 爲末每服一錢元米湯下

治痘後翳膜不退羞明怕日

夜明沙 蟬退 各一兩 密蒙花 酒洗 谷精草 各五錢

共爲末入猪肝內煮熟連汁飲

搽藥方 用象牙磨水搽入目內

證治大還 卷之三 垂 貞白堂

兔糞丸 治痘後翳膜

家菊花 二兩 白蒺藜 一兩 甘艸 一兩 兔糞 四兩

爲末蜜丸每服三十丸細茶湯下

安胎散 治孕婦出痘動胎

八珍湯去地黃加黃芩砂仁香附紫蘇

犀角黃連湯 治痘後牙疳

黃連 一錢 烏梅 一個 木香 二分 犀角 一錢 磨水

水煎服臨藥好入犀角水

治牙疳臭爛

黃連 一兩 白礬砂 一錢 膽礬 三分 冰片 爲細末 磨上

一方加人中白鹽梅燒存性 杏庄用人中白三

錢鹽梅七個煨枯礬三錢五倍細辛胡黃連各一

錢雄黃銅綠爲細末吹之

甘露飲 治牙齦臭爛出血喉舌生瘡

天門冬 麥門冬 生地 熟地 枳殼 黃芩

石斛 茵陳 甘艸 枇杷葉

神聖散 治口疳

小青蝦蟆二三枚生白礬共搗棗肉裹燒存性爲

證治大還 卷之三 垂 貞白堂

末敷之

救生散 治齒縫出血腫痛

橡碗子 按鹽盛滿以鐵線縛之 紅棗 去核入雄黃 入火中燒存性去鹽 一分以鐵線

扎之燒 共研極細末加麝香一分研細塗之

奪命散 治同上

用車健子根皮以醋煮乾炒脆爲末吹之

內托散 治餘毒

人參 黃芪 白朮 當歸 白芍 酒炒 川芎

白芷 金銀花 連翹 防風 甘艸 荆芥

牛旁子

解毒透疹湯保赤 治麻疹初熱如時令不寒不熱

以此辛平之藥發之

升麻 葛根 羌活 防風 荊芥 柴胡

前胡 人參 桔梗 連翹 牛旁子 赤芍

甘艸 蟬退 淡竹葉 時令溫暖加石膏知母

木通去羌活人參 時令暄熱加石膏知母玄參

山梔黃芩去羌活升麻人參 時令大寒加桂枝

麻黃去葛根升麻前胡柴胡連翹 用前藥發不

諸治大遺

幼幼近編 卷之三

畫

貞白堂 子

出升麻麻黃俱酒洗加人中黃牛旁子蟬脫水煎

服

玄參解毒湯 治麻疹紫赤乾燥暗晦

玄參 升麻 葛根 梔仁 石膏 知母

荊芥 桔梗 甘艸 生地 木通 黑暗加人

中黃 便秘加大黃 腹脹加滑石

化毒湯 治疹一齊湧出色似錦紋

玄參 知母 石膏 連翹 葶藶子 荊芥

升麻 橘皮 甘艸 淡竹葉

疹發不出方

麻黃去節 人參 二錢 人中黃 二兩 大人三錢小兒

錢半蒸頭湯送下

治疹疹沒能令即出

牛黃 冰片各一分 麝香一分 硃砂 雄黃各五分

天竹黃五分 蠶蚕 薄荷各三分 薄荷湯下五分

化斑解毒湯 治疹毒未盡悒悒煩熱頻嘔吐連

綿不收

玄參 知母 石膏 人中黃 升麻 大青

諸治大遺

幼幼近編 卷之三

美

貞白堂 子

牛旁子 淡竹葉

加減麻黃湯 治感冒風寒毒返內攻喘急悶亂腹

痛渾身青紫

麻黃 升麻俱酒洗 荊芥 牛旁子 蟬退 人中黃

治疹發不出效方

用櫻桃核打碎煎湯飲之

升麻解肌湯保赤 治疹欲出不出壯熱煩躁或乾

紅隱伏不起或為風寒所襲早沒

升麻 葛根 芍藥 蘇葉 防風 桔梗

解毒養榮湯	治疹退大熱不止	當歸	白芍	生地	川芎	玄參	荊芥	丹皮	黃芩	升麻	芍藥	生地	木通	黃芩	連翹	玄參	甘艸	桔梗	荊芥	鼠粘	薄荷	消斑飲	治熱退疹不退此內熱未平也	升麻	玄參	荊芥	鼠粘子	芍藥	甘艸	梔子仁湯	治疹狀如蚊咬色黑者此毒盛也	梔子	白鮮皮	赤芍	升麻	寒水石	甘艸	紫艸	薄荷	黃連杏仁湯	治疹毒氣入胃變黑眼赤喉痛口舌生瘡泄瀉
-------	---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	--------------	----	----	----	-----	----	----	------	---------------	----	-----	----	----	-----	----	----	----	-------	--------------------

黃連	杏仁	陳皮	麻黃	枳殼	葛根	加減升麻湯	治水痘赤痘麻痘疹	升麻	葛根	芍藥	甘艸	防風	桔梗	紫蘇	蒼朮	陳皮	枳殼	柴胡	薑棗	水痘赤痘卽此一服本方不用加減見疹熱不退加玄參嘔吐加藿香瀉甚者去蒼朮加訶子肉果	胡荽酒	治痘不出欲令速出	胡荽子	搗末酒煎勿使泄氣候溫去滓微微從項下噴身令遍除面不噴包暖卽出又主小兒禿瘡油煎敷之及食肉中毒吐血不止煮令取汁服辟穢飲治痘爲穢氣所觸陷伏出不快	人參	當歸	川芎	防風	桔梗	檀香	藿香	乳香	肉桂	白芷	紫蘇	甘艸	開關散	杏庄	治痰塞咽喉滴水不入聲如拽鋸	白礬	三錢	巴豆	四粒	新瓦上煨枯仍以青黛水拌	淫陰乾力利少三分天竺黃一分吹之	口舌瘡喉疳如黍腫黃胎水穀不下
----	----	----	----	----	----	-------	----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	-----	----------	-----	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	---------------	----	----	----	----	-------------	-----------------	----------------

用山豆根六分喉下神效

稀痘方

用金銀花爲末糖調常服效

又方 以兔絲子半斤好酒煮乾去皮黑玄參四兩爲末煉蜜丸如彈子大空心白湯化一九日二次或加生地黃麥冬各四錢犀角末一兩亦可又方以白牛虱數百枚炙脆和糖令兒食之

治痘喘 以白花地下水煎服

火痘毒盛遇火令 曰花地下濾汁和淡白酒漿少

證治大還

幼幼近編卷之三

真白堂

服之立解

治痘後餘毒

人參 白茯苓

金銀花

犀角

各三錢

甘艸

一錢

羚羊角

一錢

珍珠

八分

蜜丸

每服

一錢

日二服

治痘虛寒行漿時作泄

蓮肉炒去心一兩爲末加鴉片五分研勻犬者用

五分小者用三分白湯調下卽止止後以人參黃

芪鹿茸煎服補其元氣

治痘後脾虛作瀉及老人患此更效

黃芪 四兩 人參 四兩 肉豆蔻 二兩 五味子 四兩

山萸肉 四兩 蓮肉 六兩 白扁豆 四兩 白朮 三兩

爲細末棗肉搗爲丸如彈子大每用一丸薑湯化

治痘癰艱脫

人參 一錢 白芍 酒炒 三錢 炙艸 一錢 麥冬 去心 五錢 五味子 六錢

生地 四錢 金銀花 四錢 水煎服

痘疔方

雄黃 牛糞 尖燒存 每錢加水片二分研細吹患

處

證治大還

幼幼近編卷之三

真白堂

治痘後翻癰

象牙末 三錢

真珠末 三錢

白殭蚕 二錢

孩兒茶 一錢

五 爲細末以油胭脂調敷

防痘傷目 以油胭脂塗眼眶四圍三四次永不傷

目

治痘後病目兼治血熱病目而脾胃壯實者

天冬 麥冬

枸杞

各四錢

甘艸 一兩

生地 八兩

五味子 二兩

甘菊 三兩

玄參 三兩

地骨皮 二兩

白蒺藜 炒去刺 五兩

谷精草 三兩

木賊 三兩

密蒙 二兩

草決明二兩 女貞實同黑豆九蒸 槐角四兩 羚羊角三兩 蜜丸

痘後目痛上白膜不見物

谷精艸二錢 決明炒研一錢半 川連酒炒一錢半 生地二錢 川芎八分 甘艸六分 白蒺藜炒研一錢 柴胡七分 甘菊二錢 石菖蒲一錢 木賊一錢 玄參一錢 連翹一錢 麥冬二錢

治疹發未出喘嗽煩躁悶亂

西河柳葉風乾爲末水調四錢頓服砂糖調服

證治大還

幼幼近編 卷之三

聖

貞白堂

可治疹後痢

治疹後下積滯

川連酒炒一兩 升麻七分 乾葛八錢 甘艸四錢 黃芩八錢 白芍酒炒八錢 滑石一兩 山藥粉和丸白湯下三四錢

治疹後口瘡

雄黃 牛糞尖一個火煨過研細 明凡五分 水片一分五釐 皮硝一錢 白礬砂三錢 銅青三分 研細以鵝翎管

吹患處

治疹後瘡

驚甲二錢 山查肉二錢 橘紅三錢 貝母三錢 竹葉

片炙艸一分 麥冬去心三錢 知母二錢 白茯苓二錢

乾葛一錢 柴胡一錢 如不渴去知母 渴甚加石

膏五錢

治痘疹攻目壞眼 蛇脫一條洗淨焙燥加天花粉

等分爲末入羊肝內以麻布包煑食之妙甚

稀痘丹

橄欖七枚新瓦上炙脆爲末 硃砂七分 砂糖調服妙

凡兒或出痘時或未出時以絲灰連帶三寸連皮燒

證治大還

幼幼近編 卷之三

聖

貞白堂

灰砂糖調服或以硃砂末量兒大小或五分或一

錢蜜水調服或絲灰灰硃砂合而服之多者可少

少者可無

華亭陳 治三農甫述 男

拭璣先 師崇善思 參

三韓張 鏞元聲甫聞 門人

姚廷讓子遜校

兒科 按小兒惟痧痘吐瀉驚風厥口胎熱胎
寒腹痛背逆胸解頰頰陷夜啼等與大方脈為
異其餘症治相
同者或不便贅

脈法

凡診小兒脈以大指展看三關一息六七至為平和
八九至為熱五至以內為寒弦為風寒沉緩傷食
促急虛驚弦急氣不和沉細為冷浮緩為風大小

證治大還

幼幼近編

一 頁白堂

不調為鬼祟浮大數為風熱沉數為骨熱伏結為
物聚單細為疳勞脈洪為虫浮而遲潮熱者為胃
寒

三關脈色主病

食指第一節為風關第二節為氣關第三節為命關

男左女右側看青為驚風紫為傷熱赤為傷寒白
為疳積黃為虛弱惟淡紅隱隱為常候青紫相半
主驚積風熱青而淡紫伸縮來去青紫黑絲隱隱
相雜似出不出主慢脾風紅黑相兼上下脈直

如針如鎗者主心肝熱極生風風熱急驚搐搦痰

涎睡臥不寧脈有分枝者主傷風感冒發熱自汗

流珠環珠長珠形俱主飲食傷脾吐瀉腹脹作痛

來蛇形主脾胃溼熱中脘不和嘔吐不食去蛇形

主脾胃虛食積吐瀉困睡不食魚骨水字形主驚

風發熱痰盛搐搦驚悸夜啼從風關勢至氣關者

主心肺上焦病涕唾咳嗽發熱嘔吐飲食皆聚在

胸膈從氣關勢至命關者主膽脾胃三經病飲食

不貪傷食吐瀉慢驚虛熱脈形自內出外者主內

證治大還

幼幼近編

二 頁白堂

熱傷食風痼痰熱心神恍惚脾胃不和脈形自外
入內者主感冒發熱惡寒頭痛身疼咳嗽痰涎三
關通度射指面主脾肺虧損驚風痰熱聚於胸膈

三關通度射指甲主慢驚脾虛脈形或曲或亂主


虫積虛熱疳勞

證治大還

幼幼近編
卷之四

三

五江集



臟腑所屬部分

頤中爲庭。兩眉之間曰闕。直鼻而下曰直下。兩目之間曰下極。鼻樑曰方。鼻柱之端曰面黃。自額而下闕上屬首面咽喉之部分。自闕中尋鼻而下鼻端屬肺心肝脾腎之部分。自目黃挾鼻而下承漿胆胃大小腸膀胱之部分。自額而下頤屬肩背手臂之部分。牙車斜下頤屬投膝脛足之部分。經曰五臟次于中央。六腑夾其面側首面上於闕庭。王宮在于下極。正謂此也。

五臟爲人身之主故位在中央胆胃大小腸膀胱爲

五臟之府故夾其兩側由臟腑以及于四肢故循至顙及頰以屬肩背臂股膝脛足也上以閱上下以閱下上下之分然亦臟腑之定位故也

錢氏曰：額門屬腎，髮際屬膀胱，左風池屬肝，右風池屬命門，左太陽屬膀胱，右太陽屬腎，印堂屬心，風池至山根屬肺，心與肝山根至鼻端屬肝脾腎，人中至承漿屬脾，耳前與承漿屬腎，左腮屬肝，右腮屬肺，額土屬心，鼻屬脾，頤屬腎。

證治大要

幼幼近編
卷之四

四

真白堂

頭面形色主病

左腮青爲順，白爲逆。赤至肝經，風熱發熱，拘急，青黑主驚風，腹痛，淡赤主潮熱，痰嗽。右腮白爲順，赤爲逆，赤甚主喘急悶亂。飲水，小便赤瀝淋閉。額色赤爲順，黑爲逆。青黑主驚風，腹痛，痰癇，啼哭，微黃亦爲順，黑爲逆。青黑主驚風，骨熱。鼻色黃爲順，青爲逆。青主盜汗，毛焦，驚癇，骨熱。鼻色黃爲順，青爲逆。青主脾經虛熱，飲食少思，淡黃主小便秘，鼻燥，衄血。頰色黑爲順，黃爲逆。色赤主腎與膀胱有熱。小兒發熱，唇四圍白，黃色者脾弱也。青者肝勝也。

青黃不澤木尅土也青黑相兼木火風熱也黑者寒水侮土也白者氣虛也

顛門紅主胎中受熱受驚不時驚跳啾啾夜啼紅

而腫起由風熱上冲主心胸有熱痰主驚顛陷

主胃氣下陷泄瀉虛弱久病顛門紅印堂青此

心之微邪侮水也顛印皆紅亦然顛門青印堂

紅此水尅火危顛印皆青亦然額上紅脉至眉

心主風熱痛癩發熱小便赤色印堂紅主心經

積熱眉心連印堂紅主心肺上焦有熱痰夜啼嘔

證治大還

幼幼近編

五

貞白堂

吐生驚闕中青紫主傷風咳嗽痰涎印堂紅

脉至山根是心與小腸俱熱主小便赤色驚悸咬

牙山根下青紫主飲食傷脾肚痛印堂至準

頭紐主五臟內熱印堂青主風熱主驚黑主腹

痛啼哭山根至鼻柱紅是心脾腎有熱主大小

便赤滿山根青主驚山根紫傷乳食山根

赤黑主吐瀉年壽紅黑主痢疾黃赤並吐瀉

左太陽併目角紅主傷風寒壯熱煩躁啼哭太

陽紅脉至太陰主內外有熱連文章則熱微不解

至武臺則漸生變左太陽青主變瀉太陰紅

脉見主壯熱鼻衄傷風左太陰紫傷寒有感

右太陰紅至太陽因吃母乳病乳主痰左太陰

青生驚日角紅至眉中主內熱生驚文臺紅

傷寒內熱頭痛左文臺紫久熱不退青主熱傳

經不解左眉頭紅主肝熱近眉頭左下突起主

伏驚不時驚跳兩眉頭紅主夜啼風池紅主

夜啼驚悸不得安臥黃主吐逆眼胞腫主濕痰

咳嗽黑睛黃傷寒白輪黃傷積青肝熱赤心

證治大還

幼幼近編

六

貞白堂

熱淡紅心虛氣池紅三焦有熱紫主夜啼睡臥

不寧黑主中焦有痰風池氣池俱紅主煩躁啼

叫武臺紅吐泄生驚年壽至氣池青紫主風

熱顛癇耳後高骨起青筋主癰瘕人中黃傷

食吐瀉黑腹癰或虫或痢承漿黃吐青驚

明醫雜著云小兒之疾惟肝與脾為病最多以肝素

有餘脾素不足也診視之法唇黃多積唇白多虛

唇燥多熱唇紫積熱唇四圍青主木尅土驚氣入

腹耳輪紅紫主痲痘毛髮乾焦主疳積睛黃傷寒

證治大還

幼幼近編
卷之四

七

貞白堂

肝經風熱，目睛黃，脾經濕熱，胸膈胎氣不足，
赤紅色，心經虛熱，無睛光者，腎虛通身皆熱，是傷
寒，肝熱脾冷，是傷食，內熱手足心必熱，內寒手足
心必寒，呼呼吸汗出者，虫所嚙也，唇青不欲食者，
木尅土也，怕明者，心經熱甚，昏睡者，食熱在脾，停
耳者，腎有風毒，噫氣者，胃虛積聚，耳出膿水者，腎
之疳，涎流唇紫者，蛔之積，解頤者，腎氣不足，帶頤
脾胃虛寒，心氣大驚，則生顛疾，心氣虛乏，因少精
神，龜背者，風客脊髓，龜胸者，執蓄肺經，鵝口口瘡
胃中濕熱，重舌木舌，熱在心脾，膈風撮口，濕熱風
痰，胎熱胎黃，病由濕熱，身熱橫眉，頭目必痛，不食
橫眉，下痢腹疼，哭而不啼，必有所痛，啼而不哭，或
因于驚，天鈞，心脾積熱，內鈞，脾胃虛寒，夜啼有寒
熱之分，驚症有急慢之別，渴則唇紅，舌熱則眼
流淚，瞳細心浮，察百證自明。凡小兒膈帶短者，多
難養，胎帶上多壅塊
者，多兄弟，無
塊者，無兄弟

心臟虛實主病

心主驚，實則叫哭發熱，飲水而搐，虛則困倦，悸動不

證治大還

幼幼近編
卷之四

八

貞白堂

安，心病多叫哭，手足動搖驚悸，心氣熱多煩熱，口
中氣溫，心胸亦熱，有就涼之意，喜合面睡，上竅搖
頭，咬牙弄舌，實則瀉心湯導赤散，虛則生犀散，然
心痛當調其肝腎，蓋肝為心之母，腎乃賊邪，肝氣通
則心氣和，肝氣滯則心氣乏，心病求肝，清其源也，
五藏受病，傳其所勝，腎之受邪，必傳於心，心病治
腎，逐其邪也，故心病調其肝腎者，正所以益其心
也，若心病叫哭發熱而搐，又見下鼠骨重病，見亥
子丑時，是心反勝腎，所勝妄行也，用地黃丸以補
腎導赤散以瀉心

肝藏虛實主病

肝主風，實則目直大叫，項急頓悶，虛則咬牙呵欠，氣
熱則內生風，氣溫則內生熱，肝熱則目直不搖，手
尋衣領，亂捻物，熱甚身反張直，得心熱則搐風動
則目連劄，實則瀉青丸，虛則地黃丸，然肝病非腎
水不能相生，即肺金之賊，攻擊必根其病之所因，
虛則補母以滋化源，實則逐邪以去鬼賊，必使不
係二經作病，然後隨本經虛實而藥之，苟肝勝肺

病身熱目直。大叫發熱。又兼虛喘短氣。病甚于申酉戌時。是肝真強也。經曰。受所制而不能制。謂之真強。法當補肺瀉肝。

脾藏虛實主病

脾主困。病則泄瀉多睡。體重。昏倦。不思食。乳實則困。睡身熱。飲水腹脹瀉黃。虛則吐瀉生風。泄瀉色白。睡則露睛。實則瀉黃散。虛則白朮散。若因心氣虧。脾家生氣不足者。則補心。因肝氣實而水氣凌脾者。則伐肝。然小兒五藏。肝只是有餘。脾只是不足。

證治大還

幼幼近編
卷之四

九

貞白堂
三言三

故脾一病。即當制其肝也。

肺藏虛實主病

肺主氣。實則悶亂喘促。虛則喘而少氣。面白神怯。肺熱。手搥眉目。鼻乾燥。壯熱。飲水。膚痛。實則瀉白散。虛則先用益黃散。後用阿膠散。若因心火燄金者。即當先抑心氣。而後養肺清金。然肺家生氣不足。則體虛而風邪易感。故患肺寒者。多脾虛得之。脾家濕熱氣盛。痞隔中焦。上炎薰肺。氣滯生痰。故患肺熱者。又得之於脾實也。肺病見肝症。咬牙呵欠。

者易治。肝虛不能勝肺也。見目直。大叫。項急。煩悶者。難治。肺虛肝強。實而反勝之也。肺虛神白。見悶亂。氣粗。喘促。哽氣者。危。正衰邪甚也。

腎藏虛實主病

腎主虛無。實者神不足。面銹白。白睛多。解頰下窠。骨重。惟欲墜下。而縮身。兩足不喜衣履。由腎虛。心火得以下淥也。地黃丸主之。仍須察脾肺二經虛實。而後治其本藏。蓋腎病有因脾土濕熱下流。乘腎者。有因肺熱不能生水而腎病者。五行之氣。惟腎之一藏。母盛而子反受邪。蓋肺主氣。氣有餘。便是火。火炎上而不能下行。生腎。故子受反邪也。

證治大還

幼幼近編
卷之四

十

貞白堂
五言

不吮乳

小兒生下不吮乳。因穢惡入腹。則腹滿吐沫。宜白薑散。胎中受寒者。當歸散。

白薑散 治穢惡入腹不乳

乾白薑 赤茯苓 辰砂 甘草 丁香 等分

水煎綿蘸滴與之

當歸散 治胎寒不吮乳

當歸 肉桂 川芎 白薑炮 木香 香附

甘草 砂仁等分 乳汁調服

消乳丸

砂仁 半夏麴 神麴 麥芽 皂莢 白芷

小兒吐乳胃寒者用白豆蔻十四箇砂仁十四箇生

甘草炙甘草各二錢爲末入兒口中

撮口

撮口因胎中受濕熱熱生風濕生痰風痰流于心脾

二經故令舌強口撮也于見一婦生四子俱患撮

證治大還

幼幼近編 卷之四

士 貞白堂

口而死曰此非外感風邪良由母多濕熱兒受其

熱壅結藏府致臍腹腫脹流毒心脾故令舌強

撮也後有胎與金匱當歸散足發丹毒產子始無

是疾此症多見于七八朝內一見急宜早治小兒

初生藏府怯弱不勝其病故也初宜撮風散若至

肚腹腫脹此濕熱鬱結于府也急用天麻丸辰砂

膏疎利其毒後以五福化毒丹外灸煩車承漿穴

煩車在耳下曲頰端陷各三壯然谷穴然谷在足

中承漿在下唇之下內踝前起

大骨下一壯若口出白沫四肢厥冷則脾散而不

可救矣

甘草湯 治撮口取吐痰涎

甘草濃煎服令吐痰涎即以豬乳點入口中

撮風口噤不開

南星末一錢片腦少許指蘸薑汁擦牙齦立開齦

上有泡即擦破以蜜調蠶蚕末塗之

又方用生犀角及真羚羊角磨和蜜汁飲之急則

用大黃二錢甘草一錢煎服

撮風散 治撮口

證治大還

幼幼近編 卷之四

士 貞白堂

膽星二錢蜈蚣赤足者僵蚕焙蝎梢一錢硃砂各一錢

麝香二錢釣藤一錢每三分竹瀝調下

辰砂膏

辰砂一錢礞砂各一錢馬牙硝各一錢玄明粉一錢全蝎一錢

珍珠各一錢麝香二錢乳汁調與

天麻丸 治釣腸鎖肚撮口

南星炮白附子 馬牙硝 玄明粉 礞砂

全蝎 僵蚕 釣藤 五靈脂各一錢輕粉五分

辰砂二錢巴霜二錢每薄荷湯下二三分

聖惠治小兒初生七日口噤用牛黃少許細研以竹
瀝調灌更以豬乳點口中

簡要治撮口及發噤以原蚕蛾二枚灸黃蜜和傳口
內

神效方 用半邊蓮搗男左女右四十九轉取汁擦
牙銀愈

治小兒臍風撮口母孕時預服解一切胎毒

生甘草二錢懷生地四錢連翹二錢黃連一錢玄參二錢

括蕁根二錢木通一錢貝母二錢丹皮一錢金銀花四錢

證治大還 幼幼近編 卷之四 立 貞白堂

荊芥穗一錢羚羊角五分水二碗煎八分服

臍風

臍風由濕熱壅結于腸胃故令腹脹臍腫身體重着

四肢柔直也經曰諸腹脹大皆屬于熱諸瘰癧直

皆屬于濕是也宜龍膽湯星霜九下之若四肢抽

搐臍邊青黑撮口不開是毒入心脾不可療矣

龍膽湯 治臍風撮口

大黃梟 桔梗 茯苓 甘草 胆草炒 釣藤

柴胡各二錢 蟬螂二錢 每服二錢

撮口方 雀瓮真蠶蚕全蝎膩粉為末薄荷湯下仍
以蠶蚕調敷舌上

星霜九 治臍風撮口

南星 天麻 全蝎 白附子 蕪荑各一錢

滑石二錢元明粉一錢膩粉五分巴霜一分麪糊為

丸硃砂為衣薄荷湯下 一方用桑汁一二匙灌

下

胎寒

小兒生下百日內覺口冷膚起寒栗手足拳曲口噤

證治大還 幼幼近編 卷之四 立 貞白堂

不乳名曰胎寒身曲偃偻氣不舒暢口閉脚冷名

曰盤腸內釣皆腸胃受寒所致宜理中湯甘草七

香九看輕重選用

七香九 治胎寒

砂仁 香附 益智 吳茱萸 丁皮 陳皮

甘草炙 薑汁糊丸薑湯送下

胎熱

小兒生下眼閉目赤遍體壯熱小便赤澀大便或秘

眼胞浮腫口內氣熱時復驚煩名曰胎熱經久不

治則重舌木舌鵝舌口瘡赤紫丹瘤自此生矣宜連翹飲五福化毒丹隨輕重用之

連翹飲

連翹 生地 木通 赤芍 當歸 荊芥

柴胡 滑石 山梔 黃連 甘草 胎黃加茵

陳 便秘加大黃枳殼 丹毒加玄參犀角丹皮

鼠粘子 鵝口口瘡加桔梗玄參薄荷 重舌木

舌加犀角朴硝 弄舌加石膏犀角

五福化毒丹 治小兒胎熱胎毒口瘡

證治大還

幼幼近編 卷之四

圭

貞白堂

玄參 桔梗 各五錢 人參 青黛 各一錢 赤茯苓

牙硝 甘草 各三錢 麝香 分二 蜜丸 芡實大薄荷湯

下一錢

治胎驚胎熱母受孕宜預服

木瓜 錢一 炙冬 黃芪 白芍 各三錢 麥門冬 五錢

鼠粘子 錢一 金銀花 甘菊花 石斛 懷生地 各三錢

連翹 錢一 炙甘草 錢一 貝母 錢二 砂仁 錢一 人參 錢一 牛

河水二大碗煎八分食遠服

胎黃

小兒生下濕體皆黃小便如柏汁名曰胎黃由胎中

受濕熱所致宜地黃湯若百日後不因病而身黃

者胃熱也連翹飲加茵陳因病後淡黃兼白者胃

怯也參苓白朮散清便自調肢冷嗜臥益黃散

訶丁加參朮

地黃湯 治胎黃

生地 赤芍 赤茯苓 蒼朮 白朮 茵陳

澤瀉 豬苓 山梔 天花粉 甘草

胎驚

證治大還

幼幼近編 卷之四

夫

貞白堂

小兒生下百日內不因驚恐不時發搐或剝眼瞤口

或涎潮嘔吐握拳身強名曰胎驚先用利驚丸後

用抱龍丸

治胎驚

人參 白芍 酒炒各一兩 白茯苓 棗仁 各一兩 炙草

遠志 甘草汁浸 真天竺黃 另研 硃砂 另研 各一兩

磨帶 新瓦上炙焦 天麻 犀角 滑石末 各一兩

如有紫河車加一具 共研細末用鈎藤汁四

兩和煉蜜半斤搗和為丸重錢二分飢時臨臥以

燈心薄荷湯化服 如治急驚前方去河車臍帶
人參加白朮蚕蜜炙六錢全蝎六錢牛黃一錢二
分琥珀一錢胆星八錢麝香三分

發搐

發搐者皆因熱痰滯於胸腹風火相扇故手足牽引
也有搐時男左視無聲右視有聲者女右視無聲
左視有聲者此金木相勝故也有目連劄者因肝
風內動上入于目也有目直視者因熱入于目牽
其筋脉兩皆俱緊不能轉盼故也若急驚及風瀾

證治大還

幼幼近編
卷之四

七

貞白堂
三言十六

發搐宜利驚丸滾痰丸俱用薄荷天麻鈞藤煎湯
送下若吐瀉後病後慢驚發搐此脾胃虧損之虛
象也無風可祛無痰可逐宜六君子加天麻鈞藤
芍藥木香柴胡制肝補脾陽氣脫陷者補中益氣
湯加薑桂陽氣虛敗者參附湯若因飲食停滯痰
涎壅滿而見此症者乃脾土弱不能生金金虛不
能平木故木邪妄動也宜健脾消食其症自愈不
不可用涼驚等藥凡搐頻者風在表也易治宜發
搐稀者風在藏也難治宜補脾

立齋治一小兒發搐飢則益甚得食稍安目上劄此

肝木乘脾也用六君子加升麻鈞藤二劑而安

又治一兒月內發搐鼻塞乃邪也以六君子加細

辛桔梗更以葱白七根薑一片搐攤紙上手熨

熱貼顙門少頃鼻利搐止

又治一小兒發熱左腮赤而搐此心肝二經風熱以

柴胡清肝散治之而愈

又治一小兒發搐啼叫手足指俱冷左腮青黑此脾

土虛而腎水侮之也用六君子加薑桂一劑而安

證治大還

幼幼近編
卷之四

太

貞白堂
三言十六

天鈞

天鈞屬心肺積熱所致其症涎潮搐搦項強痰鳴雙
眸翻上爪甲色青皆痰熱壅滯上焦所致宜先用
滾痰丸去其積熱與痰後以涼膈散隨虛實增損
調治之

內鈞

內鈞屬脾胃虛寒寒主收引故僂僂參曲腹痛多啼
唇黑囊腫也宜理中湯參水干姜加木香吳茱萸肉
桂

夜啼

夜啼有脾寒有心熱脾為至陰夜屬陰陰勝則脾藏

之寒愈盛寒則腹中痛故曲腰而啼手腹俱冷面

色青白宜當歸散歸桂芍薑木
香附甘砂加茯神釣藤心熱

者見燈愈啼以心屬火遇火則煩熱內生兩陽相

搏故仰身而啼面赤唇焦口中氣熱手腹俱煖宜

導赤散生地木
通草加辰砂茯神犀角黃連竹葉若氣

臍便燥糞焦氣臭大腸熱也四順飲大黃赤
砂歸脾面色

白黑睛少屬腎氣不足六味丸若口到乳上即哭

證治大還

幼幼近編
卷之四

九

貞白堂
卷之四

不吮非口瘡即重舌等症也亦當兼察若啼而懷

抱即止此膽怯也加味溫膽湯

歷驗方治小兒夜啼用燈草燒灰置乳頭上吮之即

愈月內啼以真牛黃飛辰砂極細末各五厘塗

兒舌上立止

解顛

解顛者腎氣不足也腎主腦腦為髓海腎氣有虧腦

髓不足濕熱上熏故頭縫解開不合也宜地黃丸

加鹿茸酒炒片苓亦有氣虛有熱者宜四君子加

酒苓

衍義治解顛以蟹螯同白芨搗爛敷顛上

顛陷

顛陷者氣血脾胃俱虛而元氣下陷也宜補中益氣

湯手足冷者加薑桂甚者加附子

顛填

顛填者脾胃元氣虛而氣逆上冲也亦有脾胃虛熱

者有脾胃濕熱者並宜異攻散加酒苓木香蔓荊

子濕熱上薰者加蒼朮

證治大還

幼幼近編
卷之四

辛

貞白堂
卷之四

帶顛

小兒帶顛即當視其口舌有瘡否若無瘡流涎此屬

脾胃虛寒或實熱蓋涎者脾之液脾胃虛冷不能

統攝其津液故涎液自由宜溫脾散或脾胃實熱

而廉泉不能約制宜瀉實散藿脂膏
砂草作湯飲冷五

心煩熱屬熱不渴肢冷屬寒脾胃熱者鹿角屑米

飲調服

溫脾飲

人參 白朮 丁香 木香 肉果 半夏

陳皮 白芍藥

龜背

風寒客于脊髓故令背高如龜也宜二活散外炙肺

俞三椎下 膈俞七椎下 各三五壯亦有坐早致僂僕

者用六味丸加薏仁木瓜當歸肉桂

二活散

羌活 獨活 人參 黃芪 薏苡仁 當歸

肉桂 杜仲

龜胸

證治大選

幼幼近編 卷之四

主 貞白堂

肺經受熱故胸高腫滿狀似龜胸也輕則瀉白散

皮杏桔 加山梔天門冬甚則百合丹切禁五辛酒

麵炙燂煎炒之物

百合丹

大黃酒 天門冬 杏仁 百合 桑皮 葶藶炒

石膏 枳殼 桔梗 甘草 煉蜜為丸

語遲

言者心之聲舌者心之苗心氣不足舌本無力故不能言也亦有驚邪乘心心氣不守木舌不語者並

宜胃蒲丸

葛蒲丸

葛蒲 人參 茯神 遠志 麥門冬 川芎

當歸 乳香 柏子 硃砂 煉蜜為丸

行遲

行遲屬肝腎俱虛腎主骨腎虛則髓不滿骨故骨軟

不能行肝主筋肝虛則血不榮筋故筋痿不能束

骨也宜虎脰丸

虎脰丸

證治大選

幼幼近編 卷之四

主 貞白堂

虎脰骨 熟地 山茱萸 牛膝 山藥 當歸

木瓜 川芎 鹿茸 薏苡仁 五加皮 肉桂

內熱者去桂 蜜丸

鶴膝

小兒稟受腎虛血氣不足故肌肉瘦削骨節呈露如

鶴之膝也亦有腎虛精氣內耗膚革不榮或為邪

襲者並宜六味丸加鹿茸牛膝補骨脂

加味地黃丸

熟地黃 山茱萸 牡丹皮 山藥 牛膝

澤瀉 鹿茸 肉桂 補骨脂 白茯苓

人參 童便浸炙乾 煉蜜爲丸

吐瀉

小兒吐瀉有熱有寒有虛有積有驚但因乳母所傷

而致者爲多凡手指熱則胃熱手指冷則胃寒腹

痛欲按者屬虛不可按者屬實寒者氣緩神清面

白肢冷吐乳不消糞色清白宜理中湯 參朮干姜 或

異攻散加藿香肉果砂仁熱者食乳即吐四肢五

心煩熱唇紅作渴糞赤焦黃小便便赤少瀉黃散 梔

證治六選

幼幼近編卷之四

五

自白室

青防 加木通滑石傷暑者香薷飲或五苓散傷乳

食者昏睡噎氣不思乳食肚熱脚冷吐出酸穢瀉

如敗卵腹不可按宜保和丸 附查麴蘆酒曲砂 或平胃散

加麴蘆半夏丁香傷風者身溫乍寒乍熱咳嗽氣

急天麻散加防風虛者睡則露睛吐乳不消瀉糞

不變懶食乳食手指常冷腹痛喜按異攻散白朮

散助胃膏驚者面色青黃乳食不化泄瀉青色宜

六君子湯加柴胡釣藤木香大抵先吐後瀉者多

屬于熱先吐後瀉者多屬于虛有但吐不瀉但瀉

不吐者宜于大方脉中參治又當根其致病之由而藥之不可拘于吐瀉上着力也

田氏云小兒瀉毒肝風內盛脾氣不和也宜白朮散

一小兒生方九日即嘔吐腹脹作脾氣虛寒用半夏

陳皮薑汁藟子丁香藿香砂仁各少許煎飲半酒

盞而安

白朮散 治吐瀉效

人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏 砂仁

藿香 乾葛 甘草

證治大選

幼幼近編卷之四

五

自白室

助胃膏 治脾胃虛弱吐瀉不止

人參 錢六 白朮 土炒一兩半 茯苓 一兩 陳皮 錢三 炙甘草 錢五

半夏 錢八 藿香 錢三 砂仁 四十粒 木香 錢二 丁香 錢二

肉果 一兩 山藥 一兩 白豆蔻 十五粒 薑汁打米糊爲丸

如彈子太化服

玉漿膏 治小兒百日吐乳

人參 錢一 丁香 錢十 陳皮 錢一 薑一片煎取清汁服

定吐飲 治嘔吐投諸藥不納

半夏 錢二 生薑 錢二 同炒至香熟入桂三分再炒出

火毒為末。每二錢薑三片。水一鍾。徐徐服。或元

米炒黃。入薑鹽濃煎。取汁時時服之。

止泄散 治泄瀉不止

肉果煨 白朮土炒 茯苓 白芍藥炒 訶子煨各一錢

蒼朮土炒 升麻各七分 久瀉不止加龍骨為散服。或

米糊丸

墜氣散 治嘔吐諸治不效

硫黃五錢 水銀一錢 同研不見星。每一字薑水下

治久瀉不止

證治大還

幼幼近編卷之四

蓋

貞白堂

白朮土炒 白茯苓等分 陳米一撮。煮粥。止服米飲。

治久吐不止

砂仁童便炒三錢 丁香一錢 藿香三錢 每薑湯調服一匙

治小兒吐瀉不止

五倍二枚半生半熟 甘草炙 為末。米泔水下五分。

急慢驚

驚有急慢。治隔雲泥。急驚者。或因感冒發熱。或因乳

食停滯。或忽見忽聞。或跌躄受驚。驚則入通于肝。

由是風邪內作。火得風而動。風火相扇。故手足牽

引。劄眼搖頭。張口出舌。涎潮上壅也。頃爾發過。則

如故。其脉洪數。浮緊。急促。緣風火之性急暴故也。

錢氏謂無陰之症者。蓋因心經實熱。陰不能以配

陽。是為陽盛陰虛之候也。痰盛者。用稀涎散直取

其痰。後用瀉青丸。利驚丸。鎮驚丸。去肝風。降心火。

如口噤不能下者。即從鼻中灌入。牙關少舒。隨用

吐藥。痰盛不得吐者。用竹瀝薑汁吐之。或以小牛

黃丸。或滾痰丸。下取其痰。仍須別其所因而治。因

食過傷者。消其食。因冒風寒者。散其邪。因受驚恐

證治大還

幼幼近編卷之四

美

貞白堂

者。鎮其心。不可槩治以驚藥。若驚久不醒。急以搐

鼻散。擦紙條取嚏。如不嚏。或啼聲不出口。噤不省

額汗。如珠。遺尿。噴藥皆死症也。

慢驚起于吐瀉。或久病後。因脾肺俱虛。則肝木橫行。

土為風木所乘。故作驚狀。似搐而不甚。搐似睡而

不穩。睡面青身冷。睡則露睛。四肢與口鼻中氣俱

冷。其脉沉遲虛敗。錢氏謂無陽之症者。蓋脾土虛

甚。陽不能以勝陰。是陰盛陽虛之候也。治宜溫補

脾胃為主。總有痰涎。亦由脾胃虛不能運化而成。

不可驟去。縱見發搐亦由脾土弱而自招木尅。不可截風。慢驚本無熱。縱或發熱亦是虛熱。切禁涼驚。惟溫補脾胃。則肝木自寧。譬猶土薄而上有大木不能乘載。故無風而自動。厚培其土。俾根深本固。自無風邪之害矣。亦須較量陰陽。微甚用藥。若方傳慢候。尚有陽症者。不必回陽止。宜異攻散。以溫養脾胃。微加天麻全蝎白附子胆星以截風定搐。若陽虧陰盛。身凉面青。純屬慢驚者。宜加味求附湯。加味回陽散。若四肢厥冷。二便不禁。髮直頭證治大還

證治大還

幼幼近編卷之四

壬

貞白堂

搖目睛不轉。涎喘鴉聲。皆死症也。

凡驚用鎮驚豁痰藥。勿效。即宜安神補心。蓋驚屬心氣不足。愈下則愈虛。痰涎驚氣乘虛入客。則不可治矣。

治矣。

急驚方

加味天麻散 治小兒急驚初起。悸動有痰。

天麻 柴胡 僵蚕 半夏 膽星 茯苓

白朮 黃連 鈎藤 枳實 甘草

加味溫膽湯

半夏 枳實 茯苓 陳皮 竹茹 酸棗仁 鈎藤 生薑

人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 天麻 薄荷

僵蚕 茯苓 桔梗 半夏 人參 枳殼

木通 川芎 甘草 地骨皮

千金散 治一切痰喘驚風及急驚痰喘不乳。

全蝎 僵蚕 硃砂 黃連 天麻 胆星

牛黃 冰片 甘草 每用一分。薄荷燈心

證治大還

幼幼近編卷之四

壬

貞白堂

金銀煎湯下 一方無牛黃冰片甘草。有天竺黃

用竹瀝薑汁丸服。

瀉青丸 治肝熱急驚搐搦

羌活 大黃 川芎 梔子 胆草 當歸

防風 蜜九 芩實大 每服一丸

利驚丸 治急驚併臍風撮口

半夏 南星 滑石 蛤粉 硃砂

雄黃 錢巴豆 錢麝香 輕粉 飯為丸如梧

子大薑湯下十九丸

加減利驚丸 下痰甚捷

牽牛末一花青錢五巴霜二錢半 麴糊為丸豆大湯

下二三丸

抱龍丸 治驚風傷風驚駭悸動痰熱諸痰風痰驚

痰等症

胆星兩一天竺黃錢七辰砂錢五雄黃錢五殭蚕錢五真全蝎錢五去

鈞藤錢五天麻錢五牛黃錢一珍珠錢三麝香錢一甘草

膏丸芡實大薄荷湯下一丸

小牛黃丸 治急驚風痰盛

證治大還

幼幼近編卷之四

手

貞白堂

胆星 硃砂各一兩巴霜錢五 麴糊同牙皂膏為丸

如梧子大每服三丸

清心涼膈丸 治驚搐弄舌痰喘

南星 半夏 白附子各一兩鬱金 川烏各三錢

為末黃牛膽汁拌勻仍入膽內紫口高懸透風陰

乾陳久更妙臨用每兩入青黛煨硝礪砂明礬雄

黃辰砂各一錢片腦一分麴糊為丸黍米大斑湯

送下

鎮驚丸

琥珀 辰砂 青皮 甘草 珍珠 雄黃各二錢半

青黛 礞石 蘆香 柴胡各五錢天麻 乳香各二兩

胆星 天竺黃各二兩 甘草膏為丸慢驚參朮湯

下急驚薄荷薤蜜湯下

保生錠 治急驚諸傷食傷風驚駭等症

蛇含石四兩醋南星一兩湯白附子去皮

珍珠 硃砂各五錢麝香錢一元米糊為錠

礞石丸 治驚風痰盛

胆星 礞石各二兩天竺黃 青黛各五錢硃砂

證治大還

幼幼近編卷之四

手

貞白堂

蘆薈各三錢蜈蚣燒存性殭蚕各錢半甘草膏丸芡實大

開關散 治痰涎潮塞牙關緊閉藥不能下

牙皂錢二南星錢一蜈蚣錢二殭蚕錢五麝香錢二

薑汁煎藥擦牙齦并滴入齒縫中

通關散 治驚風已退但聲啞無音

南星 炮石菖蒲等分 豬胆汁下即能言語

搐鼻散

半夏 細辛各一錢荆芥七分牙皂錢三麝香二分

為細末紙條蘸藥取嚏

小兒失跌受驚用受風致眩神不正視東則見西

視西則見東用通睛用石榴一兩瓜蒂五枚為

末吹鼻日三次內用牛黃平肝之藥

祛痰鎮驚丸

胆星兩錢竺黃錢五珍珠錢一琥珀錢二硃砂錢三僵蚕錢五

全蝎錢一麝香分三真金帖三入藥蜜丸芡實大 幼科

去痰食聖藥妙不可言

金聚丹

用巴豆四十九粒每日換水浸二十一日取起入

證治大還 幼幼近編 卷之四 三 貞白堂

紅棗內濕紙包煨熟打爛拌前藥為丸外用金衣

一歲一分薄荷湯下

治小兒癇症或驚風不止

天竺黃錢五棗仁兩二麥冬去心兩二人參兩一明天麻錢五

天冬去心兩一茯神半兩橘紅錢七遠志肉兩一白芍酒洗兩一

釣藤錢五蜜丸如彈子大水飛硃砂為衣燈心湯

下每服一丸

青黛丸

白附子錢五南星 天麻 天竺黃各一兩半巴霜一錢

青黛丸

驚後膽斜人參阿膠元米炒各一錢煎服

慢驚方

異攻散 治吐瀉將成慢驚

人參 白朮 茯苓 甘草炙 陳皮 木香

大棗 生薑 搗加全蝎天麻蟬脫 吐加半夏

藿香 湯加訶子升麻肉豆蔻 遍身厥冷加附

子 語言不出加菖蒲

醒脾散 治吐瀉脾困欲發驚搐用此祛風醒脾

證治大還 幼幼近編 卷之四 三 貞白堂

人參 白朮 蓮肉 甘草炙 茯苓 全蝎

白附子 天麻 菖蒲 木香 陳米炒 入薑

棗同煎

加味朮附湯 治慢驚吐瀉身冷

人參 白朮炒 茯苓 甘草炙 肉果煨 附子炮

每三錢薑棗同煎

加味回陽散 治慢驚面青四肢逆冷泄瀉不止

人參 白朮 山藥 茯苓 甘草 附子

赤石脂煨 僵蚕 全蝎 薑湯下二錢

星附散 治慢驚

人參 全蝎 僵蚕 斷蛇 胆星

白附子 蟬脫 白茯苓 琥珀 硃砂 各一分

麝香 冰片 各半厘 牛黃 分 蝦蟆胆汁調藥抹口

中用蚌汁灌之。

回生錠 治慢驚神效

人參 白朮 山藥 茯苓 各一兩 赤石脂 煨 桔梗

胆星 各五錢 甘草 辰砂 礞石 煨 各三錢 乳香 二錢 牛黃

麝香 各一錢 棕櫚為錠陰乾薄荷湯下

證治大還

幼幼近編 卷之四

重

貞白堂 二五七

慢脾風 用羊屎二十炮丁香百粒胡椒五十粒每

五分陳壁土煎湯下

治急驚

白石膏 兩 辰砂 一兩 共為末量兒大小蜜水調下

一小兒急驚雙眸突出舌吐三寸角弓反張兒科望

而奔走予曰此風火相扇風痰上壅而然用稀涎

散齊汁調服吐痰涎數碗目舌俱收後三日復如

前症以腸胃膠痰尚在下也以神效九薑湯化下

去膠痰二三升愈

疳症

疳病因小兒飲食不節肥甘無度或幼小缺乳粥飯

太早致傷脾胃脾病則失運化而成積積久生濕

濕生熱熱內蒸津液耗消故內發虛熱外消肌

肉成疳病也疳者乾也因脾胃津液乾涸而然也

心疳身熱臉赤口舌生瘡愛臥冷地肝疳搖頭揉

目白膜遮睛髮穗瀉青脾疳身黃肚大好食土坭

泄下酸臭肺疳咳嗽喘逆皮毛焦枯口腥鼻齋腎

疳脚弱項小齒瘡口臭腦熱面熱述其症雖有五

證治大還

幼幼近編 卷之四

重

貞白堂 二五八

者之殊究其由實因于脾積所致蓋五藏皆受氣

于脾胃脾病則四藏失其所養故也治宜去脾積

為主兼殺虫清熱而佐以各經見症之藥若久而

脾胃虛弱又宜一補一消如啓脾丸蘆薈丸開服

是也錢氏云疳病當辨冷熱肥瘦初病為肥熱疳

黃連丸久病為冷瘦疳木香丸

與齋云小兒病俱是食積為多用藥宜急將草果去

殼滾水炮過炒焦研末白湯調下三分

疳積乃是食鬱為火用滑石一兩甘草二錢薄荷煎

厚滋草與木效調理用參苓白朮散有痰加半夏
南星厚滋加白附子

小兒病潮熱或病後潮熱俱屬食傷太陰脾土宜參
苓白朮散

五疳神效散 治疳積因食積發熱目生雲翳或頸
項結核或牙齦蝕落或耳鼻生瘡或頰腮腐爛或
肚腹作痛肌肉消瘦發熱作渴腹脹髮穗並皆治
之

白朮炒五錢 胡黃連 宣黃連 白蕪夷 蘆薈各錢

證治大還

幼幼近編
卷之四

章

貞白堂

山查 蛤粉 肉灰 穀精草 使君子

饅頭灰 粽子灰各三錢 銀柴胡 白雷丸

蝦蟆灰各錢 神麴三錢 米湯調下二錢

肥兒丸

白朮 蒼朮 厚朴姜製 甘草炙 黃連用苦參五錢

時焙乾 山查 龍甲醋炙 青蒿童便 牡蠣童便 煅一

禹餘糧如無以蛇含石 胡黃連五錢 蘆薈 夜明砂

史君子 鶴虱各三錢 蝦蟆二錢 煅用紅棗五兩去核

黃芪三兩當歸一兩熬入麴少許打糊為丸用

白雷丸小茴香各三錢同前甘草末為衣

又方

人參三錢 蕪夷一兩 史君子肉一兩 白芍一兩 橘紅八錢

黃連兩 甘草五錢 紅曲七錢 麥芽一錢 砂仁五錢 白茯苓一兩

山查肉七錢 滑石兩 蓮肉兩 扁豆兩 青黛兩 蜜丸

彈子大每服一丸空心白湯下

大蘆薈丸 治五疳

蘆薈 白蕪夷 青黛 枳榔 胡黃連

白雷丸 鶴虱 木香各一兩 蝦蟆二錢 麴五錢

證治大還

幼幼近編
卷之四

美 貞白堂

豬胆汁和蒸餅為丸每服一錢

啓脾丸

人參 白朮 山藥 茯苓 蓮肉 山查

麥芽 神麴 肉果 砂仁 陳皮 使君子

米糊為丸

保安丸 治食積癰塊五疳

香附 神麴 麥芽 白朮炒各 山查兩

史君子 檳榔 木香 蓬朮一兩 三棱炮

胡黃連各五錢 陳皮七錢 青皮一兩 甘草二錢 阿魏五錢 酒燉

化研爛 白膏丸 蜜丸彈子大每服一丸

石燕散 治肝疳疳眼

石燕乳一兩 蛤粉二兩紫口 穀精草五錢 石決明五錢

胡黃連三錢 爲細末每二錢人不見水豬肝內泔

水煮熟完 蕪飯食 一方有蘆薈杜木無石燕

蛤粉甚效

一方以生雞肝一具二三歲者只用半具去筋膜入

疳積散調勻加熟白酒隔湯頓熱空心服

又方以白芙蓉花陰乾三四錢聽用另以不油不蛀

證治入選

幼幼近編 卷之四

毛

真白堂

肉豆蔻一枚粉裏煨真胡連五分共爲末將赤雄

雞肝去筋膜入藥末同研細如元眼大白酒隔湯

煮熟空心食

神效散

滑石水飛一兩 蘆甘石五錢 石決明五錢 硃砂三錢

海螵蛸二錢 史君子五錢 爲細末入豬肝內煮食之

一方止用赤石脂爲末入豬肝內煮食

又方止用滑石一兩硃砂三錢並水飛入豬肝內米

泔水煮食之

疳積方

石決明五錢 硃砂五錢 麝香五錢 石膏一錢

加滑石赤石脂脾疳加五穀五疳疳

加杏仁粉肝疳加蘆薈青黛心肝加牛黃倍法

雀目加夜明砂谷精草雞肝搗爛和上藥箬葉

包好煮食飲汁效

又方

厚朴薑汁炒 廣陳皮八錢 粉草七錢 真蘆薈七錢 蕪飯五錢

青黛二錢 淨研百草霜五分 旋覆花五分 共爲末

證治大選

幼幼近編 卷之四

天

真白堂

小兒一歲用藥一分燈心湯空心調服服後病愈

再用肥兒丸調理如脾氣未實用啓脾丸或大健

脾丸如疳氣未盡用陳皮一兩白木香三錢白茯

苓五錢加平胃散三錢爲末陳米湯調下加瀉痢

見紅白積以此散加黃連薑汁土炒肉豆蔻二味

燈心湯少入熬蜜調服

小兒疳 以天南星煎湯飲效

經驗方 治小兒吃泥以膩粉砂糖爲丸麻子大空

心米飲下一二丸疳垂食土及生物皂礬煨豬

胆汁爲丸米飲下二三十九。

疳痢垂死新羊屎一升水一升浸一夜絞汁頓服日
午乃食。

消積金眼蝦蟆一箇去頭足膠肚蛆一升俱入新瓦
中以鐵線係定兩頭泥團慢火炙脆加瓦壘子煨
過谷精草等分吐瀉加木香橘皮爲末白湯調下

丹溪論吃泥胃氣熱也用石膏生地黃連白朮茯苓

周慎齋云小兒吃枯炭瓦片泥土等積宜訶子白朮

各一兩使君子肉炒甘草各二錢麥芽炒半斤隨

證治大還

幼幼近編

卷之四

真白堂

其素所好食之物半斤共爲細末入白糖調食

治蛔結九方。

胡黃連

錢八

白芍

錢一兩

枳榔

錢八

肉豆蔻

錢五

史君子

爲細末白糖調服

腹脹

小兒腹脹有虛有實小便不利悶亂喘急者此邪氣

之實也宜分氣飲壅氣丸小便自利不喘面目四

肢浮腫者此正氣之虛也或瘡痢經久或飲食傷

脾虛氣妄行並宜補脾飲或理中湯加草果砂仁

藟子

治一小兒忽遍身浮腫此俗名河白乃溢飲也用旋
覆花湯兩發汗而愈

分氣飲 治肚腹鼓脹喘急煩悶

桔梗 茯苓 陳皮 桑皮 大腹皮 枳殼

草果 藟子 蘇子 蒼朮 厚朴 木通

半夏 木香 小便不利加澤瀉傷食加麴蘖砂

仁

補脾飲 治脾虛肚腹膨脹四肢面目浮腫

證治大還

幼幼近編

卷之四

真白堂

人參 白朮 半夏 麴蘖 藟子 茯苓 砂仁

木香 陳皮 蒼朮 神曲 車前子 大腹皮

塌氣丸

藟子 木香 陳皮 茯苓 五靈脂 牽牛

神麴 打麴糊爲丸一歲十丸

尾骨痛

痛甚屬痰二陳加木香陳皮前胡黃柏知母至陰分

作痛屬陰虛濕熱六味丸加當歸牛膝防已黃柏

知母肉桂紅花

小兒初生諸要

小兒初生口噤不開用蟬蛻全蜴俱去頭足爲細末入輕粉少許乳調服再用南星研末入冰腦薑汁調勻擦牙齦上卽開。

小兒臍風振口此緣瘀血糞未盡非臍中風也用全蜴二十一枚去頭尾炙入射香少許金銀煎湯調服仍視口內上唇有一條如柏葉肉去其肉卽愈小兒生瘡臍因浴水入臍或溺濕衣衫所致用紅綿黃牛糞各燒灰乾胭脂等分濕則乾搽乾則香油

證治大還

幼幼近編
卷之四

聖

貞白堂

調搽或燕巢坭敷效。

小兒初生不尿因母食煎炒辛辣之物熱毒流入胎中以致肚腹脹滿或臍四旁起青黑色及撮口不可救急用葱白切二錢乳半盞煎分四服尿卽通乳卽食。

小兒初生腹脹大小便不通欲絕急令其母吮口口吸咂胸前背心手足心臍下七處務令咂得紅赤須臾自通。

小便閉小腸心之府也水竇流行隨氣而行心氣若

壅小便不通心氣若寒小便不禁心氣若熱小便

難澀心氣和熱小便赤而不通此結熱盛也凡小便閉皆當通利心氣爲主急取蚯蚓數條去泥搗加蜜少許敷前陰上仍將數條燒存性入硃砂麝香片腦爲細末麥冬燈心湯調服卽時效。

小便閉澀心腎不交陰陽不濟也熱卽不通冷卽不禁熱甚小便絕無此由腎與膀胱俱虛也宜赤茯苓車前子燈心麥門冬一小兒小便不通用琉璃炒成珠煎湯服之愈。

證治大還

幼幼近編
卷之四

聖

貞白堂

大便閉有邪熱入裡胃中有燥糞者有三焦暑熱津液乾枯而大腸有熱者有宿食雷滯腹脹痛悶胸痞欲吐者有熱氣煩灼內受風熱溷燥秘塞者須分治之用葱白三莖水煎入阿膠生蜜溶化服之小兒初生日開熊膽少許煎洗七八次卽愈。

小兒鵝口重舌口瘡用青黛朴硝各一錢片腦二分半蜜調敷仍視舌上有膜如榴子則哭聲不絕隨以指摘破卽愈。

小兒吐乳蘇葉甘草滑石各一錢水煎服。

小兒久瀉。用肉豆蔻平開。入麝香一分。再合麪包煨為末。米湯下。糖泄用柿餅燒熟。吃立止。身熱作瀉。四君子加白芷。黃芪。松花。五味子。

小兒吐瀉。用乾薑甘草各二錢。煮白朮一兩為末。溫湯調服。吐瀉不止。或以白朮一錢。肉果丁香各五分。薑湯調下。名三聖散。兼治大人吐瀉。或以白芷乾薑為末。蜜丸。置臍中。以絹縛定。用熱鞋底時時熨之。

小兒驚風發搐。用天芎。用天麻。荆芥。防風。薄荷。全蝎。麝。證治大還。幼幼近編。卷之四。聖。貞白堂。

蚕各八分。膽星。甘草各五分。薑汁糊丸。彈子大水磨下一丸。

小兒不時驚發。此肺虛不能平肝。宜溫肺為主。用人參。五味子。肉桂。若不用桂。用細辛一分亦可。

小兒疳積有痰。用南星一兩。半夏五錢。水泡七次。切片。用薑一兩。搗汁浸。以不麻為度。甘草白附子各五錢。水滴為丸。紫蘇湯下五分。

一小兒吃粽成腹痛。用黃連白朮藥為末服之愈。黑龍丸。治小兒腹痛。甘草乾薑各二錢。伏龍肝一兩。

人參。茯苓。白朮。霜白朮各五錢為末。粥九。梧子大。每服五丸。陳皮湯下。

小兒飲食不節。致傷脾胃。肚飽泄瀉。面黃。癖積。宜消導餅子。山查肉五兩。砂仁。陳皮。白朮各一兩。藿香。蒼朮各五錢。厚朴。莢。朮。神曲。人參。木香各三錢。蒸餅。多加糖霜為餅服。脾寒炒黑乾薑。胃熱加山藥各三錢。

小兒疳黃泄瀉。滑石一兩。薄荷三分。甘草二錢。硃砂雄黃各六分。酒下一錢。

證治大還。幼幼近編。卷之四。聖。貞白堂。

小兒疳病泄瀉。身熱。肚大。面黃。宜消積。益氣為主。勿用極寒極熱之藥。宜車前子。白朮。茯苓。甘草。人參。滑石各八分。黃連。麥芽。薄荷各三分。潮熱加柴胡。黃連。吐瀉加神曲。厚朴。半夏。便赤加梔子。嗽加杏仁。天花粉。乾葛。腹脹加大腹皮。枳殼。

五疳五積。肚大青筋。久瀉不止。手足微細。腸鳴。用胡黃連。宣胡連。蘆薈。蘇莢。木香。青黛各五錢。使君子。肉桂。榔各七錢。蟬退四錢。乾蝦蟆酥炙三枚。粟米二兩為末。打糊為丸服。

小兒初病潮熱或病後潮熱俱屬食傷太陰脾經宜參苓白朮散有瘧潮熱八珍湯加貝母

幼科必備諸要方

凡小兒患喉蛾急以銀針挑破髮頂上出血即愈

虫積腹痛用史君子每歲一個飯鍋上蒸熟食之俟

大便虫出盡而止

小兒重舌用三稜針于舌下紫脉刺出惡血即愈又

用竹瀝調蒲黃末敷舌上效

小兒臍風撮口用金頭赤脚蜈蚣一條瞿麥五分全

證治大遺

幼幼近編卷之四

聖

貞白堂

蝎稍四箇蠶蚕七箇爲末鴉管吹入鼻中如噴嚏

叶聲可治後用薄荷汁調與服之

小兒遺尿用破故紙炒爲末每夜熱湯調服五分

疳積害眼者用蘆薈三分胡黃連三分史君子肉二

箇谷精草三分爲末用雞肝一具搗取汁加酒酒

一小盞調和空心服又方用史君子肉谷精草

一錢水煎子去殼五分爲末用豬肝一片竹刀切

開摻藥肝內并箸包煮熟連汁與肝食之

沙疳人中白煨過黃柏茶脫紙燒爲末胆礬紅棗包

煨過等分爲末吹法同前

衄血不止麥門冬去心五錢生地五錢水煎服立止

又方用車前葉搗汁飲之甚效

失便下血用荆芥槐花各二兩炒黑爲末每二錢清

茶調下

絞腸沙痛馬蘭根葉細嚼咽汁立安

昇藥五靈散治小兒渾身破爛瘡凡父母生過廣倉

育兒鮮有免者自頂至踵兩目外幾無完膚

胆礬治筋而滋肝其辰砂養血而益心其

證治大遺

幼幼近編卷之四

聖

貞白堂

雄黃

長肉而補脾其

明礬

理脂膏而助肺其

磁石

榮骨液而壯腎其

此方見焦氏筆乘惜其不用水銀製而用之功效

遲緩因加水銀一兩與前五味等分共入陽城礬

內打火三香取出加敷藥內用之效如神

神效敷藥方

夜合花

陰乾象皮同黃沙炒候軟切降香研乳香

沒藥

各去血竭孩兒茶濕紙花蓋石五倍子

色帶紅良半生

白占八珍珠五冰片錢各極細

末方入白占研勻。最後入冰片如欲去腐每兩加五靈散二錢。從生肌每兩加前散三分或五分。如治痘後膿水淋漓下疳等瘡只加一二分治湯火傷每兩加絲綿灰二錢。剔牙松皮煨存性五六錢。韶粉煨黃五六錢。或乾摻或香油調一切外症俱效。

證治大還序

古聖人為天下之病而立政
為人心之病而立師為人身
之病而立醫三者之切於民
一也故有周之制醫師列於

卷一百一十五

天官歲終稽其全失而制食
焉十失四而下屏毋得業醫
其慎如此近世醫院醫學雖
設而考課之法則甚疎庸人
妄自師承聞見寡淺素問靈

樞諸經有不知其章句者而人顧以性命托之不亦殆哉夫臟腑之隱微不可以意測也然其症必外見於表中見於脉明其同異習其正變然後可以十全而無失其道非博無由也雲間陳山農風負雋才數奇不偶家饒藏書博學高蹈詩文翰墨傳寶當世性樂閒散恒於局外施利濟

之方醫術其一端也而所至輒收奇效比者輯其數世之傳為證治大還一書詳哉其言之矣名之曰大還蓋取仙家丹砂之義而欲人返求其本也夫人之身皆無病之身也嗜欲賊之於內陰陽乘之於外而病種々生焉觀是書者詳其症以施所治窮所病以絕其原然後可以還其無

病之身蓋無病之身天地父母所生之身也人能常持不敢毀傷之思則身病心病皆可脫然而天下之病亦庶幾其可瘳余謬司一方之政凋疲滿目尚未知所以起之方而嘉陳君之念切斯民若是也故為序而捐俸以助梓之



張序四

肯

康熙歲次丁丑仲冬月中浣

三韓張建績題于粵東之

禺山官舍



張序五

證治大還序

醫之為言意也道大而難明理微而難晰固不易言也古之人運于九天之上徵于九淵之下明若鑑形應如桴鼓今豈易言哉如天之陰陽寒暑地之東西

戴序一

南北人之男女老少時之春夏秋冬五行生尅六脉淺深以及土穀艸木金石昆蟲辨其性味因其重輕千頭萬緒路雜途岐非仁不能大其術非義不能斷其心非禮不能靜其志非智不

能審其要非信不能遠其從自周易乾坤定位先後分天禹貢山河九州異域詩誌鳥獸艸木春秋立法誅心然後約之以禮而得其喜怒哀樂旁及諸子百家搜神怪異山海諸書博為融

戴序二

會貫通無間於疾病藥餌之內遠而醫國近而醫心始庶幾乎其得矣若夫脫塵去垢不藥而醫不思而得是又大而化之，神非出數拔萃不敢窺其戶牖也噫今日之醫豈易言哉上古

糾糾罄罹秦燄雖醫卜種樹之
書幸而猶存大率秘而不傳
而不秘素問難經理後詞奧歷
代名流各以聖賢自處繁言疊
出至理不無奈何偏正駁雜王
霸不同博之不能該約之近于

戴序三

遺苟非明目慧心自為向背如
王叔和妄為訛謬脉訣貽殃良
可悼也故曰醫非理學大儒罕
有不成屠創近之如盲如瞽不
知書是何篇理是何物偶得一
方俸中一疾公然城市懸壺以

醫自命似循矛盾枘鑿方圓愚
昧無知任其生殺舉世茫然死
猶不悔予每為惻惕而力有未
遑隱懷如繫扼腕有年丙子冬
謬膺

特簡巡視粵鹺遼雲間陳子三農

戴序四

家學淵源究心有素纂輯秘要
彙成一書題曰證治大還乞序
于予予不禁加額踴躍欣遂願
懷益聞大還乃長生服食九轉
丹名書以是名豈云無謂于是
退食之暇細為披閱擷華撰翠

目列省分出以特達之見晰以
精粹之言後之學者幸而相值
洞如觀火茫々孽海不隨大衆
浮沈誠壽

國壽世之功深得造化之心暢發
古今之奧淹貫百家之聖學也

戴序五

可謂青囊仍在秦越猶存俾天
下萬世同登壽域胥慶春臺莫
非陳子之仁心仁術也美玉已
彰義難韞櫝亟宜授諸梨棗以
懋廼功若于紙價沸騰非予所
計也噫予于今日始知今人不

敢多讓古人矣醫之道大而難
明理微而難晰陳子豈難言哉
予果不得不為之序也

肯

康熙丁丑四月既望巡視兩廣

鹽課監察御史長白戴納拜

戴序六

題



濟陰近編小敘

目五

坤道維陰陰嘗不足而易病者何也蓋女子之經同月之盈缺女子之姪係體之安危已捐精耗血而致虧元氣矣且深居閨閣之中五性蘊結性多偏執或起居失宜或陰陽乖戾榮血即由此而愆期鮮有不體憊神疲而致病也特拈胎前產後經期通塞與夫師尼寡婦室女而另列女科一門以別其異於男子之治法其餘諸證仍同男子毋穿鑿也憶余曾大父碧年肆志場屋壯歲涉獵諸子百家讀諸證書淺有難治大還

濟陰近編

貞白堂

悟於濟陰之道救困扶衰遐邇咸服其有神異當其顛危頃刻命若懸絲之際神功片七立起沉疴及其晚年尚志林壑活人無算每曰醫以寄死生治病而中其肯綮難矣而於女子為尤難能明其內外兩因之道而不熟悉胎產經期之證雖胸羅難素博覽羣書夫復何益於是將平生所著盡削繁蕪聊存一二俾後之從事者以見濟陰之道不謬云爾

濟陰近編卷之一

華亭陳治三農甫纂述

男

扶瓊先恩

長白石文燦右容甫叅訂

門人

范松壽民姚廷讓子遜校

女科

按女科惟胎產經前師尼寡婦與大方脈為異耳其餘證治相同者茲不復贅

婦女脈

凡婦女右手脈大尺脈盛是為常脈

經脈

婦人尺脈數為陽乘陰經血乍多而在月前尺脈微為陰乘陽經血乍少而在月後尺脈洪而數

證治大還

濟陰近編

貞白堂

為血熱經水先期色紫黑者為熱甚尺脈微而緩為血少經水過期過期而色淡者肥人為溼痰瘦人為血少水溼色紫者血虛而熱尺脈弦數滑大者為血實氣滯經前少腹痛色紫黑尺脈虛瀉而緊者氣血俱虛經後腹痛或腰膝痛尺脈沉瀉或沉弦者血因氣滯或鬱怒傷肝經水淋漓不斷或腹中綿綿作痛或腰脇引痛尺脈沉細為勞傷氣血衝任虛衰過期不至脈細瀉或經血未止而妬陰陽餘血留子宮淋瀝不斷尺

證治大還

濟陰近編
卷之一

貞白堂

脉微小爲任虛損又爲風寒所乘經水不調赤白帶下尺脉絕不至主經不利氣攻胸膈小腹引腰痛 尺脉滑血氣實經絡不利月事不通 右尺按之空虛是氣血俱脫大寒証主經不調 右尺沉細而數疾或沉弦而洪大有力此皆脾胃虧損溼熱下陷與相火合主經漏不止其色紫黑 脉細軟而駛也 尺脉沉弱而近駛細軟爲溼駛數爲熱尺沉爲鬱滯主經不調臨經腹痛如刺 寸脉弦關脉沉爲肝病主經不利兼腹痛孔竅生瘡 又云少陰之脉滑又數者陰中生瘡 右關沉而急左尺微而瀉或浮或滑而斷絕不勻皆經閉不調之候也 婦人得章脉爲半產漏下 腎脉微瀉爲不月又脉遲爲不月 師曰寸口脉微而瀉微則衛氣不足瀉爲血氣無餘衛不足其息短其形燥血不足其形逆榮衛俱虛言語謬誤跌陽脉微而瀉瀉則胃氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃氣瀉則失液少陰脉微而遲微則無精遲則陰中寒瀉則血不來此爲居經三月一來 問曰婦人妊

證治大還

濟陰近編
卷之一

貞白堂

經三月師脉之言此婦人非軀令月經當下其脉何類何以別之師曰寸口脉微浮而大榮反而弱浮大則氣強反弱則血少孤陽獨呼陰不能吸二氣不停衛降榮竭陰爲積寒陽爲聚熱陽盛不潤經絡不足陰虛陽實故令少血時發洒淅咽燥汗出或溲稠數多吐涎沫此令重虛津液漏泄故知非軀畜煩滿血月稟一經三月而來陰盛則瀉名曰居經謂右脉浮大左脉反弱也師曰脉微血氣俱虛年少者亡血也乳子下痢爲可否者此爲居經三月一來 問曰婦人病經水斷一二月而反經來令脉反微瀉何也師曰此月前若當下利故令妨經利止月經當自下此非軀也 懷孕七月而不可知時時衄血而轉筋者此爲軀也衄時嚏而動者非軀也 師曰脈微弱而瀉年少得此爲無子中年得此爲絕產 少腹冷惡寒久年少得此爲無子中年得此爲絕產 師曰肥人脉細胞有寒故令少子其色黃者胸上有寒

女人德性診

太素脉云女人左右寸口脉常弱而清淨主德性涵
凝緊而短數主性急躁

女人思淫診

太素云婦人脾脉太弱腎脉太旺無土制水生平淫
泆心脉散亂浮沉不定主淫思尺脉浮沉遲速不
定主思想有約室女三部脉洪緊而大乃血脉旺
行也若微細不應指或尺脉浮洪盛而不勻皆意
在思男也又脉語云肝脉獨長主多淫

經水

謹治大還

濟陰近編
卷之一

四

貞白堂

尺脉血氣實尺弱小血枯經閉左寸沈結爲結浮弱
爲血虛寸關如故尺脉斷絕或沈主月經不利左
尺微遲經水三月一來三部俱微氣血俱虛年少
者爲亡血痿弱者血枯絕產左尺緩經水過多不
止沈數經水不及期沈緊寒邪客于血室血閉腹
痛寸弱關浮尺細月經不調收經必早

丹溪云經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火化
也血爲氣配隨氣而行依陽而運氣熱則熱氣寒
則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣

清則清氣濁則濁成塊者血之凝也將行作痛者
氣之滯也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也

黑者熱之極也經少色淡者血虛也行後作痛力
倦食少者氣血俱虛也肥人飲食如常而經水不
調者濕痰粘於血海也雲岐子云膿腐作臭者胃
中濕熱流于胞中也泥色黃水者脾胃濕熱陷於
冲任也成塊成片者熱極氣滯而血瘀也紫塊堅
凝痛甚難行者風寒搏於血海也今人不加詳察
但見紫黑作痛者悉指爲風冷俱用溫熱之劑禍
不旋踵豈知寒則凝既行而紫黑其非寒也明矣

謹治大還

濟陰近編
卷之一

五

貞白堂

經水過期不及期

王子亨云陽太過則先期而至陰不及則過期而來
其間乍多乍少斷絕不行皆由陰陽衰盛之所致
也薛立齋云經水過與不及皆虛也當理心脾爲
主蓋心統諸經之血脾爲生化之源心脾和平則
經候如常脾胃虛損心火妄動斯月經不調矣然
過期之中有心脾經血虛者有肝經血少者有氣
血俱虛者有痰氣閉塞者有久鬱傷脾者有寒凝

血室者治法。心脾經血虛者。四物加參朮或人參

養榮湯。參朮歸陳草桂芍肝經血少者。六味九

熱地山萸山四物湯送下過期色淡氣血兩虛者。

八珍湯。參朮苓艸熟地歸芍加炮薑紅花久鬱傷脾者。歸

脾湯。參朮香元眼薑棗仁遠歸寒凝血室者。桂香散痰

氣閉塞者。導痰湯。赤茯苓加芍歸香附。過期作

痛。虛中有熱者。四物加條芩丹皮香附生地

不及期之中。有血分有熱者。有肝經血燥者。有脾經

鬱火者。有肝經怒火者。有勞役火動者。血分有熱

證治大還濟陰近編六貞白堂

四物加生地丹皮芩連柴胡荆芥。肝經血燥。加味

逍遙散。本加生地。脾經鬱火。歸脾湯加香附山梔

撫芎。肝經怒火。養血平肝散。歸芍生地柴木香附草勞役動

火。補中益氣湯。參朮芪朮歸肥人不及日數而多

痰者。多血虛有熱。四物合導痰湯。芍歸芍熟地半

加黃連白朮香附。紫黑成塊者。四物加生地。芩

連連翹香附五靈脂薑黃木香。將行作痛者。四物

加檳榔木香肉桂莪朮黃玄胡索。膿腐作臭者。

加味平胃散。本泥色黃水者。連翹白朮湯。本七情

鬱結。血隨氣滯者。桂枝桃仁湯。本血結成塊作痛

者。行經紅花湯。歸尾紅花赤芍紫威牛膝蘇本經

水通來適斷寒熱往來者。四物合小柴胡湯。柴芩

經水已過腹中綿綿走痛者。血行而滯氣未盡

也。四物加木香香附青皮。經水已過力倦食少而

作痛者。氣血虛而有火也。八珍湯加黃連經水已

過腹中綿綿痛無休息者。血虛有寒也。四物加參

朮炮薑肉桂。經行後身熱脈數頭昏者。血虛不能

制火也。四物加黃芩丹皮玄參荆芥生地。經水不

證治大還濟陰近編七貞白堂

調。脈微食少體倦發熱者。脾胃虛也。補中益氣湯

歸朮升。參朮芪草經少色淡者。氣虛也。保元湯。參朮歸

後肢節屈伸作痛者。血虛有火而筋失所養也。四

物加木瓜牛膝薏苡仁。

東垣云。女人經水未至。從少陰。已至。從厥陰。已絕。從

太陰。未至。從少陰者。以腎主壬癸水也。已至。從厥

陰者。以已至。不調則宜理肝。以肝為血海也。已絕

從太陰者。以已絕。又來。則宜補脾。以脾統血也。

褚登云。女人天癸既至。踰十年無男子。合則不調。未

踰十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血
誤行或漬而入骨或變而爲腫逆於頭面肢體之
間則重痛不寧內滲竅穴則淋瀝不已後雖合而
難子

滑伯仁治一婦經水將來臍下絞痛如刀刺寒熱交
作下如豆汁既而下水兩尺沉澁欲絕餘皆弦急
此寒邪搏於衝任血將行而邪與之爭故作絞痛
寒氣生濁故下如豆汁遂以辛散苦溫之劑令先
經期五六日服之凡三次經調而孕

證治大還

濟陰近編
卷之一

八

貞白堂
五十六

薛立齋治一婦經行臍腹痛甚用桂枝桃仁湯而愈
又治一婦經行勞役忽昏暗面赤吐痰此乃去血過
多陽無所附故耳令飲童便碗許神思漸爽更用
參芪歸芎各三錢玄參麥門冬五味子白芍柴胡
山梔甘草各一錢調治漸愈

汪石山治一婦經水紫色或前或後臨行腹痛惡寒
喜熱脈細濡近滑兩尺重按畧洪而滑此血熱也
遂以黃連四兩酒煮香附當歸各二兩五靈脂一
兩粥丸服之愈

逍遙散

當歸 芍藥 白朮 茯苓 柴胡 薄荷

甘草 加丹皮山梔名加味逍遙散

桂枝桃仁湯

成雲

治七情鬱結血隨氣滯經行腹痛

桂枝 桃仁 生地 芍藥 甘草 生薑

加味平胃散 治脾胃濕熱流於胞中經水臃腐作

臭

蒼朮 厚朴 陳皮 赤芍 生地 條芩

連翹 地骨皮 茯苓 滑石 甘草

證治大還

濟陰近編
卷之一

九

貞白堂
五十七

連翹白朮湯 治脾虛濕熱經水如泥色黃水

連翹 白朮 茯苓 甘草 芍藥 生地

升麻 地骨皮 黃連 山藥

桂香散 治寒凝血室經行成塊絞痛或手足厥冷

唇面青黑尺脈微遲

桂枝 蘇葉 荆芥 烏藥 玄胡索 香附

當歸 五靈脂 川芎 桃仁 莪朮 木香

陳三農云月經者一月一經象月盈則虧也經行之
緊最宜緊慎不則與產後症相類禁用苦寒辛散

之藥。若被驚恐勞役。則血氣錯亂。經脈不行。多致勞瘵等疾。若逆於頭目肢體。則重痛不寧。若怒氣傷肝。則頭暈脇痛。嘔血瘰癧。癰瘡。若經血內滲。則衄穴淋瀝無已矣。

周慎齋云。經前作痛。此血氣凝滯。為有餘。四物加香附。玄胡索。紅花。經後作痛。此氣血虛弱。為不足。四物加人參。薑桂甘草。經行後七八日。或十數日不止。宜大補氣血。用十全大補湯。參朮苓艸歸芍熟地桂經行腹痛。愈痛而經愈多。甚至痛死者。係火之搏擊也。

經治大綱

濟陰近編

貞白堂

宜行血斂血。令其脾之能統不兼之。以破血。則火不散。血亦無由而止。用黃芩芍藥以斂血。芍歸苓朮以行氣。理脾益母。草破氣中之血。玄胡索破血中之氣。香附開其鬱。熱虛加人參。理脾則血可統。火散則血可止。將行作痛。屬血鬱滯。四物加紅花。桃仁。薑黃。莢朮。肉桂。玄胡索。

陳三農治一婦。經行後作痛。用八珍湯。

參朮苓艸歸芍熟地

加杜仲一錢。玄胡索。香附各五分。煎服愈。

又治一婦。經行作脹。作痛。行後又痛。又脹。如是二三

年餘矣。大便燥。小便微痛。微餒。肝脈弦滑。餘皆沈細而緩。按乃脾土不足。滑乃脾有濕痰。乃脾虛濕不流也。用參朮白朮散。參朮茯苓薏仁扁豆山藥蓮肉砂桔加松花木香。以行其滯而漸愈。

一婦經後。凝血成塊。在左泄瀉不止。完穀不化。血塊暴下如注。臭穢難堪。經候不調。脾胃因而下損。且經漏不止。前陰之氣血已脫。泄瀉不止。後陰之氣血下陷。總是熱症而下焦久脫。亦化于寒矣。瀉寒以熱。瀉濕以燥。宜大升大舉。以助肝木。主發升長。

經治大綱

濟陰近編

二

貞白堂

遂以柴胡升麻各五分。炙甘草陳皮歸身黃芩各一錢。人參神龍各錢半。白朮三錢。黃芩少許。每二錢水煎服而愈。

一婦經水不調。未來先痛。行後又痛。用人參炙草川芎肉桂丹皮酒洗各五錢。白朮茯苓各二兩半。當歸酒洗白芍酒炒益母草酒洗蜜拌各一兩。白芷木香各三錢。糊丸。

一婦經前作痛。且有白帶。用十全大補湯。八珍加杜仲玄胡索益母草木香而安。

流氣逐瘀湯 治將行腰腹作痛氣滯血凝紫黑成

塊者

歸尾 川芎 赤芍 莢朮 薑黃 桃仁

肉桂 五靈脂 烏藥 香附 玄胡索

女寶丹 治經行作痛及經閉不通及痛經難產及

經脉不通遍身作痛中風癱瘓

何首烏二兩 去皮 川烏各四兩 濕紙包 煨去黑

為蒼朮泔水浸仍酒 當歸 酒 兩頭尖 各二 桔梗

粉草 防風 白芷 川芎 人參 天麻

證治大還 齊陰近編 卷之一 主 貞白堂

茴香 荊芥 白朮 麻黃各四兩 木香 血竭

細辛各一兩 煉蜜丸如彈子大 經水不通桃仁

蘇木當歸煎湯下 難產紅花湯下 中風癱瘓

麻黃湯下 遍身氣痛木香湯下 經水逆行魚

膠切炒新綿灰米湯下二錢

治婦人血海痛

當歸 甘草 木香 烏藥 香附

治婦人氣血痛

青木香 檳榔 黑丑 小茴 香附 當歸

玄胡索各四錢 益母草 苟子炒 醋丸每服五十九

痛經效方

玄胡索 川芎 沒藥 木香 白芍 當歸酒洗

桃仁去皮 生地黃製 香附醋浸 或加入參五分

薑水煎服

經水過期色淡

當歸二錢 白朮 陳皮各一錢 薑黃 肉桂五 煎服

先期色紫

當歸二錢 熟地 白朮 麥門冬各一錢 黃芩五分

證治大還 齊陰近編 卷之一 主 貞白堂

經前作痛

黃芩 芍藥各二錢 梔子 肉桂各八分

經後作痛

當歸二錢 白朮 小茴 肉桂 乾薑各八分

經行四肢麻木

當歸 芍藥 陳皮 薄荷 羌活各一錢

經行腦痛頭眩

當歸 芍藥 半夏 茯苓各錢 細辛八分

經行口吐清水

當歸 白朮 乾薑 肉桂 砂仁 各錢半 滑石 二錢	經行小便淋閉	當歸 木通 車前子 白朮 肉桂 各錢半	經行泄瀉	赤芍 白芍 藿香 各錢半 當歸 肉桂 各八分	經行感冒	川芎 當歸 薄荷 紫蘇 桂枝 各錢半	經水過期紫色作痛	當歸 川芎 白芍 各八分 熟地 六分 玄胡 三分 黃芩 一分	經治大經 卷之一 治陰近編 古 貞白堂	黃連 四分 木香 三分 香附 八分 烏藥 六分	婦人血熱經行先期	枇杷葉 蜜炙 一斤 白芍 酒浸 半斤 懷生地 六兩 熟地 四兩 青蒿子 五兩 童便 五兩 五味子 四兩 蜜蒸 甘草 一兩 山萸肉 四兩 黃柏 蜜拌 炒 四兩 川續斷 酒洗 炒 四兩 阿膠 五兩 蛤粉 炒	杜仲 三兩 為末 山藥 木四兩 打糊 同煉蜜 為丸	如梧子大 每五錢 空心淡醋湯下 飢時更進一服	忌白蘿蔔	加減正元丹 治婦人經水涸無子
--------------------------	--------	---------------------	------	------------------------	------	--------------------	----------	--------------------------------	---------------------	-------------------------	----------	---	---------------------------	------------------------	------	----------------

香附 一斤 同又二兩 醋浸二宿 分作四分 一分用鹽水炒 一分酥炙 一分童便炒 一分和乳瓦	上歸身 酒洗 五兩 川芎 二兩 白芍 八兩 酒浸 半生半炒 生地 六兩 酒洗 阿膠 四兩 蛤粉 枳殼 生半炒 艾醋 打糊 餅晒乾	為末 米醋煮山藥粉糊丸 如梧子大 每四錢 淡醋湯下	治婦人血熱經行先期 腰腹痛發熱	正元丹中 去香附 當歸 換入 枇杷葉 十兩 蜜炙 杜仲 皮 三兩 鹿角膠 蛤粉 炒 麥門冬 去心 四兩 青蒿子 山萸肉 北五味 各三兩 銀柴胡 一兩	經治大經 卷之一 治陰近編 古 貞白堂	治血虛經行後期	白芍 六兩 半 生半炒 香附 四兩 童便 炒 斷艾葉 一兩 懷生地 六兩 麥冬 六兩 杜仲 三兩 蜜炙 橘紅 二兩 枇杷葉 六兩 甘草 一兩 五兩 炒 阿膠 四兩 蛤粉 川芎 二兩 青蒿子 四兩 童便 當歸 六兩 同醋煮山藥糊丸 梧子大 每服五錢 白湯下	治血虛經行後期 太甚半邊頭疼	歸身 白芍 各二錢 川芎 一錢 甘草 三錢 藥本 一錢 生地 二錢 荆芥穗 八分 天門冬 二錢 麥門冬 二錢 炙甘草 一錢	河水煎服 臨服加童便一小盞
--	--	---------------------------	-----------------	--	---------------------	---------	---	----------------	---	---------------

經行後期太甚

香附一斤懷生地五兩芍藥八兩枳殼二兩砂仁二兩

阿膠四兩新艾二兩為末醋煮山藥為丸梧子大空

心每服淡醋湯下 一方加熟地二兩川芎二兩

去砂仁俱效

經行不止 七七致發而經行不止治同此

丹溪云經水過多不止有虛有熱蓋熱則流通虛則

下溢也有陰虛不能鎮守胞絡之火故血走失而

越常度也有因氣虛血熱經行過多不止者八珍

證治大還

濟陰近編

六

貞白堂

湯參朮苓草加炒黑荆芥乾薑續斷阿膠生地

丹皮條芩柴胡因脾肺氣虛不能約制經水者補

中益氣湯參朮苓草加川芎芍藥五味子因血分

有熱者四物湯熟地加丹皮黃連生地因脾經

鬱火者歸脾湯參朮苓草加山梔香附撫

芎丹皮因怒氣傷肝肝火妄動者養血平肝散歸

芍生地熟地木氣凌脾脾虛不能統血者抑肝補脾

湯參朮苓草肝腎虛熱者當歸散門肝血虛熱

者四物加梔子柴胡生地玄參丹皮荆芥熱傷元

氣者補中益氣湯參朮苓草加五味子麥門冬炒

柏經行交合以動相火者六味丸熟地山萸山加

炒柏

薛立齋治一婦每怒則太陽耳項喉齒作痛每痛則

胸滿吐瀉食少經行不止此皆肝火之症肝有病

則外症見土受尅則內症見先以四物加柴胡山

梔脂草白朮清肝養血次用四君子參朮加柴胡

芍藥吳茱萸炒黃連培土制肝漸愈

又治一婦月經淋瀝無期作鬱怒傷肝脾虛火動而

證治大還

濟陰近編

七

貞白堂

血不歸經乃肝不能藏脾不能攝也當清肝火補

脾氣與歸脾湯逍遙散二藥四劑而愈

又治一婦因怒經事淋瀝半月方竭遇怒其經即至

甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰涎抽搦上視作肝火

熾盛以小柴胡加釣藤黃連熟地山梔而愈

常歸散本治血虛有火經水過多不止

當歸 川芎 芍藥炒 白朮炒 山茱萸一兩

黃芩 酒下

三黃丸 治氣虛血熱經水過多不止

生地 熟地 黃芪 人參 茯苓 當歸

黃芩 蒲黃 甘草 酒糊為丸

固經丸 治足三陰虧損經水過多不止

山茱萸 熟地 芍藥 丹皮 龜板 各一兩

樗皮 七錢 黃柏 三錢 香附 二錢 酒糊為丸 加鬼

絲子 補骨脂 五味子 更妙

衝任經虛風襲以致榮血暴下用荆芥防風五靈脂

水煎服

天癸當止不止條芩醋浸七日炙乾又浸七次醋糊

證治大選 卷之一 貞白堂

為丸酒下

柴胡湯 治經水不止其色鮮紅項筋急腦痛脊骨

強不安

炙草 歸身 乾葛 各三錢 獨活 桑本 升麻 各五錢

分柴胡 七分 羌活 一錢 蒼朮 一錢 紅花水煎服取

微汗

經水不通 室女月水不通統此參考

尺中之脉來而斷絕或脉絕者經閉也

集云經閉不通有虛有實有素稟陰血不足者有

因墮胎及多產傷其氣血者有久患潮熱久發盜

汗耗血者有因脾胃虛而不能生血者有因脾肺

損傷而血少者有因勞傷心經而血少者有因腎

水虛不能生肝血者凡此皆當滋其化源有因脾

鬱而血不行者有因惱怒而血少者有因衝任伏

熱耗消其血者有胃經積熱消血者有心氣不得

下通者有寒氣客于血室寒凝血結者有軀脂滿

經者凡此皆當審其病因素稟陰血不足者四物

加參朮紅花墮胎及多產者八珍湯 參朮芍藥

證治大選 卷之一 貞白堂

加阿膠久熱多汗者清金養血湯 地骨皮冬知母

橘芍芍生 脾肺傷損者人參養榮湯 參朮桂枝陳

地五味 勞心者茯苓補心湯 茯苓芍藥地 脾胃

虛者四君子 參朮 加芍歸山藥腎虛不能生肝者

六味丸 熟地山黃山 惱怒傷肝而血少者加味道

遙散 藥散歸芍藥 鬱結傷脾而血少者歸脾湯 參

朮茯苓仁遠歸 七情鬱結血隨氣滯者桂枝桃仁

湯 桂枝仁生 衝任伏熱耗血者四物 熟地 加芍

連丹皮柴胡胃經積熱消血者加味清胃散 歸芍

丹荆柴防升泰心氣不得下通而胞脉閉者四物

光獨連石膏歸生地黃連葛寒氣客于血室寒凝血結者

湯下安神丸

溫經湯本

姜加芍歸青皮香附經閉血凝作痛炒芍當歸桂

心蒲黃血竭延胡索酒下二錢

東垣云經閉不行有三若因脾胃久虛形體羸弱氣

血俱衰而經閉斷絕或病中消胃熱津液不生時

見燥渴血海枯竭名曰血枯經絕宜瀉胃中燥熱

補益氣血經自行矣此中焦胃熱結也宜調胃承

氣承氣湯

便秘結小便澀滯而經水閉絕此乃血海乾枯宜

調血脉除胞絡火邪經自行矣此下焦包絡熱結

也宜玉燭散之類或因勞心致心火上行月事不

來者包脉閉也夫胞脉屬心而絡於包中令氣上

通肺心氣不得下故月事不來宜安心補血降火

經自行矣此上焦心肺熱結也潔古以四物加芩

連合涼膈散服之或用黃連生地當歸枳殼木通

芎藭天門冬麥門冬硃砂

證治大還 卷之一 真白堂

陳貞白治一蔭王妃懷娠十五月而不產診視脉澀

而弦乍大乍小腹大如鼓堅勁如磬曰此於血而

鬼胎也當消之用桃頭煎湯下奪命丹腹痛甚復

以桃仁煎催之下黑血數盆中有如抽蠶白色者

二三十枚漸安更進歸脾湯五十餘劑方霍然矣

抱一翁治一婦不月腹脹如鼓四體骨立衆醫或爲

娠爲蠱翁診之六脉弦滑而數弦爲氣結滑爲血

聚乃氣搏血室實邪也衆曰服芍歸積歲月非血

藥乎翁曰失于順氣也夫氣道也血水也氣有一

息之不運則血有一息之不行治血必先順氣俾

經隊得通而後血可行乃以蘇合九投之三日而

腰作痛曰血欲行矣急以桃仁承氣湯下汚血累

累如瓜者而愈

三農治一女不月腹大如娠衆醫治皆不得其狀診

視色脉曰此病非有異夢即邪鬼所憑耳夫面色

乍白乍赤者鬼也或大或小者祟也病因與色脉

相同令詢之一夕果夢與男子交由是疾作遂以

桃仁煎下血類脉肝六七枚且有竅如魚病即愈

證治大還 卷之一 真白堂

薛立齋治一婦經水半年不行小腹忽痛陰戶內有

物硬如石寒痛不可禁此石瘕也用四物加附子

續柳三稜大黃桃仁澤瀉玄胡索血竭漸愈

又治一婦頭暈經少作中氣虛不能上升而頭暈不

能下化而經少用補中益氣湯而愈後因勞頓仆

經水如湧此勞傷火動用前湯加五味子愈

衛生湯古 補脾胃養血氣

當歸 芍藥 黃芪 人參 甘草

琥珀散治經脈壅脇肋腫脹臍腹刺痛及產後

證治大還齊陰近編 卷之一

惡露不決血上搶心昏迷

三稜 莪朮 赤芍 寄奴 丹皮 肉桂

熟地 玄胡索 蒲黃 烏藥 當歸

前五味各一兩烏豆一升薑半斤醋四升煮豆爛

焙乾爲末酒下三錢

行經紅花散 治經候不行臍腹疼痛小腹堅硬腰

膝重痛

歸尾 赤芍 紫威 牛膝 紅花 桃仁

玄胡索 香附 青皮 桂心 蘇木 寄奴

酒下三錢

溫經湯 治血海虛寒月水不利肚腹刺痛或風寒

客于血室其脉沈緊者

當歸 川芎 玄胡索 桂心 薑黃 莪朮

丹皮 牛膝 人參 甘草 去人參甘草加紅

花名薑黃散治瘀血凝滯肚腹脹滿疼痛

牛膝散 治月經不利臍腹作痛攻引腰脇

牛膝 赤芍 玄胡索 桂心 桃仁 丹皮

當歸 木香 溫酒調下

證治大還齊陰近編 卷之一

通經散 治經閉臍下脹滿血瘀作痛

當歸 芍藥 玄胡索 桂心 血竭 蒲黃

酒下三錢

通經丸本

川椒 蓬朮 乾漆 青皮 乾薑 大黃

桃仁 川烏 炮 當歸 桂心 紅花 洗劉寄奴

醋糊爲丸陰乾

萬病丸 治經閉成塊

乾漆 炒爛出 牛膝 酒焙各 生地汁熬膏爲丸每

服三十丸

加味四物湯 治氣鬱經閉

四物加莢朮香附 血積加桃仁牛膝肉桂蜜重

氣虛加參朮馬鞭子丹皮 胃火加大黃

雄黃丸 治鬼胎瘀血腹痛

雄黃 鬼臼 莽草 丹砂 巴豆 去油

癩肝 炙黃各五錢 蜥蜴一條 蜈蚣一條 蜜丸梧子大

酒下二丸

蒸臍法 治月經不通癰瘰血塊作痛

證治大還

濟陰近編 卷之一

五

貞白堂

沒藥 乳香 沈香 丁香 血竭 各三錢 青鹽

食鹽 五靈脂 兩頭尖 各六錢 麝香 一錢 共為細

末以麪作條透臍將藥入臍填滿上以槐白皮鑽

孔蓋之以艾炷灸皮上。

調經散 治經水或前或後或多或少或踰月不至

或一月再來或多不已或過期不來小腹疼痛皆可

治

當歸 一錢 酒洗 麥冬 二錢 吳茱萸 一錢 人參 半錢 半夏 一錢 五分

白芍 川芎 丹皮 肉桂 五錢 分 阿膠 甘草 各一錢

薑水煎空心服

月經過期腰腹作痛

川芎 五分 當歸 一錢 熟地 一錢 白芍 一錢 紅花 三錢 桃仁 廿粒

香附 一錢 肉桂 五錢 莢朮 一錢 甘草 五錢 木通 蘇木

水煎服

崩漏

洪數而疾為熱微弦遲細為虛沉弦而洪沉細而數

皆胃氣下陷尺寸虛者漏血尺急而弦大風邪入

少陰之經主女子漏下赤白虛小或遲滑者易愈

證治大還

濟陰近編 卷之一

五

貞白堂

緊大數實者難愈急疾或浮者不治

丹溪云崩漏屬虛屬熱經曰陰虛陽搏謂之崩然有

脾胃虧損其氣下陷與相火相合濕熱下迫而崩

者有腎水虛無不能鎮守包絡相火者有臟腑損

傷衝任氣虛不能約制其經者有悲哀太甚包絡

損傷者有怒動肝火經血沸騰者有肝經風熱者

有因飽食胃氣不行而崩者治法脾胃虧損不能

攝血歸源者四君子加升麻柴胡芍歸脾胃氣虛

不能約制其經者大補芪歸湯門陰虛火動者涼

血地黃湯本濕熱下迫者調經升陽除濕湯升陽

散火復源湯俱本哀傷包絡者四君子加升麻柴

胡山梔肝經風熱者荆芥穗童便調服小柴胡湯

柴芩參半神加山梔丹皮生地薄荷荆芥肝經有風者

防風末酒調服肝經虛熱者當歸散歸芎朮肝經

怒火者養血平肝散本脾經鬱結而血不歸經者

歸脾湯參芪朮歸棗木加山梔柴胡丹皮飽食胃

氣不行者平胃散甘枳加麴蘖

陳山農云血崩氣脫先以補中益氣湯當歸少用腰

證治大還濟陰近編卷之一 五 真白堂

痛加杜仲續斷後以十全大補湯血藥少用微加

陳皮以開鬱

東垣云飲食不節勞傷形體致脾胃虛弱而心包乘

之胃氣下陷氣迫於下漏下惡血或崩漏不止理

宜除濕去熱益風氣上伸以勝其濕亦火鬱發之

之意宜調經升陽除濕湯又云下血不止須用四

君子以收功

丹溪云崩漏多因氣所使而下蓋七情之火內動攻

傷衝任血得熱則走散故便數瘦血也

古卷云崩漏甚者初宜止血以塞其流中宜清熱以

澄其源未宜養血以復其舊使塞流而不澄源則

滔天之勢不可遏澄源而不復舊則孤子之陽無

所倚矣

薛立齋云崩漏不可苟用寒涼塞血之藥致傷脾胃

不能攝血歸源是速其危也惟宜用補血升陽之

劑若去血過多潮熱咳嗽脈數乃元氣虛弱假熱

之脈尤當用人參溫補況此症無不由脾胃先損

而致者

證治大還濟陰近編卷之一 五 真白堂

王淡如治一婦崩漏晝止夜來此氣虛不能升舉也

蓋夜則陰旺陽衰不足以攝血故也用補中益氣

湯而愈

薛立齋治一婦因怒患崩如湧口噤日斜手足搖擗

此肝經血耗生風用六味丸料一劑而愈但食少

晡熱用四君子加丹皮柴胡當歸芍而痊

聖惠治婦人漏下赤白不止地榆三兩醋一升煮二

三服

丹溪散火復源湯集治胃氣下陷與濕熱相火相

合以致經水暴崩。法宜升舉其陽。瀉火涼血。補血以復其舊。

羌活 防風 升麻 柴胡 各一錢 生地 黃芩

黃連 各二錢 當歸 黃芪 各四錢 人參 白朮

甘草 各二錢

調經升陽除濕湯 東垣 治飲食不節。勞傷形體致脾

胃虛弱。而心包乘之云云。見前

羌活 獨活 防風 藥本 升麻 蔓荊子

蒼朮 黃芪 甘草 各半錢 柴胡 羌活

證治大選

濟陰近編 卷之一

天 貞白堂

此從權用風藥勝濕以升提下陷之氣。勿令下迫

以救血之暴崩也。漏止必以參芪歸朮補氣升陽

和血。漏不止尤宜救其根源。治其本經。只益脾胃

退心火之亢以治其根蒂也。周慎齋云崩漏用升

芥烏梅奏功甚捷

升陽舉經湯 東垣 治經水不止。右尺按之空虛。是氣

血俱脫也。輕手數疾舉之。弦緊或澀皆陽脫之症。

陰火亦亡。見熱症於口鼻眼目。或渴此皆陰燥陽

欲先脫。宜舉之升之。大升浮氣血補其下脫。

羌活 藥本 防風 柴胡 細辛 肉桂

人參 黃芪 白朮 當歸 芍藥 川芎

熟地 紅花 桃仁 甘草 炙

涼血地黃湯 河間 治腎水真陰虧虛。不能鎮守。包絡

相火致血走暴崩。

黃芩 黃連 黃柏 知母 生地 荆芥

柴胡 蔓荊子 藥本 羌活 防風 升麻

細辛 川芎 當歸 甘草

奇效四物湯 治肝經虛熱血沸騰而崩不止

證治大選

濟陰近編 卷之一

天 貞白堂

當歸 熟地 白芍 川芎 阿膠 艾葉

條芩

養血平肝散 治大怒經血暴下

當歸 芍藥 川芎 生地 柴胡 青皮 醋炒

香附 醋炒 甘草

柏葉散 治元氣虛弱崩中漏下久而不止亦治白

帶

芍藥 續斷 川芎 當歸 生地 黃甲

龜甲 炙 烏餘糧 各一兩 阿膠 牡蠣 煅 地榆

赤石脂 艾葉 鹿茸 各五錢 米飲下二錢

大補芪歸湯

即八珍湯加黃芪升麻

寒藥 棕櫚灰 香附 醋炒 燒存性 烏梅湯下

血崩及便血 三七三錢淡白酒調下二三次愈

崩漏下血體熱心煩

八物湯加柴胡前胡獨活薄荷 姜煎 初加梔

子黃芪葱

證治大要

濟陰近編
卷之一

三
貞白堂
百五

濟陰近編 卷之二

華亭陳 治三農肅蔡述 男 杖幾先 閱

長白石文耀右容甫參訂 門人 范 崇壽民 姚廷讓子遜校

帶下

徐用誠云帶下者言其病形也不可拘於帶脉為病

論古人每赤白並言今病帶者則多白少赤何也

以此疾多因胃中濕痰滲入膀胱故多白色却不

可拘於傷氣傷血之論藥之升之最為良法丹溪

云肥人是濕痰瘦人是濕熱此為確論然亦當分

證治大要

濟陰近編
卷之二

一
貞白堂
三十五

新久虛實施治若病初起其脉洪數而促或滑大

有力此因醉飽房勞膏粱厚味濕熱生痰流注下

焦或腎肝陰淫濕勝或諸經濕熱屈滯少腹纏積

而成也輕則以淡劑滲濕消痰或升陽除濕壯實

或濕熱痰盛者必上用宣法以去其痰下用十棗

湯 范載 遂 大黃柏 逐其結痰開其屈滯務使

熱去濕除後以補脾升燥之藥調養若帶下已久

其人食減虛弱或胃氣下陷或久病血崩久則血

少復亡其陽白滑之物下流不止其脉微細或沉

緊而瀉按之空虛或洪大而澁按之如無白帶腥臭多悲不樂腰已下如冰腹內冷痛陰中亦然此為陰虛陽竭榮氣不升經脈凝滯衛氣下陷精氣滯於奇經之分虛極中寒也宜溫補氣血升陽勝濕如東垣桂附湯固真湯俱本門酒煮當歸九之類氣虛入四君子血虛入四物隨其兼見症而藥之也。

薛立齋云帶下一症戴人以六脉滑大有力用宣導之法此為其實也東垣以六脉微細沉緊或洪大

證治大還

濟陰近編
卷之二

二

貞白堂
三五五

而虛用補陽調經此責其虛也丹溪用海石南星椿根皮此治其濕痰也竊謂帶下皆當壯脾胃升陽氣佐以各經見症之藥如色青屬肝用小柴胡柴芍參半加山梔防風濕熱壅滯小便赤澀龍膽瀉肝湯柴胆車通澤柏生歸色赤屬心小柴胡加黃連木通山梔色白屬肺補中益氣湯參朮芪艸加山梔色黃屬脾六君子湯參朮苓艸陳半加柴胡升麻山梔色黑屬腎六味丸熟地山萸丹澤陽氣下陷補中益氣湯濕痰下注補中益氣湯加蒼朮半夏茯苓黃柏不可拘於

肥人多痰瘦人多火而以燥濕降火藥輕治之也保命集云帶下因任脉虛濕熱沉結不散故為帶下經曰任脉為病女子帶下輕者宜蒼朮白芍榆皮地榆滑石枳殼甘草反佐以乾薑甚者十棗湯下之玄胡索散調之虛者壯脾升陽久病虛寒者東垣桂附固真之類

丹溪云帶漏所因胃中濕痰滲入膀胱無人知此既曰濕痰下流滲入則由胃氣元氣不能升舉可知徒用燥之汁之而不補則隨舉而隨陷矣

證治大還

濟陰近編
卷之二

三

貞白堂
三五五

陳三農云白帶屬脾肺虛寒宜溫肺養脾保元湯如腹痛加乾薑急脹加艾葉阿膠治之不早必為濁熱紅帶用補中益氣湯加赤芍紅花白濁先用升麻葛根湯二三劑後以四君加芍藥調理

白帶白淫白濁白淋辨

葉石峰云白帶一症與白淫白濁白淋頗相似但白帶則膠固如濁涕白淫則如清精然綿綿而下白濁則如濃米泔水狀白淋則色如鼻涕下必淋瀝也經曰入房太甚宗筋弛縱發為白淫治宜補腎

生肝若元氣下陷或脾胃虧損宜補中益氣湯

生肝若元氣下陷或脾胃虧損宜補中益氣湯
參 芪 草 歸 脾 氣 鬱 結 歸 脾 湯 參 芪 木 香 遠 州 加 黃 柏 山 柴 升

梔 肝 經 怒 火 龍 膽 瀉 肝 湯 肝 虛 加 味 道 遙 散 歸 芍 柴 薄 梔

飛 霞 子 治 一 婦 憂 鬱 過 甚 遂 昏 昏 不 省 人 事 唇 口 生 瘡 下 部 虛 脫 白 帶 如 注 四 十 日 餘 諸 醫 投 以 涼 劑

解 其 上 則 下 部 疾 愈 甚 以 熱 藥 療 其 下 則 口 瘡 多 熱 壅 飛 霞 診 之 曰 此 虛 陽 上 攻 假 熱 也 遂 以 鹽 煮

附 子 為 君 制 以 薄 荷 防 風 佐 以 菴 桂 芎 歸 之 屬 水 證 治 太 選 濟 陰 近 編 卷 之 二 四 貞 白 堂

煎 冷 飲 不 終 劑 愈 上 乃 假 熱 故 以 假 冷 之 藥 從 之 下 乃 真 寒 故 以 真 熱 之 藥 治 之 也

程 明 祐 治 一 婦 帶 下 不 止 醫 投 調 經 劑 而 血 愈 下 或 用 寒 涼 藥 則 泄 瀉 程 診 之 脉 細 如 絲 此 陽 微 不 能

榮 陰 法 當 補 陽 陽 生 則 陰 長 遂 以 人 參 一 兩 附 子 三 片 濃 煎 飲 漏 血 俱 可 繼 以 八 珍 三 四 十 劑 而 愈

薛 立 齋 治 一 婦 帶 下 四 肢 無 力 曰 四 肢 者 土 也 脾 胃 虛 弱 濕 痰 下 注 以 補 中 益 氣 湯 加 半 夏 治 之 愈

又 治 一 婦 頭 暈 吐 痰 胸 滿 氣 喘 得 食 稍 緩 苦 于 帶 下

二十餘年曰此氣虛痰飲也痰飲去而帶自止遂

朝用六君子湯夕用六味丸而愈

一女人赤帶腰痛以四君子加乾薑肉桂地榆而愈

男子腰痛亦效

又一婦赤白濁腰痛四君子加當歸杜仲續斷乾薑

地榆而愈

滲濕消痰飲丹 治濕熱痰積滲入膀胱白帶不止

白朮 蒼朮 半夏 蛤粉 白芷 茯苓

香附 海金沙 升麻 柴胡 甘草 尺脉滑

證治大選 濟陰近編 卷之二 五 貞白堂

數濕熱盛者加苦參黃柏久加樗皮

白芷散 治下元虛弱赤白帶下或經行不止

白芷 兩 海螵蛸 一枚 胎髮 一團 酒下二錢

卷柏丸 治婦人赤白帶下腹疼腿痛面色痿黃四

肢瘦

黃芪 熟地 卷柏 赤石脂 鹿茸 川芎

代赭石 醋煅碎 白石脂 艾葉 醋炒 桑寄生 龜甲 當歸 地榆 各一 木香 龍骨 各五 乾薑 炒黑 醋煮糯米為丸

桂附湯東垣 治白帶腥臭多悲不樂大寒

人參 黃芪各錢半 附子二錢 肉桂錢一 升麻五錢 柴胡五錢

知母 黃柏各少許

固真湯東垣 治始病崩中日久血少復亡其陽故白

物下流不止

人參二錢 乾薑二錢 柴胡 甘草 郁李仁

黃芩各錢一 白茯苓錢半 橘皮五錢

海石治濕痰下流常多白帶

海石 滑石 半夏 南星 白芷 白扁豆花

證治大還濟陰近編卷之二 六 貞白堂

椿根皮 青黛 醋糊為丸

乳苓丸 治虛人帶下久而不止

乳苓四兩 白果一斤 共搗爛丸如彈子大嚼碎白湯送下

芍硫丸

白芍酒炒一兩 硫黃豆腐煮透四兩 蜜丸空心酒下一

錢不飲者聚湯下

酒煮當歸丸東垣 治白帶常流不止腰已下如冰面

如枯魚肌肉消瘦小便不禁

當歸一兩 附子 良薑各七錢 茴香五錢 共酒煮焙乾 木香三錢

玄胡索錢四 炒鹽 全蠍各一錢 丁香 苦楝 甘草

柴胡 升麻各三錢 酒煮糊丸

琥珀膏秘傳 治赤白帶下

白扁豆花 香附鹽炒各一兩 小茴香鹽炒各五錢

甘草三錢 乳香 沒藥各二錢 為末雞子去清留黃

入藥末五分和勻蒸食之

畢尚書治赤白帶

棉子半斤燒存性取一兩 柏子仁一兩燒存性取三錢 空心淡酒服

證治大還濟陰近編卷之二 七 貞白堂

三錢

又方 用白果肉四兩 硫黃二錢 同炒熟去黃空心鹽湯嚥下數料即止

海上方治白帶 用海金沙藤葉酒煎服

白帶白淫 風化石灰一兩白茯苓三兩為末糊丸

米飲下 加牡蠣炙實禹餘糧赤石脂妙

治有姪白帶 蒼朮三錢 黃芩二錢 白芷二錢

黃柏炒二錢五分 白芍二錢五分 黃柏一錢五分 檉白皮炒一錢五分

山藥錢二 糊丸酒下

不便下浮。因心腎氣虛。思想所致。黃連白茯苓等分。酒

糊丸。破故紙煎湯下。

白帶用蕎麥粉一二升。以雞子清為丸。白鹽湯每日

送下百丸。

帶下排膿

白鴿屎炒一兩 白朮麝香各一分 赤芍 青木香各五分

錢玄胡索炒一兩 柴胡三分 空心酒下一錢。俟膿血

盡自止。

治白帶因七情所致

證治大選

濟陰近編

入 貞白堂

黃連炒 扁豆酒蒸 黃柏蜜炙各五錢 香附醋炒 白芍

白朮 椿皮炒各一兩 白芷燒存性一兩 為末糊丸米湯

下七十丸

赤白帶用人味地黃丸。赤帶加赤芩花。白帶加白朮

花共為細末酒調服

赤白濁二陳湯。加蒼白朮柴胡升麻升麻各五分

艾膠湯 治不拘老少血崩白帶等症

熟斷艾五分管仲 去毛炒一錢 歸身二錢 蒲黃炒黑一錢 錢五分

乾薑煨二錢 地榆錢五分 白鎰冠花一錢 加阿膠

煎至危者不過三服。忌猪牛肉白帶如脂者加枯

梗炒黃二錢。紫黑成塊者加黃芩二錢

白濁白帶北人呼謂下寒秘驗奇方

白礬一分 黃丹一分 胡椒二厘 火硝一厘 共為極細

末醋調納手心內封蓋小便口臥一覺見汗即愈

男左女右手

血分水分

先因經水斷絕後至。四肢浮腫小便不通名曰血分

此氣血乖違行失常道故經水流注四肢。久則滯

證治大選

濟陰近編

九 貞白堂

血化水。因而浮腫也。宜小調經散沒珀桂心赤芍歸蒲辛射

瞿麥椒目牽牛續隨子。或人參丸以宣導其邪。若

先因小便不利。後至身面浮腫經水不通名曰水

分。此因脾肺虛冷滲泄之令不行。生化之氣不運

不能通調水道。下輸膀胱致經水斷絕者宜加減

腎氣丸熟扶黃丹藥犀車牛漆桂附木苗 或用六君子湯參朮苓

加肉桂炮薑木香車前子。若屬形氣不足邪淫隊

道間用葶藶子丸本門以行氣導水則邪不能容而

病易安矣

人參丸 治月經不利化而為水流走四肢悉皆腫滿

人參 當歸 大黃 蒸熟 桂心 瞿麥 赤芍

茯苓 各三兩 苧蔭一兩 蜜丸米飲下十五丸

苧蔭丸 治水分

甜苧蔭 續隨仁 乾笋末一兩 棗肉丸如梧子

大扁豆湯下

求嗣

易曰乾道資始坤道資生東垣云經水斷後一二日

證治大要

濟陰近編

十 貞白堂

血海始淨精勝其血感者成男四日後血勝其

精感者成女所藏之處名曰子宮一絲在下上有

兩岐一達於左一達於右精勝其血則陽為之主

受氣於左而男形成矣血勝於精則陰為之主受

氣於右而女形成矣褚澄云陽精先入陰血復參

血累其精精入為骨則為男胎陰血先至陽精後

冲精包其血血入為本則為女孕歷觀諸論則胎

孕之成皆賴乎父精母血之無虧依期交合之得

道苟交感失宜而子宮已閉為母者經水或前或

後或一月再至或間月一來或頻來不止或先痛

而後行或先行而後痛或紫或黑或淡或清或白

帶白淫或白濁白淋或子宮虛冷或氣旺血衰或

血中伏熱或痰塞子宮或因六淫七情之邪有傷

衝任或因脾胃虛弱不能榮養衝任諸如此類是

皆血氣之不調也必調其氣血無病無虧方可推

其有餘以成胎孕為父者嗜慾無節施泄太多以

致精元衰少微陽不能射陰或腎虛精滑或精冷

精清或臨事不堅或未竟先痿或挽而不射或未

證治大要

濟陰近編

十一 貞白堂

交先泄或素思虛損下元虛寒或稟賦元弱氣虛

不足諸如此類是皆精元之虧損也必壯其元陽

益其精血方可交合陰陽以結胚胎蓋陰血不調

固不能成孕陽精不足亦豈能成胎近見世之無

子者專責乎女子之一身而不槩求乎男子之多

故幾何而不絕嗣耶求嗣者宜審之

婦人兩尺脉細無力者乃氣血虛寒多不產育如天

地寒涼則草木必無萌芽也

丹溪云無子之因多起於父氣之不足

仲景云。男子兩尺脉浮弱而泄精氣清冷者無子。廣嗣要語云。男子兩尺脉或大或數未交易與既交易泄。或精遺精滑。皆真陰之不足也。治宜補陰。兩尺微小。或遲。陽物不舉。未竟先痿。或精冷精清。皆真陽之不足也。治宜補陽。若兩尺虛微太甚。別無相火為病法。當陰陽同補。

褚澄云。男子十六而精通。必三十而娶。女子十四而經至。必二十而嫁。若欲其陰陽二氣充實也。若精未通而御女。經未至而近男。則五體有不滿之

治本還

陰近編

主

貞白堂

處。異日有難狀之疾。且未完而傷。未實而動。根本既薄。枝葉必衰。亦理之必然也。又曰。精血散分。則有駢胎品胎之兆。陰陽均至。則有非男非女之形。父少母老。產女必羸。母壯父衰。生男必弱。羸女宜及時而嫁。弱男宜待壯而婚。此疾外之所務。不可不察也。

靈臺秘訣云。陽精太盛。必生偏指。或胎內生牙。舊血未盡。則髮必白。而肌膚色紅。

廣嗣要語云。成胎之後。宜內遠七情。外薄五味。毋暴

怒。毋醉飽。毋食辛辣炙燥。毋多交合。以動怒火。若然。則為母者。非惟無胎前產後之疾。且生子無他病。而多壽矣。

陳三農云。成胎之後。切忌淫慾。蓋兒在胎中。受母之氣。母氣足。則兒全。然男女交媾時。母必輸陰精。以應陽之求。應則兒缺。一日之養矣。且淫慾之時。無火不動。火著胞胎。百病皆由此致。而沙痘尤甚。痘乃先天之氣治痘。乃後天之功。與其藥治於痘

治本還

陰近編

主

貞白堂

始健乾丸。此方寒熱不偏。君佐不素。滋補無過。種子良方也。丈夫少病而無子者。宜服。若陽事痿弱。精冷精清。宜巨勝丸。還少丹之屬。以壯元陽。若水不勝火。心旺腎衰。熱煩精滑。宜補陰六味丸之屬。以生精血。

秋石

鹿膠

各二兩

人參

枸杞子

山茱萸

麥門冬

天門冬

生地

熟地

杜仲

各一兩

糊丸。桐子大。沸湯服。一月。候女子經過。金水正生之時。男子服車前子湯。交合。

養生順坤丸 此方和氣調經養血清熱。女人寒少
執多。久無子孕者宜服。若血海多寒。子宮久冷。宜
益斯丸。以溫煖子宮。若不甚寒者。宜墨附丸。以和
養血氣。

當歸 白朮土炒各三兩 川芎 白芍 熟地 生地

茯苓 牡丹皮 黃芩 柴胡 益母草 椿根

皮各二兩 醋糊丸。空心醋湯送下。

人神丸 固精種子益壽延年

沙苑蒺藜八兩四兩入 山茱萸 芡實各四兩

熟地各二兩 濟陰近編 古 貞白堂

兔絲子三兩酒煮 覆盆子三兩酒蒸 枸杞子三兩續斷

蓮蓬各二兩 將蒺藜以水八碗煮三碗。又以水五

碗煮一碗。入熬膏。入煉蜜丸。

男子左尺微弱。陽事不舉者。宜服。

淫羊藿四兩仙茅 杜仲 破故紙 枸杞子各二兩

黃柏 知母各一兩 胡桃肉 龍眼肉各四兩

酒浸飲效。

補腎健脾益氣方

白茯苓二錢 枸杞子一兩 懷生地二錢 麥冬五錢 人參二錢

陳皮二錢 白朮二錢 河水二碗煎八分服。

滋陰大補丸 腎脉微弱。陰陽兩虛。宜此藥補陰和

陽生精益血。

熟地二兩 杜仲 山茱萸 巴戟 肉蓯蓉

五味子 白茯苓 茴香 遠志甘艸煮各一兩 牛膝

山藥 石菖蒲 枸杞子各五錢 煉蜜和紅棗肉

還少丹 尺脉微細。陽事痿弱。微陽不能射陰者。宜

還少丹。尺脉微細。陽事痿弱。微陽不能射陰者。宜

熟地 枸杞子各兩 牛膝 山藥 山茱萸

巴戟 白茯苓 遠志 楮實子 肉蓯蓉

茴香炒 五味子 菖蒲各一兩 煉蜜和紅棗肉為丸

十精丸 治男子陽痿不舉。婦人陰弱不孕。

巴戟 鹿茸 石斛 肉蓯蓉 兔絲子 人參

白朮 續斷 柏子仁 鍾乳粉 等分蜜丸溫

或淡鹽湯下百丸

種子丹 男子服

沙苑蒺藜四兩 如黍種同州出者佳。再以重羅

過二兩細末。其粗末用水一碗熬膏。同

山茱萸去核極細覆盆子南者佳去核

五色者佳火煉法以小沙鍋將龍骨雞頭實五錢

人獨內以火連鍋紅去火毒方用雞頭實五錢

取細末四兩右用伏蜜一斤煉以紙粘去浮

沫數次無沫滴水成珠者止用四兩將前四味重

羅過先以痰藜膏和作一塊再入煉蜜四兩納石

臼內搗千餘下丸如雞頭子大每服三十丸空心

鹽湯送下一方加川續斷二兩蓮續四兩枸杞子二兩

種子丹雙用屢效

白茯苓淨山藥淨韭子各四兩溫脾一

證治太還齊陰近編去貞白堂

如無溫脾以焦黃狗外腎四枚不淡鹽湯或

可傷狗乘新鮮搗爛入煉蜜為丸

時酒送下百丸節慾月餘俟經水淨合即孕

種子方

柏子仁去油者好酒浸一宿鮮鹿茸火煨去毛淨

血者須慢火防其皮等分和柏子仁泥搗勻加煉

破血走也切片為末蜜九如梧子大每服三錢空心鹽湯下

四製香附子丸女子服之即調經

香附一斤四分之一分酒浸一分醋浸山梔四錢

附入砂鍋炒至山梔黑色為度去山梔存當歸酒

五川芎水洗白芍藥三兩熟地五兩用砂仁末

一兩茯苓末二兩同入砂鍋內將好時酒煮乾七

次看地黃黑色為度惟地黃臨時研膏入藥內再

拌餘藥磨為極細末煉蜜加杵千餘下丸如梧子

大每晨用淡薑湯送下五六十丸漸加至七八十

丸止服後有準月水赤白帶愈不必月月服之但

月水行前後共服九日遠則半年近則三月必成

孕矣後切勿再服年過四旬者必久服

墨附九治婦人久無孕月經不調數多半產者

證治太還齊陰近編去貞白堂

香附一斤童便酒醋米泔艾葉四兩同香附醋

京墨煨烟盡醋熟地飯上當歸川芎人參

茯苓木香各一米糊丸酒下

滋血煖官丸

香附十二兩川芎當歸白芍酒炒熟地阿膠

艾葉醋白朮各二醋糊為丸

調經暖宮丸

秦艽川芎人參石斛香附丹皮

蚕布燒灰各熟地當歸各二茯苓澤蘭各一

子 49-585

川椒 墨精 山藥 各五錢 大黃豆卷 兩 桂枝 少許

元米 半合 蜜九酒下

濟陰丸 治婦人血虛挾火子宮乾澀不能攝精成孕

香附 兩 八川芎 當歸 生地 熟地 白芍 各二兩

人參 山藥 黃芩 各一兩 肉桂 五錢 煉蜜丸

妙應丸 治婦人氣虛痰盛滿溢子宮不能受精肥

婦無子宜服 蒼朮 酒炒 人參 黃芪 各一兩 白朮 炒 地黃 酒洗 橘皮 各一兩

證治大還 卷之二 木 貞白堂

半夏 當歸 白茯苓 滑石 甘草 各七錢

米糊丸 薑湯下

濟坤大造丸 婦人益氣血盪子宮種子

紫河車 用白 人參 五錢 當歸 二兩 淮地 酒浸 蒸熟 兩

山藥 一兩 黃柏 酒炒 麥冬 去心 一兩 五味子 五錢

天冬 去心 一兩 杜仲 薑炒 牛膝 酒浸 一兩 虛弱汗多加

黃芪 一兩 地骨皮 知母 各一兩

婦人陰寒子宮久閉不孕用吳茱萸川椒蜜丸彈子

大綿絮納陰中日一易之

婦人無子方

香附 半斤 酒醋 鹽 琥珀 三錢 益母艸 兩 艾葉 一兩 煎服

人參 白茯苓 各一兩 木香 乳香 陳皮 貝母 各一兩

川芎 各七錢 當歸 一兩 煉蜜為丸

產前

陰搏陽別者娠少陰脈動甚者娠三部脈浮沈相等按之不絕者娠寸微關滑尺數往來流利如雀啄者娠尺滑疾重手按之散者三月不散者五月中冲滑疾者三四月少冲滑疾五六月大冲滑疾七

證治大還 卷之二 九 貞白堂

八月中指一跳一止者一月二跳二止者二月有關二部脈實大而有方者八九月肝脈浮大而緊者是足月左偏大為男右偏大為女左右尺俱浮生二男俱沉生二女左右尺俱實大浮主一男一女身重二關及尺俱沉細者必過月方產身重二尺俱沉伏者此血有餘而氣不足必至十四五月方產脈大而無力或澀或浮或虛弱皆主半產右關弱甚者必墮三月而渴脈反遲欲為水分五六月脈數必傷胎脈緊必胞滿脈遲必腹滿而喘

六七月胎動發熱惡寒其胎踰腹腹痛小腹如扇
子臍閉故也當以附子溫之七八月宜實大牢強
忌細小瀉弱月足身熱脉亂者吉脉浮腹痛引腰
脊爲欲生一呼三至或沉小而滑或脉轉急如切
繩者便生。

陳幼良云妊娠經脉育胎始於厥陰肝終於太陽膀
胱也由木火土金水五行相生之氣也手少陰太
陽經無專養者以君主無爲故也。

明醫雜著云產前諸症皆胎氣所致蓋婦人有娠則
證治大還 濟陰近編 卷之二 干 貞白堂 三三三

精氣皆併而成胎脾氣虛矣脾虛則不能運化飲
食而生濕濕生痰痰生熱熱生風也子腫子氣者
濕也惡阻者痰也子煩子淋者熱也子癰者風也
子懸者氣也轉胞者虛也濕則滲之痰則消之熱
則清之風則平之氣則散之虛則補之中病即止
毋過於治也。

產前當補脾清熱養血如金匱當歸散之類蓋補脾
則中氣固而無半產欲墮之虞清熱則火不妄動
而無胎漏煩淋之患養血則胎有所資而無坐草

難虞之苦至八九月時仍加順氣之劑俾氣降而
骨自開血足則胎自滑又何他故之足慮哉良方
云氣順則血和胎安則產順是也雖感冒解利亦
必以補養爲主天行溫疫增損柴胡雜症發熱加
減四物慎勿亂投湯劑也

當歸散 凡娠婦六七月宜服降氣養血之藥蓋
氣降則骨自開血足則胎自滑此方善補脾清熱

養血安胎蓋兒系於腎氣懸於脾脾氣健而無半
產子腫子氣之患火氣清而無胎漏胎痛子煩子

證治大還 濟陰近編 卷之二 干 貞白堂 三三三

淋之疾骨開胎滑而無逆產橫產難產之虞且滑
其源更能稀沙瘕乃屢試屢驗者

白朮 三兩一半用砂 黃芩 三兩一 當歸身 白芍

川芎 各一 血虛加熟地阿膠 氣惱加香附枳

殼 素多半產加阿膠續斷仍視在何月及何經

用事加本經藥 八九月加枳殼香附益母草

安胎飲 孕成之後覺胎氣不安或腹微痛或腰作

痛或飲食不美並宜服

白朮 人參 條芩 芍藥 川芎 熟地

砂仁 陳皮 蘇葉 當歸 甘草

有孕二月胎氣不和肚腹膨脹口吐清水

白朮 黃芩 蘇葉 香附 藿香 甘草

肉桂 薑水煎 小便不利加赤芍車前子

腹脹加腹皮枳殼嘔吐加乾薑潮熱加柴胡前胡

頭痛加川芎

保胎養生丸

人參 熟地 白朮 白茯苓 乳拌蒸 廣陳皮

山查肉 甘草 山藥 川連 三錢

證治大選

濟陰近編

三

貞白堂

薏仁 炒三次 白扁豆 炒一兩 白豆蔻 三錢 藿香 五錢

蓮肉 去心炒 澤瀉 炒三錢 桔梗 米泔浸去 芡實粉 炒

一兩 麥芽 炒黃取淨 爲末蜜丸如彈子大每丸

重二錢用白湯或橘皮湯砂仁湯化下

安胎用人參白朮熟地阿膠白芍甘草黃芩 腹痛

加砂仁紫蘇見血加續斷胸腹不寬加陳皮砂仁

婦人懷妊常服 歸芎芍苓朮爲末酒調日進三服

安胎用砂仁艾葉益母草金銀環同煎服

內吹乳痛宜清孕湯

黃芩 黃柏 山梔 生地 白朮 枳殼

王不留行 防風 薄荷 甘草 燈心煎服

固胎丸

地黃 歸身 人參 白芍 白朮 陳皮

黃芩 甘草 黃連 桑上犂兒藤 元米十四粒

血虛不安加阿膠 痛甚加砂仁

周慎齋云四物湯補血之有餘非所以安胎不宜常

服嘔吐惡心黃芩芍藥湯加蘇葉砂仁白朮傷寒

亦用黃芩芍藥湯表症多加蘇葉裡症多加黃芩

證治大選

濟陰近編

重

貞白堂

大小便不通加蘇梗痢疾加木香黃連後重加蘇

梗飽悶加砂仁瘧疾小柴胡湯加砂仁紫蘇瘧痢

並作去紫蘇加白朮木香黃連有胎不宜用紫芩

湯以內有半夏澤瀉引入小腸恐於胎不利或以

白朮二兩好酒一壺煮乾爲末服

凡婦人有胎不宜作虛治但宜行氣用條芩砂仁白

朮蘇梗甘草腹脹加腹皮有痰或噎氣加陳皮腸

中腹中不和肝火起加白芍青皮腰痛加杜仲見

血加續斷艾葉

腹中覺煩躁有熱用白朮佐黃芩胸膈不寬加砂仁
蓋砂仁安胃入脾其氣清涼最能安胎倘服砂仁
仍不寬快加蘇梗

凡娠婦嘔吐用蘇梗煎湯調砂仁末服蘇梗一味藥
內俱不可少以其下氣寬胸故也臨月胎滑八珍
湯最宜或去人參地黃加條芩蘇梗胎大加黃楊
腦二三莖以破血破氣胎滑不用難產用車前子
一兩黃芩子五錢當歸四錢川芎三錢枳殼錢半
水酒各半煎服或用冬葵子車前子急性子各二

諸治大還

濟陰近編
卷之二

舌
貞白堂
三

錢胡麻子炒五分酒調熱服

助元固胎湯 氣虛弱服此

白朮^{二錢}人參^{四錢}歸身^{三錢}川芎^{七錢}陳皮^{三錢}炙草^{四分}

紫蘇^{三錢}熟地^{二錢}條芩^{七錢}脾胃久瀉減芩加炒黃

連四分蓮子十箇

補母壽子方 治生子弱少壽胎墮不安

人參^{一錢}當歸^{三錢}白朮^{各二錢}川芎^{八錢}熟地^{二錢}

條芩^{一錢}紫蘇^{一錢}陳皮^{一錢}炙草^{各四分}稟厚肥人加

陳皮去白朮黃連四分脾胃弱常泄瀉加蓮子

十箇枳殼三分砂仁三分減熟地 多怒而瀉加
木香三分 常燥渴加麥冬一錢 驚悸加棗仁
智仁龍眼肉

加味大造丸

河車 人參 當歸^{二兩}五錢 麥冬^{一兩}五味子^{五錢}

生地^{二兩}脾胃弱常泄瀉減地黃加白朮一兩山

藥一兩黃柏八錢 久瀉去麥冬 蜜丸

驗胎法

經脉不行已經三月欲驗有胎用川芎末艾湯調下

諸治大還

濟陰近編
卷之二

舌
貞白堂
三

二錢有胎腹中必微動

惡阻

惡阻者有孕而惡心嘔吐阻其飲食是也因精血併

而成胎血虛不能統氣故氣載痰上行所以嘔惡

而阻飲食也宜前胡飲子^{本門}旋覆花湯^{本門}因胃虛

惡阻吐水甚至十餘日粥漿不入者白朮湯^{本門}嘔

吐日久不止胃氣虛甚氣滯作嘔聞穀氣亦嘔六

君子湯加沈香藿香陳米砂仁竹茹薑汁或乾薑

人參半夏丸

三農治惡阻諸藥不納以蘇梗三錢砂仁一錢煎服或烏藥為君沉香次之。人參甘草又次之為細末以薑切片粘藥末咬嚼咽津液極至丹田過一時又如此嚼即愈。

前胡飲子秘傳治痰飲氣滯惡阻

前胡 枳殼 橘皮 半夏 茯苓 甘草

生薑 有熱加黃芩吐不止枳實換枳殼

旋覆花湯

旋覆花 半夏 陳皮 茯苓 香附 川芎

證治大選

濟陰近編

集

貞白堂

竹茹 沉香 薑汁

半夏茯苓湯 治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏 陳皮 砂仁各一錢 白茯苓二錢 甘草炒五錢

烏梅 生薑 大棗

香橘散

人參 白朮 甘草炙 香附 烏藥 橘皮

前胡 竹茹 生薑

白朮湯 治胃虛惡阻嘔吐水漿不入日久不止

白朮 人參 橘皮 丁香 甘草 生薑

人參半夏乾薑丸 人參兩半 半夏兩 乾薑三錢 糊丸米飲下

治惡阻效方

橘紅一錢 麥冬三錢 人參一錢 木瓜二錢 竹茹一錢 枇杷葉三錢

藿香五分

又方治惡阻 二陳湯加白朮藿香

胎動

胎動因毒藥用甘草黑豆淡竹葉因煩仆用阿膠散

證治大選

濟陰近編

集

貞白堂

下血佛手散血出過多八珍湯大劑加益母草徐

徐服之

佛手散

當歸兩 川芎兩 每服三錢水一盞煎乾入酒一

盞再煎一沸服

胎動不安漏血

白芍炒 阿膠 熟地 地榆炒 白朮 白茯苓

黃芪各一錢 歸身 川芎 甘草 艾葉

胎動漏血安胎 歸身 益母草 艾葉 金銀環

胎動不安用續斷杜仲各一兩艾二錢虛加人參煩熱加條芩胸膈不寬加砂仁

胎漏

妊娠肝脈沉細而弱者主漏血

胎漏自跌撲損傷外有虛有熱虛者因勞傷脾肺氣虛不能統攝其血也熱者因怒動肝火或血中有熱或肝經有風也跌撲損傷者芎歸湯加阿膠續斷熟地黃芪艾葉白蠟因肝經有風致血流散不歸經者芎歸湯加防風荆芥條芩枳殼因怒動肝

澄治大還

濟陰近編卷之二

天 貞白堂

火者養血平肝散歸芍芍生因血熱者加味逍遙

散歸芍芍生因脾肺虛弱者補中益氣湯參朮

升歸芍芍生加阿膠五味子氣下陷者倍加升麻柴胡漏

血過多八珍湯參朮茯苓加阿膠黃芪從高陸下

腹痛下血用生地當歸黃芪益母草阿膠白蠟屬

氣虛熱者阿膠白朮黃芩砂仁香附炒蒲黃

安胎散 治卒然腰痛下血

熟地 當歸 白芍 川芎 艾葉 阿膠

黃芪 甘草 地榆

寄生散 治胎漏經行妄行不止

當歸 川芎 續斷 阿膠 寄生 人參

白朮 茯神 甘草

又方

當歸 川芎 艾葉 白朮 人參 寄生

續斷 熟地 各二錢 煎空心服

孕五六月胎漏下血

當歸 白朮 黃芩 熟地 柴胡 蘇葉 各一錢

人參 艾葉 各二錢 薑水煎服

澄治大還

濟陰近編卷之二

天 貞白堂

孕七八月腹痛胎漏

黃芩 白朮 梔子 甘草 柴胡 各八分

燈心薑水煎服

經驗方治胎動漏血不止用白蠟如雞子大溶化入

酒半升飲 肘後用鹿膠一兩酒煮頓飲

胎漏下血不止阿膠三兩酒一碗半煎化服 或用

雞肝二三具酒煮食之

胎漏飲食如常精神如故此血盛有餘也見大能飲

真血自止

妊婦偶有所傷能動胎元腹痛不安及下血者用砂
仁和皮畧炒不可十分焦黑，大抵妊婦不缺此
藥不特安胎而且易產妙妙

胎動

胎痛屬血虛氣滯宜四物湯加香附砂仁枳殼條芩
蘇葉血虛悠悠而痛者膠艾湯胎氣鬱滯者芎歸
湯加枳殼香附蘇葉因外邪所傷獨活寄生湯獨活寄生湯
牛膝芍歸芍熟地勞傷元氣八珍湯加杜仲砂仁
芎歸防細桂仲

證治大還

濟陰近編
卷之二

手

真白堂
卷之二

膠艾湯良方 治血虛胎痛

當歸 川芎 熟地 芍藥 艾葉 阿膠

黃芪 甘草 水酒各半煎

胎前腰痛杜仲續斷爲末鹿角膠丸酒下

又方 四物加紫蘇香附 有妊腹痛四物加烏藥

陳皮枳殼白朮甘草

子腫

有孕而手足面目虛腫或過身浮腫者名曰子腫有
氣逆者有脾虛者有濕勝者有小便不利者因氣

過水道水濕隨氣流走於經絡而浮腫者當順氣
澤瀉散加腹皮烏藥胸滿腹脹小便不通遍身浮
腫者宜分利防已散防蘇桑赤 加車前子滑石若

上氣喘急大便不通小便赤澀葶藶散脾胃虛弱

飲食減少者當補脾土六君子湯參朮苓 加車前

子脾虛濕熱下注腰脚腫者補中益氣湯加茯苓

身重倦怠濕勝者宜滲濕防已散加白朮澤瀉或

加味平胃散本門外有孕至五六箇月腹大異常不

分胸腹氣逆脹滿不安此胞中蓄水也鯉魚湯本門

證治大還

濟陰近編
卷之二

主

真白堂
卷之二

白朮散良方 治子腫面目虛浮肢體如水氣

白朮二錢 茯苓皮 陳皮 桑皮 大腹皮

薑皮各一錢 木香少許

鯉魚湯良方 治妊婦腹脹滿或通身浮腫小便不利

當歸 白芍各三錢 白茯苓四錢 白朮五錢 橘紅一錢

生薑五片 鯉魚一尾去鱗腸煮汁煎上藥

澤瀉散 治妊娠遍身腫滿上氣喘急大便不通小

便赤澀

澤瀉 桑皮炒 木通 枳殼炒 檳榔 赤茯苓

蘇葉帶

蘇散

苦茶錢三 白朮錢六 茯苓 桑皮 郁李仁

枳殼 澤瀉 蘇子 檳榔各錢半

加味平胃散 治妊娠脚浮腫因脾衰血化為水者

蒼朮 厚朴製 白朮 白茯苓 陳皮 甘草

為細末棗肉搗成餅乾為末紫蘇湯下三錢

青木香蘇散 治胎前產後行步艱難胸膈痞塞至三指不

青木香 香附子 廣陳皮 甘草 烏藥

治大還

濟陰近編

卷之二

真白堂

木香 等分薑二片紫蘇五葉日進三服

孕婦四肢腫宜護胎調養雙全散

當歸 白朮 蒼朮 防風 木通 赤茯苓

豬苓 桂皮 甘草各八分 水煎服

許學士治妊娠浮腫用羌活同蘿蔔炒取羌活為末

酒下二錢一日一服二日二服三日三服

薛立齋治一婦子腫用紫蘇飲三服而愈

子氣

妊娠兩脚浮腫漸及腿膝喘悶不安或脚指縫出黃

水名曰子氣宜天仙藤散防已散若脾胃虛弱肢

體倦怠飲食減少宜佐以六君子湯

天仙藤散良方 治婦人有水氣以成胎致兩腿足浮

腫

天仙藤炒 香附 陳皮 烏藥 甘草 木瓜

蘇葉

防已散良方 治脾虛下部浮腫

防已 桑皮 紫蘇 赤茯苓 木香

子煩

治大還

濟陰近編

卷之二

真白堂

子煩者妊娠而煩悶不安也孕至三四箇月乃厥陰

心主及少陽三焦相火用事心脾肺虛熱故也

乘心脾則煩躁悶亂犀角散知母散熱乘心脾則

煩熱口乾人參散胃經實熱竹葉石膏湯參石門冬牛膝

竹胃經虛熱人參黃芪散參芪朮歸芍膠艾艸 肝經火動加

味逍遙散歸芍朮茯苓柴 腎經火動加味地黃丸內

熱煩悶竹葉湯氣滯而煩紫蘇飲歸芍芍陳蘇羌腹香附苓砂木

葶氣鬱而煩分氣飲陳青半桑腹蘇羌 停痰積飲

而煩二陳湯加白朮黃芩枳殼氣虛而煩補中益

肺湯參朮散 加山梔麥門冬

犀角散 治心肺虛熱煩悶

犀角 地骨皮 麥門冬 赤茯苓 知母

生地 黃芩 竹葉 防風 甘草

竹葉湯 治子煩

防風 黃芩 麥門冬 白茯苓 竹葉

人參散 治熱乘心脾煩熱乾渴

人參 麥門冬 赤茯苓 地骨皮 乾葛

黃芩 犀角 甘草

證治大還

濟陰近編 卷之二

黃

貞白堂 言三

知母散 治煩躁悶亂口乾

知母 麥門冬 子芩 黃芩炒 赤茯苓 甘草

竹茹湯

竹茹一兩 水一碗半煎五分服

治五心煩熱臨產頭痛

香附錢一 丹皮 當歸 生地 川芎 白芍

陳皮 黃芩 茯苓 桃仁 梔子 紅花各七分

有痰加半夏 咳嗽加知母貝母 火盛加石膏

不思飲食加白朮 脹悶加枳殼

子懸

胎氣不和，按上心腹脹滿疼痛甚，則逼心悶絕，胎下

始，避名曰子懸。宜紫蘇飲，亦有下焦虛寒，逼胎上

攢氣，冷而白心痛，垂死者，用附子肉桂各二分，為

末，炒鹽和勻，乘熱捲胎中，更服倉公下氣湯，亦有

患怒肝火內動，氣逆胎上逼者，用小柴胡加山梔

枳殼烏藥

紫蘇飲良方 治氣逆胎上子懸，心腹脹痛

當歸 川芎 白芍炒 陳皮 紫蘇 枳殼

證治大還

濟陰近編 卷之二

黃

貞白堂 言三

大腹皮 香附 黃芩 砂仁 木香 生薑

葱白

下氣湯倉 治心腹兩脇脹滿

半夏 大腹皮 檳榔 青皮 桂心 羌活

紫蘇 赤茯苓 陳皮 赤芍 桑皮 甘草

生薑

胎前胸膈飽悶，不思飲食，白朮黃芩砂仁紫蘇甘草

胎氣不和，胸腹作脹，砂仁為末，少加吳茱萸紫蘇

湯下

子懸方

紫蘇 橘紅 麥冬^{去心} 等分爲末每服四錢用
枇杷葉三大片竹茹一錢五分煎湯調服

子癰

妊娠頭頸強直筋脉拘攣語言蹇澀痰涎不利時或

發搐不省人事名曰子癰不可作風治因肝心風

熱或肝火血燥也宜羚羊角散鈞藤散心肝風熱

鈞藤散肝脾血虛加味逍遙散^{歸芍小柴柴} 治動

肝火小柴胡湯加鈞藤青皮羚羊角氣逆痰滯紫

證治大還

齊陰近編 卷之二

美 貞白堂

蘇飲^{歸芍芍陳蘇散腹} 脾鬱痰滯二陳湯加香附

竹瀝薑汁

羚羊角散 治妊娠冒悶角弓反張名曰子癰風癰

羚羊角 獨活 酸棗仁 五加皮 薏苡仁

防風 當歸 川芎 茯神 杏仁 木香

甘草

鈞藤散

鈞藤 當歸 扶神 人參 苦梗 桑寄生

煩熱加石膏

齊陰近編 卷之三

華亭陳 治三農甫纂述 男 楊瑞先閱

三韓張 弘度甫參訂 門人 姚廷讓子遜校

子淋

妊娠小便澀滯名曰子淋因肝血虛肝火動者滋腎

生肝飲^{藥莢熟升茯苓五} 加車前子山梔或養血清

肝散肝經濕熱者龍膽瀉肝湯^{柴胡車通} 腎陰不

足膀胱虛熱者腎氣丸^{六味加歸} 火熱乘肺者黃

芩清肺飲^{冬桑澤草猪心} 心經虛熱者安榮散若

證治大還

齊陰近編 卷之三

貞白堂

淋中有血因怒動肝火小柴胡加山梔生地勞動

脾火補中益氣湯^{參朮芪草} 厚味積熱加味清

散^{蓮梔丹生} 肝經血熱加味逍遙散^{歸芍小柴柴}

養血清肝散

生地 當歸 芍藥 川芎 黃芩 山梔

知母 車前子 柴胡 茯苓

地膚子湯

地膚子 知母 黃芩 茯苓 白芍 枳殼

木通 升麻 車前子 甘草

安榮散 治心煩悶亂小便澀淋

麥門冬 通草 滑石 當歸 人參 甘草

細辛 燈心

葵子湯 治子淋澀痛

冬葵子 滑石 木通 榆白皮 杏仁 葱白

梅師治娠淋小便澀水迫熱

車前子五兩葵根三兩水五升煎三升分三服

秘製治妊娠小便數熱痛酸楚手足煩疼

地膚子十二兩水四升煎二升半分三服

證治大選

卷之三

貞白堂

子淋散 治淋瀝尿道頻數作痛

麥冬 白茯苓 木通 甘草 腹皮 淡竹葉

蔓皮 燈心 虛煩不眠加參防

小便不通 附轉胞

妊娠小便不通因脾肺氣虛不能下輸膀胱者補中

益氣湯參朮芪草加茯苓麥門冬熱氣結于膀胱

者五淋散赤茯苓芍藥歸通加葵子滑石葱白或

八味丸加車前子金為火燥者黃芩清肺飲參苓

柴胡通肝脾濕熱者龍膽瀉肝湯柴胡車通若因

氣血虛弱不能升舉其胎下墜壓膀胱之口或胞

展膀胱於一邊名曰轉胞宜大補芩歸湯參朮芪草

升麻多加升麻柴胡仍將孕婦舉足低頭而臥其

胎自上以帛兜住溺自出矣

薛立齋云妊娠小便不通百方不效非八味丸不能

丹溪轉胞醫按見小便閉門

車前散 治小便不通下焦有熱

檳榔 木通 陳皮 赤茯苓 車前子 赤芍

證治大選

卷之三

王 貞白堂

當歸 滑石 一加石芒手

大小便不通

妊娠大小便不通因大小腸蘊熱者車前子散氣滯

者紫蘇飲歸芍芍陳蘇亮腹加杏仁檳榔木香腸

胃氣虛補中湯參朮芪草加蘇梗杏仁肝脾蘊熱

龍膽瀉肝湯柴胡車通大腸血燥四物湯加條芩

桃仁風氣大便秘澀用枳殼防風甘草

一妊娠五月大小便不通胸腹痞滿腿足及小腹刺

痛難忍用芍歸赤芍枳殼檳榔木通滑石杏仁葱

白童便水各一鍾煎八分入大黃末二錢車前子

末二錢再沸入蜜四五匙溫服大小便皆利而安

車前子散治大小便不通氣急喘悶

車前子一兩大黃炒五錢枳殼炒杏仁炒檳榔

木通各二錢半每三錢葱白三莖童便一鍾煎服

孕婦痢 黃芩 白朮 赤芍 赤茯苓

又方 當歸 赤芍 赤茯苓 白朮 澤瀉 黃芩

甘草 黃連 木香 檳榔

紅膿痢 白朮 黃芩 川歸各四錢

證治大還濟陰近編卷之三 四 貞白堂

孕婦泄瀉兩脇虛鳴臍下冷痛因令瓜果生冷及當

風取涼所致

柯子皮煨 白朮各一錢 陳皮 良薑炒 木香

白芍酒炒五分 炙草 肉豆蔻

尿血

妊娠尿血因怒動肝火者小柴胡湯加山梔因勞役

動火者補中益氣湯因厚味積熱者加味清胃散

因肝經血熱者加味逍遙散因脾氣下陷者補中

氣湯

續斷湯 治妊娠尿血

當歸 生地各一兩 阿膠 續斷 赤芍各五錢

葱白湯下二錢

遺尿不禁 白薇芍藥等分爲末調服

臟燥悲傷

妊娠無故多悲因心主三焦用事肺受炎燥故也經

曰肺在聲爲哭在用爲燥火熱燥金肺不堪其屈

燥故無故多悲也宜大棗湯淡竹茹湯

官先生治一妊婦四五箇月遇晝則慘戚淚下與大

證治大還濟陰近編卷之三 五 貞白堂

棗湯而愈

薛立齋治一孕婦悲哀煩躁用淡竹茹爲主佐以八

珍湯加山梔而安

許學士治一孕婦無故悲泣用大棗湯而愈後復患

以四君子加麥門冬山梔而愈

大棗湯

甘草三兩 小麥三兩 大棗十枚 水六碗煎三碗分三服

淡竹茹湯 治妊娠臟燥悲傷或作虛煩

麥門冬 天門冬 小麥 半夏 人參 茯苓

竹茹 甘草 薑棗

芎藭散 治外感風寒渾身壯熱頭目眩運

紫蘇 川芎 白芍 白朮 麥冬 陳皮

乾葛 甘草 薑葱煎

妊娠咳嗽 紫苑 麥冬 桑皮 杏仁 炙草

桔梗 竹茹 生薑

咳嗽見紅

歸身 熟地 天冬 麥冬 紫苑 桑皮

杏仁 甘草 桔梗 片苓 五味子 阿膠

證治大還

濟陰近編 卷之三

木 貞白堂 二〇八

小蘗 竹茹

孕婦咳嗽用貝母去心麴炒爲末砂糖拌丸芡實大

每合化一丸

不語

妊娠不語因兒胞大壅塞其經脉也蓋胞絡繫於腎

腎脉繫舌本兒胞大經脉壅塞故咽音也分婉經

通自能言語不必泛用藥也

欲墮

雖娠未足月腹痛如欲產因外邪所傷獨活寄生湯

獨杜牛芎歸熟參 因元氣弱而欲產八珍湯

茯苓 寄生 細桂枝 芍藥 熟地 加杜仲 阿膠 痛而欲產芎歸補中湯倍加

知母 肝火動而欲產小柴胡湯加白朮 山梔 素因

分娩艱難有胎欲去用麝香二分 牙皂二條 天花

粉二錢 桃頭杜牛膝各七枚 入燒酒共搗薄綿裹

如彈丸大包系筆管頭上抵入戶中自下

妊娠七月胎下墜如產臥久少安日哺益甚此氣

血虛弱故也朝用補中益氣湯加茯苓夕用八珍

湯調理而安

證治大還

濟陰近編 卷之三

七 貞白堂 三〇五

陳三農治一孕婦腰痛甚如欲小產用杜仲一兩薑

汁拌炒續斷一兩二味爲丸白湯送下遂安

芎歸補中湯 治氣血兩虛而欲產

艾葉 阿膠 川芎 當歸 黃芪 炙白朮 炒

芍藥 炒 五味子 人參 杜仲 甘草 續斷

十神湯 治氣血虛不能榮養其胎素多半產

人參 黃芪 甘草 白朮 當歸 熟地

白芍 川芎 砂仁 續斷 桑寄生

打胎 用杜牛膝塗麝香綿裹納陰中

一方用鼠屎煨為末酒下三錢未下飲酒催之自下

又方自死敗龜板一個酥炙為末每一兩水煎服不

問生死胎自下 或以面粉燒酒調服即下 後用 甘草湯 解之 萊豆

小產

丹溪云墮胎自跌撲損傷外皆因氣血虛不能榮養

其胎猶枝枯則葉落。藤萎則花墮也。又勞恐傷精

內火發動亦能墮胎者。猶風撼其木。人折其枝也。

人能銷物造化自然。病源乃謂風冷傷于子臟。此

丹溪大遺 濟陰近編 卷之三 八 貞白堂

未得病情者大抵因於內熱而虛者為多蓋孕至

三月正屬相火所以易墮不然何黃芩白朮為安

胎之聖藥耶

薛立齋云妊娠數墮須審某月屬某經育養後有胎

豫為調理始不再墮 按三四月欲墮屬手厥陰三

六月欲墮屬足太陽陽明宜補中益氣湯加砂仁

阿膠七八月欲墮屬手太陰陽明宜四君子湯加

續斷 東垣云半產分挽漏下去血過多甚至目暝無知者

因血暴亡心神失養陰血既脫相火無制故也禁

用寒涼藥本氣不病是暴去其血宜補而升舉之

陽得血而神安則目自明矣用全生活血湯若用

涼劑是血亡而氣復脫也因氣虛而血不止用人

參黃芪湯因肝經血熱而血不止四物湯加參朮

山梔瘀血內停腹痛寒熱當歸川芎湯出血過多

而發熱聖愈湯本發熱煩燥肉瞶筋惕八珍湯參

苓艸芎惡寒發熱玉露飲參朮歸芎芍茯苓五味

全大補湯參朮苓艸芎汗不止而昏憤喘急獨參

湯大渴面赤脉洪而虛當歸補血湯歸身熟地赤

脉沉而微四君子加薑附以回陽仍參產後諸症

調治

陳斗巖治一婦孕四月而墮墮後腹腫發熱氣喘脉

洪盛面赤口鼻舌青黑陳曰脉洪盛者胎未墮也

面赤者心火盛而血乾也口鼻舌青黑肝氣絕而

胎死也以蛇脫煎湯調平胃散加芒硝歸尾服之

下死胎而安

薛立齋治一婦懷孕三月而墮墮後發熱自汗四肢

軟弱曰氣血虛不能榮養其胎故墮墮後益虛陰

薛立齋大遺 濟陰近編 卷之三 九 貞白堂

虛則發熱陽虛則自汗以十全大補湯去桂加五味子而安

又治一孕五月服剪紅丸而墮墮後腹脹痛服破血之劑其痛益甚手不可近此峻藥重傷脾胃也用八珍湯倍參芪加半夏乳沒二劑而愈

治一婦苦於生育有胎藥去之去後下血不止嘔吐藥食俱不納六脉細小欲絕作毒藥傷胃氣以獨參湯徐飲三四盞嘔吐止投以八珍湯而愈

當歸川芎湯 治小產後瘀血心腹疼痛或發熱惡

證治大還 濟陰近編 卷之三 十 貞白堂

寒。

當歸 川芎 熟地 白芍 炒玄胡索 紅花

香附 牡丹皮 青皮 炒澤蘭 桃仁 臨服時

入童便酒各半盞

全生活血湯 東垣

紅花 蔓荊子 細辛 生地 熟地 川芎

藥本 白芍藥 羌活 獨活 防風 柴胡

葛根 升麻 甘草

人參黃芪湯 治小產氣虛血下不止。

人參 黃芪 白朮 當歸 白芍 阿膠 炒
艾葉 甘草 川芎 香附 青皮 砂仁

聖愈方

熟地 生地 黃芪 人參 川芎 當歸

難產

難產皆因產婦不曾豫聞生育道理臨事倉皇用力失當致有難產之厄無擇云難產多因兒未轉順坐草太早努力太過以致胞衣破而血水乾產路澀而兒難下有橫產側產偏產礙產倒產則先露

證治大還 濟陰近編 卷之三 十一 貞白堂

足橫產則先露手或先露臀偏產或露額角或肩所以然者正由腹方痛時兒身纔轉動未順即被用力一逼遂致身橫故先露手露肩或子身未轉便致直下露足也故產婦但覺腹內轉動疼痛即當解寬裙帶忍痛行立或正身仰臥甚勿坐立傾側必待兒轉身向下痛陣緊急產門已開兒頭已順試捏產婦中指中節或本節跳動方與臨盆始無橫逆難產之患矣切忌心懷驚恐坐草太早若露手足者急以針刺擦搥少許兒疼驚轉一縮即

同矣。或令產婦仰臥，穩婆推入候兒有順，方可用力。偏產亦然。若兒身已順，產戶俱開，兒已露頂，尤不下者，此因兒身回轉，臍帶攀肩故也。名曰礙產。卽令產婦仰臥，徐推兒上，以中指按摩兒肩，去其肚帶，方可用力。若腹痛雖緊，產門不開，此屬腎氣堅閉也。宜用順氣迅速之藥，如腹皮、枳殼、枳椇、葵子、蛇皮、兔腦、筆頭灰、弩弦之類，或加味芎歸湯，若血水先下，子門乾澀，令兒不下者，宜用滑利之藥，如豬脂、油蜜、榆皮、滑石、歸尾、乳香之類，血水先下者，催生如神。散胞漿先乾者，大料四物湯，加味芎歸湯，仍濃煎葱湯薰洗產戶，更以油燭入陰中。若因寒月稽停，勞動之久，風寒客于胞胎，使血氣凝滯不下者，宜用溫暖之藥，如肉桂、芎歸、葱白、牛膝酒之類。外用吳茱萸、紫蘇，濃煎熱洗，時常盛暑，則被牖開牕，多貯涼水，以防血暈血溢血悶之症。時兼嚴寒，則密閉產室，四圍置火，下部加綿，以防胎寒氣滯血結之患。兒下時，不可遽然平臥，必須靠坐良久，俟惡露下行，方可安臥。不然，恐血隨虛火

上行，黃心入肺，以成危症也。若分娩艱難，勞傷元氣，產婦垂危，產子已死，急以黃芪、芎歸數斤，水煎乘熱薰蒸滿室，俾產婦口鼻俱受其氣，臍帶以油紙燃燒斷，藉其煖氣，以補接子母陽氣。

丹溪云：難產多見於鬱悶安逸之人。富貴奉養之家，其貧賤勞苦者，少有也。蓋鬱悶則氣滯，安逸厚養則氣實故也。宜於未產前豫爲料理，滯則開之，實則損之，虛則補之。

產時切勿驚恐，恐則氣怯，怯則上焦閉，閉則下焦脹。

氣乃不行，宜紫蘇飲，或用芎歸各三錢，人參五錢，肉桂蘇梗各一錢煎服。

王愴如：治一婦坐草五日不產，遍服催生丸散無效。曰：胎猶舟也，血猶水也。氣猶風也，舟無水不行，無風不速。產及五日，氣血俱敗，丸散力緩，當用湯藥治之。遂用人參五錢，芎歸各三錢，龜板髮灰、硝黃各二錢煎服立下。

薛立齋治：一婦累日不產，服催生藥不驗。此坐草太早，心懷畏懼，氣結而血不行也。用紫蘇飲一服而

下。

劉復真治一婦產當寒月數日不下。婦已危矣。用紅

花濃煎。以帛乘熱淋洗胎上。遂下。以嚴寒血凝氣

滯。見溫暖則氣行血流。故也。後一人遇冬難產。用

薑桂吳茱萸煎湯溫洗小便。即產。亦得此義。

易產方 臨月服

榆皮散 妊娠臨月。日二三服。滑胎易產。

榆皮焙 葵子 阿膠 當歸 乳香 枳殼

甘草 等分蜜湯下三錢

證治大還

清陰近編

古

貞白堂

無憂散 治胎肥氣逆。或瘦人血少。難產。臨期服之。

可保無虞

當歸 川芎 芍藥 枳殼 乳香 髮灰各三錢

木香 甘草各錢半 每服三錢

滋榮易產方 至九個月服之有益

川芎 當歸各二錢 茯苓 甘草各四分 陳皮

大腹皮 黃芩各八分 生地二錢 益母草一錢

易產效方

當歸八錢 川芎 益母草各三錢 乳香二錢 焙去油

水酒各一鍾煎八分。入乳香末調勻服。胞漿水破

時服之。即產立效。

催生方 臨產腰腹痛甚宜服

加味榆皮散 滑胎易產

榆皮二兩水三碗煎 當歸 川芎各三錢 牛膝

大腹皮 枳殼各一錢半 檳榔

煎一鍾入黃葵子乳香各二錢滑石三錢蜜半盞

調服 血水先下子門乾澀加阿膠麻仁 冬月

寒氣客胞胎氣血結滯加肉桂紫蘇 產門不開

證治大還

清陰近編

圭

貞白堂

加髮灰龜板

阿膠湯 治生產不快及水漿先下而子門乾澀者

阿膠 滑石各一兩 葵子一合 當歸二錢 榆皮五錢 水煎服

外用滑石油調敷產門內

柞枝湯 治生產不快或死腹中

柞枝一兩 甘草三錢 水煎服

一方用車前子鳳仙子益母草各五錢為粗末水煎

服

一方用麻油半盞煎沸入蜜一酒盞加朴硝五錢酒

調服

催生如神散 治橫生逆產其功甚大

百草霜 白芷 等分每三錢童便酒調下

難產方

歸尾 砂仁 益母草各三錢 赤芍 木通 枳殼

青皮 三稜 莪朮 蘿蔔子 急性子 肉桂

蘇子 乾薑 吳茱萸 杜仲 蘇木 紅花

生地 熟地 大腹皮各二錢 厚朴 白朮 川芎

續斷 白芷各一錢 桃仁各二錢 葱七根童便酒水各

治木單 卷之三 去 貞白堂

二碗煎三盞傾服 逆產加升麻五錢 產門閉

加麻黃五錢

又方

川芎二錢 當歸三錢 益母草二錢 枳殼六分 車前子一錢

紅花五分 蘇梗六分 白芷五分 砂仁五分 陳皮六分 木通五分

木香四分 水酒各一碗童便半碗煎一碗臨產熱

服即下

橫生倒產本草以參末乳香末各一錢丹砂末五分

研勻雞子白一枚入薑汁三匙攪勻冷服

順胎丸

砂仁四兩 白朮二兩 條芩二兩 為末蜜丸此丸半

身服起直至分娩每服百丸沸湯下

香砂兔腦丸

通明乳香一兩 硃砂七錢 兔腦為丸雞頭大陰乾

榆白皮湯下一丸 此方有加麝香一字丁香一

錢者尤驗

秘授兔腦丸

麝香二分 硃砂五分 石燕一錢 牛黃一分 俱為末十

治大還 卷之三 去 貞白堂

二月兔腦為丸滾水下即胎下男左手握出女右

手握出

圖經治難產以益母草汁半碗熱服無新者以乾者

水煎服 積德用雲母粉五錢溫酒調下

難產或胎死腹中用瞿麥濃煎服或用桂心童便

酒調服二錢 十全方用麝香一錢水調服

生化湯 凡有孕七八個月須預製二三服至胞石

一破候見下地即服不問正產半產雖少壯產後

平安無恙亦宜服二劑以消血生養新血

川芎四錢當歸酒洗八錢炙草五錢桃仁十四粒乾薑炒黑四錢

水煎七分加酒六七匙熱服查雷後劑並煎兩帖

共三帖煎要在一兩時辰未進飲食之先相繼煎

因下焦惡露服多而頻則速化而生新血矣

交關不開

交骨不開因陰虛而氣不下行也宜加味芎歸湯加

牛膝阿膠枳殼大腹皮葵子或以人糞燒灰蜜水

調下即開

立齋治一婦產門不開兩日不下以加味芎歸湯

治大還齊陰近編卷之三太貞白堂

一劑即時而產

又治一婦分娩素易至四十妊娠下血甚多產門不

開與加味芎歸湯一劑又以無憂散歸芍芍乳香髮灰木香

草斤許濃煎與服以助其血而產

加味芎歸湯 治交骨不開不能生產

川芎 當歸各一兩龜板 婦人髮益泥固濟煨存性

每五錢水煎服

胞衣不下

郭稽中云胞衣不下腹不脹痛或痛以手按之稍緩

此氣虛不能送出也宜無憂散歸芍芍乳香髮灰木香草若

脹滿腹中上冲心胸疼痛喘急此是血水入胞中

胞為脹滿故不得下治若稍緩則傷人矣急用奪

命丹牛膝散俱本或以二指隨臍帶而上帶盡處

以指連胞向下一捺血覆其衣隨手下矣若產胞

經停之間為風冷所乘使血道乾澀致胞衣不出

宜芎歸湯加乳香沒藥

薛立齋治一婦胞衣不出胸腹脹滿痛手不可近用

滾酒調失笑散蒲黃胎衣惡露並下

證治大還齊陰近編卷之三尤貞白堂

又治一婦胞衣不下腹痛手按稍緩此氣虛不能送

出也用無憂散而下

牛膝散 治胞衣不下腹中脹痛急服此腐化而下

牛膝 川芎 硝石 蒲黃各三錢當歸

瞿麥各錢半桂心五分生薑

花蕊石散 治產後敗血不盡血迷血暈並胞衣不

下

花蕊石一斤硫黃四兩入瓦礫中鹽泥固濟陰乾煨赤

出火毒研細童便熱酒下一錢

奪命丹

附子炮五錢 丹皮兩 乾漆一兩炒 醋一升 煎大黃末

一兩成膏和丸梧子大酒下五十九。

胞衣不下用血竭草去泥連根搗汁和酒飲之惡露并胞衣俱下。

胞漿水乾致胎不下。

用香油蜜各一碗和勻銅鍋內煎一二沸掠去沫

調滑石末一兩傾服外以油蜜于母腹上塗之

盤腸產

證治大要

齊陰近編

手

真白堂

臨產則子腸先出而後產子。子產之後其腸不收以

醋水調勻敷產婦面背驚則收上或以半夏末

搗鼻中或以重藤子塗頂上腸乾以磨刀水潤腸

上內服好磁石湯即收或濃煎黃芪湯浸腸自上

大忌驚恐恐則氣下而腸愈不收矣。

產門不開

薛立齋云產門不開氣血虛也宜十全大補湯參朮

歸芍芍藥地黃桂 加五味子若因初產腫脹痠痛而不閉

者用加味逍遙散歸芍木茯苓 若腫既消而不閉

者用補中益氣湯參朮草歸 切忌寒涼藥

治一婦陰門不開發熱惡寒用十全大補湯加五味

子數劑而寒熱退用補中益氣湯數劑而陰戶閉

又治一婦陰門不開小便淋瀝腹內一物攻動腹下

脹痛用加味逍遙散加車前子愈。

又治一婦脾胃素弱兼有肝火陰門腫痛寒熱作渴

嘔吐不食此真氣虛也先用六君子湯參朮苓 以

固脾胃後以補中益氣湯升舉而消。

一婦形氣充實初產玉門不開腫焮作痛此肝經濕

熱壅滯也。以逍遙散加山梔丹皮牛膝車前子澤

瀉而愈

主

真白堂

子宮不收

薛立齋云子宮不收氣虛不能升舉收斂也用補中

益氣湯加醋炒芍藥半夏 一婦胞衣不下努力

太過致子宮脫出如豬肚狀令用溫湯浴之即以

手捺子宮着半邊去其血即臥徐徐推入而安

死胎方論

子死腹中多因難產血水先下胎乾涸而然也須驗

子死腹中

子死腹中多因難產血水先下胎乾涸而然也須驗

產婦舌色若青黑。反胎上冷。或胎重墮。或指甲青。腹脹悶。或口中臭穢。皆是胎死。急用朴硝五錢。溫酒童便調下。或以平胃散五錢。水酒各一盞。煎數沸。入朴硝五錢。再沸溫服。胎化血水而下。或用錫粉水銀棗肉爲丸。豆大。每服三錢。水下。若產母面舌唇口俱青者。子母俱死。陳無擇云。面赤舌青。知其子死。面青舌赤。母死子生。面舌唇口俱青。吐沫。子母俱死。

陳三農治一娠婦喘不得臥。衆作肺受風邪。陳診之。證治大還

濟陰近編
卷之三

圭 貞白堂

氣口盛于人迎一倍。厥陰弦動而痰。二尺短而離經。蓋得之毒藥動血。致胎死不下。奔逼上冲。遂以催生湯。榆皮芎歸半倍芎歸煮二三升。服之下死胎而安。

薛治一婦勤苦。勤苦負重。妊娠腹中陰冷重墮。口中甚穢。意其胎死。令視其舌青黑。與朴硝五錢服之。化下穢水而安。

一婦胎死。服朴硝下穢水。肢體倦怠。氣息奄奄。用四君加芎歸薑桂而愈。

瞿麥飲 下死胎

瞿麥 牛膝 歸尾 葵子 榆皮 赤芍 各三錢

大腹子 朴硝 各三錢 桂心 一錢 水煎頓服

桂香散 下死胎

桂香 二錢 麝香一錢 爲末酒下 一方無麝香有水

銀五錢酒下

半夏湯 治子死腹中或胎衣不下

半夏 兩 桂心 四錢 桃仁 十二錢 大黃 四錢 生薑

治源治胎動下血心腹疼。胎死用芎歸各四兩水酒

證治大還

濟陰近編
卷之三

圭 貞白堂

各三升煎三升分三服。

博枚治子死腹中不出用硃砂一兩水煮熟爲末

酒下

千金治產經數日不下。或子死腹中以瞿麥濃煎汁

服之。

產後

新產脉沈小緩滑者生。堅強急疾洪數者死。黑氣起

及鼻者危。發喘者不治。

機要云。胎產之病。從厥陰經。論房犯胃氣。及上中二

焦爲之禁不可汗不可下不可利小便發汗則傷氣下之則傷脾利小便亡津液變症蜂起矣能不犯三禁則身利和寒熱自止矣

丹溪云產後當大補氣血爲主雖有雜症以未治之

宜用參朮芎歸陳皮炙甘草黃芩如發熱輕則淡

滲其熱重加乾薑蓋此熱非有餘之熱乃陰虛生

內熱耳乾薑炒黑能于肺分利肺氣入肝分引血

藥生血所以必與補陰藥同用也

立去產後發熱惡寒或症似中風或病瘧狀或

諸治大還

濟陰近編

卷之三

貞白堂

胃悶汗出或恍惚驚悸等症皆氣血虛極之象也

宜大劑參朮歸朮肉桂以補養之如不應急用炮

附子再不應用人參一兩熟附三錢頗服如猶未

應乃藥力未能及也惟宜多服自效

加參生化湯 治產後諸危症

川芎一錢 當歸三錢 黑薑四分 炙草五分 人參二錢

產後血暈

產後眩暈因惡露上行則心下滿急口紫神昏宜失

笑散 補黃 七聖散 歸芎補黃玄胡 仍用韭菜入瓶

中用滾醋灌之時用搐鼻氣血虛極而暈者心下

不滿急但昏悶煩亂宜清魂散 本門加當歸益母草

甘草去血過多而暈者芎歸湯遇勞即暈者補中

益氣湯

清魂散 治產後血氣暴損虛火妄動血隨火上以

致心神昏亂悶絕

荊芥三錢 人參 澤蘭 川芎各一錢 每二錢熱湯

和酒調下

三聖散 治惡露上行腹痛血暈

諸治大還

濟陰近編

卷之三

沒藥 血竭 五靈脂等分 童便熱酒調下

滋榮益氣復神湯 治產後若無血塊可服此若感

寒頭痛不可用

川芎一錢 當歸三錢 人參各一錢 炙草四分 白朮 黃芩

麥冬 棗仁 陳皮 五味子 生地

行義治產後血暈身瘕直以雞子清調荊芥末二錢

服或童便亦得

近效方 治血暈

以紅花二兩童便酒各半煎服

圖經治產後血暈昏迷以五靈脂半炒半生溫酒調

下一錢

本草以人參一兩紫蘇五錢以童便酒水三合煎服

產後腹痛

產後腹痛按之益甚不惡食不吞酸或小腹有塊此

是瘀血宜失笑散

蒲黃 靈脂

或七聖散

本門或清酒調

角灰服若發熱頭痛腹痛悠悠不止按之則稍緩

此屬血虛宜四物

熟地 芍藥 歸身 芩

加參朮炮薑若胸腹飽

悶惡食不酸腹痛不可按此屬停食宜保和丸若

證治大還

濟陰近編

美

貞白堂

痛而作嘔胃氣虛也六君子湯

參 朮 苓 草 半 陳

痛而作瀉

脾氣虛也六君子湯

送二神丸

故紙 肉桂痛而昏憤口

噤冷汗不止手足厥冷陽氣極虛也六君子湯加

附子忽然臍腹疝痛此冷氣乘虛入客於血分也

當歸建中湯或五積散

歸身 芍藥 炮薑 參 苓 陳 朴 蒼 芷 麻 黃 桔 半 桂 艸 棗

怒氣腹痛四物加木香柴胡因氣滯作痛芍歸湯

加香附木香青皮

衍義治一婦產當寒月臍腹脹滿痛不可按百治不

效或作瘀血將用抵當湯曰非其治也此脾虛寒

邪客于子門也以羊肉四兩當歸川芎陳皮各五

錢煮一兩煎服二三次而安

薛立齋治一婦產後惡血上冲心腹痛用大黃等藥

其血雖下復患頭痛發熱惡寒次日昏憤自以兩

手堅護其腹面色青白作脾氣虛寒而痛用六君

子湯加薑桂而愈

周慎齋治一產婦腹脹痛服敗血去瘀之藥致小腹

痛瀉入大腹用薑桂吳茱萸並投數劑而愈

三農云產後小腹脹痛用益母草肉桂玄胡索木

證治大還

濟陰近編

老

貞白堂

香視痛輕重加減後不愈或服紅花丹皮等藥瘀

血不下腹脹痛只宜溫中為主中氣足而血自下

用理中湯

參 朮 乾 薑 艸

惡寒加肉桂虛弱保元湯

薑加薑桂腹脹痛加紅花丹皮寒熱交作十全大

補湯

參 朮 苓 芍 歸 芎 熟 地 桂

加炒乾薑昏迷不知人痰盛

芎歸人參煎服血下即愈

失笑散 治瘀血上攻心腹絞痛及兒枕塊痛

痛黃

五靈脂

等分醋水煎服

或一味靈脂亦妙

七聖散

治產後瘀血停滯腹痛

當歸 川芎 蒲黃炒 玄胡索 桂心 芍藥炒

益母草 鹽湯調麝香五厘服。

四神散 治產後血虛腹痛

川芎 當歸 芍藥炒 乾薑炒

兒枕痛 用山查一兩半。砂仁木香各五分。陳皮一錢。甘草三分。水煎服。酒過口。

兒枕痛 濃煎山查汁入砂糖服之立愈

兒枕痛 當歸 赤芍 烏藥 川芎 陳皮

紅花 蘇木 山查 枳壳 香附 水二鍾煎

證治大還 濟陰近編 卷之三 美 貞白堂

服 又方 用四物煎調香附靈脂末服甚者加桃仁泥

四五分炒

治血蠱 地蘇木 紅花 鬱金 石菖蒲 香附

白豆蔻 歸尾 水煎五分服

惡露不下

惡露不下用失笑散蒲黃氣血凝滯花蕊石散 疏石

風冷相搏七聖散加肉桂乾薑

韋舟治產後血不下以益母草搗汁煎入酒攪勻服

惡露不止

惡露不絕因川氣熱而不能生血用六味地黃丸地

山黃山藥 肝氣虛而不能藏血四物加參朮脾氣

丹從澤 虛而不能攝血用六君子湯參朮苓 胃氣下陷而

不能統血用補中益氣湯參朮苓 脾經鬱熱

而血不歸源加味歸脾湯參朮苓 脾經鬱熱

肝經怒火而血妄行加味四物湯地丹梔柴生

膝意 氣血俱虛十全大補湯八珍加 肝經風邪而

血沸騰一味防風九產後血不止八參黃芪湯參

證治大還 濟陰近編 卷之三 美 貞白堂

求歸芍阿 薛立齋治一婦產後因怒其血如湧仆地口噤目斜

手足搐搦此肝經血耗風生用六味丸一劑諸症

悉退但食少哺熱用四君子加柴胡丹皮芍歸而

愈。

產後發熱惡寒

薛立齋云產後發熱惡寒皆是氣血虛弱脾胃虧損

不足之症切不可發表降火蓋陰虛則發熱陽虛

則惡寒寸口脈微陽不足則陰氣上入陽中而惡

寒入部陽氣不足則陽氣下陷入陰中而發熱

陰不足陽往乘之則陽內陷而發熱宜六味地黃

丸熟地山萸山藥丹茯苓澤陽不足陰往從之則陰氣上入陽

中而惡寒宜補中益氣湯參芪朮草歸陰陽不歸

其分故寒熱交爭而發熱惡寒也宜八珍湯參朮

芍藥熟地十全大補湯人珍加玉露飲門本若發熱惡

寒頭痛連日不止的係風寒乘虛入客用小柴胡

柴苓參半加芍歸蘇葉生薑微散之切不可妄施汗

下虛其所虛變為肉瞶筋惕鬱冒昏迷手足搖擻

證治大還濟陰近編手貞白堂

諸症頓起矣

薛立齋治一產婦惡寒發熱他治以小柴胡湯致汗

出謔語煩熱作渴四肢抽搐用十全大補湯二劑

益甚其脈洪大重按則無此藥力未及也遂加附

子服四劑愈

陳三農云產後潮熱只作虛治宜十全大補湯加炒

黑乾薑此陽生陰長之義也

玉露飲 治產後氣血兩虛頭痛發熱惡寒或往來

寒熱似瘧

人參 白朮 歸身 白芍炒 川芎 白茯苓

五味子 乾薑炒 柴胡 甘草 益母草 黃芪

熟地 有汗去柴胡加蜜炙黃芪

產後虛煩發熱

薛立齋云產後虛煩發熱煩燥作渴此陽隨陰散氣

血俱虛也用十全大補湯人珍加熱愈甚急加桂

附切勿亂投涼劑若陰血暴傷陽無所附而為外

熱用四物湯熟地加五味子炮薑補陰以配陽

若肌膚發熱而目赤色煩渴引飲此血脫發躁也

證治大還濟陰近編圭貞白堂

用當歸補血湯歸若胸膈滿悶噎膈惡食煩熱此

食物停滯也用六君子參朮苓加麴蘖砂仁若飲

食懶食四肢無力日晡煩熱此脾胃虛弱也補中

益氣湯參芪朮飲食如常小便無塊乳房硬痛

此兼乳發熱也用漏蘆湯蘆升麻大黃惡露停著

小腹有塊腹痛不可按此敗血不行也用七聖散

若誤認火症投以涼劑禍在反掌

人參當歸散 治產後虛煩短氣煩悶

人參 當歸 麥門冬 生地黃 桂心

淡竹葉各二錢 芍藥炒 梗米一合 大棗四枚

常歸羊肉湯仲景 治產後發熱白汗肢體疼痛名曰

蘇勞

黃芪兩 人參 常歸各七錢 生薑五錢 羊肉一斤煮

汁煎上藥分五服

加減四物湯 治產後陰虛發熱晝則明了夜則發

熱

當歸 川芎 生地 熟地 柴胡 丹皮

加味聖愈湯 治產後血虛心煩睡臥不寧五心煩

證治大還

濟陰近編 卷之三

至 貞白堂 三子

熱

熟地 生地 麥門冬 川芎 當歸 五味子

人參 甘草 黃芪 棗仁

長生活命丹 治產後虛甚勞倦脾胃弱或傷食誤

服消導大傷脾胃不思飲食

人參二錢 薑二片 麥芽炒五分 蓮子八個 鍋焦飯末

水煎上四味每用藥一鍾調飯末二三匙最能開

胃氣

濟陰近編 卷之四

華亭陳 治三農甫纂述 男 枳幾先 閱

三韓張 鏞元聲甫參訂 門人 范 崧壽民 姚廷讓子遜 校

產後中風

產後口眼喎斜症似中風此虛極之假象也蓋產後

失血過多陽火熾盛虛熱生風或火載痰上皆能

令人口眼喎斜舌強不語切不可誤作風治當大

補氣血為主佐以治痰又產後敗血滯于經絡亦

令人腰背強直筋脉拘急通身疼痛宜作瘀血治

證治大還

濟陰近編 卷之四

一 貞白堂 三子

凡此之類皆狀似風症而實非風也治或一差殺

人必矣慎之慎之

薛立齋云產後口喎或四肢筋攣或角弓反張或手

足痠痠如痙症有因氣血耗損腠理不密汗過多

而患者有因去血過多元氣虧極或外邪相搏者

有氣血兩虛陰火內動者有肝經風熱血燥者有

陰血去多陽火熾盛筋無所養者症雖不同皆虛

象也惟宜固氣血為主稍佐以治病之藥如見惡

寒發熱等症乃氣血虛甚也宜大劑參芪歸朮肉

桂以培養之如不應急加熟附若猶本應急用參附湯倘猶未應此藥方未到也宜多用為妙此等若肢體惡寒脉微細者此為真狀浮大發熱煩渴此為假象無力抽搐戴眼反折汗出如珠者死。	薛立齋治一產後牙關緊急四肢抽搐腰背反張此因去血過多元氣虧損陰火熾甚也用十全大補湯加炮薑二劑愈。	又一婦產後筋攣臂軟肌肉腫重此氣血俱虛而有火用十全大補湯愈。	證治大選 <small>濟陰近編 卷之四 二 貞白堂</small>	又治一產婦因勞怒發厥昏憤左手牽緊兩脰抽搐小便自遺此因氣血虛而肝火盛用十全大補湯加鈎藤山梔辰砂遠志而愈。	又治一婦產後勞動忽仆地而死意其勞傷氣血而發症也急用十全大補湯加附子令人多方灌之藥湯入咽漸愈。	天麻丸 治產後中風恍惚語澀四肢不利	天麻 防風 <small>錢各五</small> 茯神 棗仁 <small>錢各一</small> 川芎 羌活 <small>錢各一</small> 柏仁 遠志 人參 麥冬 山藥 <small>錢各一</small> 南
--	---	-------------------------------	------------------------------------	---	--	-------------------	--

星曲 半夏曲 <small>錢各八</small> 當歸 二兩 葛蒲 八錢	產後筋攣	產後四肢攣急切不可作風治蓋肝主筋產後亡血故肝經風熱熾盛血燥而筋攣耳經曰風客淫氣精乃亡邪傷肝也加味逍遙散 <small>歸芍朮苓柴 丹梔</small> 加羚羊角兼服六味地黃丸補腎生肝然敗血滯于經絡亦能令人筋脉拘攣強直疼痛宜當歸散 <small>本</small>	證治大選 <small>濟陰近編 卷之四 三 貞白堂</small>	當歸散 治產後敗血滯于經絡筋脉拘急腰背強直疼痛不安。	當歸 川芎 玄胡索 沒藥 紅花 牛膝 香附 桂心 羌活 酒水各半煎服	防風散 治產後氣血不足風邪所襲肢節疼痛	背強直	防風 <small>錢一兩</small> 桂心 赤芍 <small>錢各五</small> 羚羊角 酸棗仁 川芎 當歸 羌活 牛膝子 <small>錢各三</small> 產後風勁	強直不知人鷄子清調荆芥末二錢服	產後瘕瘕
---------------------------------------	------	---	------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------	-----	---	-----------------	------

產後癰癧因陰血去多陽火熾盛筋無所養而然耳

故癰疽膿水出多金瘡出血過多陽隨陰散宜入

珍湯參朮苓艸加丹皮鈎藤以補脾土如小兒

吐瀉之後脾胃虧損多有此症乃虛象也若陽氣

脫陷者補中益氣湯參朮苓艸加薑桂陽氣虛敗

者十全大補湯八珍加加薑附亦有復生者

薛立齋治一產婦發癰遺尿自汗面赤或時青色飲

食如故肝脉弦緊此肝經血燥風熱致瘕也肝主

小便入心則亦法當滋陰血清肝火用加味逍遙

證治大還薛陰近編四貞白堂

散歸朮苓艸而愈

又治一產婦因怒口噤吐痰臂不能伸小便自遺左

手脉弦此肝血虛而風火妄動筋無所養而然用

加味逍遙散臂能伸以補肝散六味丸而安

增損柴胡湯 治產後或經適斷口噤咬牙手足牽

搐昏冒

柴胡 黃芩 半夏 人參 黃芪 石膏

知母 生地 甘艸

麥加散 治產後不省人事或癰癧頸掉

當歸 荆芥分等 每二錢入酒少許水一盞煎服

清神道魂湯 治產後昏厥

川芎 二錢 當歸 四錢 炙艸 五分 人參 一錢 荆芥 四分

乾薑 黑四 桃仁 十二 肉桂 五分

產後胃悶汗出

胃悶者謂昏冒目瞑也東垣云因陰血暴亡而火熱

上熾也但補其血則神自暢若常時血下當補而

升舉之陽氣得血而神安則目明矣宜全生活血

湯薛化夏制細辛二地薛薛立齋云此症屬大

證治大還薛陰近編五貞白堂

虛宜同氣為主汗不止必變柔瘕宜用十全大

補湯

生津止渴益水湯

黃芪 一錢 人參 麥冬 熟地 各三 五味子 一錢

當歸 三錢 茯苓 八分 甘艸 升麻 各四 葛根 一錢

產後汗多變瘕口噤身反脹

川芎 當歸 麻黃根 桂枝 防風 天麻

人參 甘艸 羌活 附子 羚羊角

產後汗

產後多汗因陰虛血為陽所加也若汗出不止由陽

氣虛腠理不密而津液妄泄也輕則當歸黃連湯

本加五味子麥門冬甚則參附湯或十全大補

湯八珍加加熟附若汗多而脈浮洪有力者不治

以脈不為汗衰故也然汗多亡液大便必難切不

可下汗多亡陽陽虛則寒故令鬱胃汗多不止必

變柔痠三者宜大補氣血為主用十全大補湯若

但頭汗出此血虛下厥孤陽上越也急用十全大

補湯加附子

證治大選

濟陰近編 卷之四

六 貞白堂

薛立齋治一產婦暑間音響其汗如水而昏憤藥到

口即嘔作脾氣虛賤用參附為丸含咽漸加錢許

仍用參附湯而安

又治一產婦盜汗不止遂致廢寢神思疲甚口渴引

飲此血虛有熱用六黃湯二地茂連冬打內麥連俱炒過

加人參五味子棗仁而安

當歸黃芪湯 治產後失血腰疼自汗

當歸 黃芪 人參 芍藥 甘艸 水煎腰子

取汗煎藥

麻黃根湯 治產後汗

黃芪炒 當歸 人參 五味子 牡蠣煅 鹿角霜

甘艸

桂附湯 治產後氣脫汗不止小便難四肢難以屈伸

桂心 芍藥各錢 甘草一錢 附子五分 生薑 大棗

參附湯 治陽氣虛寒自汗惡寒手足逆冷或大便

自利臍腹疼痛吃逆

人參一兩 附子炮五錢 生薑三片 大棗二枚

生津益液湯 治虛弱口渴少力由產後血少汗多

證治大選 濟陰近編 卷之四 七 貞白堂

內煩

人參 麥冬 茯苓各一錢 大棗 小麥 竹瀝

爪萸根 甘草 大渴不止加蘆根

產後驚悸

人之所主者心心之所養者血心一虛神氣不守故

多驚悸也用十全大補湯加棗仁柏子仁茯神五

味子煎調辰砂末服

養心湯 治心血不足驚悸不安

黃芪一錢 茯神八分 當歸二錢 川芎八分 麥冬一錢

遠志 八分 聚仁 白芷 各一錢 五味子 十四粒 人參 一錢 五分 甘艸 五分

琥珀散 治產後血虛驚悸不寐

琥珀 辰砂 當歸 沒藥 生地 栢子仁

酸棗仁 每服三錢

加味歸脾湯 治產後失血過多發熱有汗睡臥不安驚悸

安驚悸

人參 一錢 白朮 一錢 茯神 一錢 當歸 二錢 益母 一錢

木香 二分 炙艸 四分 棗仁 一錢 麥冬 一錢 熟地 二錢

治大還 濟陰近編 八 貞白堂

陳皮 四分 圓眼肉 八個

安神丸

黃連 三錢 生地 歸身 各三錢 炙艸 五分 為末 薑汁

為丸 每服四十九

產後喘促

產後喉中氣息喘促者因下血過多榮血暴竭衛氣

無依獨聚于肺故令喘也此名孤陽絕陰最難治

宜芍歸各錢半人參三錢五味子五分或獨參湯

若脾肺氣虛者六君子參朮苓加桔梗若兼外邪

加紫蘇陽氣虛脫補中益氣湯參朮芪喘促多

汗手足俱冷參附湯若瘀血入肺而喘口鼻起黑

氣急用人參一兩蘇木二兩煎服或加附子三錢

亦有得生者此氣虛血散胃絕肺敗之症也

薛立齋治一產婦喘促自汗手足俱冷常以手護腹

此陽氣虛脫用人參附子湯四劑愈

加味生化湯 治產後喘促氣短

川芎 一錢 當歸 二錢 乾薑 四分 炙艸 五分 人參 二錢

桃仁 十二粒 杏仁 一錢

治大還 濟陰近編 九 貞白堂

產後咳逆

產後咳逆乃胃氣虛寒之惡候也宜六君子湯加丁

香附子甚則參附湯若飲食不減午後發熱咳逆

此陰虛虛火也四物湯芍歸芎下大補丸參朮芪

杞山藥山萸 熟地芍藥蓉

產後嘔逆不食

產後嘔逆不食因胃氣虛及飲食過時用六君子參朮

牛陳加藿香虛寒加炮薑木香傷食加麵蘆砂仁

寒水侮土益黃散陳青丁肝木乘脾六君子加柴

胡芍藥命門火衰不能生土。八味丸熟地山黃山藥丹茯苓澤桂

附嘔吐手足俱冷腹痛乃陽氣虛寒也急用附子

理中湯附參朮乾薑

安胃行血湯 治胃氣不和嘔吐不食七日內血塊

川芎 二錢 當歸 四錢 人參 一錢 炙甘草 五分 桃仁 十粒

炙艸 五分 砂仁 四分 藿香 四分 薑煎有汗不用薑

加減六和湯

川芎 一錢 當歸 二錢 乾薑 四分 扁豆 二錢 人參 一錢

白豆蔻 四分 藿香 三分 山藥 一錢 陳皮 三分 炙艸 四分

證治大還 卷之四 十 貞白堂

白茯苓 一錢 薑水煎

益胃升陽湯 治陰泄瀉前陰脫血益氣此方主之

升麻 柴胡 各五分 炙艸 歸身 陳皮 各一錢 人參

錢 神麴 黃芪 各一錢 白朮 一錢 生芩 三錢

心痛加白芍 二分 桂少許

產後唇青肉冷

產後唇青肉冷汗出目眩神昏此非風寒由心脾二臟陽氣虛極耳經曰脾之榮在唇心之液為涕急用參附湯仍灸關元百壯。

產後浮腫

產後飲食少思四肢浮腫此中氣不足也宜補中益

氣湯參朮芪朮歸 六君子湯參朮苓 若飲食不食

手足面目浮腫上為喘促下為泄瀉此肺氣虛寒

也六君子湯加薑桂砂仁飲食不進肚腹腰脚浮

腫小便不利泄瀉不止此腎氣虛寒也加減腎氣

丸熟地山黃山藥丹山藥澤 寒水侮土六君子湯加

桂附水氣浮腫六君子湯加蒼朮以實中氣切忌

淡滲之劑若肚腹浮腫青筋六脉孔滿不勻此效

證治大還 卷之四 十 貞白堂

血乘虛流注也宜小調經散抵聖湯俱本 若敗血

已下小腹重墜益甚此脾下陷也補中益氣湯

杜先生治一婦產後忽患浮腫衆作水氣治不效曰

水氣必咳嗽小便不利今便利而不作嗽獨手足

寒乃血虛氣塞不通故生浮腫也治宜益血和氣

用牡丹皮散愈

一產婦惡露不行瘀塞溺道小便不利遍身浮腫喘急不得臥用牛膝膏門本治之愈抵聖湯

赤芍 半夏 澤蘭 人參 陳皮 甘艸 炒各一錢

生薑 清乾五錢

小調經散 治敗血化水腫脹

沒藥 琥珀 桂心 赤芍 當歸 蒲黃 各一錢

細辛 麝香 五分 酒下五分

牛膝膏

丹皮 大黃 當歸 桂心 桃仁 蒲黃 玄

胡索 香附 瞿麥 川芎 麝香 先用杜牛

三兩水五碗煎減半入上藥煎

諸治大還

濟陰近編卷之四

主 貞白堂

沒藥丸 治敗血流經成癰疽

當歸 一兩 桂心 芍藥 各五錢 桃仁 沒藥 各三錢

蜜虫 水蛭 炒各三十 醋糊丸間用五香連翹湯下

升陽大補湯 治產後血崩并老人崩淋

白朮 三錢 人參 三錢 當歸 三錢 川芎 一錢 黃芪 八錢

生地 熟二錢 升麻 四分 炙艸 五分 荊芥 白芷 各四分

陳皮 五分 黃連 炒四分 防風 一錢 羌活 黃柏 炒各四分

瀉不用 湯加麥冬一錢五味子十粒 瀉加澤

瀉五分連子十粒 白帶加半夏蒼朮各一錢

產後頭痛

產後頭痛因中氣虛用補中益氣湯 參朮芪艸歸柴升 加蔓

荊子因陰血虛用四物湯 熟地芍歸 加參朮氣血俱

虛十全大補湯 八珍加 腎水不能生用加減八味

丸 熟地山萸山藥 風寒所傷補中益氣湯加川芎

蔓荊子

薛立齋治一婦產後患頭痛日用補中益氣湯缺則

痛甚稍勞則惡寒內熱作陽氣虛以前湯加附子

錢而愈

諸治大還

濟陰近編卷之四

主 貞白堂

陳三農治產後頭痛面青日久不止作腎水不能生

肝而血虛用六味丸 熟地山萸山藥 加當歸川芎五

味子而愈

產後脇脹痛

產後兩脇脹痛若因肝經瘀血用延胡索散 本門肝經

氣滯芍歸湯加香附青皮柴胡檳榔木香枳殼桔

梗肝經血虛四物湯 熟地芍歸 加柴胡參朮氣血兩

虛發熱惡寒胸脇脹痛八珍湯 參朮芪艸歸柴升 加柴

胡丹皮薑桂辛溫等藥助脾肺以行藥勢不則反

助其服耳

延胡索散 治產後惡露凝滯

延胡索 桂心各兩 當歸 五靈脂各一兩 熱酒下

二錢

梅師治產後餘血不盡奔上冲心腹悶腹痛以藕汁

二升飲之

治產後腹中鼓脹氣不轉動喘急坐臥不安以麥芽

水一合和酒服

產後身痛

治大還

濟陰近編 卷之四

西

貞白堂

產後遍身疼痛肢體沉重筋脉引急手按痛甚者此

由產間五節開張而瘀血溢滯也用四物湯加桂

心桃仁紅花澤蘭沒藥酒煎服午後痛甚汗出痛

止手按稍可者此血虛也四物加參朮炮薑香附

若遍身作痛惡寒拘急脉浮緊此風寒也用五積

散本門若不詳辨誤認傷寒發汗變痙急當大補氣

血

周慎齋治一婦產後受濕遍身疼痛眾以風藥治之

遂致臥床不起手足漸細此產後氣血虛而風藥

愈損其氣故也治宜大補氣血用參芪各錢半炙

甘草肉桂各一錢當歸三錢防已五分煎服愈

一產婦遍身痛坐不得臥已經二月痰多食減眾治

不效以參歸各一兩木香一錢為末酒煎分為九

次服之愈

養榮壯腎湯 治產後腰痛

當歸 二錢 獨活 桂心 川芎 杜仲 續斷各八分

防風 四分 寄生 八分

產後遍身痛

治大還

濟陰近編 卷之四

五

貞白堂

當歸 二錢 甘草 三分 黃芪 白朮 牛膝各八分

肉桂 八分 茱白 八分

五積散

當歸 芍藥炒 川芎 炮薑 人參 茯苓

陳皮 厚朴 蒼朮 白芷 麻黃 桔梗

半夏 肉桂 甘草 大棗

產後如見鬼神譫語狂妄

產後如見鬼神或言語譫妄皆由心脾血少陰虛煩

熱或瘀血停滯致心神躁動而然瘀血者調經散

本血虛發熱者。八物湯。歸熟地芍藥阿膠炙甘草加炮薑。心虛

血少者。妙香散。龍骨益智參水遠志茯苓神砂生地當歸煎湯

調下。或寧志膏。參桑仁辰砂乳香或栝子仁散。本癲狂者

由血虛神不守舍也。宜補養元氣為主。敗血上冲

大澤蘭散。血虛神不守舍。用茯苓散。本補其心虛

八珍散。參朮茯苓芍藥加遠志茯苓栝子仁。養其氣

血總有痰涎。亦勿宜輕逐。

調經散

沒藥 琥珀 桂心 當歸 芍藥 妙 細辛

證治大還

齊陰近編卷之四

未 貞白堂

麝香 薑汁 溫酒調下二錢

栝子仁散 治產後元氣虛弱。瘀血停滯。狂言。

栝子仁 遠志 琥珀 另研 人參 當歸 生地

桑寄生 防風 甘艸 用羊心一個。煮汁煎藥

茯苓散 治產後心虛驚悸。言語錯亂。

人參 茯苓 遠志 當歸 芍藥 妙 麥門冬

桂心 甘艸 生薑 大棗

蒲黃散 治敗血上冲。頭狂。

乾荷葉 生地 丹皮 濃煎湯調生蒲黃二錢

產後血暈。不知人及狂言。用血竭研細酒下二錢。

產後霍亂。手足逆冷。問無血塊。服此。

白朮 一錢 當歸 二錢 陳皮 四分 乾薑 四分 丁香 四分

甘艸 四分 人參 一錢 附子 五分 為末。每服二錢。米

湯下

產後不語

產後去血過多。心脾腎三經。血少而舌強不能言者。

用參芪歸朮生熟地。因心氣虛不能言者。用七珍

證治大還

齊陰近編卷之四

七 貞白堂

山黃從蓉巴戟白茯苓石斛 五味附子遠志薄麥冬桂 大腸風熱。加味逍遙散

求獲歸芍藥 加白芷防風。脾經風熱。秦艸升麻湯

芎升 芎升 葛芍參防 肝經風熱。柴胡清肝散。柴芍歸生

芎升 加白芷防風。脾氣鬱結。加味歸脾湯。參芪朮

遠志歸艸丹皮 加升麻。肝木太過。小柴胡湯。柴芍

梔圓眼肉蘆藥 加升麻。肝木太過。小柴胡湯。柴芍

湯。參朮苓艸芍 或獨參湯。更不應。急加附子補氣

生血。若單用血藥。則誤矣。

七珍散

人參 石菖蒲 生地 川芎各一兩 防風 五錢

辰砂 五錢 細辛 一錢 薄荷湯下二錢

石蓮散

石蓮 人參 石菖蒲 每服五錢

產後便秘

產後大便秘因去血過多血虛火燥津液因衰故大腸乾澀也。日數雖多不可用通利之藥若泥其日期飲食數多用藥通之致傷中氣則通而不止者有之。利後愈虛愈結者有之。惟宜四物湯瑣陽麻

證治大還

齊陰近編 卷之四

太 貞白堂

仁枳殼人乳之類補血潤腸必至腹滿覺脹欲去不能。糞在直腸以膽汁導之毋傷胃氣可也。

養生化滯湯 治產後大便不通誤服大黃等藥致

肚腹彭脹或腹中血塊不止。

川芎 一錢 當歸 四錢 白芍 一錢 陳皮 四分 人參 一錢

甘艸 二分 白朮 三錢 白茯苓 一錢 桃仁 十粒 香附 三分

大腹皮 五錢 肉豆蔻 一錢五分

助胃潤腸湯

川芎 二錢 當歸 四錢 桃仁 十粒 炙艸 五分 陳皮 四分

麻仁 一錢五分 血塊痛加肉桂玄胡索各五分

氣虛汗多加蒼二三錢黃芪一錢 汗多而喘加

麥冬一錢五分五味子八粒 如大便不通十日

以上脫肛必有燥糞用蜜棗導之。

煉蜜棗法 用好蜜三兩煉至茶褐色先用水濕

棗填蜜在棗上用手作如棗樣插入肛門。

產後瀉利

產後瀉利非脾胃虛不能消化穀食即飲食倍而中

氣致傷若用導水剋削之劑是虛其虛也宜參苓

證治大還

齊陰近編 卷之四

尤 貞白堂

白朮散 參朮苓艸湯或六君子湯 參朮苓

艸藥砂仁久瀉不止用升陽益胃藥中加烏梅肉

豆蔻若飲食少思去後無度或腹痛飲食不化用

人參理中湯 參朮苓乾 薑艸杜加肉豆蔻砂仁

主擔如治產婦瀉隔年不愈六脈沉遲此元氣下陷

寒熱太甚症也然湯藥猶濕也以溫治濕可乎遂

用參朮苓朮肉蔻升麻防風甘艸用猪肚一枚入

蓮肉一斤好酒燉爛搗和為丸日進而安

陳三農治一婦產後滑泄勻水粒米勿容即時泄下

半月餘矣六脉濡緩而弱此產開勞力傷脾也若

用湯藥恐滋胃濕遂以參苓白朮散加肉蔻生薑

棗肉爲丸服愈

參苓蓮子飲

人參二錢 白朮二錢 白芍八分 當歸一錢 白茯苓一錢

炙艸四分 升麻三分 山藥一錢 蓮子十二粒

生化六和湯 治血塊痛未除日患霍亂

川芎二錢 茯苓一錢 當歸四錢 乾薑四錢 炙艸四分

砂仁五分 陳皮四分 藿香四分 薑水煎服

證治大選

濟陰近編 卷之四

辛

真白堂

產後痢

產後痢不拘新久切不可用蕩積分利之劑止宜用

六君子湯 加柴胡炮薑 脾土虛寒加木香藿桂寒

肝木刑脾加柴胡炮薑 脾土虛寒加木香藿桂寒

水侮土益黃散 陳青丁 久痢不止補中益氣湯

柴升 加肉果烏梅 脾腎虛寒補中益氣湯送四

神九 故紙肉蔻 胃氣虛弱而四肢浮腫四君子加

薏苡仁車前子炮薑久而不愈是腎氣虧損也用

四神九 故紙肉蔻 八味丸 熟地山萸山藥 以補足

三陰

健脾消食生化湯

川芎一錢 當歸三錢 炙艸五分 人參三錢 神曲一錢

白朮一錢 麥芽五分 如傷肉加山查砂仁各五分

誤消健胃湯 治產後傷食誤服消導藥每致膨脹

或脇有積塊

人參 白朮各二錢 茯苓一錢 甘艸二分 當歸二錢

陳皮四分 白芍一錢 大腹皮四分 砂仁五分 神曲

一錢 麥芽五分 如傷冷物加吳茱萸

證治大選

濟陰近編 卷之四

主

真白堂

食療治產後瀉血以乾艾炙熟生薑各兩半煎濃湯

服即止

乳汁不通乳汁自出

乳汁乃氣血所化在上爲乳在下爲經冲任脉盛脾

胃氣壯則乳多而濃衰則乳少而淡然壯實婦人

乳汁不通此經氣壅閉也宜湯藥散以疎通氣

脉虛弱婦人雖有不多此脾胃氣血俱虛也八珍

湯 參朮茯苓 加通草天花粉以補養血氣或用

當歸補血湯 歸芪 內歸芪犬補氣血而養乳汁之源

加葱白直走陽明經以通乳汁之渠。外有氣虛

不能約制而乳汁自出者宜四君子。參朮加五味

子。怒動肝膽之火而乳汁自出者柴胡清肝散。柴

歸生地丹連肝經血熱而汁自出者加味逍遙散。

梔芎升朮無子食乳乳不消散結硬腫痛用麥

芽五錢石膏青皮瓜葉甘艸各錢。煎服或用歸

尾赤芍紅花牛膝各五錢通其月事。乳汁下行。

若乳汁不下麥門冬焙爲末犀角一錢煎湯調服。

湧泉散。

證治大選

濟陰近編
卷之四

主
貞白堂

王不留行 穿山甲 通草 瞿麥 天花粉

青皮 氣蹄一隻煮汁煎藥 一方加漏蘆當歸

木通

胞損

因收生不謹致胞損而得淋瀝之症宜峻補以參朮

黃芪煎膏用猪羊胞煎湯調服。

陰挺下脫 一名陰菌

陰挺下脫或因胞絡損傷或因子藏虛冷或因分娩

用力太過或因肝脾氣虛下脫。舒出如蛇翻出如

餅如鷄冠皆用補中益氣湯。參朮芪升補元氣

爲主。若小便澀滯因肝經濕熱者用龍膽瀉肝湯

柴胡車前木通 外用鉄精羊脂二味攪勻敷上

澤柏生地歸尾以熱布裹灸椎上之。

陳三農云產後陰脫宜溫中用人參肉桂玄胡索各

一錢乾薑甘艸各八分。血得溫煖卽行。泄瀉後陰

脫保元湯。參朮加乾薑寒涼藥禁用。

丹溪治一婦陰中下一物如帕有角二岐。此子宮也

乃因氣血虛弱而下宜大補氣以升提之用參芪

證治大選

濟陰近編
卷之四

主
貞白堂

朮各二錢升麻五分服二劑而入但着席一片如

掌落下心恐曰此非腸胃比也。肌肉尚可補完以

四物加參芪服數十劑而安。上症宜用十全大

補湯加白芷續斷。

立齋治一婦陰中挺出一條約四五寸。悶痛重墜。水

出淋漓小便澀滯。朝用補中益氣湯以升補脾氣

夕用龍膽瀉肝湯以分利濕熱而愈。

又治一婦陰中突出如菌四圍腫痛。小便頻數日晡

發熱或痒或痛。小腹重墜。此肝火濕熱而腫痛。

虛下陷而重墜也。以補中益氣湯加山梔車前子而安。

三農治一婦。陰中有一物如石塞之狀。痛不可當。此石瘕也。治以大黃肉桂三稜檳榔桃仁血竭玄胡索澤瀉而愈。

陰腫

產後陰腫。此氣血虛弱。用補中益氣湯舉而升之。如

常陰腫。此肝經濕熱。用龍胆瀉肝湯。柴胡、枳實、前

地黃、清之。產後陰腫。研桃仁敷之。陰腫痛極。馬齒

證治大還

濟陰近編 卷之四

香

貞白堂

莧搗敷。或生瘡。地骨皮煎湯時時洗之。

千金治陰戶疼痛。牛膝五兩酒三升煮升半。分三服。

陰痒

食少體倦。陰中痛痒。此肝脾氣虛濕熱下注也。用歸

脾湯。參朮、芪、朮、茯苓、仁、遠、歸、木、香、圓、眼、肉、薑、棗。加柴胡山梔丹皮芍藥

車前子澤瀉便赤腫悶。陰中痛痒。此肝經濕熱也。

用龍膽瀉肝湯。柴胡、枳實、前、地、黃、澤、柏、生、地、歸、尾。

陰冷

陰冷。因肝經濕熱。內鬱邪氣。乘其本。正氣走于經絡。

間也。用龍膽瀉肝湯加羌防升麻。陰冷。此穀氣實而胃氣下泄也。用豬脂半斤。髮二兩。熬消分二服。

陰瘡

婦人生瘡。乃因七情鬱火。損傷肝脾。濕熱下注故也。

腫痛者。四物。芎、歸、熟、地、芍。加柴胡丹皮山梔龍膽草車前

子澤瀉白芷濕痒者。歸脾湯加山梔柴胡丹皮淋

瀉者。龍膽瀉肝湯加丹皮蒼朮白朮腫悶重墜者。

補中益氣湯。參、朮、芪、朮、歸、柴、升。加山梔丹皮

陰蝕

證治大還

濟陰近編 卷之四

香

貞白堂

陰蝕者。陰中有細虫。附食痒不可當。食入臟腑。令人

發寒熱。與勞症相似。此屬肝脾濕熱下注。所化用

龍膽瀉肝湯。柴胡、枳實、前、地、黃、澤、柏、生、地、歸、尾。加味逍遙散。參、朮、芪、朮、歸、柴、升、草。

梔丹。柴、胡、枳、實、前、地、黃、澤、柏、生、地、歸、尾。以治其內。外用豬肝切片。葱椒猪油炒香

納陰中。俟虫附食。易取之。更以雄黃桃仁明礬花

椒搗塞陰中。

交合遠理陰腫痛出血

婦人交合遠理。陰中腫痛。宜補中益氣湯。參、朮、芪、朮、歸、柴、升、草。

若每交接血出作痛。此肝火動而不能攝血也。

用補中益氣湯加丹皮山梔芍藥。子宮有熱血海不固則交接亦致血出

師尼寡婦獨陰無陽方論

褚澄云凡療師尼寡婦皆當另自製方。蓋此二種寡居獨陰無陽。慾心萌而多不遂。是以陰陽交爭。乍寒乍熱。症類于瘧。久則為勞也。昔倉公治一女子腰背痛寒熱。眾治不效。公曰此欲男子而不可得也。蓋婦人以血為本。今肝脈弦出寸口。是血盛也。男子精盛則思室。女子血盛則懷胎也。用小柴胡湯治大還。濟陰近編卷之四 美 貞白堂

湯柴胡參半 加生地烏梅。抑肝而安。

許學士治一師尼。尋常惡風體倦。乍寒乍熱。面赤心煩。或時自汗。大小柴胡雜進。而益劇。三部脈無寒邪。但肝脈弦長。而出魚際。此獨陰無陽也。用小柴胡湯加生地烏梅而愈。

立齋治一女子寒熱。診其脈左寸弦長。而出寸口。用

小柴胡湯加生地烏梅。奏效而愈。

柴胡抑肝湯 治獨陰無陽寒熱類瘧。

柴胡三錢 青皮一錢 赤芍 丹皮各一錢 地骨皮五分

秦艽 香附 川芎 山梔各一錢 連翹 生地

落脾湯 治寡婦室女思慾不遂。致傷脾胃。飲食少

思。寒熱如瘧。面上或紅或黃。無定色。心脈散亂。腎

脈沉遲緊。不定。皆思想致傷心脾所致。

白朮 當歸各錢 人參 川芎 香附 柴胡

青皮 玄胡索 鬱金 甘艸稍分

生地黃丸 治室女寡婦。獨陰無陽。寒熱似瘧。

生地黃三兩 赤芍一兩 柴胡 秦艽 黃芩各五錢

許治大還 濟陰近編卷之四 毛 貞白堂

香附 川芎各五錢 蜜為丸。烏梅湯下。

室女思慮傷心。經閉成勞。論治。

寇宗奭云。室女童男。積想在心。思慮過度。多致勞損。

男子則神色消散。女子則經水先閉。蓋思慮則傷

心。而血逆竭。故神色散。而月水閉。且心病則不能

養脾。故不嗜食。脾虛則金鬱。故發咳嗽。腎水絕。則

木氣不榮。而四肢乾癢。故多怒。髮焦筋骨痠。五臟

傳遍則死。自能改心。易志。用歸脾湯。參其未獲。仁遠志歸脾

蓮棗 肉 栢子仁丸。補養心脾。庶可保生。切不可用

苦寒之劑復傷胃氣以致不起也

茯苓補心湯 治心氣虛耗不能主血不能制肺肺

得以乘肝肝病則月水枯涸不調此方補心元之

虛抑其肺氣調和榮衛補養血脈

即參蘇飲 蘇葛前杏桔壳 橘茯苓神桑 去木香合四物湯

柏子仁丸

柏子仁 炒牛膝酒洗 卷柏 當歸 芍藥 炒各五錢

澤蘭葉 一兩 蜜丸

濟治大還

濟陰近編
卷之四

天

貞白堂
一五

附李自材先生女科纂

總論

女人天癸未行皆屬少陰天癸既行皆屬厥陰天癸
既絕乃屬太陰二七而任脈通天癸至太冲脉盛
月事以時下夫冲爲血海任主胞絡女子陰類故
經稱癸水三旬一見象月盈虧不失其期因名月
事經行不慎致痼良多雖心爲主血肝爲藏血皆
統攝于脾故補脾和胃則精微上乘和調于五藏
而血生矣凡經行之際禁用寒苦辛散

濟治大還

濟陰近編附纂
卷之五

一

貞白堂
三六五

調經

經將行而痛氣滯也玄胡香附砂仁枳殼 結塊者
氣凝也木香玄胡烏藥 行後而痛血虛也歸芍
芎地 色淡者或爲虛四物湯加人參或爲痰二
陳加香附 紫色者熱也生地黃芩花粉丹皮
黑色者熱極也芩連知柏色黑而黯者寒也四物
加桂炮薑 來少者過期者皆虛寒也八珍湯
至期而口鼻出血者錯經妄行也玄胡丹皮生地
木香白芍歸尾降香 久而不止者或熱者四物

加梳紫。或氣虛不能攝補中益氣湯。三月一

至名曰若經大補氣血兼之疏滯十全大補加香

附砂仁。臍以上痛者脾也白朮陳皮木香炮薑

臍下痛者肝也青皮木香白芍香附當歸而痛者

腎也。按之痛減者虛也十全大補加玄胡木香

手不可近者實也香砂玄胡五靈陳皮川芎當歸

傷脾多少六君子加薑桂。思慮傷脾歸脾湯加

丹皮玄胡。鬱怒傷肝加味逍遙散歸芍苓甘朮
施紫丹皮

瘀血凝滯四物加桃仁紅花蓬朮玄胡肉桂穿山

證治大還濟陰近編附纂
卷之五 二 貞白堂

降香 熱入血室外感而經水適來晝安靜夜譫

語小柴胡加生地丹皮若涎潮昏喘先化其痰導

痰湯半夏茯苓陳皮甘草南
星枳實加竹瀝薑汁

月水不調

血熱者生脉散加生地黃柏。氣虛下陷補中益氣

加艾阿膠。因交感而致者四物加參芪升麻

因勞者十全大補去桂加升麻。因怒者逍遙散

加水香。久而血滑補中益氣加棕灰蓮房石脂

月水下調

因勞傷者十全大補湯。因鬱怒者逍遙散加香附

砂仁

經閉

胞脉屬心。心氣不得下通則胞脉閉而經斷先降心

火丹參黃連茯神麥冬竹葉然後補養八珍湯加

香附玄胡丹皮鬱金。火旺血枯六味丸加知母

黃柏。鬱怒所傷逍遙散加木香。血瘀四物湯

加玄胡香附丹皮蓬朮桃仁紅花山甲。寒閉理

中湯送八味丸。

證治大還濟陰近編附纂
卷之五 三 貞白堂

血崩

經曰陰虛陽搏謂之崩。崩者血大至如山崩也。熱

而赤者為陽。芩柏知母生地白芍甘草龜膠。冷

而淡者或黑黯者為陰。鹿茸桂附薑艾。脉洪手

足心熱心煩口苦色紫黑逍遙散加連柏。心神

不寧火發于心黃連茯神遠志棗仁麥門冬竹葉

丹參。相火炎灼六味丸加知柏龜板。脉沈遲

肢寒血黯或五色或如豆汁十全大補加鹿茸。

脾虛下陷補中益氣加山藥續斷。脾虛有痰六

君加升柴 肝家濕熱龍膽瀉肝湯 木通澤瀉車前常歸生地
柴胡 久必以胃藥收功此要訣也。

赤白帶下

帶脉繫于腰間如束帶之狀或七情內傷六淫外客

成于胞門遂為帶下 肝傷則帶下如青泥加味

逍遙散 肝挾濕熱龍膽瀉肝湯 血不足四物

加人參 心傷下赤帶歸脾湯加竹葉黃連麥冬

升參 思慮傷妙香散 人參黃芪茯苓神甘草 枯梗山藥遠志木香神砂

肺傷色如涕補中益氣加梔芩 脾傷色黃

論治大還 濟陰近編附纂 卷之五 四 貞白堂

六君子加柴梔 腎傷色黑六味丸加梔柏龜板

挾濕痰六君子加葵花 淋瀝腥穢臍臍冷痛此

敗膿也單葉紅葵根白芷白礬白芍蠟丸 瘀血

小腹痛香附五靈脂玄胡蓬朮歸尾桃仁肉桂

白濁白淫

屬腎虛胞傷金鎖正元丹 五倍子補腎脂從蓉巴戟 胡蘆巴戟萆薢骨碎砂

心氣虛歸脾湯 肝家怒火逍遙散 肝家濕熱

龍膽瀉肝湯 腎家不能收攝蓮少丹加龍骨牡

蠣 右尺大六味丸加龜板知柏 師尼寡婦有

欲不遂乍寒乍熱白濁白淫知柏梔柴香附 醋丹炒

皮遠志

前陰諸症

陰腫

風客胞絡與血相搏氣帶不得疎泄如肝家濕熱龍

膽瀉肝湯 鬱怒逍遙散 挾寒補中益氣湯

濕重陰痒

內服龍膽瀉肝湯外以雄黃黃柏桃杏仁熬煎小煎

蛇牀川椒禁湯洗煮豬肝四五片乘熱入戶虫出

論治大還 濟陰近編附纂 卷之五 五 貞白堂

陰冷

吳茱萸肉桂飛鹽綿裹納入三日再易

陰中肉線

陰中白線一條長二三尺動之則痛欲絕先服失笑

散數次以帶皮薑三斤研爛入清油二斤煎油乾

為度用絹兜起肉線于水道以前藥之冷則熨

之一日夜縮其大半二日盡收再服芎藭人參湯

調理之如線斷則不可治矣

陰蝕

或痛或痒狀如虫行淋露濃汁陰蝕幾盡皆由心神

煩鬱胃氣虛衰故曰痛痒皆屬心火陽明主肌肉

法宜補心養胃 肝火為患加味逍遙散間用龍

膽瀉肝湯外以鶴虱子煎洗平胃散加貫衆末每

二錢以熟豬肝拌藥納陰戶中。

他物傷血出

釜底煤同髮灰敷。石脂五倍子搽之。

患鬼魅

夢與鬼交或言笑或悲泣不欲見人脉遲伏狀如鳥

證治大還

齊陰近編附纂

六

貞白堂

喙乍大乍小如鬼魅所憑也參朮歸芪茯苓神遠志

硃砂菖蒲以安其神雄黃丁沈檀冰麝蒼朮桃仁

以解其邪南星半夏香附橘紅牛黃天竺以祛痰

或蘇合丸

懷胎諸則

候胎

時衄血或轉筋者胎也心脉動甚者胎也陰搏陽別

謂之有娠六脉浮沈審無他証而不月者胎也懷

胎三月尺必滑數五月但疾不滑左尺大為男右

尺大為女左右俱大為雙胎今婦南行從後墮之

左回顧是男右回顧是女得諸陽脉為男得諸陰

脉為女

驗胎湯

川芎錢五當歸錢四加艾葉煎服。待半日腹中微痛

乃治。不即痛而血行如不覺再煎服。白朮黃

芩錢五煎聖藥然黃芩犯胃不可多用。

胎忌

雞與糯米同用令子生寸白虫。食鯉魚雞子令子

證治大還

齊陰近編附纂

七

貞白堂

生瘡。食犬令子無聲。食兔令子缺唇。食鱉

令子短項。鴨子同桑椹食倒生。食蟹橫生。

食雀子淫。食薑多指。

藥忌

牛黃 牛膠 薏仁 輕粉 丹皮 桂 麝香

三稜 蓬朮 槐子 桃仁 茅根 半夏藥油

南星 通草 大黃 牽牛 巴豆 木通

皂角 七月以後諸不甚忌惟忌巴黃附子稜蓬

輕粉

十月安胎

初月肝宜地黃白芍人參白朮陳皮甘草生薑二

月膽宜阿膠艾葉丹參人參當歸地黃黃蘗三

月心胞終宜參朮當歸阿膠丹參茯苓神麥冬欲生男者

宜于此月置於牀下勿令人知終紗囊佩雄黃一兩次子美好佩美玉欲子賢良宜讀書史

四月三焦宜甘菊參朮芍歸甘草續斷厚朴五

月脾宜四君子加歸芍黃蘗是月四肢有男女分六月胃

宜參麥冬地黃白朮芍藥甘草生薑大棗是月口鼻皆成

七月肺宜參芪麥冬五味甘草紫苑八月大腸

諸治大還濟陰近編附纂卷之五人白雲

宜縮胎丸陳皮三兩茯苓一兩白朮二兩黃芩五錢為末粥丸服九月腎

宜歸地苓朮麥冬阿膠是月藏府完備十月肥盛人宜

用枳殼四兩甘草七兩末服虛人加減達生散參朮

陳皮甘草血虛加地黃痰加橘紅茯苓

胎前諸症

惡阻

惡食擇食惡心嘔吐挾痰枳殼砂仁茯苓橘紅香附

前胡食滯木香砂仁蒼朮厚朴陳皮甘草脾

胃虛者異功散怒傷者香砂逍遙散不能食

者異功散加香砂

子懸

胎上逼心名子懸枳殼蘇梗砂仁前胡虛者兼進

異功散

內熱脯熱

用逍遙散胃火黃連陳皮白朮枳殼砂仁鬱歸

脾湯加香砂

胎漏

壯盛者不必治虛人四物加阿膠艾葉山梔柴胡

證治大還濟陰近編附纂卷之五九白雲

風熱者紫蘇防風黃芩血熱加味道遙散去

血太多補中益氣加阿膠荊芥跌撲及毒藥傷

胎疼痛欲絕芍歸各一兩煎服加酒日五服胎不

損者即愈胎損者即下

搗搗

因怒手足搗搗釣藤木瓜香附芍歸木香去血者

參苓朮朮膠艾陳皮甘草因毒藥者甘草黑豆

扁豆淡竹葉為末新汲水下

子死腹中

用丹皮桃仁茯苓肉桂赤芍等分丸服立出必效。

胎水腫滿

土不制水血液散。鯉魚湯白朮五兩黃芩四兩當歸白芍各三兩鯉魚煮

煎服。脾虛者六君子加蒼朮大腹皮澤瀉。

腹內鐘鳴

鼠穴前後土酒送三錢立愈。

腹中兒哭

令本婦就地四面拾針數百使胞乳入兒口亦用鼠

穴邊土黃連湯送。

證治大還

齊陰近編附纂

十 貞白堂

臟燥

悲傷棗湯小棗一升甘草三兩大棗十枚水六碗煎三碗分三服 淋腎間虛

熱甚者心煩悶亂若頸項筋攣語澁痰多羚羊角

散羚羊角桑仁生地栝柳五加皮赤芍川芎甘草防風當歸骨碎補海桐皮酒送服 小

便澀少安勞散麥冬通草滑石當歸燈心甘草人參細辛 肝經濕熱

龍膽瀉肝湯龍膽澤瀉車前木通生地當歸山梔黃芩甘草 肝經虛熱

加味逍遙散 腿足轉筋而小便不利急用八味

緩則不救 肺氣虛而短少補中益氣加山藥麥

冬

小產

七情六氣勞動飲食皆可墮產而內熱者多患此症。

第三月屬相火第五月屬脾第七月屬肺凡墮胎

多在此三月當審而治之小產甚于大產宜用心

調攝。先期欲產涼血補氣。過期不產補血行

滯。

鬼胎

上氣虛故邪乘之補正氣為主以雄黃丸行之雄黃

奔草丹砂解肝斯賜蜈蚣一條蜜丸酒送三九 未行再加一九初下清水

證治大還

齊陰近編附纂

十 貞白堂

次下異物或如虫行即愈。

楊子建十產論

一曰正產

十月滿足腰腹作痛胎下漸下穀道挺急繼之漿破

血出便出產矣。

二曰傷產

夫產一月以前忽然腹痛如欲產此名試月未有正

產之候勿令人抱腰。雖當正產用力過早使兒

錯路或橫或倒須待兒順身臨產門然後用力一

送兒卽下生。若腹痛或作或止。名曰弄痛。非正產之候。胎氣未下。穀道未挺。逆胞漿未破。水血未出。雖出而腰腹不痛。未有的候。且令扶行。熟忍如行不得。凭物坐臥。或服安胎藥得安。卽止。慎勿催生。待子逼臨門。方可用力。并藥催生也。血虛者。或胞水已破。血涸者。用雞子黃三四枚服。脉虛無力。加人參氣不順。加砂仁。

三曰催產

漿破血來。臍腹作陣。疼痛腰重。已見正產之候。兒却

證治大還

濟陰近編附纂

三 頁白堂

未生。用藥催之。或累日久而困倦。是正產之候。但兒難生。當服藥以助元氣。此名催產。

四曰凍產

冬月天寒。血凝難產。勿去下衣。滿房着火。煖若陽和。胎卽易下。外用稻草灰乘熱熨之。

五曰熱產

夏月臨盆。不可恣意取涼。損傷胎氣。亦勿令人多熱。氣蒸逼。使產母血沸神昏。

六曰橫產

兒先露手。或出肩臂。此用力過早之故。先推其手。令入。直上漸漸逼身。以中指摩其肩。推上而正之。須產婦仰臥。然後徐徐推上。正之候。其身正。乃用推生藥。方可用力。令兒下生。

七曰倒產

用力太早。致兒不及回轉。便直下。露足。令產母仰臥。推其足入。勿令產母用力。分毫力。亦不得驚恐。使兒自順矣。或用針刺兒腳心。塗鹽少許。卽順。又法以鹽塗兒腳底。用指甲搔之。并以鹽摩母腹上。又以中指取鍋底煤。塗兒足下。卽順生。又取父名書于兒足。卽順。凡橫生逆產。子死腹中。用黑豆一大合。炒熟。長流水與童便合煎服。神效。

八曰偏產

兒身未正。產母用力一迸。致令兒頭偏露。而不得下。須令產母仰臥。輕推兒近上。以手正其頭。然後用力送之。

九曰碍產

兒身已順。爲臍帶攀肩。不能下也。令產母仰臥。輕推

證治大還

濟陰近編附纂

三 頁白堂

兒近上用中指按兒肩理脫臍帶即生矣

十日坐產

兒將欲生其母疲倦久坐椅褥抵其生路急在高處繫一手巾令母手攀之輕輕屈足令兒生下非坐在物上也

盤腸產

臨產母腸先出然後生子產後其腸不收用好醋半杯新汲水七分調勻喫產母面每喫一收三喫收盡

古法用草麻子四十九粒研塗頭頂待腸收

證治大還

齊陰近編附錄

卷之五 五 頁白堂

上急洗去若其腸乾以磨刀水少許溫潤之內用磁石煎湯飲之即收上若以水喫恐驚則氣散也又方用香油五斤煎熱盛盆中約一食時草角末吹鼻取嚏即上又半夏水搗鼻中則上又大紙撚蘸香油點火吹滅使烟薰產母鼻即上又腸出盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之即上忌用腳缸桶之類

總論

凡產婦覺腹內轉動即宜正身仰臥試捏中指中節

跳動臨盆即產若初覺不仰臥以待轉胞或木

產而水瀉下此胞衣已破血水先乾必有逆生難

產之患若胞衣破而不得分娩者急用芎歸乳

香木香枳殼車前煎服如血已耗損芎歸地黃

參芪白朮益母大劑悉飲亦有得生者大抵難

產多山于鬱悶及安逸富貴之家如難產值大寒

時急以大泔紙撚徐徐燒斷臍帶雖兒已死使煖

氣入腹母得復生切勿刀割

催生藥

證治大還

齊陰近編附錄

卷之五 五 頁白堂

必腹腰痛胎墮下漿水破然後服之川芎歸車前子砂仁炒

氣虛多加人參外用草麻三粒巴豆四粒入麝貼

臍中即分娩若胞漿已破惡水來多胎乾難下

以四物湯加入參服又以葱濃煎洗戶更用酥調

滑石末塗產門更服如意散參乳香各一錢硃砂二錢麝香一分為細末

用雞子清一棧調藥未蓋汁化開冷服凡橫生倒生即時順下一

方雲母粉半兩酒溫調服不得增減入口便產萬

不失一橫生難產右腳小指尖灸二壯立產

交骨不開

陰器虛也。芎歸灼過龜板多子。婦人頭髮一握燒存性。人參黃芪一服即效。

下死胎

面赤舌青知胎已死。桂枝一錢。當門子一箇同研酒調服。少頃如手推下。又方用朴硝五錢煎服即下。倦者與參芪芎歸同用。又用水銀硃砂炒丸服一錢更效。

調理法

凡產畢服熱童便一杯不可便臥且閉目坐須臾上證治大還

濟陰近編附纂

去 貞白堂

牀宜仰臥勿側臥。宜豎膝末可伸足高倚牀頭厚鋪褥褥四壁無隙以免賊風。用酸塗鼻或燒醋炭漆器以手從心掄至臍下使惡露不滯。如此三日以防血暈。不問有病無病皆服童便一杯。如善飲者。酒服頻食稀糜粥。蒸熟菜乾。三日後以鯊魚煮淡食少許。如食雞子須攪勻頓服不可食。勿圖者勿食他物。須慎起居。少言語。以百日為度。用苧麻作枕止血暈。安腹上止痛。百日後乃可交合。否則致病。勿輕用發散如芍藥酸寒伐生發。

之氣

產後諸症

胞衣不下

初時用力太過產後體虛不能用力。且外冷乘之則血道凝故胞衣不出。血流入胞上冲心胸喘痛危殆。急宜斷臍帶以少物繫臍。用心先繫然後截斷。不爾則胞上掩心而死。如上法則血不上潮衣當痿縮而下。縱延數日亦不害人。只要產母心安。則養終自下矣。切不可妄用手取多致殺人。

證治大還

濟陰近編附纂

去 貞白堂

治胎衣不下。牛膝一兩。萊子一合。順流水煮大煎服。又方黑豆一合炒熟醋一盞煎三沸分三服。花藍石散

藍石一斤 硫黃四兩 研末紙筋泥封固。一箇待乾入藥鹽白土固口。焙籠內烘令透熟。安在方磚上壘小磚于四圍。入炭于中從下起火。漸上徹經宿炭消取出研細置地。出火毒童便熱酒下一錢。此即療金瘡花石散神效。

二法取夫單衣並井上立出

又法用產母鞋底烘熱熨小腹即下。

又方用阜角刺灰酒送一錢。路旁草鞋灰童便送。

血暈

敗血流入肝經眼花頭旋甚至昏悶其故有三。一因

用心使力多而暈。一因下血多而暈。一因下血少

而暈。先取醋塗口鼻仍煎醋令酸香滿室。暈時

以溫醋噴其面或燒舊漆器如產婦平日惡漆者

勿用。惡露上攻宜失笑散。蒲黃生用五靈脂服

下血多用芎歸湯。芎歸各一兩有痰加二陳。因勞心

證治大還

齊陰近編附錄

卷之五 人 貞白堂

力而暈補中益氣湯同清魂散。澤蘭川芎或用

鹿角燒灰出火毒研末童便酒送即醒。外用半

夏末冷水丸入鼻中無此患。瘀血者兩脇小腹

按之尤痛脈來有力血虛者多不痛或按之痛減

尺必無力。

惡露不下

因勞傷氣血或挾宿冷或風冷干之用失笑散。虛

寒者理中湯加桂枝。或益母草搗汁入童便酒

冲服。

惡露不止

因經血虛傷或挾冷或挾熱。氣熱不能主血六味

丸肝虛不能藏血逍遙散。脾虛不能攝血六君

子加升柴肝風血沸一味防風散。

心腹痛

當分虛實。兒枕痛失笑散。惡露既行而痛八珍

湯。嘔惡六君子。痛瀉六君子送四神丸。肉果

補胃。食滯吞酸噯腐枳實白朮砂仁山查香附。

血虛四物加炮薑參朮。

證治大還

齊陰近編附錄

卷之五 人 貞白堂

不語

產後虛弱敗血悶于心竅心氣通于舌心氣閉舌亦

強矣。七珍散。參芎歸地黃

諸語

敗血于心。七珍散同失笑散。神虛者歸脾湯。挾

風者防風荆芥芎藭歸。感冒風寒惡露不行。

寒熱如瘧晝則明了暮則譫語。四物加琥珀柴胡

黃芩。痰六君子加芎藭香附。

癰狂

因七情敗血冲心澤蘭散

澤蘭扶神柏仁人參白朮川芎當歸首蒲丹參地黃

藥仁遠志辰砂

中風恍惚

五藏俱虛榮衛不足風邪所乘也宜大補氣血為主

專治風則危矣肝火熾盛十全大補加釣藤山

梔心神不足十全大補加扶神藥仁辰砂遠志

虛煩

餘血冲心芎歸玄胡蒲黃虛煩而熱參苓甘草竹

茹黃芩渴麥冬花粉參苓地黃當歸大棗日食

證治大還

濟陰近編附錄卷之五

干

貞白堂

熟蓮肉十次

自汗

汗多亡陽甚而發瘧參附黃芪白朮當歸輕用十

全大補湯

發熱

氣血俱虛十全大補湯熱不止或愈甚急加附子若

悞作火治必致殺人熱甚而渴及小便不利六

味丸同生脉散服

來往寒熱

敗血入肺則熱入脾則寒誤作瘧治謬矣特有刺

痛者敗血也四物加蒲黃玄胡五靈香附但寒

熱無他症者十全大補湯脾虛食少嗜臥補中

益氣湯兼大便不通十全大補湯加茯苓倍參歸

尺脉弱六味丸

瘧

多由敗血而作柴胡芩芍半夏芎歸地黃熱多者

加丹皮山梔寒多者加肉果厚朴生薑若用

消導發散及截藥多致不起久而不已參一兩

證治大還

濟陰近編附錄卷之五

主

貞白堂

歸朮各五錢何首烏七錢生薑五錢三劑即安

腹脹

敗血散于脾則不能運化精微散于胃則不能受納

水穀不可用治脹之藥宜當歸地黃蘇梗同六君

子煎服

水腫

敗血停蓄散布則挾水腫滿小調經湯沒藥琥珀歸

常別其所因分條施治而攻下之劑所必禁也

霍亂

產後見之甚危虛邪襲飲食不消觸冒風冷 渴而
飲水者五苓散 寒多不飲水者理中湯 還來復
丹 有食者霍香正氣散稍愈即用參朮

咳嗽

多因中虛邪易入或寒或熱或風或濕或多食鹽
太早 陰血虛者四物加生脉散 肺氣傷者四
君子加芎歸桔梗麥冬 陰火上炎六味九加參
朮 挾風寒者補中益氣加桔梗紫蘇 瘀血入
肺發喘二味參蘇飲

證治大還

濟陰近編附纂
卷之五

主 貞白堂
三子

血崩

此病得于產後是謂重陽或因七情不謹或服止血
藥致惡血不消故也 因血滯失笑散 血虛歸
芎湯 肝火加味逍遙散 脾不聚血歸脾湯
脾氣虛不能攝血補中益氣湯 厚味積熱清胃
湯 風熱相搏四君子加防風枳殼

淋閉

內虛熱客脾中 膀胱虛熱六味丸 陰虛而陽無
以化六味九加知柏 脾肺虛者補中益氣湯

外用鹽填滿臍中束葱白餅大艾炷灸熱氣入腹
便通大驗

小便不禁

因胞破者唯數日內治之八珍湯加黃芪入豬脾
腎虛者益智地黃覆盆桑螵蛸 脾虛者補中益
氣湯加益智仁或用雞內金并腸一具燒為末酒
服一錢

產門不開

勞力太過陰脫挺出逼迫腫痛 勞傷者硫黃散
證治大還 濟陰近編附纂 卷之五 主 貞白堂
三子

海螵蛸五味子 或桃仁枯凡五倍子為末敷之

服補中益氣湯外用蛇床煎洗或炒熨 有竟脫
落者服八珍湯一百帖自滿 暴怒肝火龍膽瀉
肝湯 生腸不收五倍白凡煎湯洗之

乳少

氣血虛弱經絡不調所致 乳汁勿投地虫蟻食令
無乳乳溢可潑東壁土上佳 如血氣盛而難閉
用冬葵子炒砂仁炒等分為末酒調服 又用土
瓜根漏蘆各三兩通草四兩甘草二兩水八碗煎

三碗分三服。又穿山甲為末酒服一錢。又通

草同豬蹄煮食糯米各半。合菖蒲子一合。生甘

草五錢水煎分三服。如血氣虛而不行。土露散

芍歸參苓芍桔 十全大補湯加酒服。又方王

不留行一錢。山甲五分。虛加參芪歸朮地黃

壯盛人加通草土瓜根漏蘆。

乳自出

氣虛之故。四君子加棗仁五味 未產前乳先出

名乳泣子多不育。氣血俱虛。十全大補湯 肝

證治大還

濟陰近編附纂

卷之五 真白堂

經血熱加味逍遙散 肝脾鬱怒加味歸脾湯

出如湧泉甚而昏暈者名乳厥。先以獨參湯灌之

更以大補湯服數十劑方妥。或無兒飲乳寒熱

腫脹麥芽三兩炒煎服立消

吹乳

兒吹者因母與兒俱睡。呼氣不通吹積乳內遂成腫

硬若不急治變成癰疽 阜角散 阜角炒蛤粉等

又方乳香一錢括瑗實一個切勻酒服。外用南

星末溫酒調塗之。或用陳皮一兩甘草一錢煎

服 外用荆芥羌活煎湯薰洗。吹乳將癰。忌房

塗之內用蔓荊子搗爛酒服以渣敷患處。或阜

角五兩取汁硝石半兩煎膏敷之。又葵根及子

末酒服三錢。

如乳

乳頭小瘡黃汁浸淫經來累月名妬乳。赤龍皮湯

柳皮三升切碎水 治乳初腫痛內消方 瓜蒌一

十碗煎五碗洗之 草一寸生薑一 少頃去敗乳再服即愈。

同乳

證治大還

濟陰近編附纂

卷之五 真白堂

無子飲乳欲通導者神曲炒研服二錢即回外用脚

餅和乳一夜即回

喘

產後發喘極危此下血多。衝氣無主名孤陽。陰難

治服奪命丹 附子丹皮乾漆 血去喘自定 脾肺

氣虛六君子加桔梗。兼外邪加防風紫蘇。中

氣虛寒補中益氣加薑桂。虛脫加附子。瘀血

入肺人參附子。

證治大還序

昔范文正謂士君子不爲良相則爲良醫謂是二者皆可以救世爲仁人之事也夫世逐人而救之所救幾何是故燮理陰陽相之職也陰陽和斯群生

序一

風俗淳龐凶疫天瘡之害

不生此其道通于醫而孫思邈曰不明陰陽不可爲醫於是有五運六氣之辨有補泄制化之宜易所謂裁成天地之道輔相天地之宜以左右民相與醫共

矣然而良相良醫皆不世出之人使其道法精義不著之於書而傳之于後則其救世之心亦止及其世而止左氏稱醫和謂趙孟曰上醫醫國其次醫人而不傳後之國與人將何賴

序二

嘗讀素問靈樞諸經研晰

陰陽之妙至精至神其理一本大易文字離奇自是周秦間人與莊子同時之手筆也而隱其名託之于岐伯鬼臾區意必聖人之徒通陰陽之故抱燮理之

才不得行其道于世而發其救世之心於此一書知世不可以相救而猶可以醫拯自真仁人而隱者也自倉扁以來皆習此書著述益盛然或語焉而不精而未詳讀其書者又或守

序三

訖未能變通而神明之至於以救世之方用之足以害世亦猶介甫之以周禮誤宋世之天下也可不畏哉明王宇泰庶常著有證治準繩輯諸家之大全分爲五科曰脈曰因曰病曰

證曰治脈察諸未形者也因則其所感也病分十二經絡證其見之於外者也治則其方也明是五者而醫之事備矣而獨名爲證治者以其言是二者獨詳世之不知病不察脈者皆

序四

誣以求治也特其篇卷浩濶初學之輩未易觀覽且窮阨下邑無力購求至沒世不得一覩雲間陳子山農憫世醫之惘惘于是五法也于是掇其最精補其未及目爲證治大還蓋明


其書之所載者精之又精猶九
轉之丹真足起死而還生也宇
泰自言其于醫有天性焉山農
詞壇名士也今悉棄去顧獨好
醫與余交最久年來每多痰疾
不能奏効者輒爲立起嘗

序五

云人生旣不能治于世庶
幾其治于人之疾乎雖亦由天
性要其自命不小與宇泰皆以
文正公之志爲志者也此書出
行世必廣使學醫者人得挾一
冊以救世較宇泰救世之心其

効更宏遠矣

康熙庚戌冬月合肥龔鼎孳題



序六

證治大還序

語云不爲良相則爲良醫甚矣
醫之道直與秉鈞燮理等也醫
可湯言哉又云醫不三世不服
其藥則醫之功尤在乎久且專
又可湯言乎哉三農陳子

一

間名儒久困場屋不惟工
高文工書画而復精於醫余交
三農最早知之亦最深及其北
至都門遊於諸公卿間文章譽
望鑒鑒有聲如益都馮中堂合
肥龔宗伯西泠嚴中丞真定梁

司農皆文酒達還晨夕靡間余
亦時得造膝欵洽追維疇昔足
稱一時盛事云今陳君老矣年
來隱於軒岐之術活人無竿足
迹半天下昨歲念余爲舊交來

東波對之餘謂余曰人生

工

不朽者三事自分草莽無
以德之可立意者其立言之一
端庶幾其可勉乎出其五世祖
霞山公所著證治大還一書三
農加之經驗諸論欲付剞劂以
公宇內請余數言弁之則三農

之醫不惟三世而且五世所由
來者久矣自叙云霞山公著書
立業於宦遊之日製藥餌以施
病者楚豫之民全活殆無筭解
祖歸里門朝投劑而夕起遠近

再上者尤無算其先世活

三

功當與于公等而箕裘不
替與書香並垂今三農琴書之
外裹以藥囊日以利濟爲懷樂
善不倦此書之傳實有裨益于
天下後世豈與近日之一傳再
傳僅拾他人之唾餘者可同日

而語哉宜其急於付梓而公之
宇內也詩有云貽厥孫謀以燕
翼子乃或有一世二世而弗克
繩祖武者三農此舉真仁人孝
子之用心不忍忘祖德也殊令

敢可羨因樂於捐俸以助

四

升叙及其始末以爲陳氏
之祖若孫而世其傳者幸更爲
天下後世之讀其書者幸也
康熙歲次丁丑長夏大興張天
覺撰



傷寒近小序

聖王治世澤及民生物命孳孳揆理無所不極其至
調和陰陽洞測性理內則慮夫七情戕於中表則防
其六淫襲於外不無其病卽有其治或曰病以何證
爲難治曰惟傷寒爲難曰然則曷以傷寒爲近乎曰
惟其難所以不可遠也仲景著傷寒論後如成無已
之詳註方執中之條辨鉛槧不一代有其人而學之
者不入萬花谷中莫不驚心艷目而企羨之然究不
正而合也因曰書有成規地有異宜辭

傷寒近
小序

貞白堂

千里之確而有當燕趙魯衛之邦近西北

者土敦而風冽人多剛競宜宗仲景法以治之則得
心而應手吳楚閩粵之方近東南者土潤風和人多
柔弱宜宗節菴法以治之則病瘳而易起故曰節菴
一人頓起沉淪方趨捷要藥類躬親庶幾不遠毋乃
近乎

康熙三十六年山農陳治自叙於粵東端州之文來
閣

證治大還 傷寒近目錄

前集 卷之一

熱論

仲景傷寒例

傷寒脉法

傷寒六經正治

傷寒見證識病治例

傷寒近前集
卷之一目錄

貞白堂

陳氏傷寒近 前集

雲間陳 治三農甫述

門人范 枋壽民
王 顧贊皇
男 枋璣先
師 柴燕思校

執論

黃帝問曰。今夫熱病者。皆傷寒之類也。或愈或死。其死皆以六七日之間。其愈皆以十日以上者。何也。不知其解。願聞其故。岐伯曰。巨陽者。諸陽之屬也。其脈連于風府。故為諸陽主氣也。人之傷于寒也。則為病熱。然其甚不死。其兩感于寒而病者。必不

證治本選

傷寒近
卷之一

一

貞白堂

免于死。帝曰。願聞其狀。岐伯曰。傷寒一日。巨陽受之。故頭項痛。腰脊強。二日陽明受之。陽明主肉。其脈俠鼻絡于目。故身熱目疼。而鼻乾不得臥也。三日少陽受之。少陽主膽。其脈循脇絡于耳。故胸脇痛。而耳聾。三陽經絡皆受其病。而未入于臟者。故可汗而已。四日太陰受之。太陰脈布胃中。絡于噤。故腹滿而噤。五日少陰受之。少陰脈貫腎絡于肺。緊舌。本故口燥舌乾而渴。六日厥陰受之。厥陰脈循陰器而絡于肝。故煩滿而囊縮。三陰三陽。五

證治本選

傷寒近
卷之一

十一

貞白堂

臟六腑。皆受病。榮衛不行。五臟不通。則死矣。其不兩感於寒者。七日巨陽病衰。頭痛稍愈。八日陽明病衰。身熱少愈。九日少陽病衰。耳聾微聞。十日太陰病衰。腹減如故。則思食。十一日少陰病衰。渴止不滿。舌乾已而嚏。十二日厥陰病衰。囊縱小腹微下。大氣皆去。病日已矣。帝曰。治之奈何。岐伯曰。治之各通其臟脈。病日衰已矣。其未滿三日可汗而已。其滿三日可泄而已。帝曰。熱病已愈。時有所遺者。何也。岐伯曰。諸遺者。熱甚而強食之。故有所遺也。若此者。皆病已衰而熱有所藏。因其穀氣相薄。兩熱相合。故有所遺也。帝曰。善。治遺奈何。岐伯曰。視其虛實。調其逆從。可使必已。帝曰。病熱當何禁之。岐伯曰。病熱少愈。食肉則復多。食則遺。此其禁也。帝曰。其病兩感於寒者。其脈應與其病形何如。岐伯曰。兩感于寒者。病一日。則巨陽與少陰俱病。則頭痛。口乾而煩滿。二日則陽明與太陰俱病。則腹滿身熱。不欲食。譫言。三日則少陽與厥陰俱病。則耳聾囊縮。而厥水漿不入。不知人。三日死。帝曰。

五臟已傷。六腑不通。榮衛不行。如是之後。三日乃死何也。岐伯曰。陽明十二經絡之長也。其血氣盛。故不知人。三日其氣乃盡。故死矣。凡病傷寒而成。瀉者。先夏至為病溫。後夏至為病暑。暑當與汗皆出。勿止。

仲景傷寒例

陰陽大論云。春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣凜冽。此則四時正氣之序也。

冬時嚴寒。萬物收藏。君子固密。則不傷于寒。觸冒之

證治大還

傷寒例
卷之一

三

貞白堂
書

者乃名傷寒耳。

其傷於四時之氣者。皆能為病。以傷寒為毒者。以其最成殺厲之氣也。

中而即病者。名曰傷寒。不即病者。寒熱藏于肌膚。至春變為溫病。至夏變為暑病。暑病者。熱極重于溫也。是以辛苦之人。春夏多溫熱病。皆由冬時觸寒所致。非時行之氣也。凡時行者。春時變燠。而復大寒。夏時應大熱。而反大涼。秋時應涼。而反大熱。冬時應寒。而反大溫。此非其時。而有其氣。是以一歲

之中。長幼之病。多相似者。此其時行之氣也。

夫欲候知四時正氣為病。及時行疫氣之法。皆當按斗曆占之。

九月霜降節後。宜漸寒。向冬大寒。至正月雨水節後。宜解也。所以謂之雨水者。以冰雪解。而為雨水故也。至驚蟄二月節後。氣漸和。暖向夏大熱。至秋便涼。

從霜降以後。至春分以前。凡有觸冒霜露。體中寒。即為者。謂之傷寒也。

證治大還

傷寒例
卷之一

四

貞白堂
書

其有非節之暖者。名曰冬溫。冬溫之毒。與傷寒大異。冬溫復有先後。更相重沓。亦有輕重。為治不同。症如後章。

從立春節後。其中無暴大寒。又不冰雪。而有人壯熱為病者。此屬春時陽氣。發于冬時伏寒。變為溫病。成云。此為溫病也。內經云。冬傷于寒。春必病溫。從春分以後。至秋分節前。天有暴寒者。皆為時行寒疫也。三月四月。或有暴寒。其時陽氣尚弱。為寒所折。病熱猶輕。五月六月。陽氣已盛。為寒所折。病熱

則重。七月八月陽氣已衰，為寒所折，病熱亦微，其病與溫及暑病相似，但治有殊耳。

近云：此時天氣漸熱，一時不正之寒感之，包時令熱氣在內，故發為疫病，非冬傷寒之謂也。故成云：此疫氣也。

十五日得一氣，于四時之中，一時有六氣，四六名為二十四氣。

成云：節氣十二，中氣十二，共二十四。內經曰：五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之

證治大還

傷寒近卷之一

五

貞白堂

歲

近云：節氣者，如立春正月節之類也。中氣者，如雨水、正月中之類也。

然氣候亦有應至而不至，或有未應至而至者，或有不應至而不至者，或有至而太過者，皆成病氣也。金樞要畧曰：冬至之後，甲子夜半少陽起，少陰之時，陽始生，天得溫和。以未得甲子，天因溫和，此為未至而至也。以得甲子，而天未溫和，此為至而不至也。以得甲子，而天大寒不解，此為至而不去也。以得甲

子，而天溫如盛夏，五六月時，此為至而太過也。內經曰：至而和則平，至而甚則病，至而反者病，至而不至者病，未至而至者病。

近云：非特冬為然，餘三時亦當以此法觀之。但冬甲子，尤一歲氣運所關耳。

但天地動靜，陰陽鼓擊者，各正一氣耳。

成云：天地之氣，鼓擊而生，春夏秋冬，寒熱溫涼，各正一氣也。

是以彼春之暖為夏之暑，彼秋之忿為冬之怒。

證治大還

傷寒近卷之一

六

貞白堂

成云：春暖為夏暑，從生而至長也。秋忿為冬怒，從肅而至殺也。

是故冬至之後，一陽爻升，一陰爻降也。夏至之後，一陽氣下，一陰氣上也。斯則冬夏二至，陰陽合也。春秋二分，陰陽離也。陰陽交易，人變病焉。

此君子春夏養陽，秋冬養陰，順天地之剛柔也。小人觸冒，必嬰暴疹，須知毒烈之氣，留在何經而發，何病詳而取之。

是以春傷于風，夏必發泄，夏傷于暑，秋必病瘧，秋傷

于濕冬必咳嗽。冬傷于寒春必病溫。此必然之道。可不審明之。

成云。當春之時。風氣大行。春傷于風。風氣通于肝。肝以春適王。風雖入之。不能即發。至夏肝衰。然後始動。風淫末疾。則當發于四肢。夏以陽氣外盛。風不能外發。故攻內而為飧泄。飧泄者。下利米穀不化而色黃。當秋之時。濕氣大行。秋傷于濕。濕則干於肺。肺以秋適王。濕雖入之。不能即發。至冬肝衰。然後濕始動也。雨淫腹疾。則當

證治大遺

傷寒近
卷之一

七

真白堂
書三

發為下利。冬以陽氣濕氣不能下行。故上逆而為咳嗽。當夏之時。暑氣大行。夏傷于暑。夏以陰主內。暑雖入之。勢未能動。及秋陰出。而陽為內主。然後暑動傳陰。而為痄瘧。痄者。二日一發。瘧者。一日一發。當冬之時。寒氣大行。冬傷于寒。冬以陽為主。內陽雖入之。勢未能動。及春陽出。而陰為內主。然後寒動傳陽。而為溫病。是感冒四時正氣為痛。必然之道。

傷寒脉法。

傷寒之脉。浮大動滑。數為陽。沈澁弱弦微為陰。其弦

緊浮滑沈澁六者。為成賊之脉。浮沈遲數為客重。夫寒邪傷人。先自皮膚肌肉。次及筋骨腸胃。從淺入深。宜以浮中沈三脉。拘之。再以三脉內。詳察有力無力。及遲數虛實。辨其表裡陰陽寒熱。而施治。諸浮為在表。輕手于皮膚之上。便得曰浮。屬陽。浮緊為寒傷榮。浮緩為風傷衛。浮而長。太陽陽明合病。浮而弦。太陽少陽合病。略重指于皮膚之下。肌肉之間。陰陽各半得之。為中。屬半表半裡症。乃少

證治大遺

傷寒近
卷之一

八

真白堂
書三

陽明二經微洪而長。為在陽明之經。洪長有力。為在陽明之腑。浮長有力。尚兼太陽。表未解。弦數為少陽經。諸沈為在裡。重手按至肌肉之下。筋骨之間。方得曰沈。屬陰。沈細為太陰。沈滑為少陰。沈弦為厥陰。諸遲為在臟。屬寒。諸數為在腑。屬熱。陰陽寒熱虛實。皆在有力無力中。分有力為陽。為熱。為實。無力為陰。為寒。為虛。雜症以弦為陽。傷寒以弦為陰。雜症以緩為弱。傷寒以緩為和。雜症以澁為血少。傷寒以澁為無汗。傷寒以大為病進。以緩

為邪退大為邪盛故病進緩雜症以脉歇至為正

氣脫傷寒因邪氣壅塞經絡而不得疎通也雜症

以脉伏為病篤傷寒見表症而脉伏者由寒邪鬱

閉而不泄得汗則脉自出也見裡症而脉伏者由

熱邪陷結而不通得利其脉自來也傷寒脉中有

力即為有神兩手無脉曰雙伏一手無脉曰單伏

此重陰盒雨之象必有正汗也如病初起頭痛發

熱惡寒而脉伏者緣陰邪鬱閉其陽不得伸越故

伏也伏而數為熱伏而遲為寒兩寸皆伏為邪鬱胸中滿前見之為陽伏關後見之為陰

證治大選

傷寒近

九

貞白堂

此欲汗而當攻之若七八日以來無形尅症候

但昏冒不知人事或脉全無者此欲自汗而不必

攻也寸口陽脉中或見沈細無力者為陽中伏陰

尺部陰脉中或見沈數有力者為陰中伏陽寸口

數大有力為重陽尺部沈細無力為重陰寸口微

細如絲為脫陽外臺云脉連連如蛛絲者陽氣衰也尺部見之為脫

陰寸口浮而有力主寒邪表實宜汗寸口浮緩無

力主風邪表虛宜實尺脉沈而有力主陽邪在裡

為實宜下無力主陰邪在裡宜溫浮散而虛及尺

中遲弱者不可發汗沈微沈細沈遲沈伏無力皆

為陰盛陽虛宜急生脉回陽陳三農曰以左尺浮

補以左尺屬膀胱兩寸浮弱宜沈疾沈實沈滑有力皆為陽盛

陰微急宜養陰退陽傷寒過經及老幼元氣虛弱

但以元氣中畧覺有力即宜緩藥下之寸脉弱而

無力切忌發汗尺脉弱而無力切忌汗下陽微陰

牆者不可汗下按之來疾去遲名內虛外實去疾

來遲名內實外虛來為陽去為陰由內為陰尺寸

不同名曰緩緩者和而生也純弦之脉名曰負負

證治大選

傷寒近

十

貞白堂

死按之解索名曰陰陽離離者亡汗下後脉靜

者生躁亂身熱者死溫之後脉來歇止者正氣脫

而不復生也陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死

傷寒六經正治六經症須細辨用藥期治不差而奏功速矣

尺寸俱浮者太陽受病也太陽生一身之表其經行

身之後上連風府故頭項痛腰脊強發熱惡寒惡

心是足太陽膀胱經症其標本則膀胱小腸也假

如先起惡寒者本病已後發熱煩渴小便不利者

標病若有一毫頭痛惡寒不拘日數多少便宜發

散然亦有二焉。太陽經有風寒榮衛之分如頭痛

骨疼發熱惡寒無汗。脈浮緊有力。此寒傷榮也。勝

經寒。宜升陽發表。冬月麻黃湯。麻桂輕者芍藥散。

芍藥散。柴胡汗後外熱不止。敗毒散。羌獨柴胡二

羌半陳茯苓。汗後外熱不止。敗毒散。羌獨柴胡二

其本人本虛不可發汗。補中益氣湯。參芪朮草加

川芎羌活。暴感風邪。三時皆用羌活中和湯。羌防

草蒼。夏月更加滑石知母。如頭痛鼻塞發熱惡

風自汗。脈浮緩無力。此風傷衛也。勝脫經宜疎邪

中表。冬月桂枝湯。桂枝已汗而身熱不退。參蘇飲

治大還。陽寒近卷之一。士真白堂

已罷裡症又無。其人體痛不休者。乃發汗多榮衛

不和所致。小建中湯。芍桂脈浮煩渴。小便不利。乃

熱結膀胱本也。宜引而竭之。五苓散。猪桂

尺寸俱長者。陽明受病也。其經為表之裡。行于身之

前。其脈挾鼻絡目。故目痛鼻乾不眠。頭額痛微惡

寒。是足陽明胃經症。然有在經在府之分。陽明病

而咽痛者。用葛根甘草湯。如先起目痛鼻乾微惡

寒發熱無汗。不得臥。脈微洪。是陽明經本病。宜解

肌為根解肌湯。葛芍身熱汗自出。不惡寒。渴而

有汗不解。或經汗後不解。而渴。脈長大。是陽明經

本病。表裡俱熱也。人參白虎湯。參荷無汗不渴者

不宜服。下症已具。而大便自調者。白虎湯。葛知

如已後潮熱自汗。諸語發渴。不惡寒。反怕熱。大

便實。脈沈數。是正陽明胃府標病。標宜急下。輕則

大柴胡。柴芍芩半重則三承氣選用。

寸俱弦者。少陽受病也。其經為半表半裡。行於身

側。循脇絡耳。故耳聾脇痛寒熱嘔而口苦舌乾

治大還。陽寒近卷之一。三真白堂

不足少陽膽經症。緣膽無出入。病在半表半裡。不

從標本。從乎中治。蓋表宜汗。裡宜下。在半表半裡

之中。故用小柴胡。柴芍參一湯和解表裡也。頭角

痛耳中痛耳上下腫痛。皆是少陽部分。火邪為之

不可汗。汗則譫語煩悸。口苦者。膽熱也。脇下硬痛

胸滿嘔吐。心下痞悶。皆邪熱結於少陽經也。兩耳

無聞。目赤胸滿而煩。風熱上塞也。不可吐下。吐下

則驚悸。俱宜小柴胡湯加減。傷寒三日少陽脈小

者。欲已也。

尺寸俱細者邪氣傳陰太陰受病也其脉在胃中

絡於噎故腹滿自利津不到咽時腹自痛手足溫

者是足太陰脾經症假如先起腹滿咽乾者本症

已後身熱目黃者標病至陰經則有屬熱屬寒之

別不可混治如脉沉實有力腹滿咽乾發黃者此

屬府熱腹痛者桂枝大黃湯桂芍草大黃實柴身目黃者

茵陳大黃湯大黃茵陳黃芩草朴脉沈細無力自利不渴

或嘔吐者此屬藏寒加味理中湯乾薑朮參草桂陳甚則

陽急救湯熟附乾薑桂草脉陽微陰濇而長者

證治八選 三 貞白堂

八寸俱微而微者邪傳裡深少陰受病也其脉貫

腎絡肺係舌本故舌乾口燥但欲寐者氣行于陰

而不行于陽也是足少陰腎經症假如先起舌乾

口燥者本病已後譫語大便實者標病至陰經則

難拘定法有陰分自中寒症者有傳經熱症者或

可溫或可下或可汗或不可汗宜以脉症細辨如

脉來沈實有力口燥咽乾渴而譫語大便實或連

臍硬痛或下利清水或心下硬痛俱是邪熱燥屎

使然急用六一承氣湯補黃實朴柴芍芍草分輕重下之

如少陰始病反發熱脉沈為邪在經宜麻黃附子

細辛湯汗之如脉沈細數為病在裡不可汗脉微

亡陽不可汗尺脉弱濇不可下少陰病脉微至七

八日自下利脉暴微手足溫緊脉去自愈如脉

見沈遲無力無熱惡寒身倦臥不渴或腹痛嘔

吐瀉利沈重或身如被杖或陰毒指甲唇舌俱青

或面如刀刮戰慄俱是寒邪中裡使然急用回陽

救急湯熟附乾薑桂草溫之陽脉微陰脉浮者愈

證治八選 卷之一 七 貞白堂

如惡寒而倦時時自煩欲去衣被者可治吐利

手足不逆冷反發熱者不死少陰病八九日一身

盡熱者此熱在膀胱也必便血如惡寒身倦而

利手足逆冷或四逆惡寒身倦無脉不煩而躁或

吐利煩躁四逆或下利頭眩時時自冒身冷皆死

尺寸俱微者厥陰受病也其脉循陰器絡于肝故

煩滿消渴囊縮或唇青舌卷筋急是足厥陰肝經

症假如先起消渴煩滿者本病已後舌卷囊縮者

標病亦有寒熱兩端不可誤作熱治如脉來沈實

消渴煩滿舌卷囊縮此陽勝陰竭也或手足乍冷

乍溫大便實者此屬熱症急用六一承氣湯補黃

茯苓如脉來沈遲口吐涎沫四肢厥冷上過肘

膝小腹絞痛嘔逆不渴者此屬寒症急用回陽救

逆湯熟附乾薑桂草加減脉浮緩似糖不嘔清便

者自愈

傷寒見證識病治例

凡看傷寒先須識症如三陽經太陽有陰陽榮衛之

陽明有在經在府之異少陽有半表半裏之中

證治大遺

五 頁白雲

陰有屬熱屬寒之別察得陰陽表裡寒熱虛實

親切方可用汗吐下溫和解之法經曰陽盛陰虛

汗之則死下之則愈陰盛陽虛汗之則愈下之則

死又曰桂枝下咽陽盛則驚承氣入胃陰盛乃亡

凡看傷寒先觀兩目次看口舌後以手按其心胸

至小腹有無痛處如目眇黃準頭明山根亮必為

欲愈之症如眼胞陷下瞪目直視睛不明神已竭

不能照物者皆難治也先看兩目或黃或赤開

目欲見人屬陽閉目不欲見人屬陰如目赤六脉

洪大有力躁渴譫妄此陽毒也輕則三黃石膏湯

連芩知草重則大承氣湯補黃白睛黃為疳症如

小水不利或赤或周身關節疼痛兼小腹脹滿為

濕家發黃茵陳五苓散茵陳防蘇若渴而大

熱大便實脉沈實有力為鬱熱發黃茵陳湯茵陳

次看口舌有無胎狀如見胎滑白色者邪未入

府屬半表半裏症宜小柴胡湯柴胡參和解舌上

黃胎者胃府有邪熱也大便燥實脉沈而有力大

陽者調胃承氣湯硝黃下之若脉不沈微渴者猶

證治大遺

六 頁白雲

表症還宜小柴胡湯舌上黑胎生刺者是熱氣

亢極也冬月十有九死夏月猶是內外之火相灼

庶猶可治急用大承氣湯硝黃下之無疑目閉者

為魂絕不治凡舌腫舌裂舌燥舌刺舌黑皆甚

也舌硬舌短舌強神氣昏死症也後以手按

其心胸至小腹有無痛處若按之當心下硬痛手

不可近躁渴譫語大便實脉沈實有力已經下者

為結胸急用大陷胸湯黃芩加枳桔黃連下之量

元氣虛實宜從緩治若按之心腹雖滿悶不痛未

經下者尚為在表未入于府乃邪氣填蓄胸中止
 宜小柴胡湯加枳桔以治其悶或以小柴胡湯
 參半合小陷胸湯連半服之或用疎邪流氣飲朱
 乾烏大腹瓜尤捷若按之當心下脹滿而不痛者
 是痞滿也宜瀉心湯加枳桔若按之覺小腹硬
 痛更問小便通利否如小便不利大便黑或身黃
 譫妄躁渴脉沈實者是蓄血也宜桃仁承氣湯大
 下盡黑物而愈若按之小腹但脹滿不
 痛不硬小便不利此津液留結而渴滿也五苓散
 治之
 論治大還 七 真白堂
 加減利之不可大利恐耗津液反致大便
 硬而不通也若按之小腹硬痛口渴小便
 短赤大便實者燥糞也大承氣湯枳朴下之若
 覺發熱惡寒頭痛腰脊強脉浮不拘日數多少即
 是太陽表症便宜解散經曰擬欲攻之猶當解散
 乃可下若不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂利
 煩躁諸變不可勝數矣若見腹痛咽乾而渴身
 無熱手足溫脉沈有力即陽經熱邪傳入太陰裡
 症便宜下之如腹痛自利不渴惡寒手足厥冷

脉沈無力此太陰直受寒邪不係熱邪傳入太陰
 宜溫之若見口燥咽乾而渴妄語怕熱大便閉
 或微利清水而大渴脉沈有力即是陽經熱邪傳
 入少陰裡症不拘日數多少急宜下之如腹痛
 泄利嘔吐怕寒手足厥冷不渴脉沈無力此是少
 陰自受寒邪而為陰症急宜溫之若見舌卷囊
 縮而渴身不熱外雖四肢微冷內有實熱脉來沈
 緩有力大便閉即是陽經熱邪傳入厥陰裡症急
 宜下之如腹痛瀉利口吐涎沫嘔吐不渴怕寒
 論治大還 六 真白堂
 四肢厥冷小便清白脉微無力此是厥陰自中寒
 邪急宜溫之若先起頭痛惡寒已後傳裡頭痛
 惡寒皆陰反怕熱譫語或潮熱自汗大便不通或
 揭去衣被揚手擲足或發斑黃狂亂此為陽經自
 表傳入陰經之熱症俱宜攻之設或當下失下變
 出手足乍冷乍熱此陽極發厥即陽症似陰名曰
 陽厥急宜下之又又有失于汗下或本陽症誤認為
 陰反投熱藥使熱毒入深陽氣獨盛陰氣暴絕登
 高而歌棄衣而走罵詈叫喊躁渴欲死面赤眼紅

證治八選

元 真白堂

身發斑黃或下利黃赤六脉洪大。名曰陽毒。急用酸苦之藥。令陰氣復而大汗解矣。若大便實者。又當大寒之藥下之。此與如狂不同治。如服藥不効。斑爛皮膚。手足皮俱脫。昏不知人。宜三黃白湯。連苓栢玄 若初病無頭疼。身熱。就怕寒厥冷。或腹痛嘔吐。瀉利不渴。倦臥沈重。戰慄。脉沈細。此為直中陰經。不從陽經傳來。當用熱藥溫之。如寒極而手足厥冷。過乎肘膝。此寒極發厥也。名曰陰厥。急當救理溫之。此與陽厥不同治。若病初起。外感寒邪。內傷生冷。內既伏陰。外又傷冷。內外寒盛。或本真寒。悞投寒劑。使陰氣獨盛。陽氣暴絕。以致手足厥冷。腰脊強。頭痛。眼瞤。嘔吐。煩悶。下利。腹痛。身如被杖。六脉沈細。湯飲不下。已後氣漸深入。腹攻心。咽喉不利。腹痛益甚。心下硬。如石。躁渴欲死。冷汗不止。時或鄭聲。指甲面皆青黑。此名陰毒。速灸關元氣海。仍服大熱之劑。溫之。令陽氣復而大汗解也。若病人身微熱。煩躁面赤。戴陽欲坐。臥于泥水中。脉來沈細無力。此陰

證治八選

元 真白堂

極發躁。名曰陰躁。當用辛熱之劑。溫之。若誤用涼劑。必發躁渴而死。若病人身冷。脉沈細而疾。雖煩躁不欲飲水入口。此名陰盛格陽。亦用大熱之劑。溫之。蓋陽極發厥。陰極發躁。物極則反。自然之理也。若初病無表熱。但狂言煩躁不安。精采不與相當。此因熱結膀胱。其人如狂。太陽經之裡症也。不與陽狂同治。宜五苓散。若見吐衄。雖有大熱。忌下。涼藥犯之。必死。蓋胃中有寒。則蛔上膈。急用泡乾薑理中湯。參朮 加烏梅花椒。服俟蛔定。却以小柴胡退熱。蓋蛔聞酸則靜。甘則安也。若煩渴欲飲水者。由內水清。渴欲得外水。自救大渴。欲飲一升止。與半升。勿令太過。過則停蓄心下。則為水結胸。射于肺。為喘。為咳。雷干胃。為噦。為噎。溢于肌。為腫。蓄于下焦。為癰。滲于大腸。為利。是皆多飲之過也。凡傷寒過經十餘日以上。尚有表症。宜汗者。以羌活沖和湯。羌防芎芷 微汗之。有裡症。宜下者。以大柴胡湯。柴芩芍 緩下之。蓋傷寒過經。正氣多虛。恐麻黃承氣太峻。故也。誤用麻黃。令

證治大遠

手

真白堂

人亡陽誤用承氣令人不禁故有此戒若表症未除而裡症又急亦只以大柴胡湯通表裡而緩治之如老幼及氣血兩虛之人有下症者亦以此湯下之不傷元氣如經汗過多仍發熱不退表裡症俱無脉微氣虛力弱此虛熱也人參白朮湯參朮知母加蒼朮地骨前胡凡傷寒口沃白沫或唾多併冷是俱是有寒吳茱萸湯參朮乾薑理中參朮乾薑真武附子若輕重選用切忌涼藥凡傷寒汗下後不可大補宜小柴胡湯柴胡芍藥加減和之若以參芪大補使邪氣得補而愈益變生他症也如果虛弱之甚脉見無力方用甘溫之劑補之其勞力感寒之症不在禁補之例若頭痛惡寒發熱身疼兼暖氣作酸惡食或胃脘作痛痞悶欲吐左右脉俱緊而有力此為夾食傷寒不可先攻其食宜葛蘇散葛根芍藥柴胡去桔梗合平胃散蒼朮陳皮服之若頭痛惡寒發熱身痛兼胸脇氣痛而不舒暢左手脉緊盛右手脉沈滑此為夾氣傷寒宜引瀉散加香附青皮若頭痛發熱惡寒身體倦痛骨腿

證治大遠

手

真白堂

酸疼有汗出口微渴脉左手緊盛右手浮大而無力此為勞力傷寒宜用溫和之劑溫經散寒切忌大發汗裡症見者用中和之劑加轉藥微下之切忌急攻利若頭痛發熱惡寒身痛兼左脇痛硬滿身或時涼時熱左手脉緊盛右手脉沈數此為血鬱傷寒不可先攻其血須先解散風寒後以桃仁小承氣湯大黃桃仁下之若肢體不能轉側額上微汗惡寒不欲去衣大便難下便利日晡熱劇脉虛浮而滑此風氣濕氣相搏也名為風濕不宜正發汗但宜微解肌散毒散柴胡芍藥加蒼朮獨活若一身盡痛發熱肌黃大便快小便澀脉沉緩名為中濕五苓散猪苓加茵陳若頭痛發熱惡寒一身關節疼痛而煩脉沈細名為濕痺宜羌活勝濕湯羌活獨活三四五月間患頭痛壯熱煩渴不惡寒者為溫病愈加熱者為熱病脉多在肌肉間而不甚浮右手盛于左手由肺熱在內故也若左手盛或惡寒此重感寒邪若左手浮大右手浮緩而盛按之無力宜補藥帶表陽脉濡弱

陰脉弦緊更遇溫氣變為溫疫陽脉洪數陰脉沈大更遇溫熱變為溫毒溫暑治例云經曰冬傷於寒春必病溫蓋冬傷寒邪不即為病伏寒變熱至春陽氣外發鬱熱之邪因而發動自春分至夏至前病壯熱口渴而不惡寒者是也發于夏至後愈加熱而脉洪數者為熱病重感於寒變為溫瘧更遇於風變為風溫更遇溫氣變為溫疫更遇溫熱變為溫毒症有表裡之分在表者宜辛平之劑微解之在半表半裡者宜辛涼之劑和解之在裡者

證治大還

章 慎白堂

宜鹽寒之劑通利之為寒則腸滿猶帶表邪還宜發散和解溫熱病胸脇滿即宜下之以傷寒之邪自表入裡溫熱之邪自裡達表故也隨經處治因時制宜此治之善也近時醫者一遇溫熱病不分表裡即用九味羌活以發之發而不徹隨用雙解散通表裡以治之羌活湯既為邪在表而用羌活芎芷細辛之溫散則不宜峻用黃芩生地之苦寒牽制其邪而不使之外達也若為心肺有熱而用黃芩生地之苦寒理宜用涼遠溫更不當復用溫

藥反增煩熱也又雙解散既用麻黃辛熱以發之復用芍藥酸寒以收之用硝黃鹹寒以泄之又用歸甘肅溫以補之散收並用補泄兼施矧天道溫煖熱病多汗可用麻黃辛熱之藥乎溫病不惡寒者由斜熱自內發外非風寒由外入內故不惡寒而禁大發汗也或有遇風寒之氣觸之或有酒淅惡寒意者由邪熱在表表之陽氣受病或鬱熱之邪與寒氣不合故畧覺怕寒非若卒然感冒風寒牽衣向火畏寒之甚也止宜柴葛解肌湯

證治大還

章 慎白堂

苟加生薑以解肌表之邪而已其有惡寒之甚者必是宿邪將發又復感風寒故也宜用感冒發散之劑如羌活香蘇芎芷之類其身體痛者由宿邪伏匿發而阻滯故皮膚按摩俱痛甚則骨痛難以轉側悉由濕熱鬱蒸而然非若傷寒腰脊肢體拘急而疼也宜柴葛解肌湯加蒼朮香附陳皮解散其邪而痛自止頭痛者由濕熱之氣上蒸於頭目也宜柴葛解肌湯加荊芥薄荷防風身熱者邪熱在于陽明經自汗者邪熱陷于肌肉薰蒸

證治大還

雲 貞白堂

津液而成汗。口乾者邪熱發其津液為汗。津液不足故口乾也。非若傷寒邪熱入胃耗其水穀之液煩渴喜飲。舌生芒刺之甚也。身熱自汗口乾俱用白虎湯。音知 草若身熱口乾無汗宜柴葛解肌湯以解肌表之邪。切勿誤投白虎以鬱遏其熱而不使其外達也。耳聾脇痛邪熱在于少陽經也。白虎湯加柴胡黃芩。胸滿而嘔邪熱客于胸中也。柴胡白虎湯。柴 參 半 草 音知倍加半夏之辛以散胸中之邪。兼下嘔逆之氣。若嘔逆之後渴欲飲水此邪氣

漸入于胃也。加瓜蒌以去胸中之熱不當更與半夏以重燥之也。若邪客于心胸之間痞滿微痛者小陷胸湯。連 半 實加枳實陳皮蘇梗山梔。若邪客於心胸之間懊憹煩亂者宜解毒湯。柏 芩 連 梔 麥 冬 括 蕤 根加麥冬天花粉。若嘔吐惡心此邪氣入客于胃脘較之邪客胸中猶覺深矣。渴者解毒湯加竹茹陳皮天花粉麥冬。不渴小陷胸湯加陳皮生薑梔子。若煩燥作渴引飲不止此火邪在于心脾腎之分耗其津液涸其真水也宜解毒湯加天花

證治大還

雲 貞白堂

粉麥門冬石膏知母日進三服而煩渴不止者急下之以救腎水之枯。舌生芒刺心火太甚腎水太枯不能上潤也。目睛不了了者由熱極故眼目目瞪而不圓活非直視睛定而不動移也。譫語者陽明胃熱邪上乘于心故神思昏亂而妄言也。三者雖宜急下猶當審其滿實。若腹如仰瓦而不脹滿但大便結硬者此腹無凝滯之氣為實而不滿也。用解毒調胃。柏 芩 連 梔 麥 冬 括 蕤 根承氣湯。硝 黃 草若肚腹脹滿而大便不甚堅者此邪熱雖滯于腹中猶為

滿而不實也。用解毒小承氣湯。柏 芩 連 梔 麥 冬 黃 枳 朴若大滿大實者此熱勢已熾宜急去其邪用解毒大承氣湯。黃 枳 朴以硝黃蕩堅枳實泄滿去甘草恐其緩中也。解肌及蕩滌之後邪熱已解宜柴芩湯。參 柴 半 草 麥 冬 括 蕤 根加滑石使餘邪從小便中出以徹其邪。發黃者謂之溫黃邪熱鬱蒸于脾胃也。黃而明亮大便閉結者此熱勝也。解毒茵陳湯。梔 茵 柏 芩 連 梔 麥 冬 黃 枳 朴而明亮大便閉結者此熱勝也。茵陳二苓湯。梔 茵 柏 芩 連 梔 麥 冬 黃 枳 朴黃而昏暗便軟者此濕勝也。茵陳二苓湯。梔 茵 柏 芩 連 梔 麥 冬 黃 枳 朴發斑者邪熱鬱于手足太陰脾經也。色紅者

輕涼散翹使芍藥加當歸黃連玄參色紫黑者

重大青四物湯大豆鼓草發狂者熱毒在胃併

入于心重陽則狂也解毒大承氣湯婦人經水適

來邪熱乘虛入于血室而狂者桃仁承氣湯硝黃

桃仁發厥者熱極當下失下熱深故手足逆冷

亦然極似水也脈來有力解毒大承氣湯脈來無

力元氣弱或過經再傳者不可峻下恐殘陰傾絕

充陽復散也止宜解毒湯養陰以退陽發呢者

由陽明內實地道不通故逆上而為呢也大承氣

證治大遠

老

貞白堂

湯加黃連便軟日久而呢者由陰虛冲火上逆也

人參竹茹湯加橘皮生薑麥冬炒黑黃柏胃氣

虛敗者六君子湯參朮茯苓加乾薑丁香裡症悉

罷但虛熱口乾不已由前熱傷氣耗其津液也驟

用參朮恐邪熱復生止宜麥門冬飲子麥冬五味

生地竹葉石膏湯竹葉連梗花扶陰以退陽諸

症退後俱宜用前柴苓湯柴苓參半調治病後

自發戰者由陰氣來復邪熱欲散故大汗而解也

不解小柴胡湯柴苓參半加知母若戰無汗出正

不勝邪也柴胡桂枝湯柴苓參半去黃芩倍人參

助其正氣使再戰以出汗其餘勞復食復瘥後諸

症俱同正傷寒傳變調治若發于夏至後其熱

愈甚者為熱病治同溫病無汗而熱葛根柴胡升

麻石膏甘草自汗煩熱咽痛梔子大青知母柴胡

石膏黃芩甘草若發熱虛煩不止發于三月後謂

之晚發梔子升麻湯梔升柴苓其傳經裡症治同

溫病若一方一境病多相似者名曰溫疫此非

傳染由于同感天地之瘴氣也治法與溫病相同

證治大遠

夫

貞白堂

與時行寒疫大異在表宜加味神朮散蒼朮藿香

陳生不可大發汗在裡治同溫病若脈不浮一家

長幼相傳者此為傳染初起邪氣由呼吸而入尚

在上中二焦不可遽用下藥誅伐無過宜清上中

二焦邪熱解內毒有汗用白虎湯石知草加蒼朮

厚朴陳皮薄荷連翹梔子木香甘草桔梗無汗用

神朮散加薄荷桔梗連翹梔子木香若毒在肌肉

遍身疙瘩腫毒發熱者漏蘆湯蘆升苓藍藥玄苦

大便實者漏蘆丸毒在頭面普濟消毒飲連苓玄

升枯馬勃蠶蚕鼠 毒在兩耳。近項逼咽。腫痛。此溫

毒客於少陽經。名曰蝦蟆溫。柴胡連翹湯。柴胡連翹

毒入胸膈。惡心嘔吐。煩亂或瀉或秘。竹葉石膏湯。竹葉石膏

竹不連知花 毒入腸胃。協熱而利。黃芩芍藥湯。黃芩芍藥

作渴引飲。加大黃。毒入腸胃。肚腹膨脹。大便不

通。解毒承氣湯。裡症治同溫病。大頭溫。乃濕熱

在高巔之上。宜輕揚辛涼之劑。緩而治之。不可用

降下藥。以誅伐無過。宜羌活防風荆芥薄荷柴胡

白芷桔梗連翹玄參。心實。蠶蚕酒炒。連其腫而

證治大還

无 貞白堂

痛者為實邪。加酒大黃。其腫而赤者為結熱。倍連

翹。不赤者為留氣。倍酒芩。虛邪加人參。東垣云。陽

明邪熱太甚。資實少陽相火為之。視其腫勢在何

部。隨經處治。勿令重劑過其病所。如陽明為邪。首

大腫。額上面部。二目難開。加升麻葛根石膏去羌

活防風。少陽為邪。出於耳前後。頭角紅腫。倍柴胡

加天花粉。太陽為邪。發於頭上。并腦後下項。及日

後赤腫。倍羌活防風。湯藥時時咽之。勿令飲食在

後。勿可太急攻治。急則邪氣不伏。反攻於內矣。夫

頭而乃空虛之地。既着空處。則無不至。故不可急

也。若四時之中。天有暴寒。而人犯之一家長幼

俱患頭痛身疼。發熱惡寒無汗。名曰時行寒疫。治

與傷寒相似。但畧輕耳。宜平胃香蘇散。蒼朮陳草

附 裡症治同傷寒。若有汗身熱。四肢不收。頭痛

喘急。發渴昏睡。寸脉浮滑。尺脉濡弱。此因素傷于

風。復傷于熱。風熱相搏。名曰風溫。不可汗下。宜葛

根湯。葛根升麻防風黃芩芍藥 汗之。則譫語躁擾。目亂無精

宜敗毒散。葛根升麻防風黃芩芍藥 汗後身猶灼熱。知母功

根湯。葛根升麻防風黃芩芍藥 大渴引飲。瓜蒌根湯。

若頭目疼痛。倦怠惡寒。心腹痞滿。壯熱自汗。兩脰

逆冷。寸脉軟弱。尺脉小急。此因素傷于濕。復傷于

熱。濕熱相搏。名曰濕溫。宜除濕湯。蒼朮白朮陳草

或白虎湯加蒼朮桂枝。若憎寒壯熱。頭痛昏迷

口出涎沫。脉滑者。此痰症類傷寒也。若頭痛發

熱惡寒。氣口脉緊甚。但身不痛者。此食積類傷寒

也。已上七十症。原非正傷寒。本不宜類入。今亦

大例于左正以別其四時傷感之不同雖諸症固
類傷寒然治法則大懸絕也 若頭痛身熱惡寒
或嘔吐轉筋但病先起于足或足脛軟赤而痛者
此脚氣類傷寒也

證治大還

傷寒近
卷之一

至

貞白堂
十一

證治大還 傷寒近目錄

前集 卷之二

四時用藥法

傷寒難拘日數論

傷寒見症識病法

汗後不解

下後不解

脈分寒熱辨

表熱裡熱辨

表寒裡寒辨

合病併病辨

短氣發喘辨

噦與乾嘔辨

痞氣結胸辨

獨語鄭聲辨

譫語虛實辨

證治大還

傷寒近前集
卷之二目錄

一

貞白堂

太陽少陰脉症相似辨

陰血陽血辨

陰陽易女勞復辨

傷寒六經正病方論

發熱

惡寒

自汗

頭痛

身痛

寒熱

口渴

舌胎

煩渴

胸脇滿

腹滿

譫語

陳氏傷寒近 前集卷之二

雲間陳 治三農甫述

門人 范 崧壽民 蔡 顧贊皇 蔡 栢璣先 校 師 崇羔恩 校

因時用藥法

四時皆有傷寒。治法不可樂論。交霜降至春分。此時天氣嚴寒。風霜凜冽。觸冒之者。為正傷寒。寒邪外束。腠理閉密。非辛熱之藥。大發汗不可。故寒傷榮惡寒無汗。用麻黃湯。麻黃桂枝開發腠理以散邪而愈。風傷衛惡風自汗。桂枝湯充塞腠理以

證治大還

傷寒近 卷之二

貞白堂

散邪而愈。若榮衛俱傷。則用大青龍湯。麻黃桂枝治之。裡症見者。用寒涼之藥。急攻下。此治冬時正傷寒之藥。與非時傷寒不同。交春分至夏至前後。有頭痛發熱。不惡寒而渴者。為溫病。愈加熱者。為熱病。用辛涼之藥。微解肌。不可大發汗。裡症見者。用寒涼之藥。急攻下。若誤下之。未必為害。誤汗之。害不可言。夏月大發熱。頭痛躁渴。背惡寒。微汗出。脈虛無力。前板齒乾燥者。名傷暑。經曰。脈盛身寒。得之傷寒。脈虛身熱。得之傷暑。宜柴胡湯加石

青知母。或人參白虎湯。參石膏知母天久陰雨。濕令

併行。蒼朮白虎湯。元氣素弱而重傷者。清暑益氣

湯。參芪木歸栢五味麥冬交秋至霜降前。有頭

痛發熱。不惡寒。一身關節痛。小便短者。名濕病。用

辛涼之藥。加燥劑以解肌。亦不宜大發汗。裡症見

者。用寒涼之藥。急攻下。表症不與正傷寒同治。裡

症治相同。春夏秋有患頭痛身熱。亦有惡寒者。

即是感冒。非時暴寒。不比冬月正傷寒之重。表症

用辛涼之劑。小發汗。裡症用寒涼之藥。急攻下。表

證治大還

傷寒近 卷之二

貞白堂

症不與正傷寒同治。裡症治相同。凡四時有患頭痛身熱惡寒。老幼相傳者。名時疫症。用辛涼之藥。微解表。裡症見者。用寒涼之藥。急攻下。從病制宜。不與正傷寒同治法。當參運氣而施治為妙。

傷寒難拘日數論

今人治傷寒。一二日間。不問屬虛屬實。便用麻黃桂枝之類。汗之。三四日間。不問在經在府。便用柴胡之類。和之。五六日間。不問在表在裡。便用承氣之類。下之。以致內外俱虛。變症蜂起。不知病有表裡

陰治大還

傷寒近
卷之二

三

貞白堂
言卷六

虛實之殊。邪有傳變不傳變之異。豈可擬以日數。況風寒中人無常。或入於陽。或入於陰。初無定體。非但始太陽。終厥陰論也。或有自太陽始。日傳一經。六日傳至厥陰。邪氣衰不傳而愈者。有七日已後。各經之邪未盡衰。而病尚不愈者。或有間經而傳者。或有傳至二三經而止者。或有始終只在一經者。或有越經而傳者。或有三陽經同病。而為合病者。或有先病未盡。又過一經而為併病者。或有初入太陽。不作鬱熱。便入陰經。而成陰症者。或有直中陰經。而成寒症者。或有陰陽經齊病。而為兩感者。或有變症者。或有脈變者。或有取症不取脈者。或有取脈不取症者。麻黃桂枝二湯治冬時正傷寒之方也。今又以之通治非時暴寒溫暑之病。又將傳經陰症。與直中陰經之陰症。混同論治。差誤如此。其害匪輕。豈知暴寒溫暑。必有別方。直中傳經。必有治法。仲景云。日數雖多。但有表症而脈浮者。即宜汗之。日數雖少。但有裡症而脈沈者。便宜下之。此為確論。切不可執定一二日發表。三四

陰治大還

傷寒近
卷之二

四

貞白堂
言卷六

日和解。五六日攻下。務要審脈驗症。辨名定經。一親切無疑。真知其為表邪而汗之。真知其為裡邪而下之。真知其為直中而溫之。與夫曰少與曰急下。曰先溫其裡。乃攻其表。曰先解其表。乃攻其裡。汗下溫利。了然胸中。始無差誤。假如一日。至十三日。若有一毫頭痛惡寒。每日如此。不論日數多少。即為在表。便是表症未解。還用微汗以解之。經曰。於是不開。不可攻裡。苟若誤下。則為結胸等症矣。如惡寒。背脊痠。便覺胸中飽悶。疼痛。大便秘。渴不施治。其不可拘於日數。併始太陽終厥陰之論也。

傷寒見症識病法

傷寒之病。從表入裡。裡必達外。且如頭痛項強者。太陽症也。頭搖者。裡症也。頭汗者。裡有瘀血。必發黃也。面戴陽者。下虛也。面光不慘。傷風也。面慘不光。傷寒也。面上乍白乍黑。唇口生瘡。狐惑也。面如錦紋。陽毒也。面白無神。發汗過多。或脫血也。面黃明

亮熱也而黃慘暗濕也。口禁難言。症也。口唇青黑。身極也。唇焦赤腫。熱極也。舌上黃胎。內熱也。黑胎。刺熱極也。舌卷焦黑。陽毒也。舌青胎滑。陰毒也。口燥。漱水不飲。咽或目瞑。衄血也。目睛黃。小腸熱也。白睛黃。將發痘症也。目赤者。熱甚也。鼻色黃。小便難也。鼻色赤。肺經熱也。鼻孔乾燥。陽明經熱。必衄血也。鼻黑如烟煤。陽毒熱深也。鼻息鼾睡。風濕也。鼻塞濁涕。風熱也。鼻孔扇張。肺絕也。耳聾或痛。邪熱在少陽經也。聾而舌卷唇青。厥陰經也。耳

證治大遠

傷寒近
卷之二

五

頁白堂
三十三

臥但欲起者。心下結滿而氣壅也。身大熱。反欲得衣被。表熱裡寒也。身大寒。反欲不近衣被者。表寒裡熱也。漏汗不止。亡陽氣脫也。目盲見鬼。脫陰脫陽也。尤發出血。下厥上竭也。音啞不言。熱傷少陰之絡也。耳聾無聞。熱壅少陽之經也。口難言。血虛也。心下怔忡。汗多。或水逼也。聞食臭。胃虛也。身痺陽虛。汗未透也。譫語。邪氣盛而神昏也。鄭聲。正氣奪而神失也。臍內築動。心氣虛而腎氣發動也。循衣摸床。用熱乘肺也。瞪目直視。心腎氣絕也。汗出如油。正氣脫也。

證治大遠

傷寒近
卷之二

六

頁白堂
三十三

汗後不解

常汗之症。用發汗藥。而表症表脈仍至者。宜再汗之。

若再汗之。又不解。別無異症。宜涼膈散。趙梅海

以退其熱。傷寒大發汗。汗出不解。及無汗。脈尚

浮者。蒼朮白虎湯。蒼朮知汗後煩躁。不得眠。微熱

而渴。五苓散。汗後不解。中外有熱。口乾煩渴。柴胡

飲子。

柴芩參芍
歸大黃州

陳霞山云。傷寒發汗。汗出不透。至臍。或至頸而還。不

可再發汗。宜葛根多用。柴胡次之。解而不愈。有表復有裡也。小柴胡柴胡參半和之。又不愈。五苓散茯苓桂枝利之。又云。傷寒用小柴胡湯。去上焦之邪。必用五苓散。使濕熱從下焦而去。

下後不解

當下之症。用下藥不解。再三下之。又不解。熱極不退。不下。則熱勢甚。而病不愈。再下。則本氣虛。而脈不實。宜涼膈散。合解毒湯調之。使陽熱退。陰脈漸生矣。若下後餘熱不解。小柴胡湯加知母地骨皮。

證治大要

傷寒近
卷之二

二

貞白堂
三十三

汗下後虛熱。人參白虎湯加蒼朮地骨皮。

厥分寒熱辨

四肢乃脾土之末。脾胃有寒。手足必寒。脾胃有熱。手足必熱。此常理也。惟傷寒乃有厥深熱亦深。厥微熱亦微之論。何也。蓋元則實承。乃制火氣亢極。反氣水化。故有此象。陰陽反覆病之逆從。未可以常理論也。陽厥者。先自三陽經氣分。因感寒邪。起於頭痛發熱惡寒。已後傳進三陰血分。變出四肢乍冷乍溫。大便燥硬。譫語發渴。揚手擲足。不惡寒反

怕熱。脈沈有力。此名熱厥。因邪熱內伏也。陽極發厥。即陽症似陰也。外雖有厥冷。內則有熱邪耳。輕則四逆散柴胡枳實芍藥重則諸承氣選用。元氣本弱者。不可急下。恐殘陰暴絕。元陽復散耳。須涼膈解毒等湯養陰退陽。使蓄熱漸散。厥自愈矣。傳經熱症而發厥者。從陽經傳來。初起必頭痛發熱。漸入陰經。其深厥亦深也。直中陰經而發厥者。陰寒之邪直中陰經。故無發熱頭痛之症。就便怕寒。而四肢厥冷也。陰厥者。因三陰經血分。自受寒邪。初起無身熱頭痛。就便惡寒。四肢厥冷。上過肘膝。引衣蹠臥。不渴。或兼腹痛泄瀉。或戰慄面如刀刮。口吐涎沫。脈沈遲無力。此為陰經直中寒症。不從陽經傳來。謂之陰厥也。輕則理中湯參朮干姜重則四逆湯姜附子

證治大要

傷寒近
卷之二

八

貞白堂
三十三

通湯炙甘草炮姜附子

表熱裡熱辨

一傷寒有頭痛身熱惡寒。名表熱與裡熱不相類。無頭痛惡寒。反怕熱躁渴。譫語大便實。名裡熱。與表熱不相類。

表寒裡寒辨

一傷寒頭疼身熱惡寒名表惡寒宜辛甘散之與裡寒不相類無頭疼身熱惡寒厥冷踰臥不渴或吐瀉腹痛戰慄名裡惡寒宜辛熱之劑溫之與表惡寒不相類

合病併病辨

一傷寒陽經症或三陽經同病不傳者名合病分在經過經治之與併病不相類陽經先病未盡又過一經而傳者名併病分在經在府治之與合病不

證治太遺

傷寒論卷之二

九 賈白堂

相類三陰無合症若三陰三陽合病即是兩感矣

短氣發喘辨

一傷寒失於汗下或因汗下後虛令人氣逆不相類續者名短氣分虛實治之與發喘不相類傷寒失於汗下或因飲水過多令人擡肩擗肚氣上逆於名發喘分表裡水氣治之此與短氣不相類

噦與乾嘔辨

一傷寒或汗下太過或恣飲冷水水寒相搏虛逆聲濁惡而長名噦與乾嘔不相類傷寒熱在胃口與

穀氣相併熱氣上薰嘔無物出名乾嘔分實熱水氣治之與噦不相類

痞氣結胸辨

一傷寒麻黃湯症誤下之心下滿悶不痛者名痞氣分虛實治之桂枝湯症誤下之心下硬滿而痛名結胸分緩急治之與痞滿不相類

獨語鄭聲辨

一傷寒餘熱不除蘊在心包使精神短少而昏目睡中言語一二句者名獨語宜涼劑清之與鄭聲不

證治太遺

傷寒論卷之二

十 賈白堂

相類傷寒因汗下後正氣虛而本音失則鄭重語散不知高下聲戰無力不相接續造語出自喉中大小便自利手足冷名鄭聲宜中和之劑治之與獨語不相類

譫語虛實辨

一傷寒失於汗下邪熱傳裡使水濕發燥大便不通必發譫語或心下硬痛下利清水躁渴口出無倫語凡此皆實宜寒涼之劑下之汗出亡陽或下後利不止身痛自利清穀譫語者凡此皆虛當辛熱

之劑溫之

太陽少陰脉症相似辨

傷寒有頭痛發熱惡寒脉沈者此名太陽脉似太陰當辛溫之劑散之與少陰症不相類傷寒無頭痛只發熱惡寒脉沈者此名少陰証似太陽當辛溫之劑溫之與太陽症不相類

陰血陽血辨

陽寒少陰症惡寒發熱無頭痛誤大發汗使血從耳目口鼻中出者名陰血多死此與鼻衄陽血不

論治大還

傷寒論卷之二十一

十一

貞白堂

同治傷寒太陽症發熱惡寒頭痛或微喘鼻中出血者為衄血名陽血須分點滴成流此與陰血不同治

陰陽易女勞復辨

傷寒瘥後交接淫慾無病之人反得病者名陰陽易宜清涼解毒之劑治之

傷寒瘥後交接淫慾其病復發者名女勞復宜用清涼解毒補養之劑治之不可與陰陽易同治蓋易則暴病復則重復故也

傷寒六經正病方論

發熱

翁翁發熱為表熱是風邪客於皮膚邪氣揚鬱於外表熱而裡不熱也蒸蒸而熱為裡熱是陽邪下陷於陰中裡熱而兼表熱也其半表半裡熱者以表熱未罷傳裡裡未作實故表裡俱熱也太陰厥陰皆不發熱惟少陰反有發熱之症但其脉沈或下利手足冷頭不痛為異耳大抵發於陽而發熱者頭必疼發於陰而發熱者頭不痛傷寒發熱病之常也苟陰陽脉俱虛而發熱不止或下利發熱不止或汗下後熱不止脉躁亂者皆死症也頭痛項強身痛發熱惡寒無汗脉浮緊者此寒邪在太陽之表也麻黃湯麻黃桂枝惡風發熱自汗脉浮緩者此風邪在太陽之表也桂枝湯桂枝芍藥發熱口渴小便不利脉浮者此熱入太陽旁光之本也五苓散五苓散太陽症發汗後發熱惡寒脉弦細而嘔小柴胡湯小柴胡湯熱在肌肉之分目痛鼻乾不眠脉浮洪而長此熱在陽明之表也葛根解肌

論治大還

傷寒論卷之二十一

十二

貞白堂

湯麻黃湯自汗口渴飲水背微惡寒脈洪數者此

陽明表裡俱熱也白虎湯石膏加人參不惡寒反

怕熱大便秘小便赤澀譫語渴脈洪實者此熱在

陽明之裡也調胃承氣湯黃芩太陽症頭痛發

熱脈反沈細者陽証反陰也四逆湯附子少

陰病當無熱反發熱脈沈無力是未離於表也麻

黃附子細辛湯太陽症三日發汗不解蒸蒸發熱

屬胃熱也調胃承氣湯發汗後不惡寒但發熱

者當和胃氣調胃承氣湯病人無表裡証發熱

證治大還傷寒論卷之二

七八日雖脈浮數可下之小承氣湯大黃汗後

解半日許仍發熱而見表証脈宜再汗之汗

後口渴煩熱脈洪大者竹葉石膏湯石膏汗

汗後又復下之惡寒發熱無休止小建中湯芍藥

汗下後陰陽不利水火不濟致餘熱不退不可

用涼藥宜小建中湯其人已虛虛能生熱者加參

芪歸朮或十全大補湯參朮調其榮衛

大下後身熱不去心中結痛者未欲解也梔子

豉湯下後身熱不退或胸中堅滿未消腹中疼

痛未止脈尚數實宜再下之天下後陰弱發熱

無休止脈濇者因傷陰也葶藶苦酒湯天下後

身熱不退又再下之熱愈甚者診其脈虛浮無力

此虛熱也不分有汗無汗宜人參白虎湯參

加蒼朮地骨皮傷寒全是下症大熱脈反細小

者不可下瀉心湯主之

惡寒

惡寒陰陽經皆有之但發熱惡寒頭疼發于陽無熱

惡寒頭不疼者發于陰或已發熱或未發熱必先

證治大還傷寒論卷之二

惡寒而繼之以發熱此則發于陽也若初病惡寒

而脈沈細而緊此則發于陰也在陽助發汗在

陰則溫裡苟不症悉具而猶微惡寒便是表症尚

未解當先解表而後攻裡若少陰病惡寒而手足

足厥冷自利煩躁脈不至者皆為不治也發汗

後惡寒為表虛是發其汗或汗出太過所謂陽微

則惡寒也宜溫之汗後只惡熱為裏實是表邪

傳裡所謂陰微則發熱也宜下之太陽症頭痛

身疼脈浮緊發熱無汗惡寒麻黃湯麻黃病

發熱惡寒。熱多寒少。脉微弱者。無陽也。不可發汗。

越婢湯石膏水附子麻黃 陽明府病。本不惡寒。若微惡

寒者。係與太陽合病。在經屬表。可發汗。宜麻黃湯。

若脉遲汗多。微惡寒者。表未解也。雖有陽明症。還

須桂枝湯。桂芍 少陽病。頭汗出。微惡寒。柴胡桂

枝湯。柴芍參半 太陽症。得汗後。及惡寒者。虛也。

芍藥附子甘草湯。少陰病。脉沈細。無熱惡寒者。

四逆湯。炙甘草附子 太陰病。自利不渴而惡寒。理中

湯。參朮乾姜附子 少陰病。背惡寒。口中和。宜附子湯。

證治大還傷寒近卷之二 生 貞白堂

白朮散 惡寒脉微而復下利。此亡陽也。四逆湯

加人參。下利惡寒而手足溫者。小建中湯。桂芍

枝 惡寒而踈。時時自煩。欲去衣被。大柴胡湯。柴芍

芍半枳 無汗

風暑濕干之。皆令汗出。惟寒邪在表。獨不汗出者。以

寒主收斂。腠理閉密故也。頭痛身疼。惡寒無汗。三

時用芍蘇散。芍蘇葛柴枳 冬月麻黃湯。麻桂 若當

汗之症。與麻黃二三劑而不得汗。此又不可療也。

陽明症反無汗。脉浮而喘者。麻黃湯。脉弱無

力。難作汗者。血虛也。經云。奪血無汗。黃芪建中湯。

黃芪芍 有初病。即自汗出。後熱盛不得汗者。

此陽氣發泄。而陰血不足也。宜芍歸湯。服一二劑

後。加紫蘇肉一二分。即汗出而愈矣。

陳三發治。身熱盛。用藥發汗不得汗者。此肺虛津

液少。汗至胃而還也。先用保元湯。參朮陳姜棗 保定肺

氣以出汗。

惡風

證治大還傷寒近卷之二 生 貞白堂

風傷衛氣。氣虛不能外衛。故見風則怯而惡也。悉屬

于陽。非比惡寒。有陰陽之別。但有虛實之殊耳。不

經發汗。汗自出而惡風者。為中風。當解其肌。不可

更發汗。發汗過多。漏出。不止。衛虛亡陽。外不固而

惡風者。用桂枝湯。桂芍 加附子。若裡症甚。而惡風

未罷者。猶當先解其表。三陽風濕者。惡風。不可不

知。太陽中風。脉陽浮陰弱。惡風自汗。陽浮者。熱

自發。陰弱者。汗自出。當發惡寒。漸漸惡風。翁翁發

熱。鼻塞乾嘔。桂枝湯。太陽病。頭痛發熱。汗出惡

風者桂枝湯 下後七八日不解表裡俱熱時時

惡風大渴口燥舌乾而煩白虎加人參 脉浮身

重汗出惡風防已黃芪湯已芪汗不止必惡風煩

躁不得臥先防風牡蠣白朮湯次小建中湯芍桂

風濕惡風不欲去衣骨節煩疼不得屈伸汗出

短氣小便不利或身微腫甘艸附子湯艸朮

自汗

衛氣者維腠理而固津液者也衛為邪所乘不能衛

護於外故汗自出也然有表裡虛實之殊表實者

證治大還 傷寒近 卷之二 七 貞白堂

發熱自汗出惡風微惡寒脉浮緩為表未解當解

肌以致汗泄桂枝湯桂芍若發汗後遂漏不止惡

風寒為表虛必用溫劑桂枝湯加黃芪附子若汗

多不惡風寒口渴譫語發熱大便硬則為表已解

裡証實當急下之大承氣湯確黃若自汗如雨下

利清穀煩躁引飲甚至舌黑鼻如烟煤欲去衣被

脉虛微不可誤以為實此裡虛也附子理中湯附參

乾乾四逆湯冷服又少陰症不當有汗及自汗出

者因陽氣衰不能固陰液也宜武湯炮附枝陽明

証法常有汗或反無汗皮間如虫行狀者以病人

久虛津液竭不能為汗也黃芪建中湯芪桂芍艸

凡自汗出髮潤如油如珠不流皆不可治也服

桂枝湯大汗出煩渴不解脉洪大者此轉屬陽明

經也白虎湯青知艸加人參病人臟無他病時發

熱自汗出此衛氣不和也桂枝湯桂芍陽明發

熱汗多者急下之大承氣湯確黃若小便利者不

可湯滌臟腑為無津液也宜蜜導法自汗出小

便難桂枝芍藥甘草湯汗出而渴小便難五苓

散乾乾不渴者茯苓甘艸湯茯苓

陳遂於日傷寒脾弱惡風醫用麻黃湯致自汗不止

筋惕大喘驚悸不寐譫語不識人此誤汗所致也

以黃芪附子湯三進而安繼以竹葉湯而愈

頭痛

頭為諸陽之會故頭痛專主三陽三陰無頭痛者以

陰脉至頭而還故也惟厥陰經循喉嚨之後入額

額上連目系出額故有頭痛然有乾嘔吐涎沫之

症又無身熱為異也太陽症發熱惡寒無汗頭

痛者麻黃湯麻桂有汗桂枝湯桂芍或已發汗或

未發汗頭痛如破者葛根湯葛芍白湯知芍加白芷

陽明症頭痛身熱目疼鼻乾無汗者葛根湯葛桂

芍加葱白芍自汗煩渴脈洪數者白虎湯知芍

氣湯大黃少陽症頭痛往來寒熱口苦或連頭

角耳中痛脈弦數小柴胡湯柴芍加川芎厥

陰頭痛乾嘔吐涎沫吳茱萸湯吳參脈沈微厥冷加

附子細辛附不大便六七日頭痛有熱小便赤者

證治大遺傷寒近卷之二元貞白堂

承氣湯大黃若小便清白知不在裡仍在表也桂

枝湯汗下後頭痛起而目眩者獨活防風旋覆花

當歸湯熱病後頭痛不止者川芎石膏湯

身痛

身痛拘急太陽表邪未解也然有溫經發汗之不同

如發熱惡寒無汗頭疼身痛脈浮緊此表邪也麻

黃湯麻桂若尺脈遲者為無血先用建中湯芍桂

俟尺脈浮却用麻黃湯若下利脈沈細身痛如被

杖者此陰寒症也四逆湯姜附子少陰症身體骨

節痛手足寒脈沈者附子湯炮附求若身痛不可

轉側脈緩此中濕也除濕湯蒼白朴陳赤茯倍羌

防身痛有陰陽之別陽症病在太陽太陽則脉

浮緊惡寒發熱無汗宜麻黃湯自汗九味羌活湯

羌防芎芷細辛羌防和之陰症病在少陰厥陰自利厥

冷身不熱脈沈宜四逆湯炮姜附附子湯炮附求

急當救裡面赤痛無常處或在腹中或在四肢

按之不可得而短氣此汗出不徹也宜再汗之

表症已罷裡症又無其人身痛不休者此榮衛不

和也小建中湯芍桂加以肉瞶筋踴者真武湯附

人參湯發汗後身疼痛脈沈遲者桂枝芍藥生薑

人參湯初起發熱惡寒身痛頭不疼者此少陰

症也麻黃附子細辛湯病發熱頭痛脈反沈若不

差身體痛者當救裡四逆湯炮姜附傷寒八九

日身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脈虛浮而滿

者此風濕相搏也桂枝附子湯桂附求差後身

痛不可發汗汗則成痼葛根湯葛芍風濕相

搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近則痛劇汗出短氣

小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子

湯水附桂或水附五苓水附桂之劑除濕利水

寒熱

邪居表多則多寒邪居裡多則多熱邪在少陽經半

表半裡之間表裡之不拘內外之無定因正氣之

不足陰邪出表而與之爭故陰勝則寒陽邪入裡

而與之爭故陽勝則熱所以乍往乍來而間作也

治宜小柴胡湯柴胡半升寒多加桂枝熱多倍柴胡

黃芩或本方合白虎湯服不嘔清便可可與熱一

證治太還

傷寒近卷之二

三

頁白堂

日二三度發桂枝麻黃各半湯桂枝芍藥

陳三農治寒熱交作汗出熱退少頃復寒熱此陰陽

不和也用小柴胡湯加芍歸芍藥之類和之太

陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不

可更發汗桂枝二越婢一湯桂枝芍藥寒多熱少

大青龍湯麻桂杏熱多寒少尺脉遲者榮血不

足也黃芪建中湯芍桂脉不遲者小柴胡柴胡半升

合白虎湯石膏

陳蓉城治往來寒熱心煩喜嘔屢服小柴胡湯不痊

曰傷寒熱結在裡脉實亦令往來寒熱以大柴胡

湯柴胡半升三下而安病至十餘日結熱在裏

脉實而寒熱往來此內實也大柴胡湯婦人經

水適來熱入血室其血必結使寒熱往來晝輕夜

重小柴胡湯加生地丹皮

口渴

渴常分六經而治飲多欲令者陽渴也飲少欲熱者

陰渴也脉浮而渴屬太陽有汗而渴屬陽明自利

而渴屬少陰飲水多而小便少為消渴屬厥陰太

證治太還

傷寒近卷之二

三

頁白堂

陽無汗而渴忌白虎陽明汗多而渴戒五苓先嘔

後渴則為欲解當與水解先渴後嘔則為水停宜

亦茯苓湯傷寒在表不甚渴在裡則大渴陽明不

甚渴太陰反大渴陰症亦渴蓋在表不渴者因熱

邪尚淺未入乎裡也在裡而渴者熱邪入裡消耗

津液也陽明主津邪熱在經故不甚渴太陰自利

津液內竭故反大渴陰症反渴者乃陰極發躁或

陰過火邪上升也太陽病邪熱入膀胱之本脉

浮數煩渴者五苓散陽明症汗出煩渴者白虎

加人參湯大便不利而渴者小承氣湯大黃 枳實 芍藥已
 利而渴者白虎湯 少陽寒熱往來而渴小柴胡
 湯柴胡 枳實 芍藥 半夏 黃芩 連翹 葛根 渴甚加白
 虎太陰自利而渴理中湯參 朮 乾 薑 芍藥 少陰自利咳
 而嘔引水飲猪苓湯二苓 澤 瀉 阿膠 口燥咽乾而渴急下
 之大承氣湯 厥陰煩滿囊縮便秘而渴大承氣
 湯 發汗已脉浮數煩渴者五苓散茯苓 桂 枝 白 朮 澤 瀉 汗
 出而渴小便不利者五苓散 汗下後煩渴飲水
 涼膈散連翹 薄荷 梔 子 黃 芩 滑 石 甘草 薄荷 及甘露飲 連翹 知母 生 薑 石膏 竹葉 麥冬 黃芩 茯苓 芍藥 甘草 薄荷 及甘露飲
 下利清穀純陰症而反見渴者是陰在下附陽
 干上或兼泄瀉津脫也四逆湯炮姜 附 子 炙 甘草 理中湯參 朮 乾 薑 芍藥
 乾姜 服桂枝湯大汗出反大煩渴不解脉洪大
 者白虎湯石膏 知 母 甘草 粳米 加人參湯 下後口乾舌燥是邪熱
 客於中焦也人參白虎湯 下後脉浮發熱渴欲
 飲水小便不利猪苓湯二苓 澤 瀉 阿膠 汗出多而渴者禁
 用。
 舌胎
 邪氣入裡津液搏結則舌上生胎但白而滑者表邪

猶未解也葛根湯葛根 桂 枝 芍藥 麻 黃 甘草 杏仁 熱邪漸深舌上黃胎燥
 渴飲水表裡俱熱人參白虎湯參 朮 乾 薑 芍藥 粳米 知 母 黃 芩 連 翹 葛 根 加天花粉
 知母黃連山梔竹葉熱聚於胃內實不大便舌上
 黃胎調胃承氣大黃 枳實 芍藥 甘草 熱深病篤舌上黑胎躁渴譫
 語大便不通急下之大承氣湯枳實 芍藥 黃 芩 連 翹 葛 根 又有陰寒症
 水來尅火亦生黑胎但其胎不濇不燥不渴不熱
 脉必沈細足冷四逆湯炮姜 附 子 炙 甘草 太陽症誤下胃
 中空虛客熱薰胃懊憹生胎梔子豉湯
 項強
 風寒客於太陽經故項背強也然結胸寒濕皆病項
 背強臨病須詳審 太陽症項背強元元無汗惡
 風者為表實葛根湯葛根 桂 枝 芍藥 麻 黃 甘草 杏仁 發熱項背強元元反
 汗出惡風者為表虛桂枝湯桂枝 芍藥 甘草 粳米 知 母 黃 芩 連 翹 葛 根 誤下
 太陽症結胸項強大陷胸丸黃 芩 芍藥 枳實 芍藥 甘草 粳米 知 母 黃 芩 連 翹 葛 根 或頻與理中湯
 損甚者兼與四逆湯炮姜 附 子 炙 甘草 傷寒四五日身熱
 惡寒頸項強脇下滿手足溫而渴小柴胡湯柴胡 枳實 芍藥 半夏 黃芩 連翹 葛根 渴甚加白
 陰毒病初得項背強咽痛心腹滿短氣厥逆
 吐利身如被杖附子湯附子 芍藥 甘草 粳米 知 母 黃 芩 連 翹 葛 根 陰毒甘艸湯甘草 芍藥 粳米 知 母 黃 芩 連 翹 葛 根

醫甲 雄黃

胸脇滿

胸滿者。胸膈間氣塞滿悶也。非心下滿。脇滿者。脇肋下氣填脹滿也。非腹中滿。蓋邪自表傳裡。必先至胸脇。以至心腹而入胃。是以胸滿多帶表症。宜發汗。脇滿多在半表半裡。宜和解。至于邪結心下。不經下後而滿者。治則有吐下之殊。若下後而心下滿者。症則有結胸痞氣之異矣。太陽病不解。傳入少陽。脇下硬滿。乾嘔不能食。往來寒熱。脈沈緊。

治六還

傷寒近卷之二

五

頁白堂

者。小柴胡湯

柴胡 半升

陽明症。心下硬滿者。不可

攻。攻之利遂不止者死。利止者愈。

太陽陽明合

病喘而胸滿者。不可下。宜麻黃湯

麻黃 桂枝 杏仁 甘草

太陽病

下後。脈促胸滿。桂枝湯

桂枝 芍藥 甘草 大棗 生姜

去芍藥。微惡寒者。加

附子。陽明病發潮熱。大便溼。小便自可。胸脇滿

不去者。小柴胡湯

柴胡 半升 枳實 芍藥 甘草 大棗 生姜

陽明病喘而胸滿。猶

帶表邪。不可下。宜麻黃杏仁甘草湯

陽明病。脇

下硬滿。不大便而嘔。舌上白胎。小柴胡湯。上焦通

津液得下。胃氣因和。微然汗出而解。

陽寒六七

日往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲食。心煩喜嘔。或

脇下痞硬。小柴胡湯加乾姜牡蠣。傷寒八九日

下之。胸滿驚煩。小便不利。譫語。一身盡痛。不可轉

側。柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡 半升 龍骨 桂枝 芍藥 甘草 大棗 生姜 牡蠣 鉛丹

發汗

若下之。煩熱。胸中窒者。梔子豉湯。寸脈微浮。或

沈伏。胸中痞硬。上冲咽喉。不得息者。為胸中有寒

或痰實。並入瓜蒂散。胸中痞氣滿悶。小柴胡加

黃連瓜蒌枳椇。病在胸。當吐。反誤汗下。胸中窒

塞。煩熱者。梔子豉湯

治六還

傷寒近卷之二

五

頁白堂

腹滿

胸膈脹者。邪氣閉塞。脇肋脹者。邪氣流布。心腹脹者。

邪食交結。蓋邪自表傳裡。先自胸脇。以至心腹。而

入胃。是以腹滿多屬裡症。但有陰陽虛實之殊耳。

不可按。按之則痛。常滿不減者。為裡實。須下之。大

承氣湯

黃芩 枳實 芍藥 甘草 大棗 生姜

之。理中湯。若胸腹雖脹滿。猶有寒熱。脈浮。是

表邪尚未全入裡。總日數多。不可下。宜小柴胡湯

柴胡 半升 枳實 芍藥 甘草 大棗 生姜 去參。加桔梗。青皮。若大滿大實。雖日數

半

少亦當下謂邪已入裡也。陽實為邪則腹滿而咽乾。陰寒為邪則腹滿而吐利。食不下。若經汗吐下後而腹滿者。治法又各不同也。發汗不解。腹滿痛者。急下之。大承氣湯。黃硝枳朴 本太陽病誤下。因而腹滿時痛者。屬太陰也。桂枝加芍藥湯。桂芍大 實痛者。桂枝加大黃湯。桂芍大 脈弱其人續自利便。設用前湯宜少與之。以其人胃氣弱。易動故也。太陰腹滿。吐食不下。枳桔理中湯。枳參朮乾姜 加丁香厚朴木香。口燥咽乾。腹脹滿痛不大便。此陽

證治大還 傷寒近卷之二 主 貞白堂

邪傳入少陰經也。急下之。大承氣湯。黃硝枳朴 汗後腹滿。此非裡實。由脾胃津液不足。不能敷布諸氣。壅滯而為脹也。厚朴半夏生薑人參湯。吐後腹脹滿。是胸中之邪傳入于胃也。調胃承氣湯。大黃硝枳 下後腹滿。梔子豉湯。兼心煩。起臥不安。邪氣壅于心腹之間。滿則不能坐。煩則不能臥。宜梔子厚朴枳實湯。腹滿痛者。脾不勝水。水與氣搏于皮膚之間。腹中漉漉有聲。小半夏茯苓湯加桂枝。

謬語

邪氣盛則實。精氣奪則虛。實則譫語。虛則鄭聲。傷寒胃熱上乘于心。則神思昏迷。故妄見妄言也。輕者睡中呢喃。重者不睡。亦言。熱極者。罵詈不避親疎。凡此皆熱之輕重所使也。大抵熱入于胃。水涸糞燥。必發譫語。經曰。傷寒四五日。脈沈而喘。滿沈為在裡。反發其汗。津液越出。大便為難。表虛裡實。必發譫語。又有被火劫者。有亡陽者。有瘀血者。有陽為陰迫。神不守舍而錯語者。但氣短者死。脈和者愈。微瀉者難治。若喘滿直視而氣逆。自利柔脫而

證治大還 傷寒近卷之二 主 貞白堂

奪下皆為逆也。錯語狂言。其人有時自知覺。熱輕者。黃連解毒湯。連芩枳梔 狂亂不知人。身熱汗多。潮熱腹滿。躁渴不大便。或尋衣摸床。直視叫罵。脈沈實有力。急用大承氣湯。黃硝枳朴 下之。陽明病譫語。潮熱。脈浮而疾者。小承氣湯。黃硝枳朴 腹中轉失氣者。更服一升。若不轉失氣。脈反微濇者。裡虛也。慎勿更與承氣。下利譫語。脈不微細。為有燥糞也。小承氣湯。利不止者死。得病無身熱。但狂言煩躁不安。精采不與人相當。五苓散。茯苓澤水調服 謬

語脉弱無力。生脉散。參麥冬五味。加黃連。竹葉。犀角。石

膏。發汗多亡陽。譫語者。此是汗出後。津液不和

不可下。柴胡桂枝湯。柴胡桂枝。以和榮衛而通津

液。差後身無熱。不渴。但錯語少神。此餘熱在心

包絡也。知母麻黃湯。知母麻黃。傷寒十三日不解

過經譫語者。以有熱故也。調胃承氣湯。黃硝。肩

背胸脇有斑數點。語言狂亂。脉沈細。此非熱也。陽

為陰迫。上入于肺。故斑見。神不守舍。故錯語也。宜

葶耐湯。譫語小便利如常。大便洞下。或發躁熱。妄

言者。此陰隔陽之譫語也。宜四逆湯。炮薑附。脉弱

無力。四肢厥冷。人參三白湯。人參白朮。熱退

後。目不識人。語言謬誤。用參芪歸朮等劑。狂言

譫語。漱水不咽。大便秘。小便利。或身黃腹滿。此為

當汗。失汗。蓄熱在裡。瘀血症也。輕則犀角地黃湯

犀角生。重則桃仁承氣湯。大黃桃。加歸尾。川山甲。

婦人熱入血室。晝靜夜譫。如見鬼狀。小柴胡。柴

參半。合四物。熟地。加丹皮。生地。童便。陽明病

下血。譫語為熱入血室。止頭汗出。用荊芥二錢。葛

根三錢。黃芩一錢半。麥冬五錢。丹皮一錢半。生蒲
黃二錢。濃煎。加重便對飲之。

證治大還 傷寒近日錄

前集 卷之三

傷寒六經正病方論

發狂 潮熱 嘔吐

衄血

傷寒六經變症治例

煩熱 發狂 發斑 發瘧

發黃 小腹痛 吐血

結胸 痞滿 下利 蓄血 便膿血

卷之三

傷寒近日錄

貞白堂

陳氏傷寒近 前集卷之三

雲間陳 治三農甫述

門人 范 崧壽 王 顯贊 皇 參

長洲周之士渭文甫閱

男 師 柴 堯 愚 校

發狂

傷寒發狂皆獨陽亢極熱甚所致然有陽狂如狂驚

狂陰狂者臨病悉宜詳審陽狂因失于汗下熱毒

在胃併入于心使神志昏迷故妄言妄笑棄衣奔

走踰垣上屋罵詈親疎經所謂重陽者狂是也其

症便秘目赤鼻乾唇燥舌胎脉數實滑大非鹹寒

卷之三

傷寒近日錄

貞白堂

之劑大下之不可急用大承氣湯黃芩加芍連倍

硝石下之熱輕未可下者三黃瀉心湯連芍倍

如狂者其症唇燥漱水不欲嚥小水不利大便黑

小腹滿按之結痛其人如狂而血自下者愈不愈

桃仁承氣湯黃桃桂 加歸尾川山甲 驚狂者傷

寒脉浮以火逼劫之亡陽必驚狂起臥不安桂枝

救逆湯杜獨勝龍 陰狂者陰極發躁如發狂狀

手足厥冷脉沈細微遲雖煩渴不喜飲水附子湯

諸虛散附葛 凡發狂狂妄奔走人難制伏先以

醋傾炭火上使氣沖入病者鼻中俟定後用藥若
狂言直視便溺自遺及汗下後大熱脈躁狂言皆
難治也。

三農治汗後狂言身熱發渴用白虎湯黃知州身

熱煩躁不得汗脈洪大表裡俱熱發狂三黃石膏

湯連芩知州陽毒發狂煩躁狂走妄言叫聲如

見鬼狀面赤咽痛鼻如烟煤身斑如錦下利黃赤

陽毒升麻湯升麻甲歸犀角大青湯犀角大青連本

溫熱病不得汗出而發狂急宜通解散麻黃膏

治六還傷寒近二貞白堂

少陰症不當發汗見其惡寒遂強發之因漏

不止其人亡陽而狂者黃芪建中湯芪桂加熟附

太陽病六七日表症仍在脈微沈反不結胸其

人發狂小腹硬滿小便自利以太陽經熱在裡

血症諦也抵當湯水蛭虻虫

便結

便結有陽結陰結有汗多小便數大便因硬者不可

概以下藥下之如脈浮惡風此猶帶表邪不可下

經曰疑欲攻之尤當先解表乃可下嘔吐為邪未

入府不可攻若汗後小便數大便硬少與小承氣

湯黃知州和之恐津液內竭也若六七日不大便遠

臍硬痛煩躁發作有時頭痛有熱者此為實結急

用大承氣湯黃知州下之如脈浮而數燥渴能食不

大便此為陽結大柴胡湯柴芩芍牛脈沈而遲不

渴不能食身體重大便反硬此為陰結四物麻仁

湯加熟附若曾經汗吐下後或陽明白汗過多或

曾經利小便而大便不通者此津液內竭大便因

難也傷寒近三貞白堂

遂嚴傷寒近便難用下藥不下以補中益氣湯加蘇梗香

仁或芍歸湯加上二味或六味地黃丸料煎飲

便燥躁熱四物湯芍歸芍加黃柏知母傷寒六

七日目中不了了睛不和無表裡症大便難身微

熱者此為實也急用大承氣湯黃知州無表裡症

下後脈數不解消穀善飢六七日不大便有瘀血

也抵當湯水蛭虻虫脈症皆有燥屎用下藥但

有清水者此熱結不開故屎不下耳大承氣湯加

薑炒黃連木香熱結堅固三四下之而不得通

三乙承氣湯加甘遂末五分甚者用大戟芫花甘遂等分爲末每五分用蜜湯調服 大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎大承氣湯病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘急不能臥者有燥屎也大承氣湯 胃脈浮滿浮爲胃陽強滿爲脾陰弱浮滿相搏大便則難其爲脾約麻仁丸 麻子芍枳 大黃朴

潮熱

潮熱者一日一發日晡而作如潮水之信也邪入胃

證 八選

卷之三

四

真白堂

府實熱燥糞使然皆屬陽明胃熱以陽明旺於未申也設或脈浮而緊或小便難大便澀而潮熱者熱未入府猶帶表邪先當和解其外俟大便硬或煩熱汗出日晡潮熱脈實者方可以大小承氣看輕重下之若潮熱於寅卯則屬於少陽潮熱於巳午則屬太陽是又不可不辨 日晡發熱至曉而退大便自利脈虛宜用葶附辛熱之劑 陽明病汗出不惡寒身重短氣腹滿而喘潮熱手足濇然汗出此大便已硬也大承氣湯 黃芩 枳 朴 病人煩熱

汗出則解有如瘧狀日晡潮熱脈實者大柴胡湯 柴芩芍半 枳大黃 脈虛者桂枝湯 桂芍 陽明病脈浮而緊潮熱發作有時但脈浮者必盜汗出柴胡桂枝湯 柴芩參半 桂芍 若潮熱大便澀小便自可胸脇滿不去者小柴胡湯 柴芩參 半 枳 芍

嘔吐

表邪傳裡裡氣上逆則嘔吐而水穀不下然有寒熱

水氣膿血之分胃熱則脈弦數口舌煩渴胃寒則

脈弦遲逆冷不食水氣先渴後嘔膿血間怪性膿血

證 八選

卷之三

五

真白堂

喉間血腥奔逆衝上不必治嘔盡血自愈大抵寒邪在半表半裡則多嘔吐凡嘔吐得之於太陽者非痰飲停滯胸間必是合病嘔乃漸入於內非正太陽也然經言嘔多雖有陽明症不可攻者爲其氣逆未收斂爲實也設或陽明症其有燥屎在胃不得疎通熱氣上冲而嘔頭痛者急以承氣下之不可拘於嘔屬上焦也 太陽病獨見嘔吐恐病人素有痰飲停滯先用二陳湯 陳半 茯苓 枳 芍 候嘔吐定然後用解 太陽病發汗出心下煩悶痞硬下利

嘔吐者大柴胡湯柴芍芍生枳大黃 太陽陽明合病頭

痛身疼發熱目痛鼻乾不眠而嘔葛根湯葛桂麻芍

加半夏 太陽少陽合病發熱頭痛身疼寒熱往

來脇痛而嘔黃芩湯芍 加半夏生薑 少陽病

寒熱往來胸脇滿而嘔小柴胡柴芍參半 倍半夏生

薑心煩加薑炒黃連 食穀欲嘔者屬陽明吳茱

萸湯更得湯反劇者屬上焦葛根半夏生薑湯

胸中有熱胃中有邪腹脹氣逆欲嘔者此陰不得

升而獨滯於下嘔不得降而獨炎於上黃連湯連

證治六選

傷寒近卷之三

六

貞白堂

加木香升降陰陽 太陰腹痛嘔吐理中

湯參朮 加丁香薑汁 少陰不渴而嘔或乾嘔者

理中湯加生薑 厥陰吐涎沫及食穀嘔者吳茱

萸湯加半夏薑汁 先渴而嘔胸間有水氣小半

夏茯苓湯 嘔五脈弱小便復利身有微熱見厥

者為難治四逆湯炮薑附 渴而飲水水入即吐

名曰水逆由心經受邪而小腸不便也五苓散茯苓澤

桂 陽症新瘥後見嘔吐別無所因此餘熱在

胃腕也作葉石膏湯多冬 初得病便嘔吐

多是傷食着寒藿香正氣散藿蘇芷蒼桔陳朴腹皮半神薑 胃

熱而嘔葛根芩連竹葉石膏薑汁 胃虛而嘔參

苓白朮陳皮半夏生薑

衄血

經曰傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯是傷寒

衄血皆因邪熱拂鬱於表當汗不汗熱無由解壅

遏於經迫血妄行故也邪輕者得衄而解邪重者

雖衄不解脈浮緊身熱惡寒無汗麻黃湯自汗惡

風麻黃湯桂枝湯桂芍 治以麻黃桂枝者取其散

證治六選

傷寒近卷之三

七

貞白堂

經中邪氣耳設或脈不浮緊無表症者切不可用

身涼而衄者犀角地黃湯犀丹生 以涼其內脈微

者黃芩芍藥湯芍 衄血雖為欲解若血不止頭

汗出身無汗反發熱汗出不至者皆惡症也凡

汗後不解其人發熱目瞑漱水不欲咽反脈浮發

熱口乾鼻燥能食者必衄但身涼脈滑小者自愈

身熱脈實大者死 太陽症衄血及服桂枝湯後

衄者此為欲解也犀角地黃湯犀丹生 太陽症

脈浮緊發熱無汗自衄者愈衄不止茅根湯 陽

此丸。傳裡胃中。有鬱熱也。若經吐下後。心下滿。

汗下後。十餘日。心煩不睡。此因汗下虛。餘

留於心包以致神不清故也宜硃砂安神丸歸生連神

兼仁胆星 下利後反煩按之心下濡者此虛煩

也梔子豉湯 腎傷寒表裡無熱煩悶不欲見日

光有時腹痛脉沈細四逆湯炮薑附炙

煩躁

煩躁者心火與邪熱為之也煩乃熱之輕躁乃熱之

重傷寒煩躁有陰陽虛實之殊心實則煩陽實陰

虛腎熱則躁陰實陽虛寒邪鬱熱而煩躁則宜汁

然邪在裡而煩躁則宜下陰極發躁則宜溫傷寒

證治十選

傷寒近卷之二

十

貞白堂

六七日其人煩躁者此為陽去入陰也三陰煩少

陰為多三陰躁厥陰為甚凡下利發熱與厥逆煩

躁不得眠及惡寒拘攣脉不出而躁者皆不可治

也太陽中風脉浮緊發熱惡寒身痛不汗而煩

躁者此榮衛俱傷也大青龍湯麻桂杏已得汗而

煩躁五苓散木茯苓桂身無熱但狂言煩躁者同此

湯若脉微弱汗出惡風者不可服大青龍湯服之

則厥逆筋惕肉瞤真武湯附子茯苓陽明有燥屎

不大便腹硬痛煩躁者大承氣湯黃芩枳實煩躁者

者白虎湯音知竹葉石膏湯參竹葉由陽經

傳入陰經陰得陽而煩自利而渴不眠者五苓散

木茯苓加辰砂陰氣犯陽經吐利厥冷而煩此陽

虛而陰盛之也吳茱萸湯黃芩甚者四逆湯炙附炮

加葱白下之後復發汗晝日煩躁不安夜則安

靜不嘔不渴無表症脉微沈身無大熱乾薑附子

湯不煩便作躁悶欲臥於泥水中其脉沈細

手足厥冷飲水不得入口此陰盛格陽陰極發躁

也宜通脉四逆湯參附乾仍以艾湯調硫黃末二

證治十選

傷寒近卷之三

十

貞白堂

三錢立時汗出而愈太陽病發汗及大汗出胃

中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與之令胃氣

和則愈若脉微浮小便不利微熱消渴者五苓散

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯茯苓

附乾凡陰毒火熨而煩躁或進熱藥而煩躁者

切忌涼劑俱宜四逆湯炙附炮

發喘

當分表裡水氣而治邪在表而發喘則心腹濡而不

堅外症無汗法當汗之邪在裡而發喘則心腹脹

而為滿。外症有汗法當下之水氣。心下怔忡。小青

龍炮薑細辛麻桂去麻黃加杏仁茯苓。若直視謔

語。汗出如油。喘而不休。死症也。太陽症。頭痛發

熱。身疼腹痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘。麻黃湯桂麻

杏白汗惡風而喘。桂枝湯桂芍加厚朴杏仁。陽

明症。脈浮無汗而喘。麻黃湯。太陽陽明合病。喘

而胸滿者。麻黃湯。陽明汗出不惡寒。短氣腹滿

潮熱而喘。大柴胡湯柴芍枳大黃加厚朴杏仁。悞

下。太陽利不止。脈促者。表未解也。因喘而汗出者。

證治六選

傷寒論卷之三

主

真白堂

裡熱氣逆也。葛根黃連黃芩湯。加甘艸。散表邪去

裡熱。汗出而喘。無大熱者。邪氣外甚也。麻黃杏

仁甘艸石膏湯。太陽病。下之微喘者。表未解也。

桂枝湯加厚朴杏仁。病人小便不利。大便乍難

乍易。時有微熱。喘冒不能臥。有燥尿也。大承氣湯

黃硝俱朴下後大喘。裡氣虛。正氣將脫也。生脈散麥

冬五味加杏仁陳皮薑棗

發斑

傷寒失于汗下。或汗下後不解。熱邪內鬱。裡實表虛

血熱不散。故傳於皮膚而為斑也。輕則為疹。甚

則為錦紋。皆不可汗。汗則重令開泄。更加斑爛矣。

凡汗下後不解。病人昏憤耳冷耳聾。足冷煩悶躁

亂。起臥不寧。煩嘔喘嗽。皆是發斑之候。將燈照看

胸背四肢。有鮮紅起發者。吉。稠密成片者。凶。雜黑

者。危。大便自利。沸鬱氣短。燥屎不通者。死。初出時

不可便用涼寒之藥。以攻其熱。亦不可汗下。以虛

其表。裡欲出未出之際。先與升麻葛根湯升葛芍加

紫草。草以透其毒。脈弱人虛者。加人參。稠密喉疼。

證治六選

傷寒論卷之三

三

真白堂

玄參升麻湯。加甘艸。次以犀角消毒飲牛蒡子荆

犀。若脈洪數熱甚。煩渴。人參化斑湯參膏知心煩不

眠。錯語呻吟。斑色紫赤。黃連解毒湯芩連知黃石

膏湯連芩膏和玄梅斑勢漸退。大便秘澀。語潮熱

者。調胃承氣湯黃硝未可下。且與小柴胡去半夏

加天花粉。連柏山梔大青。其人素虛。因服寒涼藥

太過。伏寒在下。逼其無根失守之火。聚于胸中。上

炎薰肺。故斑見於皮膚者。此為陰斑。其斑稀少。其

色淡紅。宜調中溫胃湯蒼陳砂朴藿芍桂寒甚

脉微者大建中湯歸芍木莖附參芪麥冬茯苓半熟地桂炙艸使真陽

回而陰火自降 傷寒有表証惡寒壯熱拘急胸

中煩悶者先用加味羌活湯解其外邪而後治斑

傷寒壯熱百節疼痛而發斑者宜陽毒梔子湯

澹公治一人傷寒十餘日身熱而人靜脉皆伏眾俱

不治舌胎滑兩額赤如火發斑公曰夫血脉之波

瀾也今血為熱邪所搏渾而為斑外見于皮膚呼

吸之氣無形可依猶溝隊之無水雖有風不能成

波瀾耳斑消則脉自出以白虎加人參化其斑脉

證治大還

傷寒近
卷之三

百九 貞白堂

隨復又以承氣湯下之而愈

發黃

傷寒發黃濕熱瘀熱者為多陰黃蓄血者間有之臨

病悉皆詳審濕熱者一身盡痛發熱身如薰黃而

暗口渴小便不利茵陳五苓散茵蒼薑蘆藜術茯苓澤瀉桂枝瘀熱

者熱蓄脾胃熱與宿穀相搏蒸鬱如橘黃而明頭

汗出至頸而還身無汗熱不得外越渴飲水漿小

便不利茵陳湯茵梔大黃陰黃乃大陰中濕体痛發熱

身如薰黃小便自利承附散承附不利五苓散茯苓

澤猪如脉沈細手足厥冷肉上粟起或氣促嘔悶

舌上白胎通身發黃或時躁渴欲投泥水中附子

理中湯附參朮加茵陳蓄血發黃脉沈結少腹硬

滿小便自利大便黑身黃如烟薰色唇焦黑其人

如狂此為蓄血在下焦也梔子承氣湯黃硝桂甚

者抵當湯水蛭虻虫桃仁大黃經曰陽明病無汗小便不利

心中懊憹者身必發黃又曰頭汗出身無汗小便

不利渴飲水漿此為瘀熱在裡身必發黃諸黃用

茵陳一握同生薑搗碎絹包周身擦之其黃易退

證治大還

傷寒近
卷之三

貞白堂

其蓄血發黃者但去其血而黃自退不必治其黃

也凡黃寸口無脉鼻出冷氣形如烟薰搖頭直視

環口黑汗出皆黃是皆真藏氣絕也 傷寒六

七日下藥太過脾胃虛津液亡渴飲水漿脾土為

濕陰所加與邪熱相搏此陰黃也宜用溫劑 傷

寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵

陳蒿湯 傷寒身黃發熱者梔子柏皮湯加甘艸

傷寒瘀熱在裡身必發黃麻黃連翹赤小豆湯

加杏仁梓白皮炒棗

韓祇和治一人發黃喘滿頭痛飲食如故大小便如常此濕熱在頭也以瓜蒂散搐之而愈

又治一人發黃小便赤大便如常鼻酸痛此濕熱在清氣道中也以瓜蒂散吐之愈

結胸

經曰病發於陽而反下之熱入因作結胸蓋太陽症自汗惡風當服桂枝湯誤用承氣下之表間邪熱乘虛入裡遂成結胸今人不問曾下與否但見心胸飽悶即曰結胸遂以枳實湯頻頻與之反成真

證治太遲

傷寒九卷之三

白雲

結胸殊不知結胸乃下早而成未嘗經下者非結胸也

正屬少陽部分只宜小柴胡柴胡 芍藥 枳實 黃芩 參 連 牛 瓜 葵 枳加枳桔

治之或以本方合小陷胸湯服連 牛 瓜 葵 枳若因下之

而成者方用陷胸湯丸分淺深從緩治之若表邪

未盡裡症未實宜疎邪流氣飲薄 壳 朴 烏 藥 腹 皮 瓜 蒌 牛 黃 蘇 木 通

大抵不宜太峻上焦乃清道至高之分若過下則

反傷元氣矣經曰結胸症不可下下之則死結

胸病發於陽亦有陰結用理中熱劑而愈者痞滿

病發於陰亦有陽痞用三黃涼劑而痊者此陰陽

二字乃指榮衛而言非指寒熱論也

陳三農云下之太早成結胸者宜枳實小氣湯枳實 芍藥 黃芩 參 連 牛 瓜 葵 枳

不按自痛連臍腹邊手不可近按之石硬脉沈

緊者大結胸大陷胸湯丸黃 硝 遂 芒 硝 枳 實 芍 藥 黃 芩 參 連 牛 瓜 葵 枳

後欲成結胸者不 熱 渴 小 便 急 與 理 中 湯 參 朮 白 為 寒 結 胸 急 與 理 中 湯 參 朮 白 為 寒 結 胸

頻與之以理中焦之邪崔 行 公 云 結 胸 心 膈 高

起手不可近用大陷胸等湯不愈此是下後虛逆

寒毒與氣交結於胸中也宜理中湯加枳實瓜蒌

牡蠣為丸彈子大湯下二丸重 發 汗 而 復 下 之

證治七還

傷寒九卷之二

白雲

不大便五六日舌上燥渴日晡潮熱從心下至小

腹硬滿而痛手不可近大陷胸湯黃 硝 遂 芒 硝 枳 實 芍 藥 黃 芩 參 連 牛 瓜 葵 枳

渴心下痛為熱實結胸少與大陷胸湯加黃連

雖痛而無煩躁等症此因下後虛逆寒氣獨結為

寒實結胸理中湯參 朮 白 為 寒 結 胸 急 與 理 中 湯 參 朮 白 為 寒 結 胸加枳實茯苓或三物白散

枳實 芍藥 黃芩 參 連 牛 瓜 葵 枳 水結胸心下怔忡無大熱頭汗出心下或

滿採之汨汨有聲茯苓半夏湯茯 苓 半 夏 枳 實 芍 藥 黃 芩 參 連 牛 瓜 葵 枳

不利五苓散茯 苓 猪 苓 桂 枝 白 朮 澤 瀉若水結不行大便實者大陷

胸湯黃 硝 遂 芒 硝 枳 實 芍 藥 黃 芩 參 連 牛 瓜 葵 枳血結胸手不可近漱水不欲咽或喜

忘如狂或大便黑色小便自利犀角地黃湯犀角生赤芍

加大黃桃仁甚者抵當湯水蛭虻蟲支結胸

中妨悶發熱微惡寒支節煩疼微嘔柴胡桂枝湯柴芍參半

桂芍加黃連枳實微結胸膈滿小便不利

心煩口渴頭汗出往來寒熱柴胡桂枝乾薑湯柴芍參半

去心中結痛者梔子豉湯傷寒五六日大下之後身熱不去

斑發狂吃逆者最重結胸症悉具煩躁者死

一切結胸痞滿用生薑搗爛去汁取渣炒熱揉熨其

證治大遺傷寒卷之二 白雲堂

結自開

痞滿

痞者心下滿而不痛也經曰病發于陰而反下之因

作痞滿蓋太陽症無汗惡寒當服麻黃湯而誤用

承氣下之表邪乘虛內陷留結胸中因成此症蓋

輕於結胸者外症心下滿而不痛按之則濡此乃

虛邪留滯故但滿而不痛也惟宜小柴胡加枳實

芍歸葛根升麻黃連香附陳皮蘇梗茯苓澤瀉為

妙不因誤下而痞者或痰或食或氣為之結也須

詳察治之誤下成痞枳實理中丸枳朮參最妙

表未解而心下妨悶名支結柴胡桂枝湯柴芍參半

吐下利裡邪已實也用大柴胡湯柴芍參半兼表

裡而治之寒痞內虛寒不能運化或氣滯停食

而痞者理中湯參朮乾加枳實茯苓熱痞時煩

熱而渴先用枳朮湯大黃連瀉心湯參連半人

大下後復發汗心下痞硬惡寒者表未解也不可

攻痞先用桂枝湯桂芍解表表解後以大黃黃連

證治大遺傷寒卷之二 白雲堂

瀉心湯攻痞實熱之邪心下痞大便秘者大黃

黃連瀉心湯心下痞復惡寒汗出者氣虛也

附子瀉心湯大黃黃連心下痞按之濡其脈關上

弦者虛熱內結也大黃黃連瀉心湯痞而陰陽

相雜半夏瀉心湯誤下傷胃虛邪上逆心下痞

硬下利穀不化腹中雷鳴乾嘔心煩此下後胃虛

也甘艸瀉心湯發汗若下之煩熱胸中窒塞者

梔子豉湯表症未罷因攻之陽熱而利心下痞

硬表裡不解桂枝人參湯桂芍參表解而胃中

不和心下痞硬乾噫食臭腹鳴下利此汗後胃虛也生薑瀉心湯薑半 芩連發熱自汗惡風寸脉

微浮則邪不在表也胸中痞硬氣上冲咽不得息則邪不在裡也此胸中有寒也瓜蒂散此氣浮上

部填塞胸中故用吐藥以宣散其邪耳痞症下

之益甚者此非結熱以胃中虛客氣上逆也甘州

瀉心湯生薑半 芩連服瀉心湯痞不去煩渴口燥小便

不利者此水飲內蓄非熱痞也五苓散茯苓桂

或吐或汗或下後心下痞硬噎氣者胃虛氣上逆

證治六選傷寒 卷之六 白雲

也旋覆代赭湯參半 枳

腹痛

傷寒腹痛有陰陽虛實之殊可按可揉者為虛不可

按不可揉者為實其痛不常身熱煩渴遠勝硬痛

者實熱也痛無休時或下利清穀者虛寒也大抵

腹痛屬裡太陽少陽則無腹痛惟陽明腹滿急痛

此為裡實宜大柴胡柴芩芍半 枳大黃小承氣黃硝 蘗用

三陰下利清穀而腹痛者裡寒故也附子理中湯

附參元 乾薑然太陰腹痛有虛有實腸鳴泄利而痛者

感虛也小建中湯芍桂腹滿痛大便秘按之痛甚

者實也桂枝桂芍加大黃枳實發汗不解腹滿痛

者急下之大承氣湯黃硝 枳朴大下後六七日不大

便煩熱不解腹滿痛者此有燥糞故也大承氣湯

小腹滿

小腹滿者臍下滿也胸滿心下滿皆為邪氣而非物

惟小腹滿則為有物而非氣小便利則為蓄血之

形小便利不利乃是溺瀆之症多利之劑宜分兩途

太陽病六七日表症在脉微沉不結胸發狂小

腹硬滿小便自利此蓄血也桃仁承氣湯大黃硝 桂芍

抵當湯水蛭蟅蟲 桃仁大黃太陽病少黃脉沈結小便硬

滿小便不利五苓散茯苓桂加滑石木通車前子

手足厥冷不結胸小腹滿按之痛者此冷結臍臍

也真武湯附水 茯苓仍灸關元穴

小便不利

邪氣聚於下焦結而不散故小便不利小腹硬滿而

痛也然膀胱受熱亦致小便赤澀而不流利大抵

有所不利者利之然中濕發黃水飲停蓄下焦蓄

熱皆以利小便爲先。若因汗多，津液乾而不利者，則以利小便爲戒。經曰：「天下後復發汗，小便不利者，亡津液故也。」慎勿利之，俟津液足而自利。苟小便不利而自汗不止，此又爲陽脫關格之症矣。

太陽症發熱無汗煩渴飲水多小便不利脈浮者

五苓散

求伏澤

豚沈者指

陽二苓澤

陽明病

無汗小便不利心下懊惱身必發黃五苓散加茵陳

汗身黃小便難潮熱而嘔者小柴胡

柴胡

加茯苓

證治六還

傷寒

卷之二

白堂

苓嘔而發熱胸滿心下怔忡小便不利此亡血

心五苓散加茵陳

汗下後仍頭痛項強發熱無

汗心下微滿痛小便不利桂枝湯

桂枝

加茯苓白

朮少陰病四逆小便不利四逆散

炙附

加茯苓

苓發汗後遂漏不止其人惡風四肢微急難以

屈伸而小便難者是陽虛不能生陰液也桂枝湯

桂枝

加熟附子茯苓

陰血虛陽乘陰小腸伏熱

便溺滴瀝色黃赤經口陰虛則小便難宜五苓散

加滑石凡小便不通先將麝香半夏末填入臍

中上用葱白田螺搗爛作餅封上外用布縛定下用皂角燒烟薰入陰中其水自通矣。

下利

下利者不因攻下而自利是也須當別其陰陽而治

陽利身熱作渴糞焦黃臭利出有聲臍下必熱黃

芩湯

芩芍

陰利身不熱洞下清穀其色淡白臍下

多寒理中湯

參朮

又有內不大滿猶生寒熱未可

下而下之內虛協熱大便赤或及下腸間垢膩白

頭翁湯

翁柏連

又有心下硬滿煩語煩渴身熱

證治六還

傷寒

卷之一

下利純清水此因胃中有燥屎飭飲下咽即彼熱

邪逐出故也大承氣湯凡此之類或清或溫或攻

或利隨症施治但不可發汗邪氣內攻復泄其津

液必轉虛胃氣而成脹滿也又下利脈大者爲未

止下利脈沈而遲其人面赤身有微熱必鬱目汗

出而解下利脈弱身微熱而渴者自愈下利寸

脈浮數尺中濇者必便膿血下利脈數而渴者自

愈不爾必便清血以有熱故也若夫下利諸證

直視煩躁厥逆無脈及日數十行其脈反實皆不

治也

陳三農云有傷寒二十日忽一日瀉利三五次程急

後重譫語不吐乃胃中鬱火也宜三黃承氣湯

柏大黃 太陽陽明合病則邪併於陽陽實陰虛

必自下利頭疼目痛鼻乾脉浮葛根湯

太陽少陽合病下利頭痛胸滿乾嘔脉浮弦黃芩

湯 加半夏生薑 少陽陽明合病下利身熱

胸滿乾嘔往來寒熱脉長大而弦弦為木勝尅土

名曰負負者死脉長大不弦為順此少陽邪氣入

證治大還

傷寒卷之三

白雲

府也大承氣湯 太陽病不解下之協熱而

利心下痞硬表裡不解桂枝八參湯 救其表

陽症反下之遂下利清穀身體痛急用四逆湯

救其裡大便已調即用桂枝湯 救其表

自利不渴手足溫身不熱屬太陰為寒在中焦

理中湯 自利而渴引水自救身涼欲睡

屬少陰為寒在下焦附子湯 自利身冷

四逆不渴屬厥陰四逆湯 少陰病下利

脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔而煩白

通湯 加猪胆汁服湯脉暴出者死微續者

生 少陰病嘔而煩渴不得眠猪苓湯 以

利腎中之熱不愈急下之 少陰病下利清水色

純青心下硬痛口乾燥者急下之 少陰病下利

清穀裡寒外熱手足厥冷脉微欲絕又不惡寒面

色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者通

脉四逆湯 少陰病二三日不已至四五日

腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有

水氣其人或噦或嘔或小便利而下利者真武湯

證治大還

傷寒卷之一

白雲

附 傷寒發熱汗出不解心中痞硬嘔吐而下

利大柴胡湯 脉汗而遲下利清穀表

熱裡寒四逆湯 下利脉滑數為有宿食

也宜下之承氣湯 下利脉大者虛也以強

下之故耳尺脉弦腸鳴泄利腹痛者小建中湯

設脉浮革腸鳴者當歸四逆湯 蓄血

蓄血者瘀血蓄結於內也傷寒當汗失汗瘀熱在裡

所以血結也凡見眼閉目紅神昏語短眩冒迷妄

漱水驚狂鼻衄吐紅。乍涼乍熱背冷足寒兩脇少

腹硬痛大便黑小便數皆血症也。不必悉具但見

一二症急作瘀血治之在上焦手不可近犀角地

黃湯在中焦手不可近桃仁承氣湯大黃桃仁桂枝在下

焦手不可近抵當湯水蛭虻蟲桃仁大黃太陽病身黃脉

沈結少腹硬滿小便自利其人如狂瘀血症也抵

當湯陽明病其人喜忘者必有瘀血抵當湯

下後無表裡症其脉數不解消穀易飢多日不大

便此為瘀血桃仁承氣湯

證治大還 傷寒卷之二 貞白堂

吐血

陽受熱當汗失汗致使熱毒積瘀於中遂成吐血

宜黃芩芍藥湯加甘艸脉滑數者犀角地黃湯犀角地黃芍藥甘草

生熱甚血不止者生地黃散枸杞柴連骨皮熟地天冬芍藥生芪坤

人虛者麥門冬飲子麥冬五味歸芍三黃補血湯

二地歸芍丹熱毒入深而吐血者桃仁承氣湯大黃桃仁桂枝

吐逆而吐膿血者犀角地黃湯犀角地黃芍藥甘草合解

湯芍藥甘草加梔子服桂枝湯吐者其後必吐膿血

犀角地黃湯大下後寸脉沈遲尺脉不至咽喉

不利吐膿血者麻黃升麻湯麻升歸桂芍藥甘草

陽毒吐血升麻湯升麻射乾血熱者黃連

阿膠湯連芍阿膠三黃瀉心湯大黃連黃芩吐鮮血

不止躁渴者黃連解毒湯黃連黃芩芍藥加丹皮茅花京墨

吐血不止用韭汁合童便磨京墨咽下血見黑

則止也

便膿血

經日下後數脉不解而下利不止必協熱而便膿血

又陽邪下行為熱多必便膿血蓋衝脉得熱則

證治大還 傷寒卷之二 貞白堂

血妄行在男子則為下血諸語在女人則為寒熱

似瘧皆熱入血室迫血下行也凡挾血之脉乍滿

乍數或伏或沈血熱交併則脉洪盛男多見於左

手女多見於右手也太陽病不解熱結膀胱其

人如狂而血自下者愈不愈桂枝湯桂枝芍藥陽明

病下血諸語胸脇滿如結胸夜則見鬼此為熱入

血室小柴胡湯柴胡芍藥腹滿身熱下如魚腦此濕

熱也桃花湯赤石脂乾地榆散地榆砂少陰症下

利便膿血桃花湯傷寒後便膿血裡急後重數至

固而不能便或少白膿有似于痢者切不可痛治
以內虛而風邪下陷聚虛入客大腸也慎勿利之
升舉其陽而陰氣自降矣升陽除濕防風湯

補陽
祛風

貞白堂

證治大要 傷寒近日錄

前集 卷之四

傷寒六經變症治例

乾嘔	短氣	咳逆
多眠	霍亂	咳逆
咽痛	不眠	鄭聲
戰慄	手足汗	陰症
筋惕肉瞤	心浮	頭眩
背惡寒	身振	動氣
差後勞復	似瘧	四肢拘急
狐惑	以瘧	鬱鬱
傷寒遺毒	傷寒	百合病
		陰陽易女勞復
		兩感

證治大要

傷寒近日錄
卷之四

一

貞白堂

陳氏傷寒近前集卷之四

雲間陳治三農甫述

門人范崧壽民參

華亭沈白賁園甫閱

男 師柴羔恩校
甥 周繩羽斯

氣逆

氣自腹中時時上冲者為氣逆然有陰陽虛實之殊
太陽病下之後其氣上冲者因表邪乘虛傳裡裡
不受邪故氣逆上仍在表也桂枝湯桂芍發汗吐
下後攻熱太過以致胃寒而逆者橘皮乾薑湯

證治大要

傷寒近前集卷之四

一 貞白堂

參桂心通半夏生薑湯加附子胃家有熱小柴胡

湯柴芍加薑炒黃連橘皮竹茹小便不通者豬

苓湯二苓澤大便不通者調胃承氣湯黃硝病後

虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯參荷麥冬

氣因發汗而氣逆者李根湯半桂歸茯苓汗下過

多陰虛冲火上逆者四物湯熟地加炒黃柏青

皮頭不痛項不强寸脉微浮胸中痞硬氣上冲咽

喉不得息此為胸中有寒瓜蒂散吐之

咳逆

咳逆俗名呃是也有虛有實有水氣有小便不利因

汗下過多中氣不足脉虛微氣不接續而呃者補

中益氣湯參送朮草加五味子麥門冬炒黃柏附

子有當下失下陽明胃實氣不得下通上冲而呃

者承氣湯黃枳內有伏陰迫其相火上冲病人自

覺煩躁憊之肌膚則冷氣自臍下直冲於咽喉而

呃者此陰症也羌活附子湯羌附朮木加肉桂人

參木香陳皮半夏砂仁飲水過多水寒停蓄心下

而呃者小半夏茯苓湯加生薑小便不利小腹滿

證治大要

傷寒近前集卷之四

二 貞白堂

而呃者豬苓湯二苓澤凡呃而不止頭汗出諸語

腹滿喘促四肢厥冷脉沈微散亂者死咳逆便

軟此胃氣虛而衝脉逆也瀉心湯半苓連加炒黃

柏咳逆便硬此熱氣冲肝肺也大承氣湯黃枳

驟下後發呃者鬱熱暴升也橘皮生薑湯半草

胃虛有熱橘皮竹茹湯加參胃冷理中湯參朮加

橘皮丁香柿蒂痰閉于上火鬱于下而氣不得

伸越者二陳湯陳半加杏仁姜黃黃連黃柏枳實

瓜蒌竹瀝薑汁

短氣

短氣者呼吸短促而不能相續也腹脹滿潮熱躁渴

而短氣者實也大承氣湯黃硝汗吐下後心腹濡

滿脉微細而短氣者虛也人參養榮湯參朮苓芪

遠志味陳桂心草食少飲多水停心下而短氣者水也小

半夏湯各半生薑五苓散猪桂身涼乾嘔短氣痛

引脇下汗出不惡寒痰飲也十棗湯先戟風濕和

搏氣短小便不通惡風不欲去衣邪在表也甘草

附子湯草朮

證治大還傷寒近卷之四

咳嗽

肺為邪所乘氣逆不下故令咳嗽然有肺寒者有停

飲者有邪在半表半裡者然水咳有三症小青龍

湯治水與表寒相合而嗽也真武湯治水與裡寒

相合而咳也十棗湯治癰合水動肺而咳也太

陽身熱惡寒身痛咳嗽喘而利小青龍湯乾薑細

芍五杏仁湯參半茯苓杏身涼咳嗽乾嘔微利

味草杏仁湯辛蘇陳前草少陽往來寒

熱胸脇硬滿而痛咳嗽小柴胡湯柴芩參去參棗

加人參乾薑五味四肢沈重痛腹痛下利或嘔

咳嗽者真武湯附夜加五味子乾薑細辛手足

厥冷腹痛泄利下重而咳四逆湯炙草炮加五味

子乾薑咳嗽有痰大半夏湯半茯苓

乾嘔

乾嘔者食在胃脘與穀氣相併熱氣上冲心下痞結

故有此症太陽頭痛自汗乾嘔桂枝湯桂芍少陰

下利乾嘔脉微白通湯葱白乾厥陰吐痰沫頭瘖

乾嘔吳茱萸湯參外有水氣二症又當以表裡別

證治大還傷寒近卷之四

之表不解心下有水氣乾嘔身微熱喘自利小

青龍湯乾姜辛麻桂不發熱惡寒但脇下痛咳

而乾嘔十棗湯先戟乾嘔不止心下鬱結微煩

大柴胡湯柴芩芍半胃熱煩渴乾嘔小柴胡柴芩

草加薑炒黃連山梔陳皮乾嘔而煩厥逆無脉

下利不止白通湯蔥白乾加猪膽汁裡寒外熱脉

微欲絕乾嘔通脉四逆湯炮姜附乾嘔自利黃

芩半夏生薑湯芩芍

噦

噦與乾嘔相似。皆有聲無物。但噦聲較之乾嘔。濁惡

而長耳。傷寒胃氣本虛。汗下太過。復飲冷水。水寒

相搏。虛逆則噦。又陽明病不能食。攻其熱必噦。又

有熱氣壅鬱。上下氣不得相通而噦者。輕則和解

之。通利之。甚則溫散之。病至於噦。亦危矣。噦而

手足冷者。小橘皮湯。陳皮生薑加姜附。噦而胸滿虛煩。

橘皮竹茹湯。參草。痰壅盛者。加黃連葛根。去人參。

噦甚。脉遲。厥冷者。理中湯。參草。加丁香附子。脉

不遲。六君子湯。參草。加丁香乾薑。噦而胸滿。

證治大還

傷寒近
卷之四

五

貞白堂

大便秘利。先宜半夏生薑湯。次用承氣湯。黃枳

小便不利而噦。豬苓湯。二苓澤。滑阿膠。加青皮木通。汗

下後虛熱。又復下之。其人怫鬱。復與之水。而成噦。

桂枝人參湯。桂參求。乾姜草。加茯苓。溫病有熱。飲水暴

冷作噦。茅根葛根湯。噦不止。橘皮湯。半夏生薑湯。

霍亂

邪在上焦。則吐而不利。邪在下焦。則利而不吐。邪在

中焦。胃氣為邪所傷。陰陽乖隔。故上吐下利也。然

有寒熱之分。如頭痛發熱身疼。熱多。欲飲水而吐。

利者。五苓散。茯苓澤。寒多不飲水者。理中湯。參求

吐利。汗出。脉微惡寒。手足厥冷。拘急。四逆湯。參求

附。腹滿者。四肢拘急。轉筋下利。理中湯。加附

子肉桂。吐利已止。身痛不休者。表邪未解也。桂

枝湯。桂芍。既吐且利。小便復利而大汗出。下利

清穀。內寒外熱。脉微欲絕者。四逆湯。吐利止。但嘔

出汗而厥。四肢拘急不解。脉微欲絕者。通脉四逆

湯。參附。湯。加猪膽汁。傷寒夾食停寒。陰陽乖隔。腹痛

悶亂欲絕者。用沸湯入炒鹽炒葛根木探吐。

證治大還

傷寒近
卷之四

六

貞白堂

鄭聲

經曰。實則譫語。虛則鄭聲。傷寒汗下後。或病久。正氣

虛。而本音失。故語言不知高下。諄諄重複。名曰鄭

聲也。手足溫。和脉沈細者。人參白虎湯。參芍。知草。脉微

細。大小便利。手足冷者。白通湯。葱白。附子湯。附求

參。多加人參。以助真氣。以此症。皆精氣奪之候也。

多眠

多眠。有四症。太陽。少陰。風溫。狐惑也。在陽則昏昏不

寤。而息。寤。在陰則脉脉不言。而沈靜。太陽病十餘

日脉浮細嗜臥者外已解也三陽合病但欲眠閉

目則汗出膽有熱也溫膽湯半枳如少陰脉微細

但欲寐或倦臥惡寒或喜向壁臥身體靜重者四

逆湯炙甘草炮風溫脉陰陽俱浮汗出身重多眠鼻

息必鼾言語難出者萎蕤湯桂枝芍藥白薇狐惑

忽忽喜眠犀角湯連犀木桃仁湯桃槐

不眠

不眠陰陽經皆有之太陽脉浮身痛無汗煩躁不得

眠者宜汗之汗後脉浮數微熱煩渴小便不利而

證治太還傷寒通卷之四 七 貞白堂

不眠者猶湯汗出身熱目痛鼻乾不得眠陽明

經也葛根湯葛麻桂胸滿脇痛鼻乾不眠小柴胡

湯有汗脉洪數表裡俱熱舌燥煩渴引飲不得眠

白虎湯音知草胃有燥屎大熱汗出錯語不得眠

大承氣湯枳朴少陰病得之二三日熱煩於內而

不得眠者黃連阿膠湯連芍岑阿少陰病下利六

七日而嘔口渴心煩不得眠者此停水也猪苓湯

汗下大熱錯語呻吟乾嘔不眠黃連解毒湯連芩

汗多心虛不眠加味溫膽湯橘菴遠連芍生合珠

砂安神丸芍參茹歸生吐下後心煩氣乏晝夜不

得眠酸棗湯棗仁知茯苓芍汗吐下後虛煩不得

眠其則反覆顛倒心中懊憹此邪熱乘虛入客于

胃中也梔子豉湯汗下太過晝則煩躁不得眠夜

則安靜不嘔不渴無表症脉微沉身無大熱是陽

氣暴虛也姜附湯瘥後不得眠是熱氣與諸陽相

併陰氣未復也溫膽湯半枳茹加山梔棗仁烏梅

人參麥門冬知母竹葉汗後驚狂起臥不安此汗

多亡陽心氣虛心神浮越也桂枝湯去芍藥加蜀

證治太還傷寒通卷之四 八 貞白堂

膝壯礪龍骨救逆湯

厥逆

手足不溫謂之四逆手足冰冷上過肘膝謂之厥逆

厥重於逆經曰厥者陰陽氣不相順接也夫直中

陰寒理宜厥逆而傳陰熱症亦見厥逆者此熱邪

內陷熱深厥亦深熱微厥亦微熱極反兼水化之

義也陽症雖厥冷而指甲尚溫緩紅潤外症惡熱

煩渴揚手擲足怫鬱昏迷頭汗舌乾便硬溺赤不

若陰厥指甲俱青倦臥引衣下利清穀惡寒太甚

也先熱後逆者陽邪傳裡也四逆散柴芍枳草白虎湯

音知主之先熱後厥者熱邪內伏也大柴胡柴芍枳草

枳大諸承氣主之經曰厥因下之而反發汗者必

口傷爛亦初起無頭痛身熱即便逆者寒邪直中

陰經也四逆湯姜附溫之初起無頭痛身熱即

便厥冷者直中陰經之真陰症也薑附四逆湯加

溫之無脈者通脈四逆湯參附若先厥而後熱者

此陰退而陽復也繼下利必自止而反汗出咽痛

者其喉必痺發熱無汗利不止者必便膿血少

證治大還

傷寒近

九

白虎堂

陰病四逆其人或咳或悸或小便利或腹中痛

或泄利下重者四逆散柴芍枳草傷寒脈滑而厥者

裡有熱也白虎湯音知少陰病吐利手足厥

煩燥欲死者吳茱萸湯加人參手足厥冷脈細

欲絕者當歸四逆湯歸桂芍辛吳大汗出熱不

去內拘急四肢疼又下利厥逆惡寒者四逆湯姜附

炮姜手足厥冷脈乍緊者邪結在胸中心中滿

而煩飢不能食者病在胸中須當吐之瓜蒂散

傷寒厥而心下悸者當先治水宜茯苓甘草湯加

不則水清入胃必作下利下利清穀裡寒外熱汗

出而厥者通脈四逆湯姜附

陰症

初病無頭痛身熱即便四肢厥冷或腹滿腹痛嘔吐

下利脈細無力此自陰經受寒即真陰症也非從

陽經傳來急宜溫之不可少緩又有陰極發躁而

赤發熱煩躁不安揭去衣被飲冷脈大此陰盛格

陽水極似火也若誤投涼劑必死不問浮沈大小

但指下無力按至筋骨全無者必有伏陰在內即

證治大還

傷寒近

十

白虎堂

用五積散麻芍蒼朮桂枝通解表裡之寒如

或沈寒之甚則用霹靂散大附研末入薑附湯以

救真陽可也陰毒病手足指甲俱青脈沈細而

急四逆湯姜附無脈者通脈四逆湯陰毒甘草

湯蜀椒升歸鼈臍中惡熨氣海關元可灸百壯仍

用溫和補氣之劑通其內外以復陽氣若俱不效

者死症也傷寒中真陰經真寒症先用好酒溫

汁各半盞服之其脈出見者可治陰毒症身如

被杖腹中絞痛嘔逆沈困不知人事四肢冰冷指

中唇口俱青。無脉欲絕。藥飲不下。急取葱白搗成餅。將餅香硫黃皂角末。填入臍中。以葱餅蓋之。時熱熨外。以吳茱萸酒煎浸熨四肢。仍服前薑汁酒。俟知人事。以回陽救急湯。熟附姜桂草參朮半枝五味服之。

頭汗

邪搏諸陽。熱氣內鬱。則汗見於頭。夫遍身汗出。熱所得越。今熱不得越。而陽氣上騰。津液隨氣上升。故但頭汗也。寒熱往來。微惡寒為表。脇下滿。大便堅為裡。然濕鬱于裡。及熱入血室。虛煩水渴。皆令頭

證治大還

傷寒近卷之四

貞白堂

汗。但小便難。內外關格而頭汗。及小便利而頭汗。皆為陽脫而難療矣。陽明發熱汗出。此為熱鬱。不能發越。但頭汗。身無汗。小便不利。此發熱在裡。身必發黃。茵陳五苓散。陳蒼朮蘇葛朮茯苓澤瀉桂枝飲水過多。水結胸中。心下怔忡。無大熱。頭汗出。小半夏湯。茯苓湯。譚語頭汗。屬陽明鬱熱。大承氣湯。黃芩枳朴心中懊憹。頭汗。梔子豉湯。頭汗出。身無汗。小便自利。湯飲水漿。此瘀血也。看上下用藥。

手足汗

四肢者。諸陽之本。熱聚于胃。故津液滂達于四肢也。

蘊熱則燥。糞語譫語。挾寒則水穀不分。是以有承氣

理中之別。陽明病。手足漚然汗出。譚語大承氣

湯。不能食。小便不利。大便澀。水穀不分。手足汗出

理中湯。參朮姜草或猪苓湯。二苓滑阿

盜汗

雜病責於陰虛。傷寒專主膽經有熱。脉浮大。但欲眠

閉目。則汗。膽有熱也。小柴胡湯。柴芩參半草或柴胡桂

枝湯。柴芩參半草

證治大還

傷寒近卷之四

貞白堂

頭眩

經曰。上虛則眩。下虛則厥。發汗吐下後而眩者。陽虛

也。人參養榮湯。參朮茯苓桂枝熟地芍遠五味陳桂草加天麻川芎酒

柏少。陰病利不止。而頭眩。自冒者。此虛極而氣眩

也。人參四逆湯。參草姜附外風家亦能作運。以風主運

動故也。上焦有痰。亦能作運。陽明病。但頭眩不

惡寒。能食而咳。茯苓白朮甘草桂枝湯。少陽病

口苦舌乾目眩。小柴胡湯。柴參芩半草加川芎天麻。

吐下後。虛煩脉微沈緊。心下逆滿。氣上冲胸。頭眩

胃身振搖筋脉動惕久而成痿茯苓桂枝白朮甘
草湯 伏痰頭目眩運二陳湯陳半加天麻枳實
竹瀝薑汁

咽痛

咽痛有陰陽二症而赤身斑如錦吐膿血而咽喉痛

者此陽毒也陽毒升麻湯升麻射干或犀角左

參湯犀角升麻射干大便秘加硝黃手足厥冷或

吐利而咽喉痛者此少陰症通脉四逆湯參附加

桔梗若少陰病得之二三日咽痛者此熱在少陰

證治大還傷寒近卷之四

之標也甘桔湯甘草生通厚之少陰症寒熱

相搏咽痛桔梗湯歸馬勃少陰客寒咽痛半

夏散半苦梗又有非時暴寒中人伏氣于少陰經

旬月方發先咽痛而次下利謂之腎傷寒此標熱

本寒迫熱上行其喉為痺迫熱下行必便膿血也

半夏甘桔湯桂加又有初得病發熱無陽毒少陰症

而咽痛者此感冒外寒壅內熱也參蘇飲蘇葛前

半疏去半夏木香加甘桔少陰症咽痛不能言

語者酒湯咽喉閉塞烏扇湯陳久也

心悸

心悸者胸膈間怔忡不自安也其症有氣虛停水之

分陽氣素弱或汗下過多正氣不足心中空虛其

人又手冒心欲得按心下悸者此陽氣不足也桂

枝甘草湯汗後臍下悸欲作奔豚者此脾氣虛而

腎氣動也茯苓桂枝甘草大棗湯傷寒二三日心

中先悸而煩或汗下後內虛而悸並小建中湯

草飲水過多停留心下心火畏水不能自安而悸

者茯苓桂枝白朮甘草湯小便多者豬苓湯

證治大還傷寒近卷之四

綱目云少陰症心悸者不可與四逆湯心悸者

火併水也惟腎欺心故為心悸是足經上于手經

也若與四逆必變惡候宜先以甘草茯苓湯加桂

導其溫次以四逆湯炙草炮溫之少陽病耳聾

目赤胸滿而煩妄加吐下驚悸小建中湯芍桂有

熱者小柴胡湯柴芍少陰病四逆其人或悸

四逆散枳芍加桂枝傷寒脉代結心下動悸灸

甘草湯炙草參生桂

懊憹麻仁阿麥冬

懊懣者。心中有鬱悶不舒之意。蓋因表症誤下。正氣內虛。陽邪乘虛內陷。結于心胸之間。故鬱懣煩悶不安也。邪在胸中。則宜吐。熱在胃府。則宜下。不可拘也。發汗吐下後。虛煩不得眠。甚則反覆顛倒。心中懊懣。梔子豉湯。若少氣者。加甘草。嘔者。加生薑。短氣煩躁。胸中懊懣。按之石硬而痛者。大陷胸湯。黃芩 枳實 陽明病。下之後。懊懣而煩。中有燥屎。未盡也。承氣湯。黃芩 枳實 陽明病。無汗。心中懊懣。小便不利。必發黃也。茵陳湯。茵陳 黃芩 大黃

證治大還 傷寒近 卷之四 五 貞白堂

動氣

動氣者。藏氣不調。築築然跳動于胸中。隨藏所主。而形見于臍之上下左右也。又有真氣內虛。水結不散。水氣相搏。衝突而發。奔豚者。動氣應臍。是皆真氣虛。不可汗下。蓋脾為中州。以行津液。妄施汗下。必亡動脾。是以戒之。症急。不得不汗者。宜柴胡桂枝湯。柴胡 芍藥 桂枝 甘草 黃芩 半夏 人参 龍骨 牡蠣 裡症急。不得不下者。宜蜜導煎。

陳三農云。傷寒宜汗吐下。但臍下築。築有動氣。中氣

虛弱。當汗宜和中散。加麻黃當下。加檳榔枳殼。此之不損中氣。亦不妨汗下。動氣在上發汗。則氣

上冲胸。李根湯。李根 桂枝 芍藥 甘草 黃芩 半夏 人参 龍骨 牡蠣 下之。則掌握身熱。汗

自泄。飲水白灌。竹葉石膏湯。竹葉 石膏 甘草 芍藥 人参 龍骨 牡蠣 動氣在

下發汗。則心中大煩。骨節疼痛。日眩。食人即吐。先

宜大橘皮湯。橘皮 甘草 芍藥 人参 龍骨 牡蠣 後與小建中湯。芍藥 桂枝 甘草 黃芩 半夏 人参 龍骨 牡蠣 下之。則

腹滿清穀。頭眩。心下痞。甘草瀉心湯。甘草 芍藥 人参 龍骨 牡蠣 動

氣在左發汗。則頭眩。汗不止。筋惕肉瞤。為逆。先宜

防風白朮牡蠣湯。汗止。與小建中湯。下之。則腹滿

證治大還 傷寒近 卷之四 五 貞白堂

拘急。身雖熱。反欲得冷。先宜甘草乾薑湯。後與小建

中湯。動氣在右發汗。則衄而渴。心煩。飲則吐。先

宜五苓散。茯苓 猪苓 桂枝 白朮 澤瀉 甘草 後與竹葉石膏湯。竹葉 石膏 甘草 芍藥 人参 龍骨 牡蠣 下

之。則津液竭。咽乾鼻燥。頭眩心悸。竹葉石膏湯。

戰慄

邪氣外與正氣爭。則戰。邪氣內與正氣爭。則慄。戰則

陰陽相爭。身為之動搖。正氣勝。則汗出而解。若正

不勝邪。戰無汗出。為難治。宜柴胡桂枝湯。柴胡 芍藥 桂枝 甘草 黃芩 半夏 人参 龍骨 牡蠣

去黃芩。倍人參。助其正氣。再戰以取汗。慄則不

戰而但心慄鼓領此正氣怯寒邪在內故也經曰

陰中於邪心內慄又曰邪中下焦陰氣為慄止膝

冷使溺妄出皆此類也宜大建中湯附方水肉蓉

茯苓半熟地桂炙甘草或黃附四逆湯姜附加灼艾以禦之若

躁而不得臥者為難治病有戰汗出而解者以

脉浮而緊按之反芤芤為本虛邪與正爭故必發

戰方汗出也但汗出不發戰自解者由脉浮數

按之不芤其人不虛邪不能與正爭脉大而浮數

陽氣全勝故不戰汗出而解也不戰不汗出而

證治大還

傷寒近
卷之四

七

貞白堂

解者由其脉微邪正俱弱因發汗吐下亡血津液

內竭不能作汗必待陰陽和自解故不戰不汗出

而自愈也太陽症陰陽俱停必戰慄汗出而解

蓋戰而汗解者太陽也不戰而有汗解者陽明也

不戰無汗而解者少陽也下之後復發汗脉微細

必振寒所以然者以內外俱虛故也

症症

太陽中風重感寒濕變為痙症寒主收斂風濕主強

直三氣客于經中故病頭項強直腰背反張頭搖

口噤身熱足寒也若寒濕勝則無汗惡寒強直而

安靜名剛痙宜葛根湯葛根桂枝加蒼朮麻黃風濕

勝則有汗惡風強直搖擻名柔痙宜桂枝湯桂枝

加瓜蒌白朮黃芪二症並屬太陽若胸滿口噤臥

不着席脚攣此又太陽兼陽明也因有陽明不宜

發汗宜承氣湯黃芩枳朴加葛根重者附子防風散附

朮草桂乾姜柴胡五味若一目或左右斜視并一足搖

擻此少陽症也宜小柴胡柴胡參加川芎防風外

有汗下過多津液氣血俱傷筋無所養而成痙者

證治大還

傷寒近
卷之四

太

貞白堂

宜大建中湯附方水肉蓉加羌活防風或八珍

湯參朮茯苓熟地加羌防黃芪肉桂少加附子

痙痙

痙者筋脉急而縮痙者筋脉緩而伸一伸一縮手足

相引搖擻不已皆由熱極生風風主乎動故也此

症多變於汗下之後脾土受傷肝木獨旺肺不能

平木本火相生遂成此症其風火皆虛極所生宜

小續命湯麻參防風已芍有汗去麻黃無汗去黃

芩或大建中湯桂朮芍苓附草傷寒至于痙痙可

謂危矣。不因汗吐下所生。能以驅風蕩熱之劑。如防風通聖散。防麻薄枯荆膏翹岑梔之類。折其大勢。間有可生者。

四肢拘急

拘急者。手足不能自如。屈伸不便。如跪臥惡風之狀。蓋四肢為諸陽之本。因發汗亡陽。陽虛而有是症矣。脉浮自汗。小便數。心煩惡寒。脚攣急。芍藥甘草湯。

太陽病發汗。遂漏不止。惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸。此亡陽脫液也。桂枝湯。桂芍加附子。

證治大還

傷寒近
卷之四

二 貞白堂

子。汗吐下後。發熱惡寒。四肢拘急。厥冷。四逆湯。

筋惕肉瞤

惕者。筋脉動跳。瞤者。肌肉蠕動。二症有虛實。已經汗吐下後。津液衰少。陽氣偏虛。筋肉失所養。而跳不安者。此表裡俱虛也。非溫經助陽不可。宜真武湯。附茯苓人參養榮湯。參朮茯苓歸地芍傷寒三四日。不因汗吐下而惕者。此邪熱搏于陽明經也。熱去則惕止。白虎湯。石膏知大便祕。遠臍硬痛而惕者。

大柴胡湯。柴芩芍半枳大黃

虛煩不得眠。筋惕肉瞤者。加

味溫膽湯。

橘茯苓連芩生地半

止筋脉跳動者。其

人素血少。邪熱搏于血脉之中。火動擾也。加味人參養榮湯。

太陽病發汗不解。仍發熱。心下悸。頭眩身瞤。欲僻地。此邪氣未解。汗出亡陽。真武湯。附茯苓

芍發汗過多。或虛弱人發汗。或傷風自汗。妄用大青龍湯。有厥逆筋惕肉瞤之症。並屬真武湯。厥者

去芍藥。熱者去附子。

身振

身振。身體動搖也。因汗吐下後。氣血兩虛。不能榮養

身振

證治大還

傷寒近
卷之四

二 貞白堂

筋骨。其身不能主持。故也。宜人參養榮湯。參朮茯苓歸地芍

陳桂心草。身振弗得睡者。十味溫膽湯。橘茯苓

半歸草參。倍人參。

鬱目不仁

鬱目。謂神思昏迷也。不仁。謂肌肉不柔和也。經曰。諸虛乘寒。則為鬱冒。不仁。蓋以氣血虛少。不能周流

于身。故肌體頑麻。不知痛痒。寒熱如尸。而鬱且目也。若脉浮而洪。身汗如油。喘而不休。水漿不下。形

體不仁。死症也。下後復發汗。致表裡俱虛。其人

體不仁。死症也。下後復發汗。致表裡俱虛。其人

致冒冒家汗自出而愈乃表和也若不得汗而解

者用人參三白湯參朮加川芎當歸天麻虛極

衰寒四逆湯炙甘草加人參桂枝芍歸莖天麻

少陰脉不至腎氣衰微精血少寒氣上奔血結心

下陽氣退下熱歸陰股與陰相動人身不仁此為

尸厥甘草乾薑湯桂枝芍藥湯加乾薑桂枝麻黃

各半湯桂芍麻

佛鬱

佛鬱者陽氣蒸越形于頭而肌膚之間聚而不散

證治大還真白堂

也其症有二太陽病初得汗汗出不微併于陽明

續自微汗面色赤者陽氣佛鬱也葛根解肌湯葛根

利大便芍藥汗後又不微其脉浮緊麻黃湯麻桂小便不

氣湯大黃汗吐下之後胃中虛冷外氣佛鬱假色

于外理中湯參朮大抵陰症佛鬱并下虛之人佛

鬱者赤而不光陽病表不解并內熱者赤而光也

背惡寒

背惡寒陽不足也蓋背為陽寒邪客於表則一身惡

寒今獨背惡寒是陽不足也然有陽氣有但

陽虛陰盛者口中和宜附子湯附朮陽邪內陷

者口乾燥白虎湯黃知

似瘧

似瘧者症同瘧狀作止有時非若往來之無定也二

日一發邪氣復發也日再發邪氣淺也日二三發

邪氣微無可容之地也太陽症似瘧脉浮洪桂

枝湯桂芍熱多寒少不嘔清便自可一日二三度

發桂枝麻黃各半湯桂芍麻若脉微弱寒少熱多

證治大還真白堂

此無陽也不可發汗宜桂枝二越脾一湯桂芍

陽明症似瘧煩熱汗出日晡發熱脉浮桂枝湯

脉實承氣湯黃枳厥陰症脉浮緩囊不縮必發

熱惡寒似瘧為欲愈桂枝麻黃各半湯婦人熱

入血室其血必結證同瘧狀小柴胡湯柴芍加

生地丹皮

臟結

臟結者邪結在臟致藏氣秘結而不流通也蓋不當

下而下邪氣乘虛入裡陰邪與藏相結也或因病

人素有痞氣，寒邪入裡，與宿積相合，使真藏之氣結而不通，故臍傍疼痛，引少腹入陰筋也。其脉寸浮，關尺沉細，緊外症如結胸，但飲食如故，時時下利，舌上白胎，臍痛引陰筋，寒而不熱，其人反靜，此為異耳。宜麻黃附子細辛湯，臍結無陽症，不往來寒熱，其人安靜，舌上白胎，不可攻，可灸關元，仍與茱萸四逆湯。歸桂芍細辛通草甘草黃

陰陽易女勞復

病新瘥後交接淫慾，無病人反得病者，名陰陽易。不

證治入選

傷寒近
卷之四

三

真白堂

因易而自病者，名女勞復。病後氣血兩虛，復損真氣，又動邪氣，內外俱傷，多死。其症男子則陰腫，小腹絞痛，婦人則裡急，腰膝內連腹痛，或背熱，上冲胸，頭重不舉，眼中生花，耳內蟬鳴，頭面烘熱，甚者手足拘攣，百節解散，在男則縮入腹，在女則引陰中，皆難治。其脉離經，榮衛精氣竭，翁翁少氣，足不能舉者死。

燒棍散

若脉症在厥陰當歸四逆湯調服在少陰通脉四逆湯調服在大陰理中湯調服

男病用婦人視襠，近陰處着久者，女病用男視襠。

燒灰白湯下。

瘥後勞復食復

傷寒瘥後，餘邪未盡，血氣未平，因勞動復生熱者，名

勞復，宜小柴胡湯。

柴胡參半草

加知母、麥門冬、竹葉、人

虛者，參胡三白湯。

半草

虛煩不得眠者，參胡溫膽

湯。

半草

加酸棗仁、遠志、氣虛煩嘔，竹葉石膏

湯。

陳草

或人參養榮湯。參半草 傷寒瘥後，更

因飲食過多，日暮微煩，胸中微痞者，名食復，梔子

豉湯加大黃，或大柴胡湯。

柴胡芍半草

傷寒瘥後，更

證治入選

傷寒近
卷之四

三

真白堂

發熱者，小柴胡湯。

柴胡參半草

脉浮以汗解之，脉沉以

下解之。瘥後半月以來，或十餘日，終不憚煩，語少

神，或寒熱似癰，或潮熱煩赤，此由發汗未盡，餘熱

在心，包絡間也。知母、麻黃湯。知母麻黃芍半草 瘥後脾胃

傷冷，物復發者，理中湯。理中芍半草 瘥後因勞復發者，

生脉散。

參半草

加梗米、竹葉、大棗。瘥後虛羸微

然不退，竹葉石膏湯。瘥後虛熱盜汗不止，當歸

六黃湯。

歸芍半草

陽虛自汗，無熱惡寒，黃芪建中

湯。

芪半草

瘥後虛羸，少氣，氣逆欲吐，竹葉石膏

湯。

竹葉石膏

瘥後虛羸，少氣，氣逆欲吐，竹葉石膏

湯 瘥後心神恍惚不寧夜臥煩躁不安或夢寐

虛驚養心湯 參茯苓神歸熟地仁 瘥後喜睡

不了了胃中有寒也理中湯 參朮 瘥後飲酒熱

劇者小柴胡湯加葛根黃連滑石 大病瘥後從

腹以下有水氣者牡蠣澤瀉散 加花粉海藻

一人勞復發熱自汗衆作虛勞用補劑伯仁曰勞復

脈宜以汗解以小柴胡三進得汗而安

百合病

百合病者百脉一宗舉身皆受病無復經絡傳次也

證治大還

傷寒近

五

貞白堂

大病虛勞之後藏府不平變成此症其病似寒無

寒似熱無熱飲食不食欲臥不臥口苦小便赤

入口即吐宜百合地黃湯百合知母湯 加地黃

兩感

傷寒兩感藏府俱受病也如太陽少陰俱病則頭痛

口乾煩滿而渴陽明太陰俱病則腹滿身熱語

少陽厥陰俱病則耳聾噤閉兩感不治者

以兩感表裡俱病正氣太虛邪氣甚急發表攻裡

兩有所妨故不治也然用藥須分表裡緩急從權

施治如見表症多而急則先發表而後攻裡如見

裡症多而甚急則先攻裡而後發表急其所先緩

其所後此傳變之大法脉從陽可治從陰難治陽

生陰死故也

陳三農治兩感太陽少陰俱病大羌活湯 羌獨活

白芷芍藥 陽明太陰俱病柴葛理中湯 參朮 陽

厥陰俱病柴胡四逆湯 炙甘草

狐惑

狐惑如狐聽水進退猶豫不定也傷寒失于汗下多

證治大還

傷寒近

五

貞白堂

日不解傳變狐惑蓋病人腸胃空虛三虫求食或

上或下故病者乍靜乍煩虫食其喉則聲啞上唇

有瘡虫食其藏則咽乾下唇有瘡其候四肢沈重

惡聞食氣默默欲眠目不能合嚙齒晦而眉間赤

白黑色變易無常治宜犀角黃連湯 加木香 桃仁

湯 槐子 或雄黃散 雄黃硝子

虵厥

虵厥因胃中空虛無穀食以養故虫上求食至咽而

吐出也蓋胃中虛冷飢不欲食食至口虵聞食氣

即逆上求食而吐蛇者理中湯參朮加烏梅花椒

足冷甚者加附子溫熱病而吐蛇者此胃熱也胃

虛有熱虫隨熱氣上行亦吐也宜犀角黃連湯

加木香烏梅大抵蛇聞甘則動遇酸則靜見苦則安也

傷寒遺毒

傷寒遺毒發于耳下前後者此因發汗不徹遺熱成

毒所致也其見於少陽部分者以是經多氣少血

而陽明邪熱又來資實其相火故也急宜清熱敗

毒兼內托遲則成膿為害矣宜羌活防風荆芥柴

證治大選

傷寒近
卷之四

毛

貞白堂

胡桔梗升麻連翹牛旁子甘草節赤芍金銀花歸

尾紅花人參乳香天花粉若腫至面部加漏蘆白

芷如大便秘加酒浸大黃

傷寒近目錄

前集 卷之五

傷寒諸方

發熱門 惡寒門 惡風門

寒熱門

自汗門 頭滿門 身痛門

諸語門

口渴門 胸滿門 嘔吐門

衄血門

發狂門 便結門 發喘門

發斑門

煩熱門 煩燥門 痞滿門

小便不利門

發黃門 結胸門 畜血門

短氣門

便膿血門 下利門 欬逆門

多眠門

咳喘門 乾嘔門 陰症門

咽痛門

心忪門 動氣門 瘧症門

痰癰門

身振門 快鬱門 瘰癧門

陰陽易女

勞復門 瘵後食復勞復門

百合病

兩感門 狐惑門

證治大選

傷寒近前集
卷之五目錄

貞白堂

六神通前歌

卷之五

卷之五

新黃

甘芳

此歌係月傷寒見太陽三陰三陽各用一以代前黃白

招黃白也

陳氏傷寒近 前集卷之五

雲間陳 治三農甫述

門人 范 泰壽民 泰 廷殿一校 杓玉衡

傷寒諸方

發熱門

麻黃湯

頭項痛發熱惡寒無汗此寒邪在太陽之表故用此以發之

麻黃 三錢

桂枝 二錢

甘草 一錢

杏仁 十箇

皮尖炒

水

一鍾半先下麻黃煎一沸去沫入餘藥煎服取汗

麻黃發汗藥也能去榮中寒邪泄衛中風熱惟冬月在外真有寒邪者宜之若無寒邪或寒邪在裡

證治大還

傷寒近 卷之五

或傷風有汗六脈不

浮緊者皆不可用

加味有

羌活

秦艽

川芎

白芷

葛根湯 陽明胃實不嘔

葛根 四錢

麻黃 三錢

桂枝 二錢

芍藥 各二錢

甘草 各五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分溫服

芍蘇散

川芎 紫蘇 乾葛 柴胡 各一錢

桔梗 枳殼 各半錢

半夏 陳皮 茯苓 各一錢

甘草 六分

水二鍾薑

三片蔥白二根煎八分熱服取汗

麻黃細辛附子湯

麻黃 細辛 各三錢 附子 炒一錢 水二鍾薑三片棗

二枚煎八分溫服

小青龍湯

乾薑 炮

細辛

麻黃

肉桂

芍藥 各一錢

半夏 八分

五味子

甘草 各三錢

水二鍾煎八分

溫服

大青龍湯

麻黃 二錢

桂枝

杏仁 各錢

石膏 四錢

甘草 一錢

水二鍾薑三片棗二枚煎八分溫服取汗

證治大還

傷寒近 卷之五

小建中湯

汗下後惡寒發熱不止宜此湯

芍藥 三錢

桂枝 一錢

甘草 炙一錢

水二鍾薑三片

棗二枚煎八分入膠胎一大匙再沸溫服

人參白虎湯

若渴飲飲水

人參

石膏

知母

甘草

水二鍾梗米百粒

煎八分溫服

竹葉石膏湯

陽明病心下硬滿邪未入腹宜此湯

人參 一錢

石膏 五錢

麥門冬 二錢

半夏 一錢

甘草 七分

竹葉 十四片

水二鍾薑三片梗米百粒

煎八分溫服

梔子豉湯 陽明病無汗小便不利心中懊惱者尚發

發熱汗出惡熱渴 加味 梔子豉湯 言更于 梔子豉湯

梔子 四枚 香豉 五錢 水鍾半煎八分溫服

惡寒門

柴胡桂枝湯

柴胡 黃芩 人參 半夏 桂枝 芍藥

甘草 水二鍾薑三片煎八分溫服

越脾湯 發熱惡寒熱多寒少亡陽而脈微弱者宜此湯

證治大還 傷寒近 卷之五

石膏 白朮 附子 麻黃 甘草 煎法如前

芍藥甘草附子湯 太陽症汗後反惡寒者宜此湯

甘草 四錢 附子 三錢 芍藥 二錢 水二鍾煎八分

服

附子湯

附子 炮三錢 白朮 二錢 茯苓 芍藥 各錢半

人參 一錢 水二鍾煎八分溫服

無汗門

黃芪建中湯 脈弱無力血虛不能作汗或病久津液竭宜此湯

黃芪 桂枝 芍藥 甘草 水二鍾薑三片煎

二枚煎八分去查入膠飴一大匙再沸溫服

惡風門

桂枝湯 惡風發熱自汗脈浮緩風邪在太陽之表者用此

桂枝 芍藥 各二錢 甘草 一錢 水二鍾薑三片煎

二枚煎八分溫服 加味 防風白朮 羌活 獨活 桑葉

防已黃芪湯

防已 黃芪 白朮 甘草 煎法如前

防風白朮牡蠣湯

證治大還 傷寒近 卷之五 四 真白堂

防風 白朮 牡蠣 酒下二錢日二三服

甘草附子湯

甘草 白朮 附子 桂枝 水二鍾薑二枚煎

自汗門

茯苓甘草湯

茯苓 桂枝 甘草 水二鍾薑三片煎八分溫

服

真武湯

附子 <small>炮二錢</small> 茯苓 白朮 芍藥 <small>各二錢</small> 水二鍾薑五片煎八分溫服	頭痛門	葛根葱白湯 葛根 芍藥 知母 <small>各三錢</small> 川芎 二錢 水二鍾薑三片葱白二根煎八分溫服	身痛門	水附湯 甘草 <small>錢一</small> 白朮 <small>四錢</small> 附子 <small>炮一錢半</small> 水二鍾薑三片煎八分溫服	寒熱門 小柴胡湯 <small>若太陽病不解入少陽脇下硬滿乾嘔不能食往來寒熱未解下脈沉緊者宜此</small> 柴胡 三錢 黃芩 二錢 人參 半夏 <small>各一錢半</small> 甘草 七分 渴者去半夏加天花粉胸滿者去參棗加枳桔	水二鍾薑三片棗二枚煎八分稍熱服 <small>若腹中痛芍藥若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓</small>	大柴胡湯 柴胡 三錢 黃芩 芍藥 半夏 <small>各一錢</small> 枳實 <small>一錢半</small>
---	-----	--	-----	---	---	--	---

大黃 <small>二錢</small> 水一鍾半薑三片煎八分溫服	桂枝麻黃各半湯 桂枝 芍藥 麻黃 杏仁 甘草 水二鍾薑三片棗二枚煎八分溫服	桂枝二越婢一湯 桂枝 芍藥 甘草 麻黃 石膏 煎法同前	口渴門 涼膈散 連翹 山梔 薄荷 黃芩 大黃 朴硝	證治大選 <small>傷寒近卷之五</small> 六 貞白堂	甘草 水二鍾薑三片煎八分溫服	理中湯 人參 白朮 乾薑 甘草 <small>等分</small> 每服六錢 水二鍾棗二枚煎八分溫服 加附子名附子理中湯	胸脇滿門 麻黃杏仁甘草石膏湯 麻黃 二錢 杏仁 <small>一錢半</small> 甘草 一錢 石膏 四錢 水二鍾煎八分溫服
-----------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------	---	---

柴胡龍骨牡蠣湯

柴胡 黃芩 人參 半夏 龍骨 桂枝

鉛丹 茯苓 牡蠣 大黃 水二鍾薑三片棗

二枚煎八分溫服

腹滿門

小承氣湯

治六日不大便腹脹滿而心下硬者

大黃 錢 厚朴 二錢 枳實 二錢半 水一鍾半煎

八分入鑊釘水三四匙服

厚朴半夏生薑人參湯

證治太遠

傷寒近

七 貞白堂

厚朴 半夏 人參 甘草 水二鍾薑三片煎

八分溫服

梔子厚朴枳實湯

梔子 厚朴 枳實 煎法同前

小半夏茯苓湯

半夏 五錢 茯苓 三錢 水二鍾煎八分入薑汁

三匙溫服

桂枝加大黃湯

桂枝 三錢 白芍 四錢 大黃 二錢 甘草 二錢 水二

鍾薑三片棗二枚煎八分溫服

譚語門

黃連解毒湯

黃連 三錢 黃芩 黃柏 梔子 各二錢 水二鍾

薑三片煎八分溫服

大承氣湯

治六日不大便腹脹滿而心下硬者

大黃 芒硝 厚朴 姜汁 枳實 水二鍾先煎

枳朴至一鍾入大黃煎八分入硝再沸服

調胃承氣湯

若表症罷後邪結于裡大便閉小便赤宜此湯

證治大遠

傷寒近

八 貞白堂

大黃 二錢 芒硝 二錢 甘草 水二鍾煎大黃甘

草至八分入硝再沸溫服

桃仁承氣湯

加味 桃仁 三錢 桂枝 二錢 芒硝 二錢 甘草 五錢

水二鍾煎至一鍾入硝煎二三沸溫服

知母麻黃湯

知母 麻黃 芍藥 桂枝 黃芩 甘草

水二鍾薑三片棗二枚

人參三白湯

人參 三錢 白芍 四錢 大黃 二錢 甘草 二錢 水二

人參 三錢

白朮

白茯苓

白芍藥

各二錢

水二

鍾煎七分溫服

發狂門

三黃石膏湯

黃連 三錢

黃芩

黃柏

玄參

山梔

各一錢

石膏 三錢

知母 一錢

甘草 七分

一方有香豉二

合麻黃二錢

水二鍾薑三片棗二枚細茶一撮

煎七分溫服

犀角大青湯

證治大還

傷寒近

卷之五

九

貞白堂

犀角 二錢

大青 一錢

玄參

黃連

黃芩

黃柏

山梔 升麻 各一錢

甘草 七分

水二鍾煎七分溫

服

陽毒升麻湯

升麻 隨甲

當歸

甘草 各二錢

蜀椒

山梔

雄黃 各一錢

水二鍾薑三片煎七分溫服

桂枝救逆湯

桂枝 二錢

蜀漆

龍骨 各三錢

牡蠣 四錢

甘草 一錢

水一鍾半薑五片棗四枚煎七分服

通解散

麻黃 二錢

滑石

石膏 各三錢

黃芩

羌活

川芎

細辛 各一錢

甘草 七分

水二鍾薑三片熱服取汗

便結門

麻仁丸

跌陽脉浮而濇小便秘大便硬為脾約宜此丸

麻子

芍藥

枳實

大黃

厚朴

杏仁

煉蜜為丸

嘔吐門

葛根湯

證治大還

傷寒近

十

貞白堂

葛根 四錢

麻黃 三錢

桂枝

芍藥 各二錢

甘草 一錢

水二鍾薑二片棗二枚煎七分溫服

黃芩湯

黃芩 三錢

芍藥 三錢

甘草 二錢

水二鍾薑三片

煎七分溫服

黃連湯

黃連

甘草

桂枝

半夏

乾薑

人參

水二鍾棗二枚煎七分溫服

吳茱萸湯

吳芽莢 人參 水二鍾 薑三片 棗二枚 煎七分 溫服

鯢血門

犀角地黃湯

犀角 丹皮 生地 赤芍藥 水二鍾 煎七分 溫服

黃芩芍藥湯

黃芩 芍藥 甘草 一錢 水二鍾 煎七分 溫服

證治大還

茅花湯

茅花 五錢 水一鍾 半煎七分 溫服

三黃補血湯

熟地 生地 當歸 白芍 丹皮 各一錢 黃芪 錢 升麻 八分 水二鍾 煎七分 溫服

柴胡 川芎 錢 升麻 八分 水二鍾 煎七分 溫服

升麻葛根湯

升麻 葛根 芍藥 甘草 煎法同前

麻黃升麻湯

麻黃 升麻 芍藥 甘草 煎法同前

麻黃 升麻 桂枝 當歸 芍藥 白朮

茯苓 黃芩 知母 石膏 天門冬 萎蕤

乾薑 甘草 煎法同上

茜根湯

茜根 三錢 生地 黃芩 各二錢 阿膠 一錢 側柏葉 錢 各一 煎法同上

甘草 錢 煎法同上

煩熱門

芍藥甘草湯

甘草 四錢 芍藥 二錢 水一鍾 半煎七分 溫服

證治大還

乾薑附子湯

乾薑 二錢 附子 三錢 水一鍾 半煎七分 溫服

茯苓桂枝白朮甘草湯

茯苓 桂枝 白朮 甘草 水二鍾 煎七分 溫服

煩燥門

茯苓四逆湯

茯苓 三錢 人參 甘草 乾薑 附子 各一錢

去茯苓即通脈四逆湯 煎法同上

發喘門		葛根黃連黃芩湯	葛根 <small>四錢</small> 黃連 <small>一錢</small> 黃芩 <small>一錢</small> 甘草 <small>各一錢</small> 煎同上
發斑門		升麻葛根湯	升麻 葛根 芍藥 <small>各二錢</small> 甘草 <small>一錢</small> 水一鍾半煎七分溫服
玄參升麻湯		玄參 <small>四錢</small> 升麻 <small>三錢</small> 甘草 <small>一錢</small> 煎法如前	治發斑
證治大還		傷寒近卷之五	三 貞白堂
人參化斑湯		即人參白虎湯	
升麻六物湯		治赤斑	
升麻 梔子		各一錢半 大青 杏仁 黃芩 各一錢	
葱白		三莖	
犀角消毒飲			
牛旁子		炒香研 荊芥穗 防風 <small>各二錢</small> 甘草 <small>一錢</small>	
水二鍾煎臨服入犀角水咽痛加玄參桔梗連翹			
熱加芩連			
三黃石膏湯			

黃連二錢 黃芩一錢 石膏二錢 黃柏一錢 玄參一錢		山梔 <small>一錢</small> 知母 大青 犀角屑 <small>各一錢</small> 甘草	水二鍾煎七分溫服
調中溫胃湯		蘇朮 <small>一錢</small> 陳皮 砂仁 藿香 芍藥 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small> 桔梗 半夏 白芷 羌活 枳殼 <small>各一錢</small> 川芎 麻黃 <small>各五分</small> 桂枝 <small>四分</small> 水二鍾薑三片煎七分溫服	
大建中湯			
證治大還		傷寒近卷之五	西 貞白堂
當歸 白芍 白朮 肉苁蓉 附子 <small>炮</small>		黃芪 <small>蜜炙各一錢二分</small> 麥門冬 <small>一錢</small> 茯苓 <small>八分</small> 川芎 <small>各七分</small> 熟地 <small>八分</small> 肉桂 <small>六分</small> 炙甘草 <small>五分</small> 水二鍾煎七分溫服	
發黃門			
茵陳湯			
茵陳 梔子 大黃			煎同上
梔子柏皮湯			
梔子 柏皮 甘草			煎同上

麻黃連翹赤小豆湯

麻黃 連翹 赤小豆 杏仁 大棗 梓白皮

甘草 水二鍾薑三片煎七分溫服

結胸門

大陷胸湯

大黃 芒硝 甘遂 水二鍾煎

八分下硝煎一沸入甘遂末和勻溫服

小陷胸湯

黃連 半夏 瓜蒌 枳實 水二

證治大還

鍾薑三片煎七分溫服

三物白散

桔梗 貝母 巴豆 共為

細末白湯調下壯盛者四分虛弱者二分病在上

則吐在下則瀉如不吐利投以熱稀粥吐利不止

投以冷稀粥

枳實理中湯

枳實 人參 白朮 乾薑 甘草

共為細末每用白湯調下五六錢

茯苓半夏湯

茯苓 半夏 枳實 甘草 水二鍾

薑三片煎七分溫服

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡 黃芩 桂枝 乾薑 瓜蒌根

牡蠣 甘草 煎法如前

大陷胸丸

大黃 芒硝 杏仁 瓜蒌 枳實

右將大黃葶藶為細末杏仁硝研成膏每用一匙

證治大還

蜜丸如彈子大強壯者入甘遂末三分虛弱者減

半每丸用水一鍾煎連查溫服大便利為度

一切結胸痞滿用生薑搗爛去汁取杓炒熟採其

結自開

痞滿門

生薑瀉心湯

生薑 瀉心 枳實 甘草

生薑 半夏 黃芩 人參

乾薑 去人參乾薑加甘草即甘草瀉心湯

去乾薑卽半夏瀉心湯 水二鍾棗一枚煎七分

溫服

天黃黃連瀉心湯

大黃 三錢 黃連 一錢 以麻沸湯一鍾投藥蓋片

時去查溫服用麻沸湯者取其氣薄以泄虛熱也

加附子卽附子瀉心湯

桂枝人參湯 卽理中湯加桂枝以和中解表也

桂枝 甘草 各三錢 人參 白朮 乾薑 各二錢

水二鍾煎七分溫服

證治大還 傷寒近卷之五 宅 貞白堂

旋覆代赭湯

旋覆花 赭石 代赭石 煅各二錢 人參 一錢 半夏 八

甘草 三分 水二鍾棗二枚薑五片煎七分溫服

小便不利門

猪苓湯 若脉浮發熱口渴小便不利宜此湯

猪苓 茯苓 澤瀉 滑石 阿膠 各二錢 蛤粉炒成珠

水二鍾煎七分溫服

五苓散

白朮 二錢 赤茯苓 澤瀉 各二錢 錢五分

肉桂 五分 煎如前

下利門

白頭翁湯

白頭翁 黃柏 秦皮 黃連 各二錢 煎同前

白通湯

葱白 乾薑 附子 加人尿猪膽汁名白通加

猪膽汁湯 煎同前

蓄血門

抵當湯 成氏曰肝者血之源血聚則肝燥肝者急食甘以緩之桃仁之甘緩肝散血故抵當湯

證治大還 傷寒近卷之五 大 貞白堂

用之傷寒八九日內有蓄血發熱如狂少腹滿痛小便自利又有當汗失汗熱毒深入吐血血結用

此湯

水蛭 十箇炒 蠅虫 十箇去翅足 桃仁 十箇去皮尖 大黃 三錢

水一鍾半煎七分溫服

吐血門

生地黄散

枸杞子 柴胡 黃連 地骨皮 天門冬

熟地 白芍 黃芩 生地 黃芪 甘草

水二鍾煎七分溫服

麥門冬飲子

麥門冬 五味子 當歸 芍藥 人參 黃芪

生地 甘草 煎同上

黃連阿膠湯

黃連 黃芩 芍藥 阿膠 雞子黃 煎同上

便膿血門

桃花湯

赤石脂 乾薑 粳米 煎同上

氣逆門

證治大還

傷寒近
卷之五

九 貞白堂

橘皮乾薑湯

橘皮 乾薑 人參 桂心 通草 甘草

水二鍾薑五片煎七分溫服

李根湯

半夏 桂枝 當歸 茯苓 芍藥 黃芩

甘草 甘李根 白皮 煎同上

半夏生薑湯

半夏 兩 生薑 五錢 水二鍾煎七分溫服

欬逆門

橘皮竹茹湯

橘皮 竹茹 各三錢 人參 一錢 甘草 一錢 水二鍾

薑三片棗二枚煎七分溫服

羌活附子湯

羌活 附子 茴香 木香 乾薑

食鹽 三味各少許

本事方 治陰毒欬逆

川烏 乾薑 炮 附子 炮 肉桂 芍藥 甘草

半夏 吳茱萸 陳皮 大黃 水二鍾薑三

證治大還

傷寒近
卷之五

半 貞白堂

片煎七分溫服

短氣門

甘草附子湯

甘草 白朮 附子 桂枝 水煎服

人參養榮湯

人參 白朮 茯苓 黃芪 當歸 熟地

白芍 遠志 五味子 陳皮 桂心 甘草

水二鍾薑二片煎七分溫服

咳嗽門

杏子湯

人參 半夏 茯苓 芍藥 杏仁 細辛

紫蘇 陳皮 前胡 甘草 肺癰加乾薑肉桂

肺虛加五味子 水二鍾姜五片煎七分溫服

十棗湯

芫花 熬 大戟 甘遂 等分搗 大棗 十枚 水二

鍾煮大棗至七分入藥末五分服

大半夏湯

半夏 白茯苓 生薑 水二鍾煎七分溫服

證治大還

傷寒近
卷之五

三 貞白堂
三子

乾嘔門

白通湯 治少陰下利乾嘔脈微

附子 炮一枚 乾薑 三錢 水一鍾半葱白四莖煎

七分入童便一盞冷服

通脈四逆湯

乾薑 炮三錢 附子 炮 人參 甘草 炙各一錢半 水二

鍾煎七分溫服

黃芩半夏生薑湯

黃芩 芍藥 半夏 甘草 水二鍾薑五片

棗二枚煎七分溫服

噦門

小橘皮湯

陳皮 生薑 加人參甘草名大橘皮湯 水一

鍾半煎七分溫服

多眠門

萎壯湯

萎壯 五分 石膏 三錢 葛根 羌活 白薇 杏仁

青木香 川芎 各二錢 麻黃 有汗不用 水二鍾煎七分

證治大還

傷寒近
卷之五

三 貞白堂
可矣

溫服

犀角湯

黃連 二錢 犀角 四錢 木香 五分 烏梅 三箇 水一

鍾半煎七分溫服

桃仁湯

桃仁 槐子 艾葉 各二錢 水一鍾半棗七枚

煎七分服

不眠門

酸棗湯

酸棗仁炒 人參 茯苓 麥門冬各一錢半 石膏二錢

知母 甘草各一錢 桂心五分 水二鍾薑三片煎

七分服

黃連阿膠湯

黃連三錢 芍藥一錢 阿膠炒 黃芩三錢 雞子黃二錢

水一鍾半煎一鍾入阿膠雞子黃再沸服

加味溫膽湯

橘紅 茯苓 酸棗仁 黃連酒炒 白芍 生地

半夏七分 軟柴胡 當歸各一錢 甘草五分 川芎七分

證治大還

傷寒近卷之五

三 貞白堂

人參二錢五分 竹茹 水二鍾薑三片煎七分服

桂枝救逆湯

桂枝一錢二分 甘草錢 蜀漆一錢五分 牡蠣二錢 煎醋滓

龍骨一錢 水一鍾半薑五片棗四枚煎七分服

厥逆門

四逆散

柴胡 芍藥 枳實各二錢 甘草錢 腹瀉加附

子咳加五味子乾薑 悸加桂枝 小便不利

加茯苓 水二鍾煎七分服

四逆湯若脈浮遲表熱裡寒下利清水者此湯主之

甘草三錢 乾薑炮二錢 附子炮一錢 水一鍾半煎七分服

分溫服加味同前 白朮 五錢 人參 鹿皮 炙甘草

當歸四逆湯

當歸 桂枝 芍藥 細辛 吳茱萸各二錢

甘草 通草各一錢 大棗五枚 水二鍾薑三片煎

七分服

陰症門

辟瘟散

證治大還

傷寒近卷之五

三 貞白堂

附子大者一枚炮研末入臍茶二錢和勻作二服 水一鍾煎六分入

蜜半匙冷服須臾躁止得睡汗出乃愈

陰毒甘草湯

蜀椒一錢 升麻 當歸 鼈甲醋炙 甘草各二錢

雄黃另研 水二鍾煎八分入雄黃末一錢服

五積散麻黃 附子 桂枝 法寒積也 蒼朮 厚朴 去濕積也 半夏 橘皮 去痰積也 參苓 甘草 補氣也 厚 歸 芍 藥 補血也 故 名五積散

麻黃 川芎 蒼朮 白芷 桔梗 肉桂

乾薑 厚朴 半夏 枳殼 橘皮 當歸

芍藥 人參 茯苓 甘草 水二鍾薑三片煎七分服	咽痛門	陽毒升麻湯	升麻 犀角 射干 黃芩 人參 甘草 水二鍾煎七分服	半夏散	半夏 二錢 苦梗 三錢 甘草 二錢 桂枝 水二鍾煎三片煎七分服	證治大還 傷寒近 卷之五 五 真白堂	苦酒湯	雞子一枚 去黃內半夏七粒以剪刀 雞坐爐火上蒸熟酒下	炙甘草湯	炙甘草 人參 生地 桂枝 麻仁 阿膠 麥門冬 水酒各一鍾薑三片棗二枚煎七分服	心忪門	桂枝甘草湯	桂枝 甘草 水二鍾煎七分服
------------------------	-----	-------	---------------------------	-----	---------------------------------	--------------------	-----	---------------------------	------	--	-----	-------	---------------

動氣門	大橋皮湯	橘皮 甘草 人參 生薑 煎同前	甘草乾薑湯	甘草 乾薑 水鍾半煎七分服	痙瘓門	附子防風散	附子 炮二錢 防風 一錢 白朮 甘草 桂心 乾薑 炮各一錢 柴胡 茯苓 各五分 五味子 十二分 水二鍾煎四片煎七分服	證治大還 傷寒近 卷之五 五 真白堂	痙瘓門	小續命湯	麻黃 人參 防風 防己 川芎 桂枝 白朮 芍藥 黃芩 各一錢 附子 童便 甘草 各五分 水二鍾煎七分服	身振門	十味溫膽湯	半夏 枳實 茯苓 陳皮 竹茹 甘草
-----	------	-----------------	-------	---------------	-----	-------	--	--------------------	-----	------	---	-----	-------	-------------------

人參 棗仁 當歸 生地 水二鍾薑三片煎七分服	佛鬱門	葛根解肌湯	葛根 黃芩 芍藥 麻黃 甘草 水二鍾薑三片煎二枚煎七分服	臟結門	茱萸四逆湯	當歸 桂枝 芍藥 細辛 通草 甘草 謹治大還 傷寒近 卷之五 貞白堂	茱萸 附子 水二鍾薑五片棗五枚煎七分服	服	陰陽易女勞復門	殺鼠屎湯	韭白根 一握 殺鼠屎 十四粒 水二鍾煎七分服下	部有粘汗則愈未汗再服	括葉竹茹湯	瓜蒌根 五錢 竹茹 一兩 水二鍾煎七分服	當歸白朮散
------------------------	-----	-------	------------------------------	-----	-------	------------------------------------	---------------------	---	---------	------	-------------------------	------------	-------	----------------------	-------

當歸 一錢 白朮 附子 甘草 芍藥 炒	黃芪 人參 各一錢 桂枝 五分 水二鍾薑五片煎七分服取微汗有熱者勿服	瘥後食復勞復門	知母麻黃湯	知母 麻黃 甘草 芍藥 黃芩 各一錢 桂枝 五分 水一鍾半煎七分服	枳實 梔子 豉湯	謹治大還 傷寒近 卷之五 天 貞白堂	牡蠣澤瀉散	牡蠣 澤瀉 天花粉 海藻 商陸 葶藶	蜀漆	百合病	百合地黃湯	百合 七枚 水浸一宿 地黃 一兩 水二鍾煎七分服	百合知母湯 卽前方加知母	兩感門	天羌活湯 治兩感表中風寒內有熱者
---------------------	------------------------------------	---------	-------	-----------------------------------	----------	--------------------	-------	--------------------	----	-----	-------	--------------------------	--------------	-----	------------------

羌活 獨活 防風 防已 黃芩 黃連

蒼朮 白朮 甘草 川芎 細辛 各一錢 知母

生地 各二錢 水二鍾煎七分溫服不解再服

狐惑門

犀角黃連湯

黃連 三錢 犀角 四錢 木香 五分 烏梅 三箇 水一

鍾半煎七分服

雄黃散

雄黃 青箱子 苦參 黃連 各二錢 桃仁 一錢

證治大還

傷寒通卷之五

末

貞白堂

右爲細末用生艾搗汁和如小指大綿裹納肛門內

證治大還 傷寒近目錄

後集 卷之一

陶節菴辨仲景傷寒論 傷寒至捷法

十勸歌 治傷寒有證法則 陶節菴

辨表裡中三症 辨陰陽二症

太陽六傳 太陽症 太陽頭痛

治太陽則不可越經 問桂枝湯發汗

太陽禁忌不可犯 太陽症亦有當汗不當汗

當汗而不汗生黃 當汗而發汗過多成瘧

證治大還

傷寒近後集卷之一目錄

一 貞白堂

不當汗而汗或蓄血 血症見血自愈

知可解 知不可解 脉知可解不可解

易老九味羌活湯解利法 當汗而下之 成協熱利

太陽一下有八變 裡傳表

三陽三陰辨症用藥治法 傷寒表症治法歌

傷寒裡症治法歌 問兩感邪從何從而入

傷寒誤下變有輕重 辨內外傷

狂言譫語鄭聲辨 陽明症不可犯禁忌

汗多亡陽 下多傷陰 傷寒五臟受病脉訣

陳氏傷寒近後集卷之一

雲間陳治三農甫述

竹西鍾素純臣甫閱

門人姚廷讓子遜
范松壽民
拭機先

男師柴羔愚

姪延陵季校
遇時邁

傷寒自霜降以後春分以前朔風剛競人有觸

之者謂之正傷寒其感之也重其餘春夏秋三

時皆謂之四時感冒雜症其感之也輕然皆謂

之四時傷寒蓋有冬感之寒至春而溫至夏而

證治大還

傷寒近後集
卷之一

一 貞白堂
子方主

暑伏久而發亦必循乎六經以治之庶幾無誤

而有當雖然長沙公已詳言剴切明晰無可疑

議獨是地有南北人有強弱江左以南四時猝

然感冒恒多真正傷寒殊少遂遂宗節菴之學

以治於南其利溥可以知操仲景之術而治其

北者其功亦不淺余故掇其菁華以備學者參

考焉

陶節菴辨仲景傷寒論

客有過余而問之曰甚矣傷寒之蘊奧麻黃桂枝二

湯之難用也服之而愈者纔一二不愈而變重者

常八九仲景立法之大賢也何其方之難憑有如

此哉今人畏而不用以參蘇飲和解散等平和之

劑代之然亦未見其妙也子孟與我言之答曰吁

難言也請以經語証之經曰冬氣嚴寒萬類潛藏

君子固密則不傷于寒觸冒之者乃名傷寒耳其

傷于四時皆能為病以傷寒為毒者以其最成殺

厲之氣也中而即病名曰傷寒不即病者其寒毒

藏于肌膚至春變為溫病至夏變為暑病暑病者

證治大還

傷寒近後集
卷之一

二 貞白堂
子方主

熱極重于溫也以此言之傷寒者乃冬時感寒即

病之名桂枝麻黃二湯為當時之傷寒設與過時

之溫暑有何預焉夫受病之源則同亦可均謂之

傷寒所發之時既異治之則不可混也請畧陳之

夫春溫夏熱秋涼冬寒者四時之正氣也以成生

長收藏之用風亦因四時之氣成溫涼寒熱也若

氣候嚴寒風亦凜冽天道和煦風亦溫煖冬時坎

水用事天令閉藏水冰地凍風與寒相因而成殺

厲之氣人觸冒之滕理鬱塞乃有惡風惡寒之症

證治大還

傷寒近後集

三

貞白堂

其餘月時則無此症也。仲景固知傷寒乃冬時殺厲之氣所成。非比他病可緩。故其言特詳于此。書而畧于雜病也。倘能因名以求實。則思過半矣。不幸此書傳世久遠。遺帖頗多。晉太醫令王叔和得散亡之餘。註次流傳。其功溥矣。惜乎以己論混經。未免穿鑿附會。成無已氏因之。順文註釋。並無闕疑正誤之言。以致將冬時傷寒之方。通解溫暑。遺禍至今。而未已也。溫暑必別有方。今皆失而無徵也。我朝宋景濂學士。嘗嘆傷寒非全書得其旨哉。

證治大還

傷寒近後集

三

貞白堂

症乃惡寒發熱。無汗。脉浮緊。為傷寒。有寒則見無寒。則不見也。當用麻黃湯。輕揚之。刺發而去之。寒邪退。汗出。表和而愈矣。曰。緊脉固為寒矣。脉之緩者。亦用桂枝湯。又何耶。曰。風則傷衛。衛傷則自汗。緣太陽受風。不能衛護。腠理疎而汗泄。所以脉見浮緩也。脉雖浮緩。其受寒則一。故亦宜桂枝。辛溫之藥。解散寒邪。腠理閉而汗止。表和而愈。又有榮衛俱傷者。二湯又難用也。故復設大青龍湯。然此藥難用。非庸俗得而識也。曰。溫暑既無方法治之。則將奈何。脉症與傷寒有何分別。曰。溫暑雖亦冬時感受風寒。而不即散。在人身中伏藏。歷過二三月之久。天道大變。寒化為熱。人在氣交之中。亦隨天地之氣而化。觀仲景以即病之傷寒。與傷暑時令為病之名。豈無異哉。治之方。亦必以隨時以辛涼苦矣。安得概用冬時治寒之方乎。今無其方者。蓋散亡之也。經既稱變為溫。變為熱。則已改易冬時之寒。為溫熱矣。方亦不容不隨時改更也。夫溫病欲出。值天時和煦。自內達表。脉反見乎右關。

證治大還

傷寒近後集

四

貞白堂

證治大還

傷寒通後集
卷之一

五

貞白堂
言六

不浮緊而微數曰惡寒否乎曰傷寒自冬月風寒而成外則有惡風惡寒之症既名爲溫則無此症矣曰然則子之言有所據乎曰據乎經耳經曰太陽病發熱不惡寒而渴者溫病也不惡寒則非因外來渴則明其自內達表曰春夏之病亦有頭疼惡寒脈浮緊者何也曰此非冬時所受之寒乃冒非時暴寒之氣耳或溫暑將發又受暴寒雖有脈浮之症未若冬時之甚也宜辛涼之藥通其內熱而解之斷不可用桂枝等劑矣曰溫熱與傷寒治之不同也已聞命矣敢問傷寒之在三陽則爲邪熱既傳三陰則爲陰症矣以熱治固其宜也三陰篇以四逆散涼藥以治四逆大承氣湯以治少陰其故又何耶嗚呼此蓋叔和以殘闕之經作全書詮次將傳經陰症混同立論所以遺禍至今而未已也姑畧陳之蓋風寒之初中人無常或入于陰或入于陽皆無定體非但始太陽終厥陰或自太陽始日傳一經六日至厥陰邪氣衰而不傳而愈者亦有不罷再傳者或有間經而傳者或有傳至

證治大還

傷寒通後集
卷之一

六

貞白堂
言六

二三經而止者或有始終只在一經者或有越經而傳者或有初入太陽不作鬱熱便入少陰而成真陰症者或有直中陰經而成寒症者緣經無明文後人有妄治之失若夫自三陽傳次三陰之陰症外雖有厥逆內則熱邪耳若不發熱四肢便厥冷而惡寒者此則直中陰經之寒症也自前人立說之荒使後人蒙害者多矣太陽受邪行盡三陽氣分傳次三陰之血分則熱入深矣熱入既深雖厥冷真熱邪也經曰亢則害承乃制熱極反兼寒化也若先熱後厥逆者傳經之陰症也經云厥深熱亦深厥微熱亦微是也故宜四逆散承氣湯看微甚而治之如其初病便厥但寒無熱此則直中陰之寒症也急宜四逆湯輩以溫之經曰發熱惡寒發于陽也無熱惡寒發于陰也尚何疑哉又有日傳二經爲兩感者傳經未終而斃也病有標本治有逆從豈可概論之乎曰陰症之不同已聞命矣嘗讀劉守真書云傷寒無陰症人傷于寒則爲熱病熱病乃汗病也造化汗脈皆陽氣也編考內

證治大還

傷寒近後集
卷之一

七

貞白堂
言至

經靈樞諸篇並無寒症陰症乃襍病也叔和悞入之耳守真高明之士亦私淑仲景者而議論之異者何耶曰雖守真之明達蓋亦因傷寒論以桂枝麻黃通治溫暑之悞而有是說故叮嚀云天道溫熱之時用桂枝湯必加冷藥于其中免致黃生斑出之患若知此湯自與冬時即病之傷寒設不與過時之溫暑設則無此論矣觀其晚年悟道著病机氣宜保命集其中羌活湯辛涼之藥以治非傷寒其妙如神足可補仲景之遺旨何其高哉夫內經言傷寒即為熱病而無寒者語其常也仲景之論有寒有熱者語其變也合常與變而無遺者也所謂道並行而不相悖而反相為用也此其所以為醫家萬世之準繩標的也歟

王執中曰傷寒雖是一病然所感不同而症亦懸絕有冬傷于風寒即時便發名曰正傷寒者有至春變為溫病至夏變為熱病名曰伏熱病傷寒者有雖伏病在身至春夏亦未發偶因暴感風寒或色慾不謹或飲食不節觸動而發者亦曰伏熱病傷

證治大還

傷寒近後集
卷之一

八

貞白堂
言至

寒有冬月飲食不節悞傷冷物而發者亦名冬月正傷寒此其所感之不同也若夫春夏秋本無伏病在身而偶感風寒謂之四時傷寒即襍病也非仲景節菴之所謂傷寒也故用參蘇飲藿香正氣散等藥與仲景節菴傷寒門藥大異至于所見之症則又不同有頭痛項強腰脊痛惡寒發熱者有滿身骨節痛有不頭疼不項強無腰脊痛寒熱骨節痛俱無者有頭不疼而即腰脊痛惡寒發熱骨節疼者有只頭疼而諸症俱無者有只腰脊痛而諸症俱無者有只惡寒發熱而諸症俱無者有只骨節痛而諸症俱無者有寒熱交爭狀似瘧疾者有協熱利下利清水狀似痢疾者有白瀉腹痛狀似水瀉者有既吐且利揮霍撩亂名曰霍亂者有傷在一經以次傳編者有始終只在一經者有越一經而傳者有越兩經三經而傳者有傳一二經而止者有傳變六經而再傳者有從陽經傳入陽明腑中者有從陰經傳入陽明腑中有不從六經傳來直中陽腑者此其症之不同也至于用藥一

差則壞症百出莫測端倪不可言紀曰衄血曰吐血曰便血曰發斑曰發黃曰發狂曰如狂曰腹痛曰譫語曰鄭聲曰噦曰嘔曰吐曰瀉曰利曰小水不利曰大便自利曰除中曰不寐曰自汗曰盜汗曰手足汗曰頭汗曰陰結曰陽結曰能食曰不能食曰狐惑曰脾約曰吐蛔曰陰陽易曰勞復曰食復曰尋衣摸床曰撮空曰動氣曰奔豚曰肉苛曰舌卷囊縮不能收舉此其壞不同也然非愚之臆說仲景先師分爲太陰等篇每條開示某經某症證治大遺

傷寒近後集

九

貞白堂

傷寒至捷法

發熱惡寒身體痛脉浮無汗怎生醫○十神湯與香蘇散有汗傷風用桂枝 四五日來口舌乾發熱身疼臥不安先服人參敗毒散小柴胡湯在後番七八日來熱在內口渴心煩腹脹小便利赤少大

使難大柴胡湯好通利 發熱口乾大便瀉小便赤少煩燥結小柴胡湯兼五苓加上黃連真一絕汗下之後病不解依然熱渴如見怪解毒湯兼小柴胡諸般熱症皆無碍

十勸歌

傷寒頭痛及身熱便是陽症不可服熱藥傷寒傳三陰三陽共六經內太陰病頭不痛身不熱少陰病有反熱而無頭疼厥陰病有頭疼而無發熱故知頭疼身熱即是陽症若妄投熱藥決死亡 二

證治大遺

傷寒近後集

十

貞白堂

傷寒必須直攻毒氣不可補益邪氣在經絡中若隨症早攻之只三四日痊安若妄謂先須正氣却行補益使毒氣流熾多致殺人 三傷寒不思飲食不可服溫脾胃藥且傷寒不思飲食自是常事終無餓死之理如理中丸之類不可輕服若陽病服之致熱氣增重或至不救丁香巴豆之類尤不可服 四傷寒腹疼亦有熱症不可輕服溫暖藥難經云疼爲實故仲景論腹滿時痛之症有曰疼甚者加大黃疼甚而加大黃意可見矣惟身冷厥

證治大還

傷寒近後集
卷之一

七

貞白堂

逆而腹疼者方是陰症須消息之每見腹疼便投熱藥多致殺人。五傷寒自利當看陰陽症不可例服補藥止瀉藥自利惟身不熱手足溫者屬太陰身冷四逆者屬少陰厥陰其餘身熱下利皆屬陽當隨症依仲景法治之每見下利便投煖藥及止瀉藥者致多死亡。六傷寒胸脇疼及腹脹滿不可妄用艾炙常見村落間有此症便用艾炙多致毒氣隨火而盛膨脹發喘以不知胸脇疼自屬少陽腹脹雖屬太陰仲景以為當下之病此外惟證治大還

證治大還

傷寒近後集
卷之一

七

貞白堂

者緣為其脉沈然陽厥脉沈而滑救陰厥脉沈而弱又陽厥時復指爪却溫或有時發熱陰厥則常冷此為可別。八傷寒病已在裡則不可用藥發汗然傷寒須看表裡如發熱惡寒則是在表正宜發汗如不惡寒反惡熱即是裡症若一倒發汗則真氣已涸死者必矣又別有半在表半在裡之症不吐皆不可下亦皆不可汗但隨症治之。九傷寒飲水為欲愈不可令病人恣飲過度病人大渴當與之水以消熱故仲景以飲水為欲愈人見此說遂令病者縱飲因而為嘔為喘為咳逆為下利為腫為悸為痞為結胸小便下利者多矣且如病人欲飲一碗只可與半碗常令不足為善。十傷寒病初安不可過飽及勞動或食羊肉行房及食諸肉骨汁并飲酒如病方愈不須再服藥兼脾胃尚弱食飽不能消化病即再來謂之食復病方好氣血尚虛勞動太早病即再來謂之勞復又食羊肉行房並死食諸肉骨汁并飲酒再病必重。石傷寒十勸誠可為醫家病家之便益治法也。

治傷寒看症法則

陶節庵

諸治大還

傷寒近後集
卷之一

三

貞白堂
子

凡看傷寒。先觀兩目。或赤或黃。陽毒。六脉洪大有力。燥渴者。輕則三黃石膏湯。重則大承氣黃芩為症。如小水不利。或赤或黃。兼小腹脹滿不痛。渴而大便實。脉來沈實有力者。為濕熱發黃。輕則茵陳五苓散。重則茵陳湯分利。小水清白為愈。黃自退矣。却法。開在殺車槌方前。次看口舌。有無胎狀。如見滑白色者。邪未及腑。屬半表半裡症。宜小柴胡和解。舌上黃胎者。胃腑有邪熱也。宜下之。調胃承氣湯。大燥實。脉沈有力。而大渴者。方可下。便不實。脉不沈。微渴者。未可下。尤宜小柴胡湯。舌上黑胎。生芒刺者。是腎水尅于心火。十有九死。急用大承氣下之無疑矣。此邪熱已極也。却法。開在殺車槌方前。已後以手按其心胸至小腹。有無痛處。若按之當心下鞭痛。手不可近。燥渴譫語。大便實。脉來沈實有力。為結胸症。急用大陷胸湯。加枳桔下之。量元氣虛實。宜從緩治。若按心胸雖滿悶。不痛。尚為在表。未入乎腑。乃邪氣填乎胸中。只消小柴胡枳

諸治大還

傷寒近後集
卷之一

西

貞白堂
子

桔以治其悶。如未効。本方對小陷胸。一服如神。若按之當心下脹滿而不痛者。宜瀉心湯。加枳梗是。若滿也。以手按之。小腹若痛。而小水自來。利大便。黑。兼或身黃。嚴妄。燥渴。脉沈實者。為蓄血。桃仁承氣下。盡黑物則愈。若按之小腹脹滿不鞭。痛。小水不利。即即溺澀也。五苓散。加木通山梔利之。不可大利。恐耗竭津液也。若按其小腹繞臍鞭痛。渴而小水短赤。大便實者。有燥屎也。大承氣下之。却法。開在殺車槌方前。再後問其大小便。通利若何。有何痛處。及服過何藥。方知端的。務使一一明白。症脉相對。庶得下藥不差。凡看傷寒。若見吐蛔者。雖有大熱。忌下涼藥。犯之必死。蓋胃中有寒。則蛔上膈。大凶之兆。人皆未知。急用炮薑理中湯。一服。加烏梅二個。花椒十粒。服後待蛔定。却以小柴胡退熱。蓋蛔聞酸則靜。見苦則安矣。凡治傷寒。若煩渴欲飲水者。因內水消竭。欲得外水自救。大渴欲飲一升。止可與一盃。常令不足。不可太過。若恣飲過量。使水停心下。則為水結胸等症。射于肺。為喘。為

咳留于胃爲噎爲噦溢于皮膚爲腫畜于下焦爲癰滲于腸間則爲利下皆飲水多之過也又不可不與又不可強與經云若還不飲非其治強飲須教別病生正此謂也

凡治傷寒若經十餘日已上尚有表症宜汗者與羌活沖和湯微汗之十餘日若有裡症宜下者可與大柴胡湯下蓋傷寒過經正氣多虛恐麻黃承氣太峻悞用麻黃令人亡陽悞用承氣令人不禁故有此戒若表症尚未除而裡症又急不得不下者證治大還

傷寒近後集

五

真白堂

只得

以大柴胡通表裡而後治之又老弱及血氣

兩虛之人有下症者亦用大柴胡下之不傷元氣如其年壯力盛者不在禁例從病制宜

凡治傷寒尺脈弱而無力者切忌汗下寸脈弱而無力者切忌發吐俱宜小柴胡和之

凡治傷寒若汗下後不可使用參芪大補宜用小柴胡加減和之若大補使邪氣得補而熱愈盛復變生他症矣解謂治傷寒無補法也如曾經汗下後果是虛弱之甚脈見無力者方可用甘溫之劑補

之此爲良法其勞力感傷之症不在禁補之例看消息用之凡治傷暑與傷寒俱有熱若悞治之害矣傷寒則外惡寒而脈浮緊傷暑則不惡寒而脈虛此爲不同治經云脈盛身寒得之傷寒脈虛身熱得之傷暑治宜小柴胡湯加石膏知母或人參白虎湯天久淫雨濕令併行蒼朮白虎湯若元氣素弱而傷重者用清暑益氣湯

三農云治暑不宜輕用小柴胡夾暑感風寒者或可用一二劑蓋傷暑非傷寒至夏變熱病之暑病也

證治大還

傷寒近後集

六

真白堂

辨表裡中三證

假令少陽症頭痛往來寒熱脈浮弦此三症但有一者是爲表也口失滋味腹中不和大小便或閉而不通或泄而不調但有一者是爲裡也如無上下表裡餘症者皆虛熱也是在其中矣

辨陰陽二症

陰症身靜重語無聲氣難布息目睛不了了鼻中呼不出吸不入往來口與鼻中氣冷水漿不入大小便不禁面上惡寒有如刀刮身表涼知在陰經也

名曰陰症。

陽症身動輕。語有聲目晴了。鼻中呼吸出入能往而能來。口與鼻氣皆然。身表熱。知在陽經也。名曰陽症。

太陽六傳

太陽者乃巨陽也。為諸陽之首。膀胱經病。若渴者自入于本也。

太陽傳陽明胃土者。名曰巡經傳。為發汗不微利小便。便餘邪不盡。透入于裡也。

證治大還

傷寒近後集卷之一

七

貞白堂

太陽傳少陽胆木者。名曰越經傳。為原受病。脉浮無汗。常用麻黃而不用之故也。

太陽傳少陰腎水者。名曰表裡傳。為得病急。當發汗而反下。汗不發。所以傳也。

太陽傳太陰脾土者。名誤下傳。為原受病。脉緩有汗。常用桂枝而反下之。所致也。當時腹痛。四肢沉重。

太陽傳厥陰肝木者。為三陰。不至于首。惟厥陰與腎脉上行。與太陽相接。名曰巡經得度傳。

太陽症

太陽症頭痛發熱。自汗惡風。脉當緩而反緊。傷風得傷寒脉也。

太陽症頭痛發熱。無汗惡寒。脉當緊而反緩。傷寒得傷風脉也。

王執中云。冬月此二症。用九味羌活湯。不應仍用桂枝麻黃各半湯。蓋穩于大青龍也。

二症脉不同。本經大青龍湯主之。易老初用桂枝麻黃各半湯。後用大青龍湯。以其有厥逆筋惕肉瞤。及亡陽之失也。易老後又改為九味羌活湯。而不

證治大還

傷寒近後集卷之一

八

貞白堂

太陽症發熱惡寒。自汗脉緩。

太陽症發熱惡風。無汗脉緩。此二症易老原將麻黃一桂枝二為治。後復改用羌活湯。

太陽頭痛

太陽膀胱脉浮緊。直至寸口。所以頭痛者。頭與寸口俱高之分也。兼厥陰與督脉會于巔。逆太陽之經。上而不能得上。故壅滯為頭痛于上也。左手浮弦。胸中痛也。沈弦。背俞痛。右手浮弦者亦然。頭痛者

本也最高之分。惟風可到。風則溫也。治以辛涼。秋
尅春之意。故頭痛皆以風藥治之者。總其體之常
也。然各有三陰三陽之異焉。故太陽則宜川芎陽
明則宜白芷。少陽則宜柴胡。太陰則宜蒼朮。少陰
則宜細辛。厥陰則宜吳茱萸也。王執中曰。此卽論
風而不及寒者。風亦寒氣所化。初從下起。後從上
來。風與寒本相因。但感之不同耳。故治傷寒者。初
分有汗無汗。到傳經後。則不分矣。由此觀之。亦能
散寒其理同也。

慈治大還

傷寒近後集
卷之一

九

貞白堂

治太陽則不可越經

假令治太陽陽明。不可遺太陽。而只用陽明藥。餘倣
此用三陽經解藥後。身番覆重者。若煩則是有陽
明也。若不煩而番覆輕者。知不傳三陰也。不傳三
陰則爲解也。大抵三陰之體。靜重。與濕相同。傷寒
五日後無汗。謂穀消水去。形亡。故下之。二日前謂
內有水穀。故汗之。

問桂枝湯發汗

發汗或云當得汗解。或云當發汗。更發汗。并發汗。宜

桂枝湯者。數方是用桂枝發汗也。復云。無汗不得
服桂枝。又曰。汗家不得重發汗。又曰。發汗過多者。
却用桂枝。甘艸湯是閉汗也。一藥二用。如何說得。
仲景發汗。與本草之義合。而爲一。答曰。本草云。桂
枝味辛甘熱。無毒。能爲百藥長通血脈。止煩出汗。
者是調血而汗自出也。仲景云。臟無他病。發熱自
汗。此衛氣不和也。又云。自汗者。爲榮氣和榮氣
和則外不諧。衛氣不與榮氣相諧和也。榮氣和。則
愈。故皆桂枝湯調和榮氣。榮衛既和。則汗自出矣。

慈治大還

傷寒近後集
卷之一

十

貞白堂

風邪由此而解。非桂枝能開腠理發出汗也。以其
固閉榮血。衛氣自和。邪無容地。而出矣。其實則閉
汗孔也。昧者不解閉汗之意。凡見病者。便用桂枝
湯發汗。若與中風自汗者合其効。桴鼓。因見其取
効而病愈。則曰。此桂枝發出汗也。遂不問傷寒無
汗者。亦與桂枝湯。悞之甚矣。故仲景云。無汗不得
服桂枝。是閉汗孔也。又云。發汗多。父心悸。欲得
按者。用桂枝甘艸湯。是亦閉汗孔也。又曰。汗家不
得重發汗。若桂枝發汗。是重發汗也。凡桂枝條下。

言發字當認作出字。是汗自然出也。非若麻黃能開腠理而發出汗也。本草出汗二字。上文有通血脉一句。是非三焦衛氣皮毛中藥。是為榮血中藥也。如是則出汗二字。當認作榮衛和自然汗出。非桂陽腠理而發出汗也。故後人用桂治虛汗。讀者當逆察其意。則可矣。神農之作于其前。仲景之述于其後。前聖後聖。其揆一也。

太陽禁忌不可犯

小便不利。不可使利之。利之是謂犯本。以是知五苓

證治大還

傷寒近後集

主

貞白堂

散不可妄用。

大便不可易動。動之是謂動血。此

為犯禁。表在不可下。下之尤犯禁也。

太陽症亦有當汗不當汗者

咽乾淋渴鼻衄。小便不利。已經發汗。不得重發。如無

已上忌症。雖經發汗。倘邪氣未盡。亦當重發之。

當汗而不汗生黃

其症為風寒所傷。陽氣下陷。入于內而排寒水上行。于經絡之間。本當發汗。因以微其邪。醫失汗之。故生黃也。脾主肌肉。四肢寒濕與內熱相合而生黃。

也。

當汗而發汗過多成瘥

其症因發汗太過。腠理開泄。汗漏不止。故四肢急難以屈伸。

不當汗而汗或蓄血

蓄血其症燥火也。當益津液為上。而反汗以亡其津液。其毒擾陽之極。則慢陰也。故燥血而蓄于胸中也。

血症見血自愈

證治大還

傷寒近後集

主

貞白堂

太陽病人。膀胱。小便利而赤。蓄血症也。血自下者愈也。

知可解

戰而汗解者。太陽也。不戰有汗而解者。陽明也。不戰無汗而解者。少陽也。若先差經。必不爾矣。

太陽傳陽明。其中或有下症。陽明症反退。而熱兼不竭。却退顯少陽症。是知可解也。

太陽知可解者。頭不痛。項不強。肢節不痛。則知表邪退也。

陽明知可解者。為無發熱惡寒。知裡易解也。

少陽病。知可解者。寒熱日不移時而作。邪未退也。若

用柴胡。而移其時。早移之于晏。晏移之于早。氣移

之于血。血移之于氣。是邪無可容之地。知可解也。

知不可解

服解藥而去沈因。只頭痛目悶。是知濕去而風不去。

則欲解也。若風去而濕不去。則不解。何以然。風則

高濕則下。而入裡也。

脈知可解不可解

證治大還

傷寒近後集

重

貞白堂

可解之脈。浮而虛。不可解之脈。浮而實。浮而虛者。只

是在表。浮而實者。知已在裡也。汗多不解者。轉屬

陽明也。傷寒不頭痛。知邪不在經。若頭痛。知邪在

經也。

易老九味羌活湯解利法

羌活 治太陽肢節痛。君主之藥也。乃撥亂反正之

主。故大無不迴。小無不入。關節非此不治也。

防風 治一身盡痛。乃軍卒中卑下之職。一聽君令

而行。隨所使。引之而至者也。

蒼朮 別有雄壯上行之氣。能除濕下安太陰。使邪

氣不傳于足太陰脾。

細辛 治少陰腎經頭痛。

川芎 治厥陰頭痛在腦。

白芷 治陽明頭痛在頂。

生地黃 治少陰心熱在內。

黃芩 治太陰肺熱有神。

甘艸 能緩裡急。調和諸藥。已上九味。雖為一方。

然亦不可執。執中無權。猶執一也。當視其經絡前

證治大還

傷寒近後集

重

貞白堂

後左右之不同。從其多少大小之不一。增損用之

如神。右水煎服。

若欲急汗。當熱服以羹粥投之。若緩汗。溫服之而不

用湯投之也。

脈浮而不解者。先急而後緩。脈沈而不解者。先緩

而後急。

本湯不獨解利傷寒。治雜病亦有神。中風行經者。

加附子。中風秘澀者加大黃。中風并三氣合

而成痺等症。各隨十二經上下內外。寒熱溫涼。四

時六氣加減補瀉用之煉蜜作丸尤妙

當汗而下之成協熱利

當各隨三陽本症表藥解之表解下利自愈若不愈者方可以利藥治之

太陽一下有八變

太陽病下之其脉促不結胸者此為欲解也脉浮

者必結胸脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急

脉細數者頭痛不止脉緊數者必欲嘔脉

沈緩者協熱利脉浮滑者必下血

證治大還

傷寒近後集卷之一

圭

貞白堂

裡傳表

太陽反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍

藥湯主之至于太實痛者胃也桂枝加大黃湯主

之已傳戊婦告夫也所以為裡傳表即名誤下傳

也

三陽三陰辨症用藥治法

太陽無汗麻黃為最太陰有汗桂枝可先小柴胡為

少陽之要領大柴胡行柴胡之秘堅至三陰則難

拘定法或可溫而或可下宜數變以曲全生意或

可方面或可圓

傷寒表症分別治法以便四時取用

傷寒表症是如何左手脉浮緊無汗惡寒身熱多頭項俱

疼脉浮取輕手按之脉浮大而緊施方施劑汗之和冬麻黃湯春夏羌活中風湯

傷寒裡症治法宜次第

傷寒裡症心腹疼邪傳入裡脉重取洪數不惡寒而惡熱蒸其

脉數沈兼自汗二便秘少下之生輕則大柴胡湯重則三承氣湯

證治大還

傷寒近後集卷之一

美

貞白堂

陽症陽症身熱及頭疼體重咽乾難臥動或自汗

語及循衣脉息弦洪宜審用脉洪大有力汗多

陽明湯 九味羌活湯 大柴胡湯 三承氣湯次第選用

陰症陰症身涼二便清病初自汗也頭疼也無煩

躁也無渴脉息沈微自可明脉沈微無力四肢逆冷

四逆湯 理中湯 三建湯

陰毒手足甲青至節三建湯此症極危灸

關元氣海丹田臍中

陽症似陰陽症身涼四肢小使赤少大便秘心

煩口燥脉沈數白虎湯兼竹葉奇 脉沈數有力

作藥石音湯 三黃解 亦湯 柴胡五苓散

陰疽似陽 陰症如陽面赤經小便清利大便通渾

身微熱沈遲脉真武湯佳兼理中 脉沉遲弱

五積散 兼附湯 灸服藥而脉不回宜灸 氣

海 神闕 丹田

陽厥 陽厥時時指爪溫心煩便秘口乾論脉來沈

細中還疾承氣柴胡最可吞

陰厥 陰厥身涼熱不回二便通滑不煩時脉來沈

證治大選 傷寒近後集 卷之一 毛 貞白堂

伏知端的三建湯兼四逆宜 脉沈微昏愢 先以 聖藥

用三建湯 灸此症倉卒無藥只灸 關元 氣

海 丹田妙

血發黃 發黃恰似烟熏色小便自利大便黑 皆焦

漱水血家黃桃仁承氣湯堪擇

蓄血黃 此由脾胃熱甚失于汗下以致之宜抵當

湯桃仁承氣湯選用

濕症黃疸 發黃渾似橘皮明小便不利大便行濕

熱相蒸名曰疸茵陳湯共五苓平

蓄熱陰黃 頭汗出四肢沈重如瘧俱用茵陳湯加

五苓兼小柴胡加梔子湯

發斑 發狂 陽毒發斑是如何梔子大黃黑奴科

此症甚危紅白赤易治如黑斑則胃爛難治如陽

毒五日內可治六日七日難治 人參石膏化斑湯 玄參升麻石膏湯

溫毒 葛根黃芩皮湯 調胃承氣湯 黃連黃芩皮湯 猪胆鷄子湯

黑奴丸方 治陽毒發斑煩躁大渴倍常時行熱病

六七日未得汗脉洪大或數面赤目脹身痛大熱

煩躁自汗欲走渴甚又五六日以上不解熱在胸

證治大選 傷寒近後集 卷之一 天 貞白堂

中口噤不能言為壞傷寒醫所不治棄為死人精

魂已竭心下纔暖撥開其口灌下即活凡灌藥

下咽便能即時甦醒 黃芩 芒硝 麻黃 金

底煤 小麥奴 龍突墨 梁上塵 各一大黃一兩

錢 右為末煉蜜為丸彈子大井水化下即當發

寒寒已汗出乃差若時頃不汗再復一丸須見微

利若不大渴不可與此藥

問兩感邪從何道而入

答曰經云兩感者死不治一日太陽與少陰俱病頭

痛發熱惡寒身乾煩滿而渴太陽者腑也自背俞而入之人之所共知之少陰者臟也自鼻息而入人所不知也鼻氣通于天故寒邪無形之氣從鼻而入腎為水也水流濕故腎受之經曰傷于濕者下先受之同氣相求耳又云天之邪氣感則害人五臟以是知內外兩感臟腑俱病欲表之則有裡欲下之則有表表裡既不能一治故死矣故云兩感者不治然所稟有虛實所感有淺深虛而感之深者必死實而感之淺者猶或可治治之而不救證治大還

傷寒近後集

卷之一 真白堂

者有矣夫未有不治而獲生者也予嘗用此間有生者十得二三故立此方以待好生君子用之

大菴活湯 防風 羌活 獨活 防己 黃芩

黃連 白朮 蒼朮 炙甘草 細辛 各三錢 知母

川芎 地黃 各一兩 右每服五錢水煎熱服不解

再服三四次必解病愈則止若有餘症並依仲景隨經法治之

傷寒誤下變有輕重

或問曰傷寒雜症一體若誤下之甚者變大否曰非

一體也傷寒誤下變無定體雜病誤下變有定體何以然傷寒自外而入陽也陽主動雜病自內而出陰也陰主靜動者犯之其變無窮靜者犯之其變止痞腹脇痛而已故變無窮者為重痞與腹脇痛者為輕

辨內外傷

傷風鼻中氣出粗合口不開肺氣通于天也傷食口無味涎不納鼻息氣勻脾氣通于地也

外傷一身盡熱先太陽也從外而之內者先無形也

證治大還

傷寒近後集

卷之一 真白堂

內傷手足不和兩脇俱熱先少陽也從內而之外者先有形也

內外俱傷人迎氣口俱盛或舉按俱實大表發熱而惡寒腹不和而口液此內外兩傷也

凡診則必捫手心手背手心熱則內傷手背熱則外傷次以脈別之

冬傷于寒者春必溫病夏為熱病長夏為大熱病益

因房色勞傷與辛苦之火水虧無以奉春生之金

故春陽氣長而為溫病也夏為熱病者是火先動

于火未動之時。水預虧于已旺之日。故邪但藏而
不爲病也。夏令炎蒸。其火既旺。與前所動者。客邪
與主氣二火相接。所以爲熱病也。長夏爲大熱病
者。火之方與秋之分。皆手經居之。水之方與春之
分。皆足經居之。所傷者皆經不足。故夏火旺。客氣
助于手經。則不足者愈不足矣。故所用之藥。皆泄
有餘而非足經藥。何以然。泄有餘。則不足者補矣。
此傷寒本足經。只言足經。而不言手。手經也。大意
如此。至于傳手經者。亦有之。當作別論。與大奇經
證治大還

傷寒近後集
卷之一

三

貞白堂

之病亦在其中矣。

狂言讖語鄭聲辯

狂言者。大開目。與人語。諸所未嘗見之事。卽爲狂言。
也。讖語者。合目自言。言所日用常見常行之事。卽
爲讖語也。鄭聲者。聲戰無力。不相接續。造字出于
喉中。卽鄭聲也。

陽明症不可犯禁忌

不當發汗。不當利小便。若發汗利小便。竭其津液。則
生蓄血症也。唯當益津液爲上。以其火就燥也。益

津液者。蓮鬚慈白湯是也。汗多亡陽。下多亡陰。小
便重利之走氣三者。雖異。爲言少津液則一也。

汗多亡陽

汗者。本所以助陽也。若陽受陰邪。寒結無形。須當發
去陰邪。以復陽氣。所謂益陽而除風寒客氣也。陰
邪已去。而復汗之。反傷陽經。曰重陽必陰。故陽氣
自亡。汗多亡陽。此之謂也。

下多傷陰

下者。本所以助陰也。若陰受陽邪。熱結有形。須當除
證治大還

傷寒近後集
卷之一

三

貞白堂

去。已敗壞者。以致新陰。此所謂益陰而除火熱邪
氣也。陽邪已去。而復下之。及亡陰也。經曰。重陰必
陽。故陰氣自亡。下多亡陰。此之謂也。

傷寒五臟受病脈病相尅訣

心臟。心病舌強笑。面赤燥煩。掌熱口乾。臍上動
氣洪緊數。反得沈微。命不全。

肝臟。肝家面青目痛閉。筋急怒容。臍左氣脈當弦
急。或兼長浮瀄短。各不治。

脾臟。脾家不食。面皮黃。體重肢痛。喜臥床。動氣當

臍脉緩大弦長而緊是凶殃

肺臟 肺家面白帶憂愁吐血寒溫喘嗽求臍右氣

兮沈細澹大而牢者死根由

腎臟 腎家而黑爪甲青耳閉足寒泄腹疼臍下氣

兮脉沈滑緩而大者死之形

已上皆受尅之脉爲賊邪故凶也

證治大還

傷寒近後集

卷之

真白堂

證治大還 傷寒近後集

後集 卷之二

痰瀉

傷食

虛煩

脚氣

論傷寒用藥法則

陰經用藥格法

治傷寒看症大畧

一提金脉要

截江網論脉

傷寒撮要論脉

足太陽經圖

太陽經見症法 辨症法 用藥法

足陽明經圖

陽明經見症法 辨症法 用藥法

證治大還

傷寒近後集 卷之二目錄

一 真白堂

足少陽經圖

少陽經見症法 辨症法 用藥法

足太陰經圖

太陰經見症法 辨症法 用藥法

足少陰經圖

少陰經見症法 辨症法 用藥法

足厥陰經圖

厥陰經見症法 辨症法 用藥法

煎藥法

切病法

製藥

陳氏傷寒近後集卷之二

雲間陳治三農甫述

長白石文煥右容甫閱

門人姚廷讓子遜
范崧詩民參

男 杖義先
師柴羔愚

姪 廷殿一校
遇府通

痰證

外痰憎寒壯熱惡風自汗胸滿氣上衝咽不得息頭

不疼項不強若涎多者亦隱隱頭疼脉有寸浮者

亦有寸伏者以意參之柴胡半夏湯金沸草散大

證治大還

傷寒近後集
卷之二

貞白堂

半夏湯上衝瓜蒂散吐之

此亦風痰症也如食積
痰虛損痰不用此藥

傷食

亦頭疼惡寒身熱但左手脉平和右手脉緊盛知為

食大橘皮二陳湯心腹滿脹大柴胡湯下之胸滿

嘔吐者瓜蒂散吐之

亦夾食傷寒也全傷
食者恐不可用柴胡

虛煩

諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒頭不疼身不痛為

異耳表既虛不可汗裡不實不可下叔和云虛煩

有熱不可攻

脚氣

傷寒傳足不傳手所以寒濕之氣蒸于足發則類傷

寒其症頭疼身熱肢節痛大便閉或嘔但初病時

起于脚膝屈弱不能移動為異耳感于寒所患必

冷越婢小續命湯入生薑汁最妙感于暑所患是

熱小續命去附子減桂一半脚腫木瓜散檳榔散

大便秘脾約丸

論傷寒用藥法則

標本逆從之既明五劑之藥用須識且如表汗用麻

證治大還

傷寒近後集
卷之二

貞白堂

黃無葱白不發吐痰用瓜蒂無豉不湧去實熱用

大黃無枳實不通溫經用附子無乾薑不熱熱甚

則以泥清水加葱白煎之竹瀝無薑汁不能行經

絡蜜導無皂角不能通秘結非半夏薑汁不能止

嘔吐非人參竹葉不能止虛煩非小柴胡不能和

解表裡非五苓散不能通利小便非天花粉乾葛

不能消渴解肌非人參麥門冬五味不能生脉補

元非犀角地黃不能止上焦之吐衄非桃仁承氣

不能破下焦之瘀血非黃芪桂枝不能實表開虛

汗。非茯苓白朮不能去濕助脾。非茵陳不能去黃疸。非承氣不能制定發狂。非枳桔不能除痞滿。非陷胸不能開結胸。非羌活不能治四時之感冒身疼。非人參敗毒不能治春溫。非四逆不能治陰厥。非人參白朮不能化斑。非理中烏梅不能治虻厥。非桂枝麻黃不能除冬月之惡寒熱。隨汗解。非薑附湯不能止陰寒之泄利。非大柴胡不能治實熱之妄言。陰陽咳嗽上氣喘息。用加減小青龍分表裡而可汗下。此傷寒用藥之大法也。

證治大還

傷寒近後集
卷之二

三

貞白堂
三十七

陰經用藥格法

太陰脾土。性惡寒濕。非乾薑白朮不能燥濕也。
少陰腎水。性惡寒燥。非附子不能溫潤。
厥陰肝木。藏血榮筋。非芍藥甘艸不能滋養。此經常之道。

治傷寒看症大畧

凡症有頭疼惡寒。皆是傷寒。無則皆否也。何則。蓋傷寒則惡寒。傷食則惡食。理固然也。但風從上來。陽先受之。寒從下來。陰先受之。風與寒常相因而感。

胃之時。則又不同。及其症之外見者。則一也。

一提金脈要

人之陰陽。即為先天。人之氣血。即為後天。脈者非血。非氣。乃血氣之先。即營行之道路。又問曰。既知先後天之脈理。須明持脈之要。曰。舉。曰按。曰尋。三字。若此不明。即陰陽表裡虛實。何以別之。持脈者。輕手循之曰舉。重手取之曰按。不輕不重。委曲求之曰尋。

截江網論脈

證治大還

傷寒近後集
卷之二

四

貞白堂
三十八

襍症以弦為陽。傷寒以弦為陰。襍病以緩為陽。傷寒以緩為和。兩手無脈曰雙伏。一手無脈曰單伏。必有正汗也。寸口陽脈中。或見沈細者。但無力者。為陽中伏陰。尺部陰脈中。或見沈數者。為陰中伏陽。寸口數大有力為重陽。尺部沈細無力為重陰。寸脈浮而有力。主寒邪表實。宜汗。浮而無力。主風邪表虛。宜實。尺脈沈細而有力。主陽邪在裡。為實。宜下。無力。主陰邪在裡。為虛。宜溫。寸脈弱而無力。切忌發吐。尺脈弱而無力。切忌汗下。初按來疾去遲。

名曰內虛外實去疾來遲名曰內實外虛尺寸俱
同名曰緩緩者和而生也汗下後脉靜者生躁亂
身熱者死乃邪氣勝也溫之後脉來歇至者正氣
脫而不復生也純弦之脉名曰負負者死按之解
索名曰陰陽離離者死陰病見陽脉者生陽病見
陰脉者死。

傷寒撮要論脉

左右手脉俱急緊盛是夾食傷寒右手脉來空虛左
手脉來緊盛是勞力傷寒左手脉來緊右手洪滑
或寸脉沈伏身熱惡寒隱隱頭痛喘咳煩悶胸脇
體痛是夾痰傷寒左手脉來緊澹右手脉沈數心
胸脇下小腹有痛處是血鬱內傷外感六經圖及
傷寒撮要一提金六經正治捷法。

足太陽經委中穴在腘中央約紋動脉陷中腦中央
即膝後相對腓骨中也目內眦在面前眼內邊神
庭在中間額上額角也

證治大還

傷寒近後集
卷之二

五

貞白堂
子午



證治大還

傷寒近後集
卷之二

六

貞白堂
子午

此圖王枕至陰二穴膀胱經穴也風府穴督脉穴也
膀胱與督脉會于頂顛連于風府太陽症項強故
併及之。

足太陽膀胱經圖頭為諸陽之首故多傳變受病為
先也其脉起于目內眦從頭下至項連風府行身
之背終于足也其症頭項痛項強腰脊骨節痛經
曰太陽頭痛脉浮項背強而惡寒嘔逆身疼或已
發熱或未發熱者俱宜發表不可輒下之表邪乘
虛內陷傳變不可勝數又不可利小便利之則引

熱入裡其害不淺若本病煩熱小便不利者乃利之則不禁如小便自利如常則不可利也凡有汗不得再發汗汗多不得利小便

足太陽起于目內眥上額過神庭營至玉枕過項夾脊脊由後廉而下至小趾外側至陰穴止

太陽經見症法

假如先起惡寒者本病已後發熱者標病若有一毫頭痛惡寒身熱不拘日數多少便宜發散自然熱退身涼有何變症此處寒熱標本指病之先後

證治大還

傷寒近後集
卷之二

七

貞白堂
三子

言上文本病煩熱之本字指六經標本言不可混看

辯症法

表裡自汗者為風傷衛氣宜實表表實無汗者為寒傷榮血宜發表

診脉法

診脉大凡皮膚之上輕手按之便得曰浮脉浮緊有力為傷寒脉浮緩無力為傷風

用藥法

冬月正傷寒用升陽發表湯即加減麻黃湯冬月

傷風用疎邪實表湯即加減桂枝湯春秋無汗

用羌活中和湯發表有汗用加減中和湯實表腹

痛小建中湯甚桂枝加大黃湯夏月無汗用

神水湯有汗用前加減中和湯

足陽明經圖

證治大還

傷寒近後集
卷之二

八

貞白堂
三子



此圖神庭穴督脉穴也陽明經神庭過故載之

足陽明胃經圖乃兩陽合明于前也一日府者居中

土也萬物所歸也其脉起于鼻額上頭額絡于目

循于面行身之前終于足也經曰傷寒二日陽明

脉大又曰尺寸俱長者陽明受病也

足陽明起于鼻兩傍上頭維從乳中近外傍而下前

廉梁丘穴至大趾次趾之端厲兌穴止

陽明經見症法

頭額痛目痛鼻乾不眠微惡寒足陽明胃經受病假

證治大還

傷寒近後集
卷之二

九

貞白堂

如先起目痛惡寒身熱者陽明經本病已後潮熱

自汗譫語發渴大便實者正陽明胃府標病大承

宜解肌標宜急下看消息用之

辯症法

目痛鼻乾微惡寒身熱病在經潮熱自汗譫語發渴

便實不惡寒病在腑

診脉法

按至皮膚之下肌肉之間畧重按之乃得之脉見微

洪為經病按至筋骨之間重按之乃得脉見沈數

為腑病

用藥法

微惡寒自然目腫痛鼻乾不眠者用柴葛解肌湯即

加減葛根解肌湯渴而有汗如神白虎湯即加白

潮熱譫語發渴揭去衣被揚手擲足斑黃狂亂不

惡寒反怕熱大便實者輕則大柴胡湯重則三承

氣湯選用俱在秘方六一順氣湯加減治之


足少陽經圖

證治大還

傷寒近後集
卷之二

十

貞白堂



足少陽膽經其脉起于目銳眥上頭角絡耳中循胸脇行身之側終于足也前有陽明後有太陽居二陽之中所以居半表裡經曰尺寸俱弦者是少陽受病其症頭痛目眩口苦腦漏耳聾脇痛或心煩喜嘔或胸中煩悶而不嘔或心下病鞭或寒熱往來或發熱寅申時尤盛或身微熱者皆少陽也凡頭角痛耳中痛耳中烘烘而鳴耳之上前後腫痛皆少陽所主部分其火爲之也若口苦者少陽之胆熱脇下鞭者少陽之結也

證治大還

傷寒近後集卷之二

十一

貞白堂

足少陽起于目銳眥上頭角絡耳中過乳外傍從兩脇由外廉而下至小指次指之端竅陰穴止

少陽經見症法

假如先起惡寒身熱耳聾脇痛者本病已後嘔而舌乾口苦者標病緣胆無出入病在半表半裡之間止宜小柴胡湯加減和解表裡治之再無別湯本方有加減法此經有三禁不可汗下利也若治之得法有何壞症當須識此毋致忽焉

辯症法

耳聾脇痛寒熱嘔而口苦舌乾便溺半表半裡症不從標本從手中治

診脉法

按至皮膚之下肌肉之間畧重按之乃得脉見弦數本經

用藥法

耳聾脇痛寒熱嘔而口苦舌乾者用柴胡雙解飲即加減小柴胡湯若陽明少陽合病則脉弦而長此湯加芍藥芍藥

證治大還

傷寒近後集卷之二

十一

貞白堂

足少陰經圖



此圖膈中穴任脉穴也太陰脉過此故載之

足太陰脾經圖脾爲中榮宮之坤土也其脉始于足

大指上行至腹絡于噎連舌本行身之前也若寒

邪卒中直入本經者一時便發腹痛或吐或利宜

溫之如四日而發腹滿噎乾者此傳經之邪也宜

和之若太陽病下之早因爾腹痛者此誤下之而

傳也凡治太陰症自利不渴脉沈細手足冷急溫

之若脉浮者可發汗宜桂枝湯主之若發熱脉數

者少陽之邪未解小柴胡湯主之如自利不渴者

證治太還

傷寒近後集
卷之二

主

貞白堂
言五

臟有寒也宜理中湯甚者加附子重則回陽救急

湯卽加減四逆湯腹滿噎吐食不下者宜治中湯

手足冷脉沈細者宜四逆湯若傳經邪熱內陷腹

痛者宜桂枝芍藥湯主之

足太陰從足大趾隱白穴由內廉而上環小腹上乳

內傍胆中其別從乳外近厥陰而上至喉下入迎

止

陳云凡陽經傳來之邪終是陽明腑症皆不當和亦

不可用桂枝只三承氣選用其用桂枝者中在陰

經未入陰府也

太陰經見症法

腹滿自利津不到咽手足溫者是足太陰脾經受症

假如先起腹滿咽乾者本病已後身目黃標病內

有寒熱所分不可混治臨病之際用在得宜

辯症法

腹滿咽乾發黃者屬腑熱自利不渴或嘔吐者屬臟

寒

診脉法

證治太還

傷寒近後集
卷之二

主

貞白堂
言五

重手按之肌肉之下筋骨之間方得脉沈而有力宜

當下赤見沈而無力宜當溫

用藥法

身目黃者茵陳大黃湯卽加減茵陳湯自利不

渴或嘔吐者加味理中飲重則回陽急救湯卽加

減四逆湯

足少陰經圖

足少陰經圖

證治大還

傷寒近後集
卷之二

五

貞白堂



足少陰腎經圖爲人身之根蒂也其脉始于足心上
行貫脊循喉絡舌本散舌下注心中行身之前也
若因慾事腎虛者寒直中之也其症一二日便發
故發熱脉沈足冷或惡寒倦臥宜溫經散寒若五
六日而發躁舌乾者此傳經之熱邪宜急下之恐
腎水乾也如其脉沈細足冷者又不可下急溫之
脉沈疾有力者乃可下之凡少陰飲水而小便色
白者下虛有寒引水自救非熱宜溫之蓋少陰傷
寒多因勞傷腎經之所致有緊有慢其害甚速宜

溫之不可以寒涼之藥妄投之也但脉沈足冷雖

發熱者急宜溫腎以扶元氣

足少陰起于足心湧泉穴由內廉而上在太陰經之

後行人乳內傍近胆中至喉下入迎止

少陰經見症

假如先起舌乾口燥者本病已後譫語大便實者標

病至陰經則難拘定法或可溫而或可下因分直

中者寒症傳經者熱症是其發前人之所未發也

診脈法

證治大還

傷寒近後集
卷之二

六

貞白堂

重手按至肌肉之下筋骨之間方得脉見沈實有力
宜當下脉見沈遲無力宜當溫

用藥法

口燥咽乾渴而譫語大便實或透膈腹痛或下利純

清水心下鞭痛者俱是邪熱急用六一

順氣湯分輕重下之即承氣湯有加減法無熱惡

寒厥冷劬臥不渴或腹痛嘔吐瀉利沈重或陰毒

手指甲唇青嘔逆絞痛身如被杖而如刀刮戰慄

者俱是寒邪中裡使然急用回陽救急湯溫之即

四逆湯有加減法

足厥陰經圖



證治大選

傷寒近後集
卷之二

七

貞白堂
三子

此圖一經從缺盆下乳上入裡會于頂巔

足厥陰肝經圖厥者盡也六經之尾也其脉起于足
大指上環陰器抵小腹循脇肋上口唇與督脉會
于巔頂行身之前側也若本經不足寒邪直中之
也一日便發吐利小腹痛寒甚者唇青厥冷囊縮
急宜溫之并看艾灸丹田氣海以溫之若六七日
發煩滿囊拳者此傳經熱邪厥深熱亦深也若脉
沈疾有力者宜急下之若脉微細者不可下也凡
傷寒傳至厥陰經則病勢極矣然死生在于須臾

可不謹察之也大抵熱深厥亦深則舌卷囊縮陰
寒冷極亦舌卷囊縮也當要仔細而辨其冷熱之
治其法微矣

足厥陰起足太趾大敦穴由內廉而上在太陰經之
前行入小腹過脇下從乳外傍髀入乳內傍至中
腕而止其入裡行者會于巔頂也圖內不載

厥陰見症法

假如先起消渴煩滿者本病已後舌卷囊縮者標病
亦有寒熱兩端不可概作熱治

證治大選

傷寒近後集
卷之二

大

貞白堂
三子

辨症法

煩滿囊拳消渴者屬熱口涎沫不渴厥冷者屬寒似
症不嘔清便自愈

用藥法

消渴煩滿舌卷囊縮大便實手足乍冷乍溫者急用
六一順氣湯下之即承氣湯有加減法口吐涎沫
或四肢厥冷不溫過乎肘膝不渴小腹絞痛嘔逆
者急用茱萸四逆湯即回陽救急湯有加減法

煎藥法

一發汗藥先煎麻黃 二沸後人餘藥同煎 一止
 汗藥先煎桂枝 一和解藥先煎柴胡 一下藥
 先煎滾水入枳實 一溫藥先煎乾薑 一行血
 藥先煎桃仁 一利水藥先煎猪苓 一止瀉藥
 先煎炒白朮 一消渴藥先煎天花粉 一止痛
 藥先煎白芍藥 一發黃藥先煎茵陳 一發斑
 藥先煎青黛 一發狂藥先煎石膏 一止嘔藥
 先煎半夏 一勞力感寒先煎黃芪 一濕症藥
 先煎蒼朮 一感冒傷寒先煎羌活 一暑症藥
 治法入遺 傷寒近後集 九 貞白堂
 先煎香薷 一瘧病藥先煎防風 一腹如雷鳴
 先煎煨生薑 已上俱以主病者先煎餘藥俱後
 入同煎
 初病法
 傷寒發狂奔走人難制伏先于病人處生火一盆
 用醋一碗傾于火上其烟冲入鼻內即安方可察
 其陽旺陽跡親切用藥無差若初起頭疼發熱惡
 寒方除已後登高而歌棄衣而走踰牆上屋罵詈
 叫喊大渴欲死脉來有力乃因邪熱傳裡陽盛發

征當用寒藥下之此為陽狂凡見舌卷囊縮者不
 治若病起無頭疼身微熱面赤戴陽煩躁脉來沈
 微無力欲坐臥于泥水中乃因寒熱而發躁手指
 甲面色青黑冷汗不止心腹結鞭如石躁渴欲死
 即陰症似陽當用熱藥溫之此為陰躁凡見厥冷
 不利譫語者不治須詳脉來有力無力此為良法
 傷寒腹中痛甚將凉水一盞與病人飲之其痛稍
 可若病熱當用涼藥清之清之不已而或連臍鞭
 痛大便結實煩渴屬燥屎急用寒藥下之若食痛
 治法入遺 傷寒近後集 十 貞白堂
 同治法若小腹鞭痛小水自利大便黑身目黃者
 屬蓄血亦用寒劑加行血藥下盡黑物則愈此三
 者皆痛隨利減之法也若飲水愈加作痛屬寒當
 用溫和之藥和之和不已而或四肢厥冷腹痛
 嘔吐瀉利急用熱藥救之須詳脉來有力無力此
 為良法
 傷寒直中陰經真寒症甚重而無脉或吐瀉脫元
 而無脉用好酒薑汁各半盞與病人服之其脉來
 者可治當察其脉用藥不拘脉浮沈大小但指下

出見者生。如用此法，脉不至者必死。又常問病人何處有痛症，要知痛甚者，脉必伏，宜隨病制宜。方爲吉兆。如無痛症，用此法而脉不至者，不爲吉兆。尤當問病人若平素原無正取脉，須用覆手取之，脉必見也。此屬反關脉診法，與正取法同。若平素正取有脉，後因病診之無脉，亦當覆手取之，而脉出者，陰陽錯亂也，宜和合陰陽，如覆取正取俱無脉者，必死，此爲良法。

證治大還

傷寒近後集卷之二

三

貞白堂

一傷寒舌上生胎，不拘滑白黃黑，俱用井水浸青布片于舌上洗淨，後用生薑片子時時蘸水利之，其胎自退。凡見舌生黑胎，芒刺者必死。此熱毒入深，十有九死。是腎水尅心火也。若發黃者，用生薑粗時時週身擦之，其黃退。若心胸脇下有邪氣結實，滿悶鞭痛，用生薑一斤，搗粗去汁，炒微燥，帶潤用絹包于患處，欸熨之，稍可，又將粗和勻前汁炒乾，再熨，許久豁然寬快，俱爲良法。

一傷寒鼻衄成流，久不止者，將山梔炒黑爲末，吹入鼻中，外將水紙搭于鼻中，其血自止。若點滴其血

不成流者，其邪在經未解，照後秘方用藥，不在此法。

傷寒熱邪在裡，服轉藥後，鹽炒麩皮一升，將絹包于病人腹上，欸欸熨之，使藥氣得熱則行，大便秘通矣。

一傷寒吐血不止，用韭汁磨京墨呷下，其血見黑必止。如無韭汁，用鷄子清亦可。正謂赤屬火而黑屬水也。

證治大還

傷寒近後集卷之二

三

貞白堂

一傷寒直中陰經，真寒症或陰毒症，身如被杖，腹中絞痛，嘔逆沈重，不知人事，四體堅冷如石，冰指甲唇青，藥不得入口。六脉沈細或無脉，欲絕者，將葱縛一握切去根葉，取白三寸許，如篋先用射香半分填于臍中，後放葱餅于臍上，以火熨之，連換二三餅，稍醒，灌入生薑汁煎服，回陽救急湯。如不醒，再灸關元氣海二三十壯，使熱氣通其內，逼邪出于外，以復陽氣。如用此法，手足溫，汗出，即醒者爲有生也。如用此法，手足不溫，汗不出，不省人事，必死。

傷寒熱病熱邪傳裡。凡極無解。用黃連煎水一盞。放井中頓冷。浸青布搭于胸中。徐徐換之。待熱勢稍退即除。不可久漬。夏月用此法。冬月不宜用。

一傷寒服藥轉吐。出不納者。隨用竹管重捺內關後。將生薑自然汁半盞熱飲。其吐即止。大凡服寒藥熱飲。熱藥寒飲。中和之劑溫和服之。如要取汗。雖辛甘之劑亦宜熱服。如要止汗。雖辛甘溫之劑亦宜溫服。此為良法。

內關中掌後腕二寸厥陰心包相火之經

證治大還

傷寒近後集

卷之二 頁白堂

一中風癱厥昏迷卒倒。不省人事。欲絕者。先用皂莢末。擦紙燒烟。冲入鼻。有嚏可治。隨用吐痰法。用皂莢末五分。半夏白礬各三分。為細末。薑汁調服。探吐後服導痰湯。加減治之。無嚏不可治。此為良法。

一治乾霍亂者。不得吐。用滾湯一碗。入皂莢末三分。鹽一撮。調服探吐。切莫與米湯與之。即死。是穀氣反助邪氣也。

一中寒卒倒昏迷不醒者。先用熱酒薑汁各半盞灌入。稍醒後服加味理中飲為效。如不飲酒人。止用

薑汁灌之。依此調治。冬月有之。餘月不多見。

製藥法

一用附子。去皮臍。先用鹽水薑汁各半盞。用砂鍋煮七沸。後入黃連甘艸各五錢。再加童便半盞。再煮七沸。住火良久。撈起入磁器盛貯。伏地氣一晝夜。取出曬乾。以備後用。庶無毒害。項圓臍正。一兩一枚者佳。

證治大還

傷寒近後集

卷之二 頁白堂

一用川大黃。須錦紋者佳。剉成飲片。用酒拌勻。燥乾後用。不傷陰血。如年壯實熱者。生用不須製。

一用麻黃。去節。先滾醋湯畧浸片時。撈起以備後用。庶免大發。如冬月嚴寒。腠理至密。當生用不須製。

一用吳茱萸。將鹽水拌均炒燥。庶無小患。

一用附子。後身目紅者。乃附子之過。用蘿蔔搗汁濾。

二大盞。入黃連甘艸各半兩。犀角三錢。煎至八分。

服之以解附子毒。其紅即除。如解遲。必血從耳口鼻出者。必死。無蘿蔔。用蘿蔔子搗水取汁亦可。如

無蘿蔔子。用澄清泥漿水亦可也。

一用大黃。後瀉利不止者。用烏梅二枚。炒粳米一撮。

乾薑三錢。人參炒白朮各半兩。生附子皮一錢半。
升艸一錢。升麻少許。燈心一握。水二大鍾。煎之。去
滓。後入炒陳壁土一匙。調服。即愈。取土氣以助胃
氣也。

一。用麻黃後。汗出不止者。將病人髮。披水盆中。足露
出外。用炒糯米半升。龍骨牡蠣。藥本防風。各一兩。
爲細末。周身撲之。隨後秘方用藥。免致亡陽而死。
此爲良法。

陳氏傷寒近後集卷之三

雲間陳治三農甫述

三韓張載齡弘度甫閱

門人 姚廷讓子遜
王 顧贊皇
王 顧贊皇
師 柴羔愚
延陵季校
遇時邁

羌活冲和湯 治太陽傷風有汗脉浮緩羌活

白芷 黃芩 甘艸 各一錢半 防風 白朮 生地 各一錢半

錢川芎 五分 右如前煎法若一服汗仍未止加黃

芪一錢仍未止以小柴加桂枝芍藥各一錢

謹治太還

傷寒近後集卷之三

貞白堂

葛根湯 治太陽陽明項背強急無汗惡風脉帶弦

浮而發熱。又治太陽陽明合病必自利此湯

金主之 葛根 一錢 甘艸 麻黃 各二錢 湯泡二次

水二鍾薑四片棗二枚煎畧微覆取汗

獨活散 治傷寒溫熱等症羌活 獨活 防風

枳壳 黃芩 麻黃 各二錢 人參 細辛 茯苓

炙甘草 蔓荊子 甘菊花 石膏 水二鍾薑

三片薄荷五葉煎

敗毒散 治傷寒溫疫風濕頭目昏眩四肢疼痛憎

寒壯熱頭強目睛疼尋常風眩拘急羌活 獨

活 前胡 柴胡 川芎 枳壳 桔梗 茯苓

人參 甘艸 各等分 水二鍾如常煎服

六神通解散 麻黃 黃芩 滑石 各二兩 石燕 二兩

甘艸 一兩 蒼朮 四兩 治時行三日煎加葱白香豉

煎服而汗之立效即止不可盡劑

升麻湯 治傷寒中風頭疼憎寒壯熱肢體疼痛發

熱惡寒鼻中乾不得臥兼治寒暄不時人多痰疫

及暴熱之頃忽然變寒身體疼痛頭重如石升

謹治太還

傷寒近後集卷之三

貞白堂

麻 甘艸 芍藥 葛根 各等分 每服七八錢煎

如常法若老人去芍藥加柴胡茯苓人參各一錢

五積散 治陰經傷冷脾胃不和感冒寒邪蒼朮

枳壳 桔梗 陳皮 白芷 茯苓 各四兩 厚朴 半夏

枳壳 當歸 麻黃 乾薑 各三兩 右十六味除

枳壳肉桂陳皮其餘共一處生搗為粗末用酒拌

勻曬乾分作六分大鍋內文武火炒令黃色不得

焦榔令入殼挂陳皮和勻每服五錢水二鍾薑三

片煎一鍾服

婦人血風症因崩漏大脫血或前後血因而洞燄其熱未除等衣摸床撮空閉目不省人事楊手擲足搖動不安錯語失神脉弦浮而虛內有燥熱之極氣粗鼻乾而不潤上下通燥此為難治宜服生地黃黃連湯

治男子去血多亦有此症其妙不可容言

生地黃黃連湯 川芎 生地 當歸各七 赤芍藥

施子 黃芩 黃連各三 防風 每服五錢水煎

證治大還

傷寒近後集

三

真白堂

清飲徐徐呷之如脉實可加大黃下之大承氣湯氣藥也自外而之內者用之生地黃黃連湯血藥也自內而之外者用之氣血合病循衣撮空滑同自氣而之血血而復之氣者大承氣湯下之自血而之氣氣而復之血者生地黃黃連湯主之二者俱不大便此是承氣湯對子又與三黃石膏湯表裡皆是三焦胞絡相火之用也病既危急只得以此湯降血中火耳不拘婦人男子去血過多而有此症者皆宜服之無不効者

秘用三十七方就註三十七槌法

升麻發表湯即麻黃湯附加減法 治冬月正傷寒

頭疼發熱惡寒脊強脉浮緊無汗為表症此足太

陽勝於受邪當發汗以頭如斧劈身如火熾者宜

此湯有汗者勿用 麻黃 桂枝 甘草 杏仁

升麻 川芎 防風 白芷 羌活 本經發熱

惡寒頭痛無汗而喘者本方加乾葛去升麻 本

經發熱惡寒身體痛者本方加蒼朮芍藥去杏仁

本經惡寒發熱身疼而赤者以其不得小使便出

證治大還

傷寒近後集

四

真白堂

故也本方去白芷升麻杏仁加柴胡芍藥 本經

頭痛發熱惡寒胸中飽悶者本方加枳殼桔梗

本經感寒深重服湯不作汗者再宜服至二三劑

而汗不出者死 本經汗後不解者宜再服釐症

輕重用麻黃升麻分多寡為當 水二鍾煮三片

葱白二莖槌法加江西豆豉一撮煎之熱服取汗

有神宜厚被覆育凡中病即止不得多服多則反

加別病

疎邪實表湯即桂枝湯附加減法 治冬月正傷風

頭痛發熱惡寒脊強脉浮緩自汗爲表症此足太陽勝肌經受邪當實表散邪無汗者不可服

桂枝 芍藥 甘草 防風 川芎 羌活 白

朮 如汗不止者加黃芪 喘加杏仁柴胡 胸

中飽悶加枳壳桔梗 水二鍾薑三片棗二枚梔

法加膠飴二匙溫服

葱活神和湯以代桂枝麻黃青龍各半等湯此太陽

經之神藥也 治春夏秋非時感冒暴寒頭疼發

熱惡寒脊強無汗脉浮緊此足太陽勝肌經受邪

證治大還

傷寒近後集 卷之三

五

貞白堂

是表症宜發散不與冬時正傷寒同治此湯非獨

治三時暴寒春可治溫夏可治熱秋可治濕治雜

症亦有神也冬寒亦可用惟黃芩須輕投耳

羌活 蒼朮 防風 黃芩 川芎 白芷

甘草 生地黃 細辛 水二鍾煎八

分熱服溫被蓋覆取微汗溫土司天加蒼朮一錢

五分天久淫雨亦加 如渴加石膏三錢知母一

錢不渴不加冬月禁之 如胸中飽悶加桔梗枳

壳去生地 夏月加石膏知母各神朮湯如服此

湯後不作汗本方加蘇葉 喘而惡寒身熱本方

加杏仁生地 汗後不解宜服要汗下兼行加大

黃乃釜底抽薪法 其春夏秋感冒非時傷寒亦

有頭疼惡寒身熱脉浮緩自汗宜實表本方去蒼

朮加白朮汗不止加黃芪即加減冲和湯再不止

以小柴胡加桂枝芍藥一錢有神 梔法薑三片

棗二枚煎至一鍾加蔥白梔汁五匙再煎一二沸

如發汗熱服止汗溫服

柴葛解肌湯即葛根湯附加減法 治足陽明胃經

證治大還

傷寒近後集 卷之三

六

貞白堂

受邪目痛鼻乾不眠微頭疼眼眶痛脉來微洪宜

解肌屬陽明經病其正陽明腑病別有治法

柴胡 葛根 甘草 黃芩 芍藥 羌活 白

芷 桔梗 本經無汗惡寒甚者去黃芩加麻黃

冬月宜加春宜少夏秋去之加蘇葉 本經有汗

而渴者治法在如神白虎湯下即白虎湯 水二

鍾薑三片棗二枚梔法加石膏末一撮煎之熱服

柴胡雙解散即小柴胡湯附加減法 足少陽胆經

受症耳聾脇痛寒熱嘔而口苦脉來弦數屬半表

半裡宜和解此經無出入有三禁不可汗下利也
止有小柴胡一湯隨病加減再無別湯

柴胡 黃芩 半夏 甘州 人參 陳皮 芍

藥 若只小柴胡湯無芍藥 本經症小便不利

加茯苓 脇痛加青皮 本經嘔者入薑汁竹茹

痰多加瓜蒌貝母 寒熱似瘧加桂 渴加天花

粉知母 齒燥無津液加石膏 嗽者加五味金

沸草 壞症加鱉甲 本經症心下飽悶未經下

者非結胸乃表邪傳至胸中未入乎腑症雖滿悶

證法大還

傷寒近後集
卷之三

七

貞白堂

尚為在表只消小柴胡加枳梗末效就以本方對

小陷胸加枳桔一服虛煩類傷寒症本方加竹葉

炒粳米 本經與陰陽合病本方加葛根芍藥

婦人熱入血室加當歸紅花 男子熱入血室加

生地黃 老婦人傷寒無表症其熱勝者本方加

大黃甚者加芒硝 水二鍾薑一片棗二枚法加

生艾汁三匙煎之溫服

小柴胡湯症註釋

治太陽病十日已去脈細而嗜臥外雖已解設胸滿

痛與服之若脈浮者麻黃湯 五六日來往寒

熱胸脇若痛默默不飲食心煩喜嘔或煩而不嘔

或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心悸小便不利或

不渴身有微熱者此湯主之血氣弱腠理開邪氣

因與正氣相搏結于胸下邪正分爭往來寒熱休

作有時默默不飲食臟腑相連其痛必下邪高痛

下致使嘔也此湯主之服柴胡湯已渴者屬陽明

以法治之傷寒五六日身熱惡風頭項強脇下滿

手足溫而渴者此湯主之傷寒陽脈微陰脈弦腹

證治大還

傷寒近後集
卷之三

八

貞白堂

中急痛先與小建中湯不差者此湯主之太陽病

過經十餘日發汗吐下後四五日柴胡湯症仍在

者先與小柴胡湯嘔不止心下鬱微煩者為未解

也與大柴胡湯下之則愈婦人中風七八日續得

寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血

必結致如癰狀此湯主之傷寒五六日頭汗出微

惡寒手足冷心下滿不欲食大便秘脈細者為陽

微結必有表復有裡脈沈亦裡也汗出為陽微假

令純陰結不得復有外証悉入在裡此為半在表

證治大還

傷寒通後集
卷之三

九

貞白堂

半在裡也。脈雖沈緊，不得為少陰病，所以然者，陰不得有汗也。今頭汗出，故知非少陰，可與此湯。設不了了得尿而解，傷寒五六日，嘔而發熱者，柴胡湯主之。而以他藥下之，柴胡症在者，復與小柴胡湯。心下痞為逆，必蒸蒸而振，却發熱汗出而解者，心下滿而腹痛者，此為結胸也。大陷胸湯主之。但滿而不痛者，此為痞氣，柴胡不中與之。宜半夏瀉心湯。已上屬太陰經。末後五六日，嘔而發熱，至太陰經一段，俱太陰症，節庵併及者，見太陰症，柴胡亦有常與不當與者。陽明病發潮熱，大便溼，小便自可，胸脇不利者，與此湯。陽明病，腸下乾澀，不大便而嘔，舌上白胎，皆可與之。上焦得通，津液得下，胃氣因和，漑然汗出而解。陽明中風，脈弦浮大，而短氣，腹部滿，腸下及心痛，久按之氣不通，鼻乾不得臥，一身及目悉黃，小便難，有潮熱，時時噦，身前後腫，刺之少差，外不解，病過十日，脈續浮者，此湯主之。已上屬陽明經。太陽病不解，轉入少陽，腸下滿，乾嘔，不能飲食，往來寒熱，尚未吐下，脈沈

證治大還

傷寒通後集
卷之三

十

貞白堂

緊者，此湯主之。若已吐下後發汗，溫鍼譫語，小柴胡證罷，此為壞症，知犯何逆，以法治之。已上屬少陽經。嘔而發熱，宜服此湯。傷寒已後更發熱，此湯主之。若脈浮者，以汗解之。屬陽易，瘥後勞復症，彭用光加減法。如胸中煩而不嘔，去半夏人參加瓜蒌仁，煩者熱也。嘔者逆氣也。今煩而不嘔，則熱聚而氣不逆，邪氣欲漸成實也。參甘恐補，去之無助。煮夏味辛散，去之以無逆氣也。瓜蒌仁苦寒，用之以通鬱熱于胸中。若渴者，去半夏，惡燥，津液加入人參之甘潤，瓜蒌仁之苦潤，相合則津液生而渴已也。若腹中痛，去黃芩，加芍藥，寒邪入裡，裡氣不足，寒邪壅則腹中痛。芍藥性堅，而寒中去之，則中氣易和。芍藥味酸，而和申，加之則裡氣得通，而腹痛自愈。如腸下痞鞭，去大棗之甘溫，恐令滿，加牡蠣之酸鹹，則痞消而鞭軟矣。若心下悸，小便不利者，去黃芩之苦寒，恐蓄水浸行，加茯苓之甘淡，能滲利，則津液通矣。若不渴，外有微熱，去人參微熱，恐有表邪，加桂枝取汗，發散表邪。

證治大還

傷寒近後集
卷之三

士

頁白堂

也。若欲首去人參大棗生薑加五味于乾薑肺氣逆則咳參薑甘溫中則肺氣愈逆故去之用五味子之酸收斂肺氣乾薑之辛熱以散內之寒氣則咳自止若加葛根芍藥治少陽陽明合病頭略痛發熱耳聾脇痛或往來寒熱如瘧和解散治之和解散即小柴胡湯加減如嘔逆加薑九片陳皮一錢如頭痛惡寒加羌活防風各一錢寒熱間作加桂枝一錢夏月中暑發熱頭痛加黃連一錢春天溫病時行加生地黃川升麻一錢瘧疾或先

寒後熱加川常山尖檳榔半錢各要未發時煎服

傷寒惡寒頭項強發熱前方中

和湯內去細辛蒼朮加白朮二錢

桂枝大黃湯即桂枝湯加大黃附加減法治足太陰脾經受邪腹滿而痛咽乾而渴手足溫脈來沈

而有久此因邪熱從陽經傳入陰經桂枝芍藥

甘草大黃和氣柴胡本經腹滿不惡寒而喘者加大腹皮去甘草水二鍾薑一片

棗二枚槌法臨服入檳榔麝水三匙熱服

證治大還

傷寒近後集
卷之三

士

頁白堂

三張云看此症不如三承氣湯選用或一日初傳太陰乃可觀仲景書或者邪中陰經而留于腹者也不然必外症未全除可也不然此方亦當用在壞症例非本經藥也直說陽症傳來者悞也

加味理中飲即理中湯附加減法治太陰脾經受

症自利不渴手足溫身無熱脈來沈而無力此臟

寒乾薑白朮人參甘草肉桂陳皮

茯苓厥陰消渴氣上冲心飢不欲食食即吐嘔

腹痛大便實者本方加大黃蜜少許利之本經

腹滿滿時減者本方去甘草本經嘔者入半夏

薑汁本經勸臥沈重利不止少加附子利後

身體痛者急溫之加附子自利腹痛者入木香

磨薑汁調服和之水二鍾薑一片棗二枚槌法

臨服入炒陳壁土一匙調服取土氣以助胃氣

茵陳將軍湯即茵陳湯附加減法治足太陰脾經

腹滿身目發黃小便不利大便實發渴或頭汗刺

頭而還脈來沈重者宜用大黃茵陳山梔

甘草厚朴黃芩枳實大便秘者去大

黃厚朴加大腹皮利小便清為效 水二鍾薑一
一片槌法加燈艸一握熬服

導赤飲即五苓散附加減法 治小水不利小腹滿

或下焦蓄熱或引飲過多或小水短赤而渴脉沈

數者以利小便為先惟汗後亡津液與陽明汗多

者則以利小便為戒 茯苓 猪苓 澤瀉 桂

枝 白朮 甘艸 滑石 山梔 中濕身目黃

者加茵陳 水結胸症加木通燈心如小水不利

而見頭汗出者乃陽脫也此死症 自得病起無

證治太還

傷寒近後集
卷之三

三

貞白堂

熱但狂言煩躁不安精采不與人相當此湯治之

此曰熱結膀胱太陽經之裡症也一名太陽本

病 水二鍾薑一片燈心二十莖槌法入鹽二字

六一順氣湯 以代大承氣小承氣調胃承氣大柴

樞三乙承氣湯大陷胸等湯之神藥也舉世無人

知此計妙耳秘之莫與俗人言附加減法 治傷

寒熱傳裡大便結實口燥咽乾怕熱譫語揭衣狂

妄揚手擲足斑黃陽厥潮熱自汗胸腹滿硬逆臍

疼痛等症悉皆治之 大黃 枳實 厚朴 甘

艸 黃芩 柴胡 芒硝 芍藥 潮熱自汗瀝

語發渴揚手擲足揭去衣被狂妄斑黃大便實者

俱屬正陽明胃腑病依本方 下利純清心下鞭

痛而渴者屬少陰依本方 怕熱發渴譫妄手足

乍冷乍溫大便實者陽厥症屬厥陰依本方舌卷

囊縮者難治須急下之熱病目不明謂腎水已竭

不能照物病已篤矣惟宜急下依本方目中不了

了即目不明也 轉屎氣者謂下泄也有燥屎焉

當下依本方如更衣者止後服不必盡劑不更衣

證治大還

傷寒近後集
卷之三

古

貞白堂

宜再少與大便通者愈若結胸者心下鞭痛手不

可近燥渴譫語大便實者依本方去甘艸加甘遂

桔梗凡傷寒過經及老弱併血氣兩虛之人或婦

人產後有下症或有下後不解或有表症未除而

裡症又急急不得不下者用此湯去芒硝下之即吉

蓋恐轉藥硝性燥急故有此戒 大凡傷寒邪熱

傳裡結實須看熱氣淺深用藥今之庸俗不分當

急下可少與宜微和胃氣之論一概用大黃芒硝

亂投湯劑下之因茲枉死者矣余謂傷寒之邪傳

來非一治之則殊耳。病有三焦俱傷者。則痞滿燥實堅全。俱宜大承氣湯。厚朴苦溫以去痞。枳實苦寒以泄滿。芒硝鹹寒以潤燥。軟堅。大黃苦寒以泄實。去熱。病斯愈矣。邪在中焦。則有燥實堅三症。故用調胃承氣湯。以甘艸和中。芒硝潤燥。大黃泄實。不用枳朴。恐傷上焦。虛無氣血之元氣。調胃之名。自此立矣。上焦受傷。則痞而實。用小承氣湯。枳朴之能除痞。大黃之泄實。去芒硝不傷下焦血分之真陰。調不伐其根本也。若夫大柴胡湯。則有表症。

證治大還

傷寒近後集卷之三

主

貞白堂

尚未除。而裡症又急。不得不下者。只得以此湯通表裡而緩治之。猶有老弱及血氣兩虛之人。亦宜用此。故經云。轉藥就緊。有芒硝者緊也。大承氣最緊。小承氣次之。調胃承氣又次之。大柴胡又次之。其大柴胡加大黃。小柴胡加芒硝。方為轉藥。蓋為病輕者設也。仲景又云。蕩滌傷寒熱積。皆用湯液。切禁丸藥。不可不知也。

石先將水二鍾。滾三沸。後入藥。煎至八分。槐法。臨服時。入鐵銹水三匙。調服。立効。取鐵性沈重之義。

最能墜熱開結有神。此千金不傳之秘。

如神。白虎湯。即白虎湯。附加減法。治身熱渴而有汗不解。或經汗過。渴不解。脈來微洪。石羔。知母。人參。甘艸。山梔。麥冬。五味。心煩。

者。加竹茹一團。如大渴。心煩。背惡寒者。依本方去山梔。加天花粉。無渴不可服。此藥為大忌。水二鍾。薑一片。棗一枚。槐法。加淡竹葉十片。

三黃石膏湯。此湯治傷寒後。五心煩熱。舌燥。表裡皆實。佛鬱陽毒發斑。黃身如塗朱。眼珠如火。狂叫。

證治大還

傷寒近後集卷之三

主

貞白堂

欲走。十指皮脫。六脈洪大。滑數。燥渴欲死。鼻乾而赤。齒黃。過經不解。已成壞症。表裡皆熱。欲發其汗。病熱不退。又復下之。大便遂頻。小便不利。亦有錯治溫症。而成此症者。又八九日。已經汗下後。脈洪數。身壯熱。拘急沈重。欲治其內。由表未解。欲發其表。則裡症又急。趙昶不能措手。待斃而已。殊不知熱在三焦。閉塞經絡。津液榮衛不通。遂成此症。又治汗下後。三焦生熱。脈洪數。譫語不休。晝夜喘息。鼻時加衄。身目俱黃。狂叫欲走者。通用此湯治之。

有神 石膏 一兩 黃芩 黃連 黃柏 各七錢 山梔

麻黃 香豉 二合 每服一兩水二鍾薑三片棗二枚槌法入細茶一撮煎之熱服 未中病再服

三黃巨勝湯 此湯治陽毒發斑狂亂妄言大渴叫

喊目赤脉數大便燥實不通上氣喘急舌卷囊縮

難治者權以此湯切之三黃石羔湯內去麻黃香

豉加大黃芒硝是也 水二鍾薑一片棗二枚槌

法臨服入泥漿清水二匙調服即安

神和靈寶飲 治兩感傷寒起于頭痛惡寒發熱口

證治大還 傷寒近後集 卷之三 七 貞白堂

燥舌乾以陽先受病多者先以此湯探之中病即

愈 羌活 防風 川芎 生地 細辛 黃芩

柴胡 甘艸 乾葛 白芷 石膏 水二鍾煨

生薑三片棗二枚槌法入黑豆一撮煎之溫服取

微汗為愈如不愈表症多而甚急者方可用麻黃

葛根為解表如裡多而甚急者先以調胃承氣為

攻裡是也 如以陰經自中病發熱下利身疼痛

脉沈細無力不渴倦臥昏重者又當先救裡溫之

回陽救急湯是分表裡寒熱而治此其權變之法

古云兩感雖為死症復有可救之理乃用藥先後
寒熱之劑及發表攻裡之序不用故枉死者多矣
此方良可

桃仁承氣對子即桃仁承氣湯附加減法 治熱邪

傳裡熱蓄膀胱其人如狂小水自利大便黑小腹

滿痛身目黃識語燥渴為蓄血症脉沈有力宜此

湯下盡黑物即愈未服前而血自下者為欲愈不

宜服 桃仁 桂枝 芒硝 大黃 芍藥 柴

胡 青皮 當歸 甘艸 枳實 水二鍾薑三

證治大還 傷寒近後集 卷之三 六 貞白堂

片槌法臨服入蘇木煎汁三匙服

消毒清血飲 治熱邪傳裡裡實表虛血熱不散熱

氣乘于皮膚而為斑也輕則如疹子重則如錦紋

重甚則斑爛皮膚或本屬陽候投熱藥或當下不

下或下後未解皆能致此不可發汗重令開泄更

加斑爛也然而斑之方萌與蚊迹相類發斑多見

于胸腹蚊迹只在手足陽脉洪大病人昏憤先

紅後赤者斑也脉不洪大病人自靜先紅後黃者

蚊也其或大便自利短氣拂鬱氣短燥屎不通又

如葉實腐者。盧醫復生。不能施其巧矣。凡汗下不

解。足令耳聾。煩悶。咳便是發斑之候。黃連 甘

艸 石羔 知母 柴胡 玄參 生地 山梔

犀角 青代 人參 水二鍾薑一片棗二枚槌

法臨服入苦酒一匙大便實者去人參加大黃

生地黃連湯 治鼻衄成流久不止者。或熱毒入深

吐血不止。黃芩 山梔 桔梗 甘艸 生地

黃連 柴胡 川芎 芍藥 犀角如無升麻代之

水二鍾棗二枚煎八分槌法臨服入茅根搗汁磨

證治大還 傷寒近後集 卷之三 九 貞白堂

京墨調服。如無茅根以藕搗汁亦可。外用切法

水紙搭于鼻中。

加味犀角地黃湯 治煩躁漱水下咽者。嚮上焦

有瘀血。犀角 生地 芍藥 甘艸 桔梗

牡丹皮 陳皮 紅花 當歸 水二鍾薑三片

槌法臨服入生藕節搗汁三匙溫服。

回陽救急湯即四逆湯附加減法 治寒邪直中陰

經。真寒症。初病起無身熱無頭疼。止則惡寒。四肢

厥冷。戰慄腹疼。吐瀉不渴。引衣自蓋。跡臥冰重。或

手指甲唇青。或口吐涎沫。或至無脈。或脈來沈遲

無力。熟附子 乾薑 人參 甘艸 白朮

肉桂 陳皮 五味 茯苓 半夏 嘔吐涎沫

或小腹痛。加鹽炒吳茱萸。無脈者加猪胆汁一

匙。嘔吐不止。加薑汁。泄瀉不止。加升麻黃芪

水二鍾薑三片煎之。臨服加射香三釐調服。中病

以手足溫和。即止。不得多服。多則反加別病矣。如

未止。可用前理中飲。加減治之。無妨

回陽反本湯 治陰盛格陽。陰極發躁。微渴面赤。欲

證治大還 傷寒近後集 卷之三 十 貞白堂

坐臥于泥水井中。脈來無力。或脈全無欲絕者

附子 乾姜 甘艸 人參 麥門冬 五味

臘茶 陳皮 面戴陽者下虛也。加葱七莖。黃連

少許。用澄清泥漿水二鍾煎之。臨服入蜜五匙。頓

令服之。取汗為效。

柴胡百合湯 治瘧後昏沈發熱。渴而錯語失神。及

百合勞復等症。柴胡 人參 黃芩 甘艸

知母 百合 生地 陳皮 渴加天花粉 胸

中煩熱加山梔 頭微疼加羌活川芎 嘔吐加

姜汁炒半夏 胸中飽悶加枳壳桔梗 食復者

加枳實黃連甚重大便實者加大黃 胸中虛煩

加竹茹竹葉 瘥後乾嘔錯語失神呻吟睡不安

者加黃連犀角 咳嗽加杏仁百合甚加麻黃

心中驚惕爲血少加當歸茯神遠志 虛汗加黃

芪 脾倦加白朮 腹中雷鳴加煨生薑 勞復

時熱不除加葶藶烏梅生艾汁 水二鍾棗一枚

姜三片槌法加醋炙蠶甲煎之溫服

如聖散 治剛柔二症頭搖口噤身反張手足攣搐

證治大還

傷寒近後集

卷之三 貞白堂

頭面赤項強急與痰癰同此法 羌活 防風

川芎 白芷 柴胡 芍藥 甘艸 當歸 烏

藥 半夏 黃芩 有汗是柔瘥加白朮桂枝

無汗是剛瘥加麻黃蒼朮 口噤咬牙者如大便

實者入大黃利之 水二鍾姜三片煎之臨服入

姜汁竹瀝溫服

溫經益元湯 治因汗後太虛頭眩振振然欲擗地

并肉瞤筋惕及因發汗太多衛虛亡陽汗不止或

下後利不止身疼痛者併皆治之 熟地 人參

白朮 黃芪 甘艸 芍藥 當歸 生地 茯

苓 陳皮 肉桂 大附子 如飽悶加枳壳去

地黃 如瘦人去芍藥有熱去附子 利不止加

炒白朮升麻陳壁土去當歸地黃 嘔者加姜汁

製半夏 渴者加天花粉 汗後惡風寒屬表虛

去附子肉桂生地加桂枝膠飴 水二鍾姜三片

棗一枚加糯米一撮槌法煎之溫服

逍遙湯 治有汗傷寒瘥後血氣未平勞動助熱復

還于經絡有因與婦人交接淫慾而後發不易有

證治大還

傷寒近後集

卷之三 貞白堂

病者謂之勞復內交接淫慾而無病人反得病者

謂之陰陽易余曾見舌出數寸而死者多矣此症

最難治必宜此湯 人參 知母 竹青 卵縮

腹痛倍加黃連 甘艸 滑石 生地 韭根

柴胡 犀角 水二鍾姜三片棗二枚煎之臨服

入燒裊襦末一錢半調服有粘汗出爲効不粘汗

出再服以小水利陰頭腫則愈

升陽散火湯 治有患人叉手冒胸尋衣摸床譫語

昏沈不醒人事不可呼爲風症而用風藥悞死者

多矣。蓋汗熱乘于肺金。元氣虛不能自主持。名曰
振空症。小便利者可治。小便不利者不可治。

人參 當歸 柴胡 芍藥 黃芩 甘艸 白

朮 麥冬 陳皮 茯苓 有痰加姜製半夏

大便燥實。譫語發渴加大黃。泄漏者加升麻炒

白朮 水二鍾姜三片棗一枚槌法入金首飾煎
之熱服

再造散 治有患頭疼發熱項脊強惡寒無汗用發

汗藥二三劑汗不出者苟不識此不論時令遂以

證治大還

傷寒近後集
卷之三

重

貞白堂
三〇〇

麻黃重藥及火劫取汗者。候人死者多矣。殊不知

陽虛不作汗。故有此症。名曰無陽症。黃芪 人

參 桂枝 甘艸 細辛 熟附子 羌活 防

風 川芎 煨生姜 夏月加黃芩石膏 冬月

不加 水二鍾棗二枚煎至一鍾槌法加炒芍藥

一撮煎三沸溫服

黃龍湯 治有患心下鞭痛下利純清水譫語發渴

身熱殊不識此症。但見下利便呼為漏底傷寒。而

使用熱藥止之。就如抱薪救火。候人死者多矣。殊

不知此因熱邪傳裡。胃中燥屎結實。此利非內寒

而利。乃逐日自飲湯藥而利也。宜急下之。名曰結

熱利症。身有熱者宜用此湯。身無熱者用前一

順氣湯 大黃 芒硝 枳實 厚朴 甘艸

人參 當歸 年老氣血虛去芒硝 水二鍾姜

三片棗二枚煎之後再加桔梗煎一二沸熱服

調榮養氣湯即加減補中益氣湯 治有患頭疼身

熱惡寒微渴。漉然汗出身痛脚腿酸疼。沈倦脉空

浮而無力。不可因見頭疼惡寒發熱便呼為正傷

證治大還

傷寒近後集
卷之三

重

貞白堂
三〇〇

寒而大發其汗。所以輕變重而害人者多矣。此勞

力內傷氣血外感寒邪。宜少辛甘溫之劑則愈。名

曰勞力感寒症。故經云。勞者溫之。損者溫之。溫能

除大熱。正此謂也。有下症者。太柴胡湯下之。則緩

人參 黃芪 當歸 生地 川芎 柴胡 陳

皮 甘艸 細辛 羌活 防風 白朮 元氣

不足者。加升麻少許。須知元氣不足者至陰之下

求其升。口渴加天花粉知母 喘嗽加杏仁去

升麻 汗不止加芍藥。去升麻細辛 胸中煩熱

加山梔竹茹 乾嘔加薑汁炒半夏 胸中飽悶

加桔梗枳殼去生地甘艸黃芪白朮少許痰盛者

加瓜蒌仁貝母去防風細辛 腹痛去芪朮加芍

藥乾姜和之 有因血鬱內傷腹有痛處或大便

黑加桃仁紅花去芍辛羌防黃芪白朮甚者加大

黃下盡瘀血則愈後去大黃調理 水二鍾姜三

片棗二枚槌法入葱白二莖煎之溫服

導赤各半湯 治患傷寒後心下不鞭腹中不滿大

小便如常身無寒熱漸變神昏不語或睡中囁語

證治大還

傷寒近後集

卷之三

貞白堂

一二句目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則噦不

與即不思形如醉人俗不識此而候人者多矣殊

不知熱傳手少陰心也心火上而迫肺所以神昏

名越經症 黃連 山梔 黃芩 滑石 甘艸

知母 犀角 茯神 麥冬 人參 水二鍾姜

棗煎之加燈心一握煎沸熱服

益元湯 治有患身熱頭疼全無不煩便作躁悶面

赤飲水不得入口不識者呼為熱症而用涼藥遂

至候人殊不知元氣虛弱是無根虛火泛上名曰

戴陽症 熟附子 甘艸 乾姜 人參 五味

麥冬 黃連 知母 葱 艾 水二鍾姜一片

棗二枚槌法臨服入童便三匙頓冷服

桂苓飲 治有患初得病無熱狂言煩躁不安精采

不與人相當切勿呼為狂發候用下藥死者多矣

此因熱結膀胱名如狂症 猪苓 澤瀉 桂枝

甘艸 白朮 知母 黃柏 山梔 蘇葉

水二鍾姜三片煎一鍾槌法再加滑石末一錢煎

二三沸溫服取微汗為効

證治大還

傷寒近後集

卷之三

貞白堂

當歸活血湯 有患無頭疼無惡寒止則身熱渴小

水利大便黑口出無倫語設如不識呼為熱症而

用涼劑則候矣殊不知內傳心脾二經使人昏迷

沈重故名挾血如見崇 當歸 赤芍 甘艸

紅花 桂心 乾薑 枳殼 生地 人參 柴

胡 桃仁 服三帖後去桃仁紅花乾姜桂心加

白朮茯苓 水二鍾姜一片煎之槌法入酒三匙

調服

加味導痰湯 有患憎寒壯熱頭疼昏沈迷悶上氣

喘急口出涎沫。庸醫皆作傷寒治之多悞。殊不知

此因內傷七情。以致痰迷心竅。神不守舍。神出舍

空。空則痰生也。名曰挾痰。如見祟。痰症類傷寒。與

此同治。茯苓 半夏 南星 枳實 黃芩

瓜蒌仁 白朮 陳皮 甘艸 桔梗 人參

黃連 年力壯盛。先用吐痰法。後服此湯。水二

鍾姜三片棗二枚槌法臨服入竹瀝姜汁溫服

加減調中散 治食積類傷寒。頭疼發熱惡寒。氣口

脉緊急。但身不痛。此為異耳。經云。飲食自倍腸胃

證治大還 傷寒近後集 卷之三 三 真白堂

乃傷輕則消化。重則吐下。此良法也。蒼朮 厚

朴 陳皮 甘艸 白朮 山渣 神曲 枳實

草果 黃連 乾姜 腹中疼加桃仁。痛甚大便秘

實。加大黃下之。去山渣草果神曲乾姜 心中

元元欲吐者。與乾霍亂同吐法。用滾水一碗入鹽

一撮皂角末五分探吐。水二鍾姜一片臨服入

木香磨汁調服即效

如減續命湯 治脚氣類傷寒。頭疼身熱惡寒支節

痛便秘。嘔逆。脚軟屈弱。不能轉動。但起于脚膝耳。

禁川補劑。及淋洗。防風 芍藥 白朮 川芎

防己 桂枝 甘艸 麻黃 蒼朮 羌活

暑中三陽所患必熱。脉來數。去附子桂枝麻黃加

黃柏黃芩柴胡 寒中三陰所患必冷。脉來遲。加

附子。起于濕者。脉來弱。加牛膝木瓜。起于風者

脉來浮。加獨活。元氣虛。加人參少許。大便實

者。加大黃。水二鍾姜一片棗二枚燈心二十莖

槌法臨服入姜汁調服

芩連消毒飲。時天行大頭病。發熱惡寒。頭項腫痛

證治大還 傷寒近後集 卷之三 三 真白堂

脉洪。取作痰症治之。其喉痺者。亦照此方治。

柴胡 甘艸 桔梗 黃芩 川芎 荆芥 黃

連 防風 羌活 枳殼 連翹 射干 白芷

先加大黃利去一二次後。依本方去大黃。加人參

當歸。水二鍾姜三片。煎一鍾加鼠黏子一撮再

煎一沸。槌法入竹瀝姜汁調服。初起不可用大

黃末後不減。方可量加。

如麻六神通解散 治時行。三月後謂之晚發。頭痛

身熱惡寒。脉洪。先用中和湯。不愈。後服此湯。

麻黃 甘艸 石羔 黃芩 滑石 蒼朮 川

芎 羌活 細辛

水二鍾姜三片梔子入豆豉一撮蔥白二莖煎之
熱服取汗中病即止

證治大還

傷寒近後集
卷之三

无

貞白堂
卷三

證治大還 傷寒近目錄

後集 卷之四

藥誤傷人

病人應死症

望色

聞聲

問因

切生死形狀六經絕脉

傷寒不可發汗

傷寒發汗不出燻法

傷寒汗出不止住法

傷寒可吐

傷寒不可吐

傷寒吐不出探法

傷寒吐不住止法

傷寒不可下

證治大還

傷寒近後集
卷之四目錄

一

貞白堂
二頁

傷寒小便不通燻法

傷寒胸膈不寬熨法

到傷寒家不染病法

用藥寒溫合宜論

妊娠傷寒禁忌藥

蒸臍法

熨臍法

中寒

傷寒合病

陰毒傷寒

夾陰傷寒

寒疫

大頭傷寒

食積

中濕類傷寒

痰症類傷寒

內傷瘀血症發熱狀類傷寒

漱水不欲嚥	晝夜偏側
心下滿	遺尿
大便有利	驚惕
呃逆	鄭聲
瘡痂不言	陰症似陽
冷結	蛇厥
僂冒不仁	肉瞶筋惕
肉苛	百合
痰癰	循衣摸床
證治大還	傷寒近後集 卷之四目錄 二 貞白堂
舌捲囊縮	瘡後發腫
瘡後遺毒	瘡後發碗頭瘡
瘡後勞復	瘡後女勞復
瘡後陰陽易	瘡後虛弱
瘡後昏沈	瘡後飲酒復劇

陳氏傷寒近後集卷之四	雲間陳治三農甫述	門人姚廷讓子遜 范松壽民叅
澠壘王顯西園甫閱	男	拭璣先 師柴羔愚 杓玉衡校 遇時通
姪	藥誤傷人	
凡應用小柴胡湯和解誤用承氣湯致身發黃者死	中暑作熱病誤用燥劑者死腎虛受寒內逼浮陽	之火泛上面赤煩躁身有微熱渴欲飲水不能下
證治大還	傷寒近後集 卷之四 一 貞白堂	咽大便閉或自利小水淡黃或嘔逆或氣短或鄭聲或咽痛狀似陽症醫見面赤煩渴便閉認作陽症誤投寒涼立死陰症身熱面赤足冷煩躁渴去衣被脉來數大無力不急用加減五積散冷服藥用涼藥者死傷寒汗多用利小便藥者死陽明病潮熱汗多小便因少若利之加喘渴者死濕病若發其汗使人耳聾不知痛處者死病人煩躁自覺甚熱他人以手按其肌膚殊無大熱此為無根失守之火用涼藥者死

病人應死症

頭重視身此天柱骨倒元氣已敗死大便濁氣極臭者死目睛正圓者死卵縮入腹脉見離經者死癰後小便濇有血名曰內外癰皆黑澀不出膿者死少陰下利止頭眩時時自汗者死熱盛躁急不得汗出是陽脉極死舌上黑胎生芒刺刮不去易生者死夏月可治鼻衄自汗者死胃寒發呃丁香香柿蒂良姜湯調服脉不出加胆汁合生脉散其脉又不出或暴出者皆死

證治大還

傷寒近後集
卷之四

二

貞白堂

望色

昔肥今瘦主痰大肉脫去主不治平人消瘦主脾熱眼眶黑主內有痰鼻色青主腹中痛苦冷者死鼻色微黑者有水氣鼻色黃主小便難鼻色白者屬氣虛鼻色赤者屬肺熱鼻色鮮明者有留飲鼻孔乾燥者必衄血鼻色燥如烟煤者是陽毒熱極鼻孔冷滑色黑者是陰毒冷極鼻流濁涕者屬風熱鼻流清涕者是肺寒鼻孔癰脹者屬肺熱有風唇口焦紅者吉唇口焦黑者凶唇口俱腫赤者是熱

極唇口俱青黑者是寒極唇口舌胎斷紋者難治

唇口燥裂者是脾熱唇青舌捲者死唇吻色青者

死環口鰲黑者死口張氣直出者死齒燥無津液

者是陽明熱極前板齒燥兼脈虛者是中暈齒如

熟者難治耳色黑枯燥者是腎虛目赤唇焦舌黑

者屬陽毒目熏黃色暗者屬濕毒目黃兼小便利

大便黑小腹滿痛者屬畜血目瞑者將欲衄血目

之白睛黃兼冷無熱不渴脉沈細者屬陰黃兩皆

黃者病欲愈凡開目見人者屬陽閉目不欲見人

者屬陰睛昏不識人目反上視睛小睜目直視目

邪視目睛正圓戴眼反折眼胞陷下此八者皆死

症目睛微定暫時稍轉動者屬痰目中不了了睛

和不明白者此因邪熱結實在內不了了者謂

見一半目不見一半目是也舌腫者難治舌出者

死面額頰赤在午後此虛火上升不可作傷寒治

面赤脉數無力此伏陰病其症煩燥引飲虛陽上

升面赤脉沈細此少陰病外熱內寒陰盛格陽宜

溫誤用寒涼者死面赤脉弦數此少陽病宜小柴

證治大還

傷寒近後集
卷之四

三

貞白堂

胡和解緣面赤赤乃陽氣拂鬱在表汗不徹之故
宜發汗面部通赤色此陽明表症未解不可攻裡
宜解肌而唇青是陰寒極面青兼舌捲囊續亦是
陰寒面青兼小腹絞痛是夾陰傷寒面目身黃兼
小水短赤是濕熱面目身黃兼小腹滿硬痛小便
利是蓄血傷寒面白為無神或汗多或脫血所致
面白人不宜大汗黑氣在魚尾相牽入太陽者死
黑氣自人中入口者死黑氣自入耳目鼻舌者死
而黑人在傷寒內涉虛不宜參朮大補

證治大還

傷寒近後集
卷之四

四

貞白堂

聞聲

聲清聲濁

病邪在表其聲清而響亮病邪入裡其

聲濁而不亮

聲輕聲重

病在陽分其聲前輕後重病在陰分其

聲前重後輕

聲斷聲續

病邪表淺併有餘陽症其聲續病邪入

深併內傷不足其聲斷

言壯言怯

外感陽病有餘出言壯厲則寒熱交作

內傷陰症不足出言懶怯則寒熱間作

欬 欬是心變動之聲

久 腎主欠陰氣積下陽氣未盡陽引而上陰引而

下陰陽相引故數欠也

噫

噫是心變動之聲是胸中氣不交通寒氣客于

胃厥逆從上下復出于胃故為噫

噎

噎是腎變動之聲有病發噎是傷風或傷熱無

病發噎是陽氣和滿于心

吞

吞是脾變動之聲

呃

其聲皆從胃中至胸嗌間而為呃有胃中實熱

證治大還

傷寒近後集
卷之四

五

貞白堂

失下者有胃中痰飲者有服寒涼藥過多者有

胃中虛冷者

咳

咳是肺變動之聲俗呼為嗽肺為邪于氣逆不

下也有肺寒咳者有停飲咳者有停食咳者有

邪在半表半裡咳者

喘

陰氣實陽氣虛陰氣速陽氣遲陰氣盛陽氣絕

故為喘

怒

怒是肝變動之聲

欬是脾變動之聲

哭是肺變動之聲。

笑是心變動之聲。

太息 憂思則心系急。急則氣約。氣約則不利。故太

息以伸屈之。

錯語 意錯言亂。自知言錯。邪氣則瞤目不知覺。此

熱甚正氣衰。

呢喃 病邪入輕則睡中發此聲也。

聲嘶 肺有風熱。

聲啞 聲啞唇口見生瘡。是狐惑病。有風熱傷心肺

證治大還

傷寒近後集

六

貞白堂

卷之四

而聲啞者。少陰病咽中生瘡者。有瘡病口禁者。有熱病三四日不得汗出者死。

口噤 口噤難言。見手足攣摘。是風瘧。口噤不言。難

治。陽明病渴欲飲水。口噤舌乾。白虎加人參

湯咽乾不可汗。

舌哽舌短舌強 病邪入深主難治。

口噤咬牙 是風瘧。

喉中有聲 喉中哢哢有聲者。是痰也。

卒然無音 寒氣客于厭會。則厭不能發。發不能下。

至其開闔不便。故無音。

聲如鼻鼾 聲如鼻鼾者難治。

久病耳聾 屬氣虛。

咽喉不得息 寸脉微浮。或沈伏。胸中痞硬。氣上衝。

此胸中有寒。宜吐之。

鼻息如鼾睡 屬風濕。

耳聾兼脇痛 宜和解寒熱。咽而口苦。屬少陽。

耳聾兼耳腫耳痛 是少陽風熱。

問因

證治大還

傷寒近後集

七

貞白堂

卷之四

口苦舌甜 口苦是胆熱。口甜是肝熱。

舌乾口燥 是胃家熱極。

心下滿 因下早致滿。為痞氣。手按拍之有聲。又輒

此停水。手按則散。此虛氣。手按輒痛。此宿

食。

喜明喜暗 喜明屬陽。元氣實。喜暗屬陰。元氣虛。

睡向壁向外 向壁屬陰。元氣虛。向外屬陽。元氣實。

病起 覺不舒快。少情緒否。有此症是夾氣傷寒。

病起 覺勑臥。骨腿酸疼。脇痛否。有此症是勞力傷。

寒要知病在肝經問婦人乳頭縮不縮與男子

耳聾耳聾邪氣入深難治或兼虛症有少陽症不

可不知

切生死形狀六經六絕脉

雀啄連來三五啄屋漏半日一點落彈石鞭來尋即散搭指散亂真解索魚翔似有亦似無鰕遊靜中跳一躍寄語醫家仔細看六脉一見休下藥一動一止兩日死兩動一止四日通三動一止六日

亡四動一止八日事五動一止只十日十動一止

醫治大選

傷寒近後集

八

貞白堂

一年去春草生時即死期二十一年動二年住清明

節後始傾亡三十動一止三年次立秋節後病則

危四十動一止四年住小麥一熟是死期五十動

止五年試草枯水寒時死矣此為太素脉玄秘

左右手脉俱急緊盛是夾食傷寒右手脉來空虛

左手脉來緊盛是勞力傷寒左手脉來緊盛右

手洪滑或寸脉沈身熱惡寒隱隱頭痛喘咳煩悶

胸脇體痛是夾食傷寒左手脉來緊澀右手脉

沈數心胸脇下小腹有痛處是血鬱內傷外感

鬼脉得病之初便識語或發狂六部無脉大指之

下寸口之上。有脉動者是

反關脉如病人六部無脉便不可言其無要在掌

後切看脉來動者是

傷寒不可發汗

口燥舌乾者口苦咽乾者咽喉痛者吐血下血者淋

血者小便淋瀝者大便瀉利者內傷倦勞者尺脉

微弱者房勞陰虛者夢遺世精者風濕者濕濕者

暑者瘡漏者

傷寒近後集

九

貞白堂

傷寒發汗不出煙法

用發表藥汗不出將蘇葉燒湯以器盛之至于被內

兩膝下燻之又法用薑查綿裹周身擦之其汗自

出此良法也

傷寒汗出不止住法

將病人髮披在水盆中足冷于外用炒麴皮糯米粉

龍骨牡蠣以煨為末和勻周身撲之其汗自止此

良法也

傷寒可吐

胸中懊惱者。喉中有痰聲者。胸滿鬱鬱微煩者。中風
寒。痰涎壅塞者。乾霍亂。心腹刺痛欲死者。傷寒三
四日。邪在胸中者。脉大。胸滿多痰者。下利日數行。
寸口脉滑者。脉沈伏。或浮滑有痰者。

傷寒不可吐

病人元氣虛羸者。房勞陰虛者。勞倦內傷者。胎產崩
漏者。寸脉虛細弱無力者。經水適斷適來者。少陽
胆病者。

傷寒吐不出探法

證治大還

傷寒近後集
卷之四

十

貞白堂

用梔子豉湯。大瓜蒂散不得吐。隨用三山丸。合解毒
散煎服。再不吐。將鵝羽在喉中探吐。

傷寒吐不住止法

用炒糯米一撮。生姜自然汁少許。水煎服。凡嘔吐止
者。亦用此二味。入各藥中同煎服。嘔吐自止。如胃
實嘔吐不可用。

傷寒不可下

六脉虛細者。嘔吐者。腹中時滿時減者。不轉屎氣者。
少陽胆病者。腹如雷鳴者。陽明面赤色者。咽中

閉塞者。血氣兩虛者。內傷勞倦者。陰虛勞倦者。經
水適斷適來者。胎前崩漏者。小便清白者。夾陰面
赤者。心下鞭者。脉雖大無力者。

傷寒小便不通燻法

一切小便不利。先將麝香半錢。填患人臍中。上用葱
白田螺。各搗爛成餅。封于臍上。用布帶縛住。良久
下。用皂夾燒烟。燻入陰中。其水竇自通。婦人亦用
皂夾煎湯。洗玉戶立通。

傷寒胸膈不寬熨法

證治大還

傷寒近後集
卷之四

士

貞白堂

一切寒結熱結水結食結痞結血結痰結支結。大小
結。胸痞氣結者。俱用生姜搗爛如泥去汁。取查炒
熟絹包。漸漸揉熨心胸脇下。其滿痛豁然自愈。如
姜查冷。再入姜汁再炒。再熨。揉之以愈為度。惟熱
結用冷姜查揉之。不可炒熱。醫當慎之。又有傷寒
衄血將解。未盡成熱極。及吐血不盡。醫不知其症。
遂用涼藥之劑。止住。其衄血留結于心胸之分。故
滿痛而成血結胸也。用加味犀角地黃湯。

妊娠傷寒護胎法

川井底泥青黛伏龍肝各爲末調勻塗于孕婦臍中
二寸許如乾再塗上以保胎孕也

到傷寒家不染病法

凡入病家須避其邪氣不使染着爲上以雄黃末塗
鼻孔行動從客位而入男子病穢氣出于口女子
病穢氣出于陰門其相對坐立之間必須識其向
背

用藥寒溫合宜論

如麻黃得桂枝則能發汗芍藥得桂枝則能止汗黃

證治大還

傷寒近後集
卷之四

主

貞白堂

荑得白朮則止虛汗防風得羌活則治諸厥蒼朮
得羌活則止身痛柴胡得黃芩則寒附子得乾姜
則熱羌活得川芎則止頭疼川芎得天麻則止頭
眩乾姜得天花粉則止消渴石膏得知母則止渴
香薷得扁豆則消暑黃芩得連翹則消毒桑皮得
蘇子則止喘杏仁得五味則止嗽丁香得柿蒂乾
姜則止呃乾姜得半夏則止嘔半夏得乾姜則回
痰貝母得瓜蒌則開結痰桔梗得升麻則開提血
氣枳實得黃連則消心下痞枳壳得桔梗能使胸

姪振傷寒禁忌藥

中寬知母黃柏得山梔則降火豆豉得山梔治懊
憊辰砂得酸棗則安神白朮得黃芩則安胎陳皮
得白朮則補脾人參得五味麥門則生腎水蒼朮
得香附開鬱結厚朴得腹皮開膨脹草薢得山查
消肉積神麴得麥芽能消食烏梅得乾葛則消酒
砂仁得枳壳則寬中木香得姜汁則散氣烏梅得
香附則順氣芍藥得甘草治腹痛吳茱萸得良姜
亦止腹痛乳香得沒藥大止諸痛芥子得青皮治
脇痛黃芪得大附子則補陽知母黃柏得當歸則
補陰當歸得生地則生血姜汁磨京墨則止血紅
花得當歸則活血歸尾得桃仁則破血大黃得芒
硝則潤下皂莢得麝香則通竅訶子得肉果則止
瀉木香得枳榔治後重澤瀉得猪苓則能利水殭
泄得白朮則能收濕此用藥相得之大端也

證治大還

傷寒近後集
卷之四

主

貞白堂

蛭斑水蛭及蝨虫烏頭附子配天雄野葛水銀
並巴豆牛膝薏苡與蜈蚣三稜代赭羌花射
大戟蛇蛻黃雌雄礞石芒硝牡丹桂槐花牽

牛皂角同 半夏南星與通草 瞿麥乾薑桃仁
通 礪砂乾漆蟹甲爪 地胆茅根都不中

蒸臍法

用射香半夏皂莢末一字填患者臍中後用生姜薄
荷貼于臍上放大艾火于姜片上蒸二七壯灸關
元氣湯二十壯熱氣通于內通于外陰白退而陽
自復矣

熨臍法

用葱頭縛一把切去葉留白根切餅二寸許連縛四
五餅先將射香硫黃二字填于臍中放葱餅于臍
上以熨斗盛火于餅上熨之餅爛再換餅再熨熱
氣入腹以通陽氣如大小便不利以利爲止

中寒

中寒寒邪卒時直中陰經卽病如中太陰脾經用藿
香正氣散合理中湯寒甚加附子如寒中少陰腎
經用五積散加茱萸寒熱足冷加附子四逆湯寒
熱手足甲唇皆青舌捲蜷縮脉伏絕者用蒸臍法
及大劑姜附溫之不然則死矣

傷寒合病

三陽若與三陰合病卽是兩感所以三陰無併合例
也大抵傷寒二陽經合病必用二陽經藥合治三
陽經合病必用三陽經藥合治

陰毒傷寒

咽喉不利致毒氣攻心如傷寒時氣得病一二日便
結成陰毒或服藥後三四日或十餘日變成陰毒
身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下脹
滿硬如石短氣不息嘔逆唇青面黑四體如冰身
證治大遺 傷寒近後集 卷之四 頁白堂
如被杖其脉沈細而疾或伏絕用陰毒甘草湯先
進一服如人行十里再進一服取汗出乃愈蓋陰
毒之氣隨汗而出也五六日可治七日不可治如
湯藥不受面唇指甲皆青黑色或時鄭聲舌卷囊
縮煩躁冷汗不止腰背眼痛此皆陰寒毒氣入深
急用蒸臍法如手足溫煖卽止知人事者生灌入
生姜汁照前用藥不可與涼藥候服必死

夾陰傷寒

陰極發躁用四逆湯合生脉散入辰砂細茶白蜜冷

服。陰利用四逆湯。加人參、茯苓、肉桂、肉果、砂仁、木通、燈心、升麻、少許服之。虛陽伏陰。用加減五積散。冷服。藥服下。噤。冷體既消。熱性乃發。熱因寒用也。

寒疫

寒疫四時皆有之。若初起。病頭疼發熱。憎寒拘急。或吐逆惡心。煩躁。病滿。或飲食停滯。不化。或腹中作痛。未發熱者。宜霍香正氣散。加減治之。若已發熱者。十味藳薢散汗之。若身體痛。骨節疼。發熱者。羌活沖和湯。加蘇葱主之。若有汗。不得再發汗。宜加證治六還。

傷寒近後集

卷之四

六

真白堂

大頭傷寒

若先發于鼻。額紅腫。以致兩目盛腫。而不開。并額上而部皆赤而腫者。此屬陽明也。或壯熱氣喘。口乾舌燥。咽喉腫痛。不利。脈來數大者。用普濟消毒飲主之。內實熱盛者。用通聖消毒飲。若發于耳之上。下前後。皆紅腫。此少陽也。或肌熱。日晡熱潮熱。往來寒熱。口苦咽乾。目疼。脇下滿。宜小柴胡

加天花粉、羌活、荊芥、連翹、蒼朮、蓮主之。若發于頭上。并腦後項下。及目後赤腫者。此屬太陽也。宜荊芥敗毒散主之。若三陽俱受邪。併于頭面耳目鼻者。以普濟消毒散。外用清涼救苦散敷之。治法當先緩後急。則邪伏也。先緩者。宜退熱消毒。虛人兼扶元氣。胃虛食少者。宜助胃氣。候其大便內熱甚。以大黃下之。按其毒根。此緩之法。蓋此毒先腫于鼻。額次腫于目。又次腫于耳。從耳至頭上絡。後腦結塊。則止。不散必膿也。普濟消毒飲。如無板藍根。用大青或青黛。虛人脈弱。加人參。引至毒處。加皂角刺。胃弱食少。加白朮、橘紅。如大便不通。加酒浸大黃。服後就臥。使藥氣上行。內熱用荊芥敗毒散。加酒炒黃芩。熱盛加酒炒黃連。口渴加天花粉。凡頭面腫盛。目不開。鼻塞悶。口乾舌燥。內外有熱。或咽喉腫痛。不利。或內實大便秘結。脈洪數煩渴。宜用通聖消毒散。不消。加牛蒡子、玄參。或生犀角、水姜汁服。凡時毒頭面赤腫。咽喉壅塞。水藥不受。若臍素有積熱。發為腫毒。疔瘡。一切惡瘡。紅腫並宜。

證治大還

傷寒近後集

七

真白堂

治瘧大便秘加大黃芒硝凡雷頭風頭面疔瘡

腫痛增寒壯熱四肢拘急狀似傷寒用清震湯治

咽喉腫痛用綠雲散以細竹管吹入喉中病處

食積

身不痛惡食噯氣作嘔欲吐不下惡心短氣痞滿腹

脹胃口痛按亦痛

中濕類傷寒

太陽病關節疼痛脈沈細者此名濕痺其人小便不

利大便反快但當利小便凡濕病頭汗出背強欲

治大還

傷寒近後集卷之四

太

貞白堂

得被覆向火胸滿小便不利舌上白胎者此丹

有熱胸中有寒渴欲得水而不飲則口燥煩也若

誤下則噦為難治若下之額上汗出微喘小便利

者死若下利不止者亦死也

痰症類傷寒

如病人目睛微定暫時轉動目如炭煤昔肥今瘦喘

嗽轉側半難臂痛皆痰症也痰在上部寸口脈浮

滑痰在中部右關脈滑大痰在下部尺脈洪滑或

痰飲發寒熱胸滿氣粗語出無倫此夾痰如見崑

用二陳湯加蘇子枳實芩連瓜蒌貝母桔梗山梔

前胡姜汁調辰砂溫服

內傷瘀血症發熱狀類傷寒

或被踢打相撲悶胸一時不覺過至半日或一二三

日而發者有至十數日半月一月而發者胸脇小

腹滿痛手不可近者而發寒熱此有瘀血也或一

時傷重就發寒熱瘀血上冲則昏迷不省如死之

狀良久復甦輕則當歸導滯湯重則桃仁承氣湯

加蘇木紅花牛膝桔梗姜汁量其元氣下其瘀血

證治大還

傷寒近後集卷之四

尤

貞白堂

自愈

漱水不欲嚥

漱水不欲嚥者此屬陽明胃熱也欲飲不欲嚥是邪

熱循經裡無熱也陽明氣血俱多熱逐血妄行作

衄但宜漱水不欲嚥口燥者欲犀角地黃湯外無

寒熱喜忘如狂小便自利大便黑色口燥舌乾但

漱水不欲嚥者此有瘀血結于下焦宜桃仁承氣

湯下盡黑物則愈少陰症脈沈細手足冷或時煩

燥渴漱水不欲嚥者宜四逆湯下利厥逆無脈乾

嘔煩渴。嗽水不欲嚥下。宜用通湯加豬膽汁。入人尿煮之。厥陰虬厥煩燥吐虬口燥舌乾。但欲涼水浸舌并口唇時不可離。不欲嚥下。宜理中湯加烏梅花椒主之。大抵陰症發燥煩渴不能飲水。或欲勉強飲下。良久誠復吐出。或飲水而嘔噦者。皆內寒也。宜四逆湯溫之。蓋無根失守之火。遊于咽噤之間。假作燥渴。則不能飲水也。

晝夜偏劇

凡病晝靜夜劇者。熱在血分。宜四物湯加黃柏知母。

證治大還

傷寒近後集卷之四

主

貞白堂

芩連山梔丹皮黃芩胡主之。若夜靜晝劇。此熱在氣分。宜小柴加山梔連母地骨主之。

心下滿

傷寒心下滿者。當心下高起滿硬者是也。不經下後而滿者。則有吐下之分。若下後心滿者。有結胸痞氣之別。若發熱者。以小柴胡加枳實姜炒黃連去黃芩治之。若按之拍拍有聲而軟者。此停水。五苓散主之。若按之硬痛者。有宿食也。輕則消導。重則用承氣下之。寒在胸中。心下滿而煩。飢不能食。宜

瓜蒌散吐之。陽明病心下滿硬者。不可下。下之則利不止者死。脉浮大有力。心下硬。有燥渴譫語大便秘實者。此屬臟病。宜攻之。此言屬臟者。宿屎在臍也。故下之。若食在胃口。未入于胃。未可下也。大抵腹中滿。心下滿。胸中滿。俱不可用甘草糖棗甘甜之物。蓋甘能補氣。填實故也。外用姜擦法甚良。

遺尿

遺尿者。小便自出而不知也。大抵熱盛神昏遺尿者。

可治。若陰症下寒逆冷遺尿。脉沈者多。難治。宜四

證治大還

傷寒近後集卷之四

主

貞白堂

逆湯加益智仁主之。厥陰蜷縮逆冷脉沈遺尿者。宜四物加茱萸湯。陽不回者死。傷寒汗下之後。熱不解。陰虛火動而遺尿者。用人參三白湯加黃柏知母麥冬五味歸地主之。

大便自利

下利微熱。脉弱自愈。下利脉數微熱。汗出自愈。

驚惕

傷寒八九日。胸滿煩驚。小便不利。譫語。一身盡通用柴胡龍骨牡蠣湯主之。大抵傷寒汗吐下之後。虛

極之人或因事驚恐遂生驚惕宜養心血安神之劑

呃逆

橘皮半夏生姜湯加茯苓枳實陳皮桔梗凡其氣自臍下直衝于胸噎間呃忒者此陰症呃忒也其病不在胃因下虛內有伏陰或候服寒藥遂至冷極于下逆火上冲發爲呃傷而欲盡也又病人煩燥自覺其熱他人以手按其肌膚則冷此爲無根失守之火散亂爲熱非實熱也乃水極似火陰症似陽若不識此候用涼藥下咽則死當用羌活附子湯加官桂人參木香陳皮半夏砂仁急溫其下其陽回陰火降呃忒止也陰症及因胃寒呃忒不止者外用乳香硫黃散嗅法內用丁香柿蒂散服之則止再灸期門中脘氣海關元此良法也但手足溫煖脈重者爲有生矣灸期門穴法以婦人之乳頭向下盡處骨間動脈是穴男女乳小者以手一指爲率陷中動脈是穴男左女右灸三五壯

識語

證治大還

傷寒近後集卷之四

主

貞白堂

諸語語脈浮大者生沈小四逆者死也太陽本病邪結膀胱其人如狂與五苓散利之辰砂末虛甚錯語柴胡三白湯加黃連麥冬五味主之

鄭聲

鄭聲者喉中鄭重而不接續如氣息不促手足頗溫其脈沈細者急以白虎湯加人參五味麥冬助其元氣或濃煎獨參湯徐徐呷之其脈微細大小便自利手足冷用白通湯

瘖瘖不言

證治大還

傷寒近後集卷之四

主

貞白堂

瘖瘖不言者若少陰病咽中生瘖不能言語者以雞子苦酒湯若狐惑上唇青瘖聲啞者在太陰瘖病口噤不能言治在本條熱病瘖瘖不言三四日不得汗出者死熱在大腸肺金不能言者宜清肺降火則愈風熱擁盛咳嗽聲啞者以消風熱降痰火則愈又有失于發散風邪于肺中者以發散爲主也

陰症似陽

又云面赤目赤引飲脈來七八至按之則散者此無

根之脉用人參四逆湯治之。又夾陰中寒而色青脉沈厥冷囊縮舌捲下利清穀裡寒外熱者身痛脉沈厥冷脉微欲絕者並用四逆湯。瀉多加肉果訶子粟壳炒陳壁土熟艾木通燈心二十莖取土氣嘔吐不止加姜汁半夏陳皮胃氣寒嘔不止加丁香咽喉痛不利加桔梗大腹痛加肉桂乾姜小腹痛加茱萸青皮藿香痛甚不止加木香乳香沒藥砂仁熟艾玄胡口食寒物身受寒邪加砂仁草果養葉惡寒戰慄加麻黃桂枝骨體疼痛甚加

證治大還

傷寒近後集
卷之四

西

真白堂

冷結

凡人手足厥冷脉沈細無結胸但小腹脹滿按之病者此冷結膀胱須灸關元穴也宜服茱萸當歸四逆湯磨木香溫服外用採熨法。

蛇厥

舌乾口燥常欲冷水不欲嚥蛇上煩躁昏亂欲死兩手脉沈遲足冷至膝甚者連蛇并尿俱出大便不行此症雖出多端可救治也加味理中安蛇湯主之。又有胃中空虛虫無所安反食其真臟之血病人心胸脇下有痛陣必撮臂呻吟或時下血如豚肝色或如濕毒膿狀或鮮血下利急迫或昏沈不省人事者一切吐蛇雖身大熱不可與涼劑服之必死俱用理中安蛇湯加減治之待蛇定却以小柴胡退熱。又有厥陰病消渴氣上冲心似不能食食即吐蛇既曰胃寒復有消渴之症蓋食在上焦而中下焦但寒而無熱若大便秘用理中湯加大黃主之吐蛇未止加黃連苦棟樹皮細辛治蛇不可用甘草。

鬱冒不仁

證治大還

傷寒近後集
卷之四

西

真白堂

四逆湯加人參歸桂枝莖莖天麻主之凡頭目眩暈非鬱冒也蓋眩暈爲輕鬱冒爲重

肉瞤筋惕

太陽病發汗出不解仍發汗頭身瞤動振振欲墜地用真武湯合人參養榮湯倍用歸莖若不因汗過多其人筋脉跳動者此人稟素血少邪熱傳于六脉之中火動惕也用加味人參養榮湯汗後虛煩不得眠筋惕肉瞤內有熱以加味溫胆湯

肉瞤

證治大還

傷寒近後集卷之四

美貞白堂

肉瞤者瞤者衣絮猶尚苛也傷寒發汗過多亡其血

爲變此証蓋虛而衛實則血氣不得和通肉

失所養故頑痺不仁痛痒不知也用羌活沖和湯

加桂枝當歸木香主之治肉苛肌肉不仁路龍吉

升麻湯治榮虛胃實肌肉不仁滿身痛痒用肉苛

羌活散

百合

若惡寒嘔者病在上焦二十三日愈若腹滿微喘大便堅三四日一行微溏者病在中焦六十三日愈

若小便淋瀝難者病在下焦三十三日愈並宜百合湯主治百合病也已經發汗後更發者用百合知母湯已經下後更發者用百合代赭湯已經吐後更發者用百合雞子湯

瘵瘵

不因汗所生者當平肝木降心火佐以和血之劑用羌防劑連柴芍歸地川芎天麻參類若兼痰者必加南星半夏竹瀝姜汁如風邪急搐須兼全蝎姜蚕若曾經汗下之後多日傳變得此症者爲病劇證治大還傷寒近後集卷之四美貞白堂虛極生風用小續命湯加減凡傷寒汗出露風則汗不流通遂變筋脉掣急手足搐攣用牛旁根散主之若用小續命湯有汗去麻黃無汗去黃芩須要通變治之

循衣摸牀

凡循衣摸牀直視譫語脉弦者生脉澀者死小便利者可治不利者不可治謂津液枯竭也大抵陰陽二氣俱絕則妄言撮空也若大便秘結撮空譫語燥渴者此爲實熱宜承氣湯下之

舌卷囊縮

有陽症有陰症其陽症囊縮者因熱極而縮急用大承氣湯下之陰症囊縮者因寒極而縮急用四逆湯加吳茱萸湯溫之婦人無囊觀其乳頭縮者卽是也凡治此症先灸關元氣海丹田及蒸熨法甚效

瘰癧後發腫

傷寒方愈後浮腫者此水氣也用牡蠣澤瀉散主之

胃虛食少五苓散加蒼朮陳皮木香砂仁胃不虛

證治大還

傷寒近後集卷之四

未

貞白堂

者以商陸一味煮粥食之亦效傷寒大病瘰癧後足

腫者不妨但節飲食戒酒胃氣強腫自消

瘰癧後遺毒

傷寒汗下不徹餘邪結在耳後一寸三分或兩耳

下俱硬腫者名曰遺毒宜速消散後之必成膿以

通翹敗毒散治之項腫痛加威靈仙大便實加大

黃川山甲發腫有膿不消或已破未破者但用內

托消毒散加皂莢升麻金銀花甘州

瘰癧後發碗頭瘡

碗頭瘡者亦因汗下後餘毒不盡瘰癧後故發碗頭瘡

也只以黃連甘草歸尾紅花防風苦參荆芥連翹

羌活白芷煎服外用芒硝赤小豆青代爲末以雞

子清和豬胆汁調敷瘡上最效勿動待其脫落傷

寒瘰癧後小便澀有血者名曰內外瘰癧皆有膿不出

膿者死亦是餘熱毒也用黃連解毒湯加生地歸

翹木通滑石牛膝扁蓄琥珀甘草稍

瘰癧後勞復

氣虛煩嘔竹葉石膏湯燥渴去半夏知母倍天花粉

證治大還

傷寒近後集卷之四

未

貞白堂

虛熱不止者千金麥冬湯

瘰癧後女勞復

其候頭重不舉目中生花腰背痛小腹裡急絞痛或

憎寒發熱或時陰火上衝頭目烘熱心胸煩悶者

竹皮燒散散殺鼠屎有熱加柴胡調赤衣散入虛

弱者用參胡三白湯調赤衣散小腹急痛脉沈足

冷用當歸四逆湯加熟附菜莢送下赤衣散若見

卵縮入腹脉見離經者死

瘰癧後陰陽易

若見腎經虛損真陽有寒無熱脉虛足冷者以人參
四逆湯調下燒視散若傷肝經以當歸四逆湯加
柴胡熟附下燒視散用分寒熱而治陰易熱氣上
衝胸中煩悶手足攣拳搐搦如風狀用瓜蒌竹茹
湯婦人病未平復有犯房事小腸急痛連腰膝痛
四肢不仁無熱者當歸白朮散陰陽易不燥大便
不通心神昏亂驚惕不安用妙香丸

瘥後虛弱

瘥後虛熱盜汗不止屬陰虛用當歸六黃湯陽虛自

諸治大綱

傷寒近後集
卷之四

手

貞白堂

卷三

汗無熱惡寒無力下虛用加味黃芪建中湯瘥後
心神恍惚不寧夜臥煩躁不安或亂夢虛驚不眠
因汗下過多心血虧少用硃砂安神丸加遠志酸
棗仁茯神有痰加橘紅

瘥後昏沈

若用知母麻黃取汗者但慮病後血氣兩虛豈可再
大汗之若人元氣壯實脉來有力者乃可行之脉
虛人弱者只用十味溫胆湯有寒熱潮熱口嘔發
熱者參胡溫胆湯加苓連主之

瘥後飲酒復劇

緣傷寒病熱未解而飲酒者則病增劇轉加熱盛脉
弦數者用小柴胡合解毒湯加烏梅乾葛砂仁脉
洪者用人參白虎湯合黃連解毒湯加乾葛烏梅
砂仁主之

諸治大綱

至

貞白堂

卷五

證治大還 傷寒近日錄

後集 卷之五

妊娠傷寒

產後傷寒

不可水

再三汗下熱不退

四肢冷

附四肢沈重
四肢不收

結陽

結陰

寒在皮膚熱在骨髓熱在皮膚寒在骨髓

太陽傳經用藥

內傷似外感始為熱中病

內傷似外感末傳寒中病

內傷似外感陽明中熱病

內傷類傷寒

證治大還

傷寒近日錄
卷之五目錄

一

貞白堂

房室傷風

房室傷寒

瘡瘍發熱類傷寒

赤膈傷寒

黃耳傷寒

解休類傷寒

砂病類傷寒

搖頭

身痒

未交接而作易病治

人迎氣口脉

衝陽脉

太谿脉

結脉

促脉

代脉

或問

陳氏傷寒近 後集卷之五

雲間陳 治三農甫述

門人范 姚廷讓子遜
王 崧壽民參

橋李徐 愈載韓甫閱

男 師 顧贊皇
王 枋璣先

姪

延陵季 校
遇時遜

妊娠傷寒

若有表症宜汗者用羌活中和湯加柴胡當歸芍藥

蘇葉葱白即四物冲和湯汗之有氣滿喘急加香

附砂仁去生地外用護胎法若裡實熱症大便不

證治大還

傷寒近日錄
卷之五

一

貞白堂

通燥渴者當用大黃轉藥不必疑矣須酒製用有

病則病當之設思真寒脉伏厥冷用姜桂附子不

必慮也附姜桂雖熱炒製無害必加芩連甘草制

之沈香墜之

產後傷寒

產後傷寒不可輕易汗下恐產時傷力其發熱有去

血過多有惡露不盡有三日蒸乳發熱或早起勞

動或飲食停滯俱有發熱惡寒狀類傷寒不可便

用發表攻裡之劑產後惡露不盡亦有發熱惡寒

必脇肋脹滿連大小腹有塊作痛產後飲食停滯發熱頭痛必有意氣作酸惡聞食臭胸膈飽悶右關脈緊用治中湯加山查神麴砂仁炒黃連川芎當歸佐之若產後蒸乳發熱惡寒者必乳間脹硬疼痛令產婦揉乳汁通其熱自除不藥而愈矣若果產後不謹虛中入風者當以四物湯防風荆芥白芷人參香附烏梅姜蚕乾姜產後不謹感冒傷寒發熱惡寒頭疼骨疼脈浮緊表症宜汗者用四物湯加羌活蒼朮白朮乾姜蘇葉梔子少佐用葱

證治大還

傷寒近後集卷之五

二

真白堂

不可水

水停心下微微喘汗吐下孤脾胃寒腹滿結胸

兼不食縱食切勿與之餐傷寒汗吐下後外氣怫鬱胃中寒也發汗後尤不可水與之則噦嘔喘咳發熱惡寒濡弱相搏臍氣裡微胸中苦煩非結也不可水漬青布冷貼胸中誤下後寒氣相搏腸鳴得水令汗大出即成飢陽明病潮熱誤下腹滿不能食或胃中虛冷不能食皆不可水下利脈浮大不可水當溫之傷寒結胸無熱症者宜平和藥若與水益令熱不得出當汗而不汗則煩假令汗出後腹中痛亦服和氣之藥

證治大還

傷寒近後集卷之五

三

真白堂

再三汗下熱不退

汗下再三熱不休長沙公見應心憂人參白虎加蒼朮解毒湯和涼膈餅經云三下而熱不退者即死後人有四五次下加至十數次行而生者此乃偶誤中耳活者未一二死者已千觀是之言後之學者切不可為法但當解毒令涼膈多服調之使陽熱徐退陰脈漸生庶不失事是知權變者矣傷寒下後自汗虛熱不止白虎湯加人參蒼朮一服如神汗出身涼此通仙之妙法也汗

證治大還

傷寒近後集 卷之五

四

貞白堂

下之後熱不退。不問有汗無汗。皆宜白虎加蒼朮湯解之。又加人參亦妙。仍服涼膈合解毒調之。發汗之後熱不解。脈尚浮者。白虎加蒼朮湯傷寒表解傳裡熱而不退。或有汗而未愈。調和陰陽湯。病在半表半裡。熱不退。小柴胡湯。半表半裡。大便微實。小柴胡湯加大黃。半表半裡。大便不通者。除膈熱湯。裡微熱者。宜除胃熱湯。熱勢未退。宜六一順氣湯。兩除表裡之熱病。至六七日裡熱已甚。表熱漸微。脈浮數。先用大柴胡湯不退。宜解裡熱湯。

病在半裡。半表熱不退。脈尚浮洪者。當微表。小柴胡合白虎湯和之。病在半表半裡。脈沈實。當微利。除膈熱湯輕下之。汗吐下。三法之後。別無異症。但些微熱。或微熱。並小柴胡和之。口舌乾燥。合解毒湯涼之。汗吐下之後。別無異症。大便硬結不通。涼膈散病熱已去。微熱者。以益元散和之。無令再病。熱不退。發黃斑。涼膈散加當歸。下後熱不退。或證未全退。雙解散雙和表裡。大汗前後逆氣熱勢不退。雙解散。瘥後遺熱不退。雙解散再解之。次用小

證治大還

傷寒近後集 卷之五

五

貞白堂

柴胡和之。他人病氣汗毒傳染。或食豬羊牛馬肉。毒再復發。熱不退。雙解散。除膈熱湯。風寒暑濕。他勞逸憂愁思慮。志怒悲恐。四時中外諸邪所傷。意覺身熱。頭項拘攣。強痛發熱。惡寒惡風。汗下後熱不退。並退服雙解散。有汗去麻黃。無汗加葛根。身微熱不退。表虛汗出不已。或過表汗。以致表虛。脈不實。海藏黃芪湯。寄毒惡寒。發熱不退。其人大渴飲水者。其腹必滿。小便不利。而自汗出。其病欲解。此為肝乘脾。名曰縱。當刺期門。發熱不退。腹滿。瀉諸寸口。脈浮緊。此為肝乘脾。名曰橫。當刺期門。男女下血。發熱不退。識語者。此為熱入血室。但額上汗上。當刺期門。婦人經水適來。適斷者。為熱入血室。

四肢冷 附四肢沈重四肢不收

下利腹疼。屬厥陰。欲眠。嘿。嘿。風溫等。身如被杖。施真武。厥利。脈沈。四逆。珍。四肢疼。下利。厥逆。惡寒。脈沈。弱。四逆。湯。回陽。救急。湯。少陰。症。四肢沈重。疼。痛。嗽。咯。小便不利。或自下利而咳。真武湯溫。

經益元湯四肢沈重昏黑有瘡或如傷寒四肢沈重忽忽喜眠見多眠條羌活蒼朮湯風濕症四肢不收嘿嘿欲眠頭疼身熱白汗體重而喘萎痺湯羌活蒼朮湯

結陽

四肢腫滿結陽名。陽脉住停氣不行。八五苓

兼理胃。消風退腫萬全靈。結陽者肢腫也諸

陽脉不行陰府蓄結成熱為四肢腫滿也萬全木

通散五苓散。大正散並加蘿蔔枯酒靈根妙。

證治大還

傷寒近後集

六

真白堂

結陰

血氣無宗滲入腸。致成便血可驚惶。三黃補面

誠為妙。四物阿膠桂附湯。結陰者便血也陰

氣內結不得通行。血氣無宗滲入腸則下血也四

物阿膠湯。三黃補血湯。桂附六合湯。

寒在皮膚熱在骨髓熱在皮膚寒在骨髓

病身大熱反欲衣。寒在骨間熱在皮。寒在皮膚

熱骨髓。身寒反不欲其衣。身熱惡寒而反欲

得近衣者。先服麻黃湯汗之。次用柴胡桂枝湯和

之身寒惡熱而反不欲近衣者。先用防風通聖散

人參羌活散表之。次用白虎加人參湯和之。經要

云。身熱欲衣桂麻各半湯身寒不欲衣白虎加桂

枝湯劉全備云。身熱而常食納被。內虛寒而邪熱

淺浮藥辛溫而取效。宜不換金正氣散。八解散並

加川芎白芷頭疼加細辛羌活葱白藿香正氣散

人參養胃湯五積散。臨症擇用。加減得宜。最為良

法。體寒而欲飲衣。素壯熱而感寒。鬱閉飲辛涼而

必痊。宜。人參敗毒散。防風通聖散。升麻葛根湯。柴

證治大還

傷寒近後集

七

真白堂

葛解肌湯。參蘇等並加黃芩主之。

太陽傳經用藥

傷寒傳病太陽始。依次傳經陽明起。若越陰經

不順傳。各經引藥加減矣。太陽傳陽明而太

陽症已罷。陽明症已至。曰傳經。餘倣此。太陽傳

陽明。名巡經傳。葛根湯入于裡。承氣涼膈下之。

太陽傳少陽。名越經傳。小柴胡加川芎。太陽傳

少陰。名表傳裡。小承氣涼膈。合小柴胡。或更合解

導天水。太陽傳太陰。名誤下傳。桂枝加芍藥湯。

桂枝加大黃湯。太陽傳厥陰名巡經得度傳。大承氣湯加川芎柴胡六一順氣湯。太陽白入于本名傳本。未入本為表麻黃湯。自入本為裡五苓散。

內傷似外感始為熱中病

始為熱中氣難言。頭痛四肢痠熱。鼻息不調。聞食惡。補中益氣正當先。頭痛大作四肢痠。聞氣高而喘。身熱而煩。上氣鼻息不調。四肢困倦。不收無氣以動。無氣以言。或煩躁悶亂。心煩不安。

證治太還 傷寒近後集 卷之五 九 貞白堂

或渴不止。病久者邪氣在血脈中有濕。故不渴。如渴是心火炎上剋肺金。故渴。或表虛不任風寒。目不欲開。口不知味。右手氣口脈大。大于左手人。一倍其氣口脈急大而數。時一代而滿。是脈之太。脈代者是無氣不相接。乃脾胃不足之脈。是洪大而數。乃心脉刑肺。急是弦急。乃肝脉挾心火剋肺金也。其右關脾脉比五脉獨大而數。數中顯緩。時一代。此不甚勞役。是飲食不節寒溫失所。則右關胃脉損弱。隱而不見。惟內顯脾脉如此也。治用

補中益氣湯。

內傷似外感末傳寒中病

末傳寒中胃心疼。足弱肢寒。噤不通。脉大滿而。腰脊痛。神聖湯施豆蔻同。腹脹胃脘當心痛。四肢兩脇膈咽不通。或延唾。或清涕。或多溺。足下痛。不能任身履地。骨乏無力。喜唾。兩舉丸冷陰作痛。或妄見鬼狀。夢亡人。腰背脾眼腰脊皆痛。不渴。脉盛大以濇。名曰寒中病。用神聖復氣湯。白朮附子湯。草豆蔻丸。

證治太還 傷寒近後集 卷之五 九 貞白堂

內傷似外感陽明中熱病

內傷中熱類陽明。脾胃久虛因熱乘。清暑益氣加減用。誤施白虎恐難禁。有天氣大熱時。勞役得病。或路途勞役。或田野中勞役。或身體怯弱。食少勞役。或長齋久素。胃氣久虛。勞役其病肌體壯熱。躁熱悶亂。大惡熱。渴飲水漿。與陽明傷寒熱白虎湯症相似。鼻口中氣短促上喘。此乃脾胃久虛元氣不足之症。身亦疼痛。至日西作必譫語。熱渴悶不止。脉洪大空虛。或微弱。白虎湯症。其脉洪

大有九與此內傷中熱不同沿用清暑益氣湯。

內傷似傷寒

內傷煩躁類傷寒。伏逆蒸蒸總一般。昏倦不眠。

脉細數。補中益氣倍傷寒。凡似傷寒煩躁不

絕。汗後復熱脉細數。五七日不睡。補中益氣倍

人參。用竹葉同煎。甚者加麥門冬五味知母。似

傷寒三戰後。勞乏煩燥昏倦。四君子加當歸黃芪

知母麥門冬五味子。似傷寒至五七日汗後煩

躁吃水者。補中益氣加附子。有舌黑燥。大便滑

證治大還

傷寒近後集
卷之五

十

貞白堂

泄食在大腸煩躁不安。宜防風當歸引子。內傷

病退後燥渴不解者。有餘熱在肺。麥冬甘草少加

姜汁冷服。虛者用人參湯。

房室傷風

房室傷風脉緊浮。頭疼發熱汗如油。解肌羌活

湯尤穩。參朮芎歸白朮投。體氣虛弱犯房室

而冒傷風。頭疼發熱自汗惡風。脉浮緩宜羌活湯

大白朮湯。並加當歸人參黃芪湯。血虛汗不止。加

桂枝白芍當歸參朮芎歸湯。凡房室傷風。挾內

傷者。補中益氣湯。隨六經加減。頭疼惡寒羌活

散。身熱石膏湯。腹痛合芍藥散。寒熱合柴胡散。自

汗加白朮茯苓。無汗蒼朮防風。氣虛合四君子血

虛合四物湯。

房室傷寒

房室因感冒寒憂。無汗頭疼脉緊浮。羌活湯兼

大白朮。人參敗毒總宜投。夫人體氣虛弱。犯

房室而感傷寒。頭疼發熱無汗惡寒。脉浮緊。宜羌

活湯。大白朮當歸。人參川芎湯。加當歸蒼朮防風

證治大還

傷寒近後集
卷之五

十一

貞白堂

參朮芎歸湯。頭疼發熱自汗惡風。脉浮緊。無汗

惡寒。脉浮緩。黃芪湯。合川芎湯。汗止外症不解。尤

味羌活湯。加人參當歸。頭疼身體痛發熱惡寒

或惡風。或胸痛。或咳嗽。或寒熱。人參敗毒散。無汗

加蒼朮防風當歸。自汗加白朮黃芪當歸。參朮芎

歸湯加減。血虛人四物湯。頭疼惡風。合羌活散。

腹痛。合芍藥散。寒熱而嘔。合柴胡散。上症全俱。合

服體虛。其加人參。頭疼惡風。身熱自汗。羌活散

合石膏湯。虛者更合四物湯。身熱自汗。腹痛。石

熱湯合芍藥散血虛者更合四物湯寒熱腹痛柴胡散合芍藥散血虛者更合四物湯頭疼惡風身熱自汗腹中痛寒熱而嘔羌活散石膏湯芍藥散柴胡散四藥合和血虛者更合四物湯大抵羌活散治頭痛惡風石膏湯治身熱自汗芍藥散治腹中痛柴胡散治寒熱而嘔四物湯治血虛四君子治氣虛無汗加蒼朮川芎防風白汗加白朮黃芪茯苓有是諸症臨時選用合服不可執一而無權也

證治大選

傷寒近後集卷之五

二

貞白堂

瘡瘍發熱類傷寒

瘡瘍發熱要詳看初發防刑敗毒安已潰還須托裡散忌投汗劑與涼寒經曰諸脉浮數當發熱而洒淅惡寒若有痛處飲食如常畜積有膿也又曰數脉不時則生惡瘡也所以惡瘡初生必寒熱交作不可便以傷寒治之須視病人頭面脊背有無瘡頭若有小紅白膿頭瘡須當仔細辨之凡發背初作先起一小瘡也不過二三日則大發也若疔瘡初作全與傷寒相似要當識之也若一

證治大選

傷寒近後集卷之五

三

貞白堂

赤膈傷寒

赤膈傷寒胸膈上疼痛赤腫號為名防風敗毒宜加減裡實防風通聖靈夫受傷于寒變故萬狀未易默悟也然胸膈赤腫疼痛頭疼發熱惡寒身體痛此正非正傷寒乃類傷寒也名之赤膈傷寒宜防刑敗毒散加瓜蒌子黃連黃芩紫金皮玄參赤芍升麻白芷有表復有裡胸膈赤腫疼痛防風通聖散加瓜蒌子黃連紫金皮表症已

退大便燥實胸膈腫痛涼膈解毒加瓜蒌子枳實
桔梗紫金皮赤芍藥又宜稜針刺腫處出血半
表半裡胸膈腫痛柴胡枳桔湯加瓜蒌子紫金皮
赤芍藥

黃耳傷寒

黃耳傷寒耳痛詳要知風入腎家狀不治卒變
成危症續命防刺敗毒良凡耳中策策痛者
皆是風入于腎經也不治流入腎則卒然變惡寒
發熱脊強背直如瘞之狀曰黃耳傷寒也此不可

證治大選

傷寒近後集

五

貞白堂

作正傷寒治乃類傷寒法也治宜小續命湯去
附子加白附子姜蚕天麻羌活獨活蔓荊子細辛
次用附刺敗毒散加細辛蔓荊子白芷蟬蛻黃芩
赤芍紫金皮又法用苦參磨冷水滴入耳中熱
則去之再易又虎耳草取汁滴入中又猴姜根
取汁滴入耳中又苦蕒詩土木香搗汁滴入耳
中

解你類傷寒

解你傷寒出內經四肢骨節苦伶仃寒如不寒

熱不熱治法通舒血氣寧解者肌肉解散你

者筋不束骨解你之症似寒非寒似熱非熱四體
骨節解散懈惰倦怠煩疼飲食不美食不知味俗
呼為砂病內經名為解你原其因或中酒或中濕
或感冒風寒或房事過多或婦人經水不調血氣
不和皆能為解你症與砂病相似實非真砂病也
治宜先用熱水蘸搭臂膊而以辛麻刮之甚者更
以鍼刺十宣及委中出血或以香燈照視身背有
紅點處皆烙之皆能使腠理開通血氣舒暢而愈

證治大選

傷寒近後集

五

貞白堂

又宜服蘇合香丸

砂病類傷寒

嶺南砂病類傷寒壯熱憎寒肢痛酸鵝鵝鵝
毛黃嫩酒調灰服勝金丹夫砂病者嶺南閩
廣之地多有之矣乃溪毒砂虱水弩射工蝎短狐
鰕蟻之類俱能含砂射人被其毒者則憎寒壯熱
百體分解似傷寒初發之狀彼土人治法以手捫
摸痛處用角筒入肉以口吸出其砂外用大蒜煨
煨封貼瘡口即愈諸虫惟鰕蟻最毒若不早治

十死八九其毒深入于骨若蠟蠟之狀其齋類乎
疥腫彼地有鵝鵝鵝等鳥專食已上諸虫以此
鳥毛糞燒灰服之及籠此鳥于被毒者身畔吸之
其砂間氣自出而病愈也

搖頭

搖頭直視似烟熏、真病心家已絕根、痙病反張
并口噤、頭中痛者戰而言、頭者諸陽之會陽
脉有平則頭爲之搖動然有心絕而搖頭者有風
盛而搖頭者形症皆不類焉陰根于陽陽根于陰
證治大還

傷寒近後集
卷之五

六

真白堂

陰陽互根氣血所以周流而無間若心絕則神去
而陰竭陽毒無根不能自主是以頭搖經所謂陽
毒而形體如烟熏直視搖頭者此也至于太陽發
痙則風盛于上風主乎動是以頭搖經所謂獨搖
頭卒口噤而背反張者此也言搖頭中有痛也言
則其痛又云裡痛言者爲虛不言爲實均是搖頭
析而分之曰實邪曰虛邪曰真邪當明其減否可
灸百會上星風府其搖卽定

身痒

身弱身痒、未解桂枝各半靈、風盛防風
通聖散、血虛四物入浮萍、陽明反無汗皮中
如虫行以久虛也、承附湯黃芪建中湯、風熱盛
身痒發熱無汗、口燥舌乾、大小便秘、瀉防風通聖
散加羌活、風症身痒、小續命去附子、加白附子
血虛身痒、四物湯加浮萍、蒺藜防風
未交接而作易病治

證治大還

傷寒近後集
卷之五

七

真白堂

新瘥後未交接、曾與言談起慾心、思慾切心
因病復、女勞易病共條、夫男子病新瘥未
與婦人交接、而男子感動其情、思其慾事心切、而
得病者、治與女勞復同

人迎氣口脉

左手關前一分爲人迎之位、凡脉緊盛乃傷寒也、右
手關前一分爲氣口之位、凡脉緊盛乃傷食也、若
人迎氣口俱緊盛、此爲夾食傷寒、又曰內傷外感
也。

衝陽脉

衝陽脉在足面去指縫陷谷三寸、動脉中、此陽明胃

經之脉動于此。夫胃為水穀之本。人之所主。若胃氣已憊。水穀不進。穀神已去。其脉不動而死也。故傷寒。診衝陽者。以察胃氣之有無也。仲景又謂之跌陽脉。

太谿脉

太谿脉在足內踝後陷中。動脉是也。此少陰腎經脉動于此。蓋腎者。乃人身之命蒂。真氣之所主。然其脉動而不息者。真氣在也。若真氣以憊。腎氣以絕。其脉一動而死。雖衝陽有脉。而少能進食者。亦主死也。

證治大還

傷寒近後集
卷之五

大

貞白堂
一百五

結脉

結者。間至而動。緩而一止。復來者曰結。此陰盛之脉。凡傷寒脉結代。心動悸者。炙甘草湯。若脉結足冷。腹中痛。陽氣已微者。大建中湯。若脉結者。主有老痰食積死血在內。為之丁治。若內無宿積。其脉結者。此為不相應。病發多難治也。

促脉

促者。間至而動。數而一止。復來曰促。此陽盛之脉。凡

熱極發斑發喘等症。皆脉促也。雜病則多因怒氣傷肝。與夫畜血在于上焦者。皆脉促也。大抵促脉漸退則生。漸加則死矣。

代脉

代者。止也。動而歇。至不能自還。曰代。乃真氣已憊。不可治。若結而代者。可治。非結而獨代者。不可治也。

或問

或問局方十神湯。傷寒發散可用否。然此湯用升麻葛根。能解利陽明經。瘟疫時氣發散之藥也。蓋非

證治大還

傷寒近後集
卷之五

左

貞白堂
一百五

正傷寒之藥。若太陽經傷寒發熱用之。則引邪入陽明。經傳變發斑。不可勝言也。易老云。太陽病服葛根。是引賊破家也。要當辨而用之。

或問小柴胡湯。近世治傷寒發熱。不分陰陽而用之。何也。然柴胡之苦平。乃足少陽經傷寒發熱之藥。解半表半裡之熱。除往來寒熱。小有日晡潮熱也。佐以黃芩之苦寒。以退熱。半夏生薑之辛。以散寒。人參大棗之甘溫。以助正氣。解渴生津液。則陰陽和而邪熱解矣。但太陽經之表熱。陽明經之標熱。

皆不能解之也。如誤用不無害乎。若夾陰傷寒。面赤發熱。脈沉足冷者。服之立至危殆。可不慎哉。及內虛有寒。大便不實。脈息小弱。及婦人新產發熱。皆不可用之也。

或問大青龍湯。仲景治傷寒發熱惡寒。煩躁者服之可用否。夫傷寒邪熱在表。不得汗出。其人則躁亂不安。身心無如奈何。如脈浮緊。或浮數者。急用此湯發汗。則愈。乃仲景之妙法也。若不曉此理。見其躁熱。投以寒涼之藥。為害豈勝言哉。若脈不浮緊。

證治大還

傷寒近後集卷之五

手

真白堂

數無惡風惡寒。身疼者。亦不可用之也。如誤用其害亦不淺也。所以脈症之不明者。多不敢用。

或問陰虛傷寒。用附子湯冷服何也。蓋陰極于下。陽

浮在上之治法也。余曾治一人。傷寒十餘日。脈息

沈細。手溫而足冷。大便不通。面赤嘔煩。渴藥不能

下。惟喜涼二三口。或西瓜一二塊。食下良久而復

吐出。此陰寒于內。通其浮陽失守之火。聚于胸中。

上冲咽嗝。故為面赤嘔煩也。遂用附子一箇。以生

姜自然汁。和白麴包裏煨熟。去麴取附子。去皮臍。

切作八片。又以人參三錢。乾姜炮二錢。水二鍾煎。取一鍾。浸于冷水中。待藥冷與之。即愈。此良法也。

或問三陽知可解者。何以辨之。曰。太陽知可解者。頭不痛。項不強。肢節不痛。知表已解也。陽明知可解者。無發熱。無惡寒。無口渴。不便難。知裡已解也。少陽知可解者。寒熱移其時。早移于晚。氣移于血。晚移于早。血移于氣。是邪無可容之地。知可解也。如寒熱日作。不移其時。是邪未退也。

證治大還

傷寒近後集卷之五

主

真白堂

或問太陽禁忌。不可犯者何也。曰。小便不利。利之是犯本。犯本則邪熱入裡。不能解。此犯之禍也。大便不利。不可利。利之是動血。動血是犯禁。此犯之禍也。

或問治病必求標本。治何標本耶。曰。假令太陽陽

寒。有外入。標本有二說。以主言之。膀胱為本。經絡

為標。以客邪言之。先得者為本。後得者為標。此標

先受之。即是本也。後入于膀胱。本却為標也。此乃

客邪之標本。當從客之標本。如麻黃桂枝治其標。

羌活桑本治其本也。

或問陽明症禁忌不可犯者何也。曰不當發汗。不當利小便。犯之竭其津液。則生蓄血症。唯當益津液。爲上。以其火就燥也。益津液者。連翹葱白是也。

或問半表半裏有幾。曰邪在榮衛之間。謂之半表半裏。太陽陽明之間。少陽居身之半表半裏。五苓散分陰陽。膀胱經之半表半裏。理中湯治吐瀉上下之半表裏。

或問傷風汗自出。桂枝湯以散其邪。傷寒無汗。麻黃湯以發其汗。又言表症未解者。用桂枝湯。理似相反。取曰傷風汗出。腠理自開。傷寒已汗後。腠理既開。故並用桂枝湯以解肌。可謂宜矣。

證治大還

傷寒近後集卷之五

主

貞白堂

或問發熱惡寒發于陽。無熱惡寒發于陰。且如傷寒或發熱。或未發熱。必惡寒。體痛二說。皆曰惡寒。如何辨之。曰傷寒或發熱。或未發熱。必惡寒。體痛。嘔逆。頭痛。項強。脈浮緊。此在陽。可發汗。若陰症。則無頭疼。無項強。但惡寒。而動脈沈細。此在陰。溫裡也。

或問經言用藥有言可與某湯。或言不可與。又有言

宜某湯。及某湯主之。凡此數節。旨意不同。敢問曰。傷寒論中。一字不苟。觀是書。片言隻字之間。當求

古人之用意處。輕重是非。得其至理。而後始可言醫矣。所問有言可與某湯。或言不可與者。此說法禦病也。又言宜某湯者。此臨症審決也。言某湯主之者。乃對病施藥也。此三者。卽方法之條目也。

或問時人言下不厭遲。汗不厭早。斯言若何。曰凡汗症。固宜早。仲景謂不避晨夜者。此也。天下症。須從宜定奪。當急則急。當緩則緩。安可一槩而論。假如

證治大還

傷寒近後集卷之五

主

貞白堂

陽明病。已有可下之理。但合面赤。其在後之熱。尤未斂。又如嘔多。雖有陽明症。謂熱在上。焦未全入府。皆言不可攻。凡此之類。固宜遲也。

或問傷寒論中有症同而藥異。有藥同而症異者。皆非愚陋之可也。且如小青龍與小柴胡症。皆治嘔而發熱。表裡之病。大槩彷彿。何故二方用藥之不同。誠爲可疑也。曰治病之要。當究病源。夫傷寒表不解。裡熱未甚。而渴欲飲水。飲不能多。不當與之以腹中熱尚少。而不解。消水飲停蓄。故作諸症。然

水寒作病。非溫熱不能解。故用小劑龍湯發汗散水。其水氣內漬。則所搏不一。故有或爲之病。因隨症增損以解化之原。其理初無裡症。有水寒以然也。其小柴胡症。係傷寒發熱之邪傳裡。在乎半裡間。熱氣內盛。故生。或爲諸症。緣二症雖曰表裡俱病。其中寒熱不同。故用藥有姜桂柴苓之異。苟能循理以推之。其事之異同自然明矣。更復何疑。

或問煩躁不得眠。與虛不得眠。皆汗下後之餘症。夫煩躁以理言。則爲熱也。虛煩者。既言虛字。非實熱。

證治大還

傷寒近後集
卷之五

論

貞白堂
卷之三

也。何故煩躁反與姜附湯。虛煩仍用梔子豉湯。二藥天壤之隔。其理何如。曰煩躁本爲熱。分晝夜則知陽虛。虛煩不得眠。無間斷。故爲裡熱。經曰下之後復發汗。晝日煩躁不得眠。夜而安靜。不嘔不渴。無表症。脉沈微。身無大熱。乾姜附子湯。退陰復陽。其虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊憹。梔子豉湯以吐胸中之邪。雖曰二症俱煩。而不得眠。却有寒熱之異。故不同然。

或問經言脉浮而緊。法當身痛。宜用汗解之。又曰發

汗後身疼痛。脉沈遲。新加湯主之。夫身疼痛。皆係表邪不盡。固宜汗解。何故復加人參生姜芍藥以益血也。曰表邪盛。則身疼。血虛。則身亦痛。其脉浮緊者。邪盛也。其脉沈遲者。血虛也。盛者宜損之。則安。虛者宜益之。則愈。

或問經言服桂枝湯或下之。仍頭項強。翁翁發熱。無汗。心下滿。微痛。小便不利者。桂枝去桂加茯苓白

朮湯主之。夫頭項強痛。爲邪氣仍在表也。雖經汗下而未解。猶宜解之。何故去桂加茯苓白朮。是無

證治大還

傷寒近後集
卷之五

論

貞白堂
卷之三

意于解表也。曰此非桂枝症。乃爲飲家也。夫頭項強痛。既經汗下而不解。心下滿而微痛。小便不利。此爲水飲內蓄。邪不在表。故云去桂枝加茯苓白朮。若得小便利。水消腹滿減而熱自除。則頭項強痛悉愈矣。

或問經言結胸症其脉浮大者不可下。下之則死。既不可下。復作何術以治之。曰夫陽沈浮關沈乃結胸。不可下之脉浮大。心下雖結。其表邪尚多。未全結也。若微下之。重虛其裡。外邪復聚而必死矣。仲

景言此為箴戒使無踵其弊也其脉既不可攻當以俟其變而待其實假如小結胸症其脉浮滑按之則痛故知邪非深結亦不敢下無過解除心下之熱耳

或問病方入胃何為不傳曰經言陽明居中土萬物所歸無所復傳註曰胃為水穀之海主養四旁四旁有病皆能傳之于胃入胃則更不復傳如太陽傳之入胃則更不傳陽明陽明傳之入胃則更不傳少陽少陽傳之入胃則更不傳三陰已上所言

論治大還

傷寒近後集卷之五

美

貞白堂

入胃不傳之理乃聖賢之至論也

或問經言病人無表裡症發熱七八日雖脉浮數者可下之緣攻下之法須外無表邪裡有下症庶幾可攻今言無表裡症况脉更浮數何故言可下之然此症此理非僕所知敢問曰此非外感乃內傷也若外不惡寒裡無譫語七八日消燥津液乃陽盛陰虛之時苟不攻之其熱不已而變生焉故云脉雖浮數可下之言不待脉浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病特醫之所為也仲景之意不外

是矣凡傷寒當下之症皆從太陽陽明可下之邪而入于府也故下之今不言陽明病而止云病無表裡症此非白表之裡而病也但為可下故編于陽明篇中此章之理非初學所能備悉其意也

或問六經傷寒惟少陰與厥陰有不治之症以二經較之少陰死症尤多未審其理何如曰少陰者腎也位居于正而一陽生于其中是為復其乃大地之根宰輔之職周旋運用承土使下一動一靜莫非腎之功也病至其經已至危殆陰陽兩全雖危弗咎蓋無陽而陰獨居故言其死然子中之陽氣微弱凡病則易為消滅其言死多丁厥陰也

登台大還

傷寒近後集卷之五

三

貞白堂

陳氏診視近纂 卷上

雲間陳 治三農甫述

男

栻幾先

全訂

師柴羔愚

長白石文燦右容甫叅 外孫周繩羽斯聞

望引

治病貴先察色原五色者氣之華應五行合四時彰於面部諸位有如粟如豆如絲如髮如烟雲污泥之狀在於皮上者謂之色皮病者謂之氣沉濁為內浮澤為外黃亦為熱青黑為痛白為寒和生者

證治大還

診視近纂

望引

貞白堂

吉相飽者內明亮者吉昏慘者凶今引者言反時者凶滋榮者生枯夭者死從內部走外部者從內出外從外部走內部者病從外之內察其浮沉以知淺深察其澤天以觀成敗察其散搏以知遠近視色上下以知病處夫然則未明之禍福何往之吉凶其精微之義皆炳然昭著矣奚必飲上池之水而後能垣視一方哉是以古人於望而知之者謂之神也近見世之拘於內外之防者坐臥於重障之中形聲盡匿聞望難施欲令治病而竟不

使之察病抑獨何歟

臟腑肢節部分所屬

經曰庭者首面也闕上者咽喉也闕中者肺也下極者心也直下者肝也肝左者胆也下者脾也方上者胃也中央者大腸也挾大腸者腎也當腎者臍也面王以上者小腸也面王以下者膀胱子處也額者肩也額後者臂也臂下者手也目內眥上者膺乳也挾繩而上者背也循牙車以下者股也中央者膝也膝以下者脛也當脛以下者足也巨分證治大還 診視近纂 臟腑 十 貞白堂 者股衰也巨屈者膝肱也此五臟六腑即部分也有部分用陰和陽用陽和陰當明部分當辨為當能別左右是謂大道男女異位故曰陰陽察天澤謂之良工沉濁為內浮澤為外黃赤為熱青黑為痛白為寒黃而膏潤者為瘰赤甚為血痛甚為癰寒甚為痺不仁五色各見其部察其浮沉以知淺深察其天澤以觀成敗察其散搏以知遠近視色上下以知病處積神於心以知往今故相氣不微不知是非屬意不去乃知新故色明不蒼沉

天爲甚。不明不澤。其病不甚。其色散駒。駒然未有聚其病散而氣痛聚未成也。腎乘心。心先病。腎爲應色。皆如是。男子色在於面王爲小腹痛。下爲邪痛。其圓直爲莖痛。高爲本下爲首。狐疝瘻陰之屬也。女子在面王爲膀胱子處之病。散爲痛搏爲聚。方圓左右各如其色形。其隨而下至脰爲滯。有潤如膏狀爲暴食不潔。左爲左。右爲右。其色有邪。聚散而不端。面色所指者也。色若青黑亦白黃。皆端滿有別。鄉別鄉赤者其色亦大如。面王爲證治大還。診視近纂。臟腑。三。貞白堂。

臟腑分部之圖



察色

帝曰。予欲臨病人。觀死生。決嫌疑。欲知其要。如日月光。可得聞乎。岐伯曰。色之變化。以應四時之脈。此上帝之所貴。以合於神明。所以遠死近生也。夫精明五色者。氣之華也。赤欲如白裹朱。不欲如赭。白欲如鵝羽。不欲如鹽。青欲如蒼璧之澤。不欲如藍。黃欲如羅裹雄黃。不欲如黃土。黑欲如重漆色。不欲如地蒼。五色精微象見矣。其壽不久也。

帝曰。予欲臨病人。觀死生。決嫌疑。欲知其要。如日月光。可得聞乎。岐伯曰。色之變化。以應四時之脈。此上帝之所貴。以合於神明。所以遠死近生也。夫精明五色者。氣之華也。赤欲如白裹朱。不欲如赭。白欲如鵝羽。不欲如鹽。青欲如蒼璧之澤。不欲如藍。黃欲如羅裹雄黃。不欲如黃土。黑欲如重漆色。不欲如地蒼。五色精微象見矣。其壽不久也。

證治大還

診視近纂

察色

觀形

經曰治病必先察其形氣色澤之盛衰病之新故形氣相得謂之可治色澤以浮謂之易已形氣不相得謂之難治色夭不澤謂之難已

經曰形氣不足病氣有餘是邪勝也形氣有餘病氣不足是氣虛也形氣不足病氣不足此陰陽俱不足形氣有餘病氣有餘此陰陽俱有餘也

內經曰形肉已脫九候雖調猶死蓋形肉者脾所主脾為土土者萬物之母觀其形肉已脫則脾壞

證治大還

診視近纂

觀形

卷上

貞白堂

于內而根本喪矣即使九候雖調亦不免於死矣形可勿察哉

經曰形弱氣虛死形氣有餘脈氣不足死脈氣有餘形氣不足生形盛脈細少氣不足以息者危形瘦脈大胸中多氣者死形氣相得者生察互不調者死

察神

黃正公云神大為神有餘神小為神不足氣過於神為氣有餘氣下於神為氣不足有形不如有神有

肉不如氣

神解云虛化神神化氣神為骨之苗裔骨為神之根株將全其形先須理神精實神氣固則神安血枯氣散則神亡神亡則形骨枯而病矣

靈臺秘典云神者一身之主百脈之根清無神寒秀無神薄古無神陋怪無神粗骨不附神者病病而無神者死

太極風云有氣無肉者譬則寒松肉多氣少者譬如靈木有肉不如骨有骨不如氣有氣不如神

證治大還

診視近纂

察神

卷上

貞白堂

神

察神

經曰陽明脈其面始焦又曰胃病者面黃肝病面塵脫色又曰面腫曰風按面光不燥傷風也面燥不光傷寒也傷寒面赤緣緣邪熱熾也面唇俱青陰毒也面白無神氣血不足也面塵脾土虛而肝木乘之也面黑脾土弱而腎水侮之也乍白乍紅崇也面多白點蟲也傷暑則垢傷濕則暗濕熱則黃實則紅腫虛則虛浮至於生瘡風刺癰疹紫

黑皆胃中風熱上攻所致黑色見於三元髮際者死

察日 左日為太陽
右日為太陰

經曰五臟六腑之脉皆上注於目目赤色者病在心
白色者病在肺青色者病在肝黃色者病在脾黑
色者病在腎黃色不可名病在胸中又曰開目見
人屬陽閉目不欲見人屬陰又曰諸有水氣者微
腫先見於目下又曰目黃者黃疸目下黑者痰
也睛藍色者神氣不足也暴紅腫者實熱也紅腫
證治大還 診視近集 察目 七 貞白堂
流膿者濕熱也目不了了者熱極也赤余視
上視下視戴眼反折無睛光者必死也

王管照云寐則神處於心寤則神依於目故目為神
遊息之宮而神之清濁身之疾病悉於目而可察
者

察眉

眉喜清秀而長更齊天倉者乃為保壽官也生白毫
者壽髮白而眉不白者壽

察耳

經曰耳焦枯色塵垢者病在骨又曰耳間青脉起主
聖痛按耳輪紅潤者吉或黃或黑或白兼枯燥者
病薄而黑薄而白皆為腎敗耳堅者腎堅耳薄者
腎脆耳陷者腎下耳高者腎高至於耳痛耳癢耳
聾耳鳴皆少陽三焦及少陰厥陰血虛風熱所致
也 耳門即命門也青黑色者主死耳紋焦黑腎病
口角黑氣入耳七日內死

察鼻

洞中記云鼻居面中肝脾腎之部分也黃明潤者
吉青黑昏黯者病按準頭黃主小便難青主腹痛
證治大還 診視近集 察鼻 八 貞白堂

赤主肺熱白主亡血鮮明主留飲微主小氣微
赤非時者死鼻孔扇張肺氣絕也死鼻孔在外勝
眈漏泄

龜鑑云鼻柱薄而陷者多病低小者胆小尖薄者下
劣忽然黑色者肺絕年上青黑常帶病鼻偏凹者
貧天準頭青色主灾禍色黑主死

察唇

經曰脾之榮在唇脾之竅在口唇高揭者脾高唇下
縱者脾下唇堅者脾堅唇大而不堅者脾脆脾燥

則乾脾熱則裂脾風則爛脾寒則揭脾虛則淡白
熱極則焦黑寒極則青黑遠口青黑者病自法令
黑氣入口者死唇吻青唇口顫搖不止口張氣出
不返口如魚口皆死上唇白者主肚腹有疾上唇
有瘡蟲蝕上部下唇有瘡蟲蝕下部前口角青色
主脾弱傷食
人中紫黑者死

察舌

舌乃心之苗以顏色厚薄為占青為冷為痛紫為熱
為黑赤裂成瘡強硬吐舌美舌皆心脾熱所致
證治大還 診視近纂 察舌 九 貞白堂

重舌木舌則心脾濕熱痰所為也至於舌胎
白乃熱之微黃則熱之重黑胎刺裂卷短則心脾
肝腎真陰衰竭亢陽所致若黑而滑則為陰寒青
而滑則為冷也

夫椒枕流子云舌胎黑色乃熱毒極深猶物之着火
而焦突之燎烟而黑也節菴氏謂腎水刑尅心火
為說可謂意員而語滯矣俗人執此一說藥作真
寒悞豈淺哉然陰症舌黑百中之一二其黑胎必
滑潤有涎又何至於枯刺乾枯燥裂耶且陰陽二

症必有兼症脉息可辨亦不獨在舌也

察四肢

經曰四肢者諸陽之本脾土之末故結陽腫四肢脾
太過則令人四肢不舉不及則令人四肢不用又
曰肝病則四肢滿閉便難轉筋又三陰三陽發病
為偏枯痿易四肢不舉又曰足脛腫曰水又曰臍
跛風寒濕之病按燥則筋攣濕則軟短風則動搖
寒則拘急風熱則痠癢濕熱則肢腫濕痰在胃則
麻死血在胃則木也

證治大還

診視近纂

察身軀

十 貞白堂

察身軀

經曰頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣背者胸
中之府背曲肩隨府將壞矣腰者腎之府轉搖不
能腎將憊矣骨者髓之府不能久立行則振掉骨
將憊矣衣被不斂言語善惡不避親疏此神明之
亂也倉廩不藏者是門戶不要也水泉不止者是
膀胱不藏也

經曰陽病則仰而不能俛陰病則俛而不能仰又曰
身輕屬風身重屬濕又曰坐不能起臥便身全三

陽病也。

肥屬氣虛瘦屬血虛肥而澤氣血俱多瘦而不澤氣血俱少肥而多汗氣虛瘦而無汗血虛。

察病機

雷公問曰：小子聞風者百病之始也，厥逆者寒濕之起也，別之奈何？帝曰：常候關中，薄澤為風，重濁為痺，在地為厥。此其常也，各以色言其病。

帝曰：四時之風病人何如？曰：黃色皮薄弱肉少，不勝春之虛風；白色皮薄弱肉者，不勝夏之虛風；青色皮薄弱肉者，不勝秋之虛風；赤色皮薄弱肉者，不勝冬之虛風。曰：黑色不病乎？曰：黑色皮厚而肉堅，固不傷於四時之風，其皮薄而肉不堅，色不一者，長夏至而有虛風者，病矣；其皮厚而肌肉堅者，長夏至而有虛風不病矣。其皮厚而肌肉堅者，必重感於寒，內外皆熱，乃病也。

證治大還

診視近纂

察病

士

貞白堂

岐伯曰：肺風之狀，多汗惡風，色皛然白，時欬短氣，蓋日則差，暮則甚，診在右寸，其色白，心風之狀，多

汗惡風，焦絕善怒，嚇赤甚，病甚則言不可快，診在口，其色赤，肝風之狀，多汗惡風，善悲，色微蒼，隘乾

善怒，時憎女子，診在目下，其色青，脾風之狀，多汗惡風，身體倦怠，四肢不欲動，色薄微黃，診在鼻上

其色黃，腎風之狀，多汗惡風，面疣然浮腫，脊痛不能正立，其色焔，隱曲不利，診在肌上，其色黑。

經曰：診血脉者，多亦多熱，多青多痛，多黑為久痺，多亦多黑，多青皆見者，為寒熱身痛，而色微黃，齒垢

黃，爪甲上黃，疸也。

證治大還

診視近纂

察病

士

貞白堂

經曰：風勝則動，熱勝則腫，燥勝則乾，濕勝則濡，濕勝則濡泄。

難經曰：寒熱之病，何以候之？然皮寒熱者，皮不可以

近膚，毛髮焦，鼻葉肌寒熱者，皮膚痛，唇舌稿，無汗

骨寒熱者，病無所安，汗注齒本稿痛。

仲景云：色鮮明者，有留飲；色澤者，病溢飲。

察德

帝曰：人之有德者，氣和於目，有亡憂知於色。

察死證

雷公曰人不病卒死何以知之曰大氣入臟腑者不病卒死矣曰病小愈而卒死者何以知之曰赤色出兩額大如母指者病雖小愈必卒死黑色出於天庭如大母指者必不病而死

五陰氣絕則目系轉轉則目運目運者志先死遠一日半死矣六陽氣絕則陰與陽相離離則腠理發泄絕汗乃出大如貫珠出而不流即氣先死巨占夕死夕占旦死故曰陽虛之死暴陰虛之死僵也扁鵲云髮直如麻血竭也爪甲青黑筋竭也燥如熟豆骨竭也鼻張氣促氣竭也耳鼻唇焦肉竭也皆死口如魚口氣出不返者髮冲起唇反人遺尿不覺唇青舌卷環口鰐黑耳目口鼻有黑氣入口者死

華佗云平人面忽如烏肝色望之如青近之如焦黑者死目無精光面若土色不受飲食者四日死病人面青目白面青唇黑面黑唇青面青目青面赤目白面青目黑面黑目白面赤目青皆死以無胃氣故也

證治大還

診視近纂 卷上

三 貞白堂

仲景云脉浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下形體不仁乍靜乍亂為命絕汗出髮潤喘而不休者肺絕也

陽反獨匿體如烟薰直視搖頭者心絕也唇吻反青四肢熱者肝絕也環口鰐黑柔汗發黃者脾絕也溲便遺失狂言目反直視者腎絕也陽氣先絕陰氣後竭身死色青陰氣先絕陽氣後竭身死必赤腋下溫心下熱也

管仲云魂不守宅血不華色精爽烟浮容若木此證治大還 診視近纂 卷上 內 貞白堂

云鬼幽

經曰嬰兒頭毛皆逆上者死嬰兒頭毛拔之易出及髮根聚者疳也

聞引

夫人聲有清濁輕重長短怡怡悽慘之不同者以聲音發於五臟五臟屬乎五行五行各有五音也末世療病竟弗留意於聲聞者豈以聽聲無益於識證耶如宮為脾之音大而和其聲歌商為肺之音輕而勁其聲哭角為肝之音調而直其聲呼徵為

心之音。美而和其聲笑。羽爲腎之音。沉而深。其聲呻。是五內可以音知也。經曰。心爲噫。肺爲咳。肝爲語。脾爲吞。腎爲噦。爲欠。胃爲氣逆。爲噦。是藏府可以聲音辨也。東垣云。內傷則出言怯弱。先重而後輕。外感則發言壯厲。先輕而後重。是內外傷可以聲別也。仲景云。精氣奪。則鄭聲。胃實熱。則譫語。是虛實可以聲識也。神鑑云。怡悅者樂聲。慘悽者悲聲。圓實洪滿者旺相。虛怯摧折者休囚。是悲。樂。休。旺。可以聲曉。古有垣視一方者。用是道也。故越人

證治大遺

診視近集 卷上

開

圭

貞白堂

以聞知者。而謂之聖也。就謂聽聲。非急移邪。

玉管照云。神氣清和。則聲溫潤而圓暢。神濁氣亂。則聲焦急而不揚。故器宇宏大者。聲出於丹田。渾然外達。器宇短小者。聲發於肝膈。急促不長。先遲而後急。或聲未止而氣先絕。或聲未舉而色先變。皆氣促不壽者。有病之聲也。

經曰。肺病好哭。心病好妄言。脾病好歌。腎病好呻吟。肝病好叫呼。又曰。心氣實則笑不休。心虛則悲。又曰。病深者其聲噦。又曰。金空則鳴。金實無聲。又曰。

聲如室中言。此中氣之濕也。言而微。終日乃復言者。此氣奪也。言語善惡不避親疎。此神明之亂也。大素云。聲如鼙中。言是痰火之滯於肺也。欲言語意不相接者。陰陽失守也。

仲景云。病人語多善驚呼者。關節間病。語聲啞暗不出者。心膈間病。語聲啞啞結細而長者。頭額中病。脉之呻者。痛也。言遲者。風也。聲如鼙睡者。風濕也。機要云。咳謂肺氣傷而不清。嗽謂脾濕動而生痰。丹溪云。聲暴啞者。寒包熱也。漸啞者。熱痰壅肺也。聲

證治大遺

診視近集 卷上

開引

圭

貞白堂

嘶者。肺受火傷也。鼻塞聲重者。肺受風邪也。

理會云。語言怯弱。聲難接續。懶言者。內傷及久病也。語言壯厲。重濁氣粗。多言者。外感及新病也。

錢仲陽云。嬰兒哭而不啼者。痛也。啼而不哭者。驚也。叫呼冷汗出者。重所嗜也。直視大叫發搐者。肝氣實也。忽作鴉聲者。死之兆也。

問引

世之談醫者。與醫之自謂者。僉曰理明者。不必問。多問者。必不明於理也。是以醫者恥問。病家卑其問。

遂致問知之工廢而不用嗚呼聖如岐黃尚曰閉戶塞牖繫之病者數問其情以從其意矧世醫乎惡意工巧僞識神聖會融病情萬變四術猶疑問其可廢乎且能識問則察識之未明診切之未至皆將問以得之斯病机明而用藥當矣蓋古人以問知爲工則必以不能問者爲工夫之未至醫亦何爲而弗問病家亦何故而惡問耶予故曰診察要矣問尤急焉

蘇東坡曰吾疾必盡告醫者使胸中了然然後診脈證治大還

診視近纂 問引 七 貞白堂

疑似不能惑也吾求愈疾而已豈以困醫爲事哉治病必當審問

經曰診病不問其始憂患飲食之失節起居之過度或傷於毒不先言此卒持寸口何病能中

經曰凡診病者先審問其始病與今之所方病

經曰凡診病者必問飲食居處暴樂暴苦始樂後苦皆傷精氣精氣竭絕形體毀沮暴怒傷陰暴喜傷陽形樂志苦病生於脉形樂志樂病生於肉形苦志樂病生於筋形苦志苦病生於咽隘形數驚恐

經絡不通病生於不仁

經曰凡診病者必先問貴賤後賤雖不中邪病從肉生名曰脫營富後貧名曰失精五氣留連病有所并故貴脫失雖不中邪精神內傷身必敗亡始富後貧雖不傷邪皮焦筋屈痿癱爲變

經曰診有三常必問貴賤貴則形樂志樂賤則形苦志苦苦樂殊情病情各異封君敗傷及欲侯王情慕尊貴則妄爲不已也

經曰臨病人問所便熱中消瘴則便寒寒中之屬則便熱

診視近纂 問引 六 貞白堂

玄機云治病必問其愛惡五味以察陰陽逆順冷熱欲甘者脾經不足愛辛者肺氣虛寒腎衰欲鹹心熱欲苦皮極肝傷則喜酸此爲順候若心病喜鹹肺傷欲苦脾弱思酸肝疲喜辣腎病欲甘候逆逆矣

玉機云診病須問病人從來稟氣厚薄所傷寒物熱物若是喜食而食之不可服破氣藥乘飢困而食之當益氣也

凡治傷寒。必問惡風惡寒。有汗無汗。怕寒怕熱。渴與

不渴。頭痛有無。胸腹痞脹否。大小便通利否。今經

幾日。曾汗下否。

餘見傷寒節要

凡治婦人。必問胎孕有無。經水調否。產後須問惡露

有無。產經幾日。肚腹痛否。所食何物。分娩難易。生

子存亡。

餘見女科理會

凡治癰疽。必問今經幾日。飲食何如。寒熱何如。痛淺

痛深。腫與不腫。經曰。有形而不痛者。陽之類也。無

形而痛者。陰之類也。有形而痛者。其陰完而陽傷

證治大還

診視近纂

問部

尤

貞白堂

之也。無形而痛者。其陽完而陰傷之也。

餘見外科理會

凡問小兒。必問其曾出痘疹否。素好食何物。乳食食

否。睡臥安否。吐瀉何物。發熱何時。

餘見兒科理會

甲乙經云。問病者。所思何也。所懼何也。所欲何也。所

疑何也。問之。要察陰陽之虛實。辨藏府之寒熱。疾

病所生。不離陰陽。藏府。寒熱。虛實。辨之。分明。治無

悞矣。

五十一難。問病欲得寒。欲見人者。病在府也。病欲得

溫。不欲見人者。病在藏也。

按之而痛止者。為虛。按之而痛甚者。為實。痛不移者。為血。痛無定者。為氣。

凡百病。問其晝則增劇。夜則安靜。氣病而血不病也。夜則增劇。晝則安靜。血病而氣不病也。晝熱夜靜。陽氣旺於陽分也。晝靜夜熱。陽氣下陷入陰中也。晝夜皆熱。重陽無陰也。亟瀉其陽。峻補其陰。晝靜夜寒。陰血旺於陰分。夜靜晝寒。陰氣上溢於陽中。也。晝夜俱寒。重陰無陽也。亟瀉其陰。峻補其陽。晝寒夜熱。病名陰陽交變而死矣。

證治大還

診視近纂

問部

子

貞白堂

問其所欲。以知其病。欲熱者。知為寒。欲冷者。知為熱。好靜惡動者。知為虛。煩躁不寧者。知為熱。惡食知傷食。惡風知傷風。

王海藏云。常人求診拱默。惟令切脈試其知否。殊不知氣血附于經絡。熱則脈疾。寒則脈遲。實則有力。虛則無力。若得病之由。及所傷之物。豈能以脈知之乎。故醫者不可不問其由。病者不可不說其故。

切引

按脉理難明。古今所病。至虛有盛候。大實有羸狀。疑似之間。死生之。况胸中不了了。指下難明。不惟初學者難得。其要領。即熟習者亦難窺其蘊奧。竟萬變無窮之病情也。是以採素難之精微。蒐諸家之要旨。仍集望問。問症于前。以補切之未逮云。

證治大還

診視近纂 切引

貞白堂

氣為榮化而為血。行於脉中。故內經曰。壅遏榮氣。令無所避。是為脉者。蓋言壅遏榮氣。嘗聚於經隧之中也。是以氣血旺。則脉壯。氣血衰。則脉弱。氣血和。則脉平。長人脉短。人脉短。肥人脉沉。肌肉厚也。瘦人脉浮。肌膚薄也。老者脉衰。壯者脉盛。性急脉躁。性緩脉遲。富者脉沉。緩洪潤貴者脉流利。輕清貧者脉浮短散亂。賤者脉淹滯重濁。壽者脉圓滑而長。夭者脉促滿而短。男子尺脉常弱。女子尺脉常

盛。此其候也。少嫌伏弱。老怕浮洪。形充脉弱。形小脉充。健人脉病。病人脉健。瘦人脉肥。肥人脉瘦。或一部之內。獨大獨小。偏疾偏遲。及左右強弱之相反。四時男女之相背。皆病脉也。

脉有神机

經曰。營行脉中。衛行脉外。世之粗醫。因而泥之曰。脉者。氣血而已。然氣血惡足以盡之。經曰。根於中者。命曰神机。脉之所以神其用者。皆元氣主宰其机也。若惟是氣血何獨於此為脉耶。

證治大還

診視近纂 取脉式

二

貞白堂

取脉式

診家常以平旦之際。取手太陰肺經。以掌後高骨為關。關之前名曰寸。關之後名曰尺。浮以取表。沉以取裡。中以取胃氣。寸部法天候。胸以上至頭之有疾也。關部法人候。膈以下至臍之有疾也。人部法地。候臍以下至足之有疾也。左手候左。右脉候右。兩手皆然。病者危殆。則勿以平旦為拘。雖一日三診之可也。

寸關尺義

經巨膠處也。即鼻孔旁上部人耳前之動脈。手少

陽三焦經耳門分也。即系竹空中部天手太陰肺

經寸口是也。中部地。手陽明大腸經合谷分也。中

部人手少陰心經神門處也。下部天。足厥陰肝五

里分也。婦人則取太衝中部地足少陰腎經是也。

太谿穴也。下部人足太陰脾經箕門是也。候胃氣

則取足跗上之冲陽足陽明胃經也。取諸經之部

候。即儒者求道於散殊寸口之部候。即儒者本之

於一貫也。

證治大遺

診視近纂 三部復

四

貞白堂

七診法

七診之說世皆勿聽。予所惑。今舉內經以証之。黃帝

曰。何以知病之所在。岐伯曰。察九候獨小者病獨

大者病獨疾者病獨遲者病獨熱者病獨寒者病獨

獨陷下者病。王冰註曰。診凡有七者。此之謂也。經

又曰。七診雖見。九候皆從者不死。若勿聽。子則以

靜其心。忘外慮。均呼吸。浮以取臍。中以取胃。沉以

取臍。皆醫者察病人脉息七事。與經言七診雖見

之文不合。粗淺如此。可慨見矣。

七診雖見九候皆從者不死。

此岐伯欲人融通脉理。不可一途而取也。七診者。脉

來獨大獨小獨遲獨疾獨寒獨熱獨陷下也。此皆

惡脉。今論其不死者。如少陽之至。以陽之乍大乍

小。猶未離乎陽明之至。退無浮大而短。太陽之至。

洪大而長。以陽盛故純太陰之至。緊大而長。少陰

之至。緊細而微。厥陰之至。沉短而敦。是皆旺脉。而

非七診也。又如司天尺寸不應。南政之歲。三陰司

天。則寸不應。三陰在泉。則尺不應。北政之歲。三陰

司天。則尺不應。三陰在泉。則寸不應。是皆運氣使

然。故謂之從。謂順四時五行。而為之遷變也。安得

謂之死哉。

臟腑部位論

吳草廬曰。醫者於寸關尺。輒名之曰。此心脉。此肺脉。

此肝脉。此脾脉。此腎脉者。非也。五臟六腑。凡十二

經。兩手寸關尺者。手太陰之一脉也。分其部位。以

候他臟之氣耳。脉行始於肺。終於肝。而復會於肺。

肺為氣所出之門戶。故名曰寸口。而為脉之大會。

證治大遺

診視近纂 七診雖見

五

貞白堂

以占一身焉。

李時珍曰兩手六部皆肺之經脉也特取此以候五臟六腑之氣耳非五臟六腑所居之處也凡診察皆以肺心脾肝腎各候一動五十動不止者五臟皆足內有一止則知一臟之脉不至據此推之則以肺經一脉候五臟六腑之氣者可心解矣諸儲趙氏不知脉隨五臟之氣行於經隧之間欲以男女臟腑顛倒部位執泥不通戴同父言諸氏倒裝五臟丹溪別男女尺寸草廬明三部皆肺三說皆謬治太遺

診視近纂

臟腑部論

六

真白堂

人迎氣口論

左關之前一分爲人迎右關之前一分爲寸口殊非內經之意若古人以左手三部總爲人迎右手三部總爲寸口又夾喉嚨兩旁之脉亦曰人迎若人

迎寸口相應若引繩大小齊等命曰平人若人迎大於寸口一倍二倍三倍爲外感風寒寸口大於人迎一倍二倍三倍爲內傷飲食其理安在蓋以人迎之分肝膽在焉肝主風故於人迎以候風寒亦左手主表也寸口之分脾胃在焉胃者倉廩之官故於寸口以候飲食亦右手主裏也

五臟平脉

平脉者五臟平和之脉也心脉浮而散大象火之發揚也肺脉浮而短濤肺主氣故浮短而濤象

診視近纂

人迎氣口論

七

真白堂

金之堅勁也脾脉沉軟而和緩象土之敦厚也肝脉弦細而長象木之急速條達也腎脉沉而軟滑象水之沉重流利也經曰平心脉來累累如循連珠心氣和平血脉流利故累累如連珠如循琅玕曰心平平肺脉來厭厭聶聶厭厭謂輕虛而緩似元氣然如落榆莢揚也聶聶和通而相觸也如揭長竿末曰肺平平肝脉來奘弱招招奘更而微也如揭長竿末稍曰肝平平脾脉來和柔相離和緩分明也如雞踐地曰脾平平腎脉來喘喘累累如鈞滑也按之而堅曰腎平必先識經脉後方識病脉必先定五臟

之脉乃可言間甚之時死生之期

六腑平脉

膽脉弦大而浮胃脉浮長而緩膀胱脉洪滑而長大
腸脉浮短而滑小腸脉洪大而緊心包脉沉弦而
散三焦脉洪散而急

五臟病脉

五臟之脉肝弦心洪脾緩肺浮腎石俱帶和緩此為
中和應時無病之脉若太過不及皆為病脉太過
者脉來強實是也病在外不及者脉來虛微是也

診治大還

診視近纂 八 貞白堂

病在中如心脉宜洪洪大益盛則過於中和之氣

固病宜洪而反微細則不及夫中和之氣亦病經

曰病心脉來喘喘連屬謂急故而不和緩也其中微曲微曲則鉤

多胃心脉曰心病病肺脉來不上不下謂不輕不重如循雞

羽謂旁虛中實也曰肺病病肝脉來盈實而滑則其大如

循長竿曰肝病病脾脉來實而盈數不沉軟如雞

舉足曰脾病病腎脉來如引葛按之益堅謂輕按

重按則搏指堅長也曰腎病

五臟死脉

經曰真心脉至堅而搏實而有如循薏苡子絕無和

累累然色赤黑不澤又曰前曲後踞曲者瀉滯而

前曲瀉滯後則居然如操帶鉤曰心死真肝脉至

中外急如循刀刃責責然如按琴瑟絃動急而色

青白不澤曰肝死真肺脉至大而虛如以毛羽中

人膚浮而無神非來無根則胃如風吹毛曰肺死真脾脉至弱而乍數

乍疎色黃青不澤弱而無神此脾氣欲脫又曰如

鳥之啄堅動而不如鳥之距如水之流介然不岐

診治大還 診視近纂 五臟死脉 九 貞白堂

曰脾死真腎脉至搏而絕如彈子石搏擊而辟辟

然色黃黑不澤或如解索曰腎死此皆無胃氣以

和之故真臟獨見其獨見者病勝臟也故死

脉以胃氣為本

經曰平人常以胃氣為本胃者平人之常氣脉之中

和也中和者弦不甚弦鉤不甚鉤更不甚裏毛不

甚毛不甚石順四時五行而無太過不及者也

若真臟脉至而無胃氣曰逆逆者死春胃微弦曰

平弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死胃而有毛曰

平

秋病木旺之時而毛甚曰今病金旺而木受

微鈞曰平秋病毛甚則鈞多胃少曰心病但鈞無

胃曰死但來盛又不活動寸關有而胃而有石曰

冬病石甚曰今病長夏胃微奕弱曰平弱多胃少

曰脾病但代無胃曰死奕弱有石曰冬病土病不

肺病但毛無胃曰死毛而有弦曰春病金氣通

甚曰今病弦甚則所勝冬胃微石曰平石多胃少

曰腎病但石無胃曰死石而有鈞曰夏病鈞甚曰

證治大還 診視近纂 醫門彙編 卷下 三才

今病此內經候胃氣之法也而丹溪謂男子以氣

為主久病而右脉充於左有胃氣也雖重可治女

人以血為主久病而左脉充於右者有胃氣也雖

重可治反此者虛之甚也

脉究上下來去至止六字

斯六字者足以別平陰陽虛實本岐黃之奧旨而滑

櫻寧關明之上者為陽來者為陽至者為陽下者

為陰去者為陰止者為陰上者自尺部上於寸曰

陽生於陰也下者自寸口下於尺部陰生於陽也

脉有上下是陰陽相生病雖重不死來者自骨肉

之分出於皮膚之際氣之升也去者自皮膚之際

還於骨肉之分氣之降也脉有來去是表裏交泰

病雖重必起此謂之人病脉和也若脉無上下來

去死無日矣經曰脉不往來者死此之謂也若

疾去徐上實下虛為癰厥疾來徐去病上虛下實

為惡風也至者脉之應止者脉之息也止而暫息

者喻之疾止久有常者死也

脉分有力無力

證治大還 診視近纂 醫門彙編 卷下 三才

東垣著此事難知謂脉貴有神有神者有力也雖六

數七極三遲二敗尤生此得診家精一之言也節

庵辨傷寒脉法以脉來有力為陽症沉微無力為

陰症此發傷寒家之朦瞽也清碧診論曰浮而

有力為風無力為虛沉而有力為精無力為氣遲

而有力為痛無力為冷鬱而有力為熱無力為瘡

各於其部見之此得診家之領要也

二十八脉

浮脉 浮在皮毛如水漂木 舉之有餘按之不足

浮脉爲陽其病在表寸浮傷風頭疼鼻塞左關浮者風在中焦右關浮者風痰在膈尺部得浮下焦風客小便不利大便秘澁

無力表虛有力表實浮緊風寒浮遲中風浮數風熱浮緩風濕浮芤失血浮短氣病浮洪虛熱浮虛暑憊浮澀血傷浮濡氣敗浮脉宜于秋

沉脉沉行筋骨如水投石按之有餘舉之不足

沉脉爲陰其病在裏寸沉短氣胸痛引脇或爲痰引或水與血關主中寒因而痛結或爲滿悶吞酸筋

證治大還

診視近纂 浮脉 主 貞白堂

急尺主背痛亦主腰膝陰間濕痒淋濁痢泄沉脉宜于冬

無力裏虛有力裏實沉遲痛冷沉數內熱沉滑痰飲沉澀血結沉弱虛衰沉半堅積沉緊冷痰沉緩寒濕

遲脉遲脉屬陰象爲不及往來遲慢三至一息

遲脉主臟其病爲寒寸遲上寒心痛停癢關遲中寒癥結攣筋尺遲火衰溲便不禁或病腰足痛痛牽陰

有力積冷無力虛寒浮遲表冷沉遲裏寒遲澀血少遲緩濕寒遲滑脹滿遲微難安

數脉數脉屬陽象爲太過一息六至往來越度

數脉主腑其病爲熱寸數喘欬口瘡肺癰關數胃熱邪火上攻尺爲相火赤濁淋瘕

有力實火無力虛火浮數表熱沉數裏熱陽數君火陰數相火右數火亢左數陰戕肺部見之爲金家賊脉秋月逢金凶微

滑脉滑脉替替往來流利盤珠之形荷露之義

證治大還

診視近纂 數脉 主 貞白堂

滑脉爲陽多主痰液寸滑欬嗽胸滿吐逆關滑胃熱壅氣傷食尺滑病淋或爲痢積男子溺血婦人經鬱

浮滑風痰沉滑痰食滑數痰火滑短氣寒滑而浮大尿則陰痛滑而浮散中風癱緩滑而冲和娠孕可決血盛則脉滑故腎脉宜之

澀脉澀脉塞滯如刀刮竹遲細而短三象俱足

澀爲血少亦主精傷寸澀心痛或爲怔忡關澀陰虛因而中熱右關土虛左關脇脹尺澀遺淋血利可

決孕為胎病。無孕血竭。滿而堅大為有實熱。滿而

虛軟。虛火炎灼。腎司精血故男女尺中見此脈必艱于嗣

虛脈虛合四形浮大遲弱及乎尋按幾不可見

虛主血虛。又主傷暑。左寸心虧驚悸怔忡。右寸肺虧

自汗氣怯。左關肝傷。血不營筋。右關脾寒。食不消

化。左尺水衰。腰膝痠痺。右尺火衰寒症蜂起。氣為陽主

浮分血為陰主沉分今浮分大而沉分空故獨主血虛耳

實脈實脈有力長大而堅應指幅幅三候皆然

血實脈實大熱壅結。左寸心勞舌強氣湧。右寸肺病

證治大遺

診視近纂 虛脈 貞白堂 卷下 三子二

嘔逆咽疼。左關見實。肝火脇痛。右關見實。中滿氣

疼。左尺見之。便閉腹疼。右尺見之。相火亢逆。緊脈者熱

為寒束故其象細急而不寬舒實脈者邪為火迫故其象堅滿而不和柔

實而且緊。寒積稽留。實而且滑。痰凝為祟。

長脈長脈迤迤首尾俱端直上直下如循長竿

長主有餘。氣逆火盛。左寸見長。君火為病。右寸見長

滿逆為定。左關見長。木實之殃。右關見長。土鬱脹

悶。左尺見之。奔豚冲兢。右尺見之。相火專令。長脈屬肝

宜于

短脈短脈滿小首尾俱肺中間突起不能滿部

短主不及為氣虛症。短居左寸心神不定。短居右寸

肺虛頭痛。短在左關肝氣有傷。短在右關腦間為

殃。左尺短時。少腹必疼。右尺短時。真火不降。氣屬陽主

乎克沛若短脈獨見氣衰之兆也 短脈屬肺宜于秋

洪脈洪脈極大狀如洪水來盛去衰滔滔滿指

洪為盛滿。氣壅火亢。左寸洪大。心煩舌破。右寸洪大

胸滿氣逆。左關見洪。肝木太過。右關見洪。脾上脹

熱。左尺洪兮。水枯便難。右尺洪兮。龍火燔灼。失血下利

診視近纂 短脈 金 貞白堂 卷下 三子二

久嗽久病俱忌洪脈 洪脈宜于夏

微脈微脈極細而又極軟似有若無欲絕非絕

微脈模糊。氣血大衰。左寸驚怯。右寸氣促。左關寒

右關胃冷。左尺滑微。髓竭精枯。右尺得微。陽衰命

絕

細脈細直而軟繁繁紫紫狀如絲線較顯于微

細主氣衰。諸虛勞損。細居左寸。怔忡不寐。細居右寸

嘔吐氣怯。細入左關。肝陰枯竭。細入右關。胃虛脹

滿。左尺若細。洩痢遺精。右尺若細。下元冷憊。吐血失血

得沉細者生憂勞過度脈亦多細大抵細脈宜于
老弱不宜于少壯宜于秋冬不宜于春夏 虛勞
兼數必死

濡脈 濡脈細軟見于浮分
來之乃見按之即空

濡主陰虛髓竭精傷左寸見濡健忘驚悸右寸見濡

膝虛自汗左關逢之血不營平 脾虛濕

侵左尺得濡精血枯損右尺得 敗命垂 久病

見之尚未至必死若平人及小壯見之
或暴病者各為無根之脈去死不遠

弱脈 弱脈細小見于沉分
來之則無按之乃得

弱為陽陽真氣衰弱左寸心虛驚悸健忘右寸肺虛

證治大還

診視近集

濡脈

去

貞白堂

自汗短氣左關木枯必苦鬱急右關土寒水穀之

病左尺弱形涸流可微右尺若見陽陷可驗 弱按

陰猶未絕若兼瀉象則氣血交敗矣總之此脈
不宜于少壯新病或老人久病見之猶可維援

緊脈 緊脈有力左右彈人
如較轉索如切急繩

緊主寒邪亦主諸痛左寸逢緊心滿急痛右寸逢緊

傷寒喘嗽左關人迎浮緊傷寒右關氣口沉緊傷

食左尺見之臍下痛極右尺見之奔豚疝疾 中惡

脈得浮緊邪方盛而脈無根也咳嗽虛損
脈得沉緊正已虛而邪已病也咸稱不治

浮緊傷寒沉緊傷食急而緊者是為遁尸數而緊

者當主鬼擊。

緩脈 緩脈四至來往和勻
微風輕暖初春楊柳

緩為胃氣不主于病取其兼見乃可斷症浮緩風傷

沉緩寒濕緩大風虛緩細溼痺緩瀉脾薄緩弱氣

虛右寸浮緩風邪所居 左寸 少陰血虛左關浮緩

肝風內鼓右關沉緩土弱溼侵左尺緩瀉精宮不

及右尺緩細真陽衰極。

弦脈 弦如琴弦輕虛而滑
端直以長指下挺然

弦為肝風主痛主瘧主痰主飲弦在左寸心中必痛

證治大還

診視近集

緩脈

去

貞白堂

弦在右寸胸及頭疼左關弦今痰癰瘰癧右關弦

今胃寒膈痛左尺逢弦飲在下焦右尺逢弦足學

疝痛 弦為初春之象陽中之陰長為莫春之象純
屬于陽兩關弦為雙弦若不能食為木尅土

土已
負也

浮弦支飲沉弦懸飲弦數多熱弦遲多寒弦大主

虛弦細拘急陽弦頭疼陰弦腹痛單弦飲癖雙弦

寒病。

動脈 動無頭尾其形如豆
脈發動搖必兼滑數

動脈主痛亦生于驚左寸得動驚悸可斷右寸得動

自汗無疑。左關若動驚及拘攣。右關若動。心脾疼
痛。左尺見之。亡精為病。右尺見之。龍火奮迅。

促脉 促為急促數時一止
如趨而蹶進則必死

促因火亢。亦因物停。左寸見促。心火炎炎。右寸見促。

肺鳴咯咯。促現左關。血滯為殃。促居右關。脾官食

滯。左尺逢之。遺精堪憂。右尺逢之。灼熱為災。氣

稽留凝泣。阻其運行之機。而歇止者。為輕。若真元
衰敗。陽絕陰涸。失其揆度之常。而歇止者。為重。

代脉 代為禪代。止有常數
不能自還。良久復動

代主臟衰。危惡之候。脾土敗壞。旺利為咎。中寒不食。

證治大還 診視近纂 動脉 亢 貞白堂
卷下

腹疼難救。兩動一止。三四日死。四動一止。六七日

死。次第推求。不失經旨。代脉見而脾衰。散脉見而
腎絕。兩者交見。必死。若傷

寒心。悸懷胎三月。或七情太過。或跌打
重傷。風家痼疾。均所不忌。久病者忌之。

革脉 革大弦急。浮取即得
按之乃空。渾如鼓革

革主表寒。亦屬中虛。左寸之革。心血虛痛。右寸之革。

金衰氣壅。左關遇之。疝瘕為祟。右關遇之。土虛而

疼。左尺診革。精空可必。右尺診革。殞命為憂。女人

得之。半產漏下。唯表有寒。邪故弦急之象。見焉
惟中虧氣血。故空虛之象。顯焉。

牢脉 牢在沉分大而弦實
浮中二候了不可得

牢主堅積。病在平內。左寸之牢。伏梁為病。右寸之勞

息責可定。左關見牢。肝家血積。右關見牢。陰寒痞

癖。左尺牢形。奔豚為患。右尺牢形。疝瘕痛甚。以其
在沉

分故悉屬陰寒。以其
形強實。故咸為堅積。

散脉 散脉浮亂有表無裏
中候漸空。按則絕矣。

散為本傷。見則危殆。左寸之散。怔忡不臥。右寸之散。

自汗淋漓。左關之散。富有溢飲。右關之散。脹滿熱

壞。居于左尺。北方水竭。右尺得之。陽消命絕。腎脉
本沉

而散脉按之不可得見
是先天資始之本絕也。

證治大還 診視近纂 牢脉 亢 貞白堂
卷下

乳脉 乳乃草名。絕類慈葱
浮沉俱有。中候獨空。

乳脉中空。故主失血。左寸呈乳。心主喪血。右寸呈乳。

相傳陰亡。乳入左關。肝血不藏。乳入右關。脾血不

攝。左尺如乳。便紅為咎。右尺如乳。火炎精竭。脉以
血為

形乳脉中空
故主脫血

伏脉 伏為陰伏。更下于沉
推筋着骨。始得其形。

伏脉為陰。受病人深。伏犯左寸。血鬱之愆。伏于右寸。

氣鬱之殃。左關值伏。肝血在腹。右關值伏。寒凝水

穀。左尺伏見。疝瘕可驗。右尺伏藏。少火消亡。傷寒
一手

脉伏為單伏兩弄伏為雙伏火邪內鬱不得發越
乃陽極似陰必自有人汗而解不必發汗陰症脉
伏須用

疾脉 疾為疾急數之至極
疾為陽極陰氣欲竭脉號離經虛魂將絕漸進漸疾
旦夕殞滅左寸居疾弗戢自焚右寸居疾金被火
乘左關疾今肝陰已絕右關疾今脾陰消竭左尺
疾耶涸轍難濡右尺疾耶赫驤過極傷寒熱極方
察虛德陰陽易病如
見此脉其死必矣

結脉 結為凝結緩時一止
徐行而怠頗得其旨

證治大遺

卷下 診視近纂 伏脉

車 貞白堂

結屬陰寒亦因凝積左寸心寒疼痛可決右寸肺虛

氣寒凝結左關結見疝瘕必現右關結形痰滯食

停左尺結今痿癰之疴右尺結今陰寒為楚

者為積聚無力者是真氣衰弱達其運化之常唯
溫補為正治止數頻多參伍不調為不治之症

諸病宜脉忌脉

傷寒未汗宜陽脉忌陰脉已汗宜陰脉忌陽脉中

風宜浮遲忌急數咳嗽宜浮濡忌沉伏喘急

宜浮滑忌短澹水腫宜浮大忌沉細頭痛宜

浮滑忌短澹心痛宜浮滑忌短澹腹痛宜沉

細忌弦長腹脹宜浮大忌沉小消渴宜數大

忌虛小痿痺宜虛濡忌緊急癥瘕宜沉實忌

虛弱癲狂宜實大忌沉細吐血宜沉小忌實

大衄血宜沉細忌浮大脫血宜陰脉忌陽脉

腸澼宜沉小忌數大下痢宜沉細忌浮大

霍亂宜浮洪忌微遲虛損宜更緩忌細數墮

傷宜堅緊忌小弱金瘡宜微細忌緊急癰疽

宜微緩忌滑數中惡宜緊細忌浮大中瘴宜

洪大忌微細新產宜沉滑忌弦緊帶下宜遲

證治大遺

卷下 診視近纂 宜忌脉

車 貞白堂

滑忌急疾崩漏宜微弱忌實大蠱蝕宜虛小

忌緊急

怪脉

雀啄脉連三五至而歇歇而再至如雀啄食脾絕也

屋漏脉良久一至如屋漏水之狀腎絕也彈

石脉從骨間劈劈而至如指彈石腎絕也解索脉

散亂如解繩索精血竭絕也鯁游脉沉時忽一

浮如鯁游靜中一躍神魂絕也魚翔脉浮時忽

一沉如魚翔之似有似無命絕也釜沸脉如釜

中水。火然而沸。有出無入。陰陽氣絕也。

男女脉異

男子以陽為主。故寸脉常旺于尺。若兩寸反弱。尺反盛。腎不足也。女子以陰為主。故尺脉常旺于寸。若兩尺反弱。寸反盛。上焦有餘也。

女人脉

陰捕陽別謂之有子。尺中陰脉搏大與寸部之陽脉迥別也。手少陰脉

動甚者。妊子也。心主血。三部脉浮沉正等。無他

病而不月者。為有妊也。左疾為男。右疾為女。

證治大還

診視近纂 男 女 脉 異 卷下 貞白堂

尺脉左大為男。右大為女。

反關脉

脉不行于寸口。由列缺絡入臂後。手陽明大腸經也。不正行于關上。故曰反關。必反其手而診。乃見左手得之主貴。右手得之主富。左右俱反。富而且貴。男女皆然。

政運有不應之脉

不應沉細也。至沉細之極。則幾于不可見矣。覆病者之手。而診乃見。凡值此不應之脉。歲運合宜。命曰

天和之脉。不必求治。甲巳二年為土運。南政。如

遇少陰司天。則兩寸不應。厥陰司天。則右寸不應。

太陰司天。則左寸不應。少陰在泉。則兩尺不應。

厥陰在泉。則右尺不應。太陰在泉。則左尺不應。

已丙丁戊壬癸庚辛。八年皆為北政。如遇少陰司

天。則兩尺不應。厥陰司天。則右尺不應。太陰司天。

則左尺不應。少陰在泉。兩寸不應。厥陰在泉。右

寸不應。太陰在泉。左寸不應。凡遇病人不拘寸關

應而反浮大當浮大。反浮細俱為不治之脉。

證治大還

診視近纂 不應厥 卷下 貞白堂


五運司天

壬午歲 少陰君火司天 辰戌歲 太陽寒水司天

寅申年 陽明燥金在泉 卯酉年 陽明燥金在泉

丑未年 太陽寒水在泉 巳亥年 太陽寒水在泉

仰人骨度部位圖




論治大還

診視近纂
卷下

仰人伏人
種

貞白堂

伏人骨度部位圖



十一 經絡 一 手之三陰從臍走手

肺手太陰經歌

手太陰脉起中焦 下絡大腸循胃口 上膈屬肺

從肺系橫出腋走脇內行主少陰心主前

下肘循臂入寸口 上循魚際出大指 其支絡者

從腕後 直出次指內廉端 交手陽經絡絡剖

大腸手陽明經歌

手陽明起次指端循指上出合骨間兩筋之中

循臂上入肘外廉臑外廉上肩髃骨前廉出

證治大還

診視近纂
卷下

經歌

三

柱骨會入缺盆邊
絡肺下膈屬大腸
支從缺盆

頰頰連
入下齒中出挾口
人中左右鼻孔擗

胃足陽明經歌 足之三陽從頭之足

足陽明起鼻交頤 旁約太陽之脉達 循鼻外入

上齒中 挾口攬辱承漿撮 卻循頤後出大迎

頰車耳前客主人
循髮際兮至額顙
支者大迎

下人迎 循喉嚨入缺盆通 下膈屬胃絡脾宮

南者缺盆下乳內 下挾臍入氣街中 支者起于

胃口下循腹裏下合氣衝以下髀關抵伏兔

膝膕循胛下足跗 一入中指之內間 一指下廉

入外間 其一指者別跗上 入太指間出其端

脾足太陰經歌 足之三陰從足走腹

足太陰起大指端 循指內側白肉間 過核骨後

入內踝 上踰胛後厥陰前 上膝股內前入腹

極脾絡胃上膈咽 連舌本兮散舌下 支從胃膈

注心用

心手少陰經歌

手少陰起心中央 屬心下膈絡小腸 支從心咽

證治大還 診視近纂 經歌 真白堂

繫目系 直復從心卻上肺 下出腋下下循膈

行太陰後下肘臂 後抵掌後銳骨端 入掌後廉

小指內

小腸手太陽經歌

手太陽起小指端 循手外側上腕臂 出踝直上

循臂骨 出肘內側兩筋間 循臑出肩繞肩胛

交臂上入缺盆邊 絡心循咽下貫膈 抵胃仍屬

小腸焉 支從缺盆頸上頰 至目銳皆入耳關

支別頰上頰抵鼻 至目內眥斜絡顙

膀胱足太陽經歌

足太陽脉起於目 內眥上額交頂巔 支者從巔

至耳上 直者從巔絡腦還 別項肩脊抵腰脊

絡腎仍屬膀胱焉 支者從腰下挾脊 貫髖入膈

中相連 支者從膈左右別 貫脾挾脊過髀間

循髀外從後廉下 合膈中下貫踰間 出外踝後

循京骨 直至小指外側端

腎足少陰經歌

足少陰起小指下 斜走足心然骨鄉 下循內踝

證治大還 診視近纂 經歌 真白堂

骨之後 別入跟中上踰臑 出膈內廉上股內

貫脊屬胃絡膀胱 直從腎上貫肝膈 入肺循喉

挾舌傍 其一支者從肺出 絡心直注胸中堂

心主手厥陰經歌

心主手厥陰經者 心包絡脉起胸臑 其脉出屬

心包絡 下膈歷絡通三焦 支者循胸出脇腋

三寸抵腋下循膈 內行太陰少陰間 入肘下臂

兩筋交 入掌中循中指出 支別掌循名指跑

三焦手少陽經歌

三焦手少陽之脉 起于小指次指端 上出兩指
循手腕 出臂之外兩骨間 貫肘循臑上肩胛
足少陽之後焉 入缺盆兮布膻中 散落心包
心主宮 下膈徧屬三焦腑 支從膻出缺盆冲
上項繫耳後直上 出耳上角以屈從 下額至頤
而已矣 支從耳後入耳中 耳前過客主人接
前交頰至目銳逢

膽足少陽經歌

足少陽起目銳眦 抵頭耳後循頸奔 行少陽前
證治大還 診視近纂 經歌 元 貞白堂

至肩 上 交少陽後入缺盆 支從耳後入耳內
出走耳前銳眦根 支別銳眦下大迎 合手三陽
抵頤繫 下頰車兮復下頤 合缺盆兮下胸庭
貫膈絡肝仍屬胆 循脇裏出氣街行 繞毛際橫
入髀厭 直者從盆下腋膺 過季脇下合髀厭
下循髀陽出膝膕 外廉之下外輔骨 直抵絕骨
之端存 出外踝之前足跗 上入小指次指分
支者別跗入大指 遠循大指岐骨行 內出其端
貫爪甲 直出三毛屬胆經

肝足厥陰經歌

厥陰之脉起大指 叢毛之際足跗從 上廉去內
踝一寸 上踝交出大陰逢 上膈循股入毛際
過陰器抵小腹中 挾胃屬肝絡胆府 貫膈布脇
循喉嚨 上入頤頰連目系 出額與督會巔宗
支從目頰環唇內 復從肝膈注肺宮

督脉

督脉少腹骨中起 女繫廷孔絡陰器 篡間篡後
別繞髀 至少陰與巨陽幸 少陰上股內後廉

證治大還 診視近纂 經歌 元 貞白堂

貫脊屬腎太陽次 起目內眦上額巔 上入絡腦
下項肩 挾脊抵腰脊絡腎 男子循莖至篡間
其一少腹直土者 貫臍心入喉咽邊 環唇上
兩目下 任督二脉本一焉

任脉

任脉起于中極下 以上毛際循腹舍 上關元兮
至咽喉 上頤循面入目罅 為病男子結七疝
女子帶下及瘕聚

督由會陰而行背 任由會陰而行腹

頤頤俗名兩太陽頤音摠面黃肌瘦

齒牙小者在前面爲齒大者在後面爲牙

目內眦
角
咽
飲食者

頽頽音杭爽
咽頽也

肩解臂上兩

巨骨
橫骨
膺上
膺也
膺前

鳩尾蔽心骨也

中 季臘下
空軟處 肝大腸

子

鷓鴣骨 音思骨
肉之端

纂前門後
下極

肘臂中
曲處
腕之交

脾
腿也
大

臍
也

膾
 腿音象下
 肚也
 非
 腿音象下
 肚也

絕骨
尖骨

骸苦音 臚問音

一手
頤
蓋骨

捷骨上
輔骨
骨出夕

覆音核足大指大節後側圓骨

高骨

足岐骨 大指本節後也

100

經緯

貞白堂

藥理近考小序

診病之脈貴通其神治病之源務明其藥寒熱溫涼
平明其氣也酸寒鹹苦辛明其味也燥潤緩急剛柔
補瀉疎散攻發通利收斂明其性也然後以人之虛
實老少男女強弱消息其致病之由窮之以七方十
劑之道汗吐下之法以臨其證苟有一線之挽者豈
不能直中肯綮出幽壑而登春臺起沈疴而回元氣
耶用是而備藥理近考纂

證治大還

藥理近攷
小叙

身白堂

陳氏藥理近考 卷上

雲間陳 治三農述

男 枳璣先 全閱
師柴羔愚

三韓張 鏞元聲叅 門人

姚廷讓子遜 全訂
范 崧壽民

學者醫理既明脈法洞悉尤宜用藥切近庶幾治疾
有當自古聖賢皆參透精微而垂諸典要以便後
世好學之士從此而得心應手苟非探賾索隱焉
能遵聖學而起沉疴乎余故採取羣珍以樹寶林
證治大還 藥理近考 補法 一 身白堂
之意公諸同志毋哂管窺

補法

虛則補之正氣奪則虛人參 黃芪 白朮 甘草
補氣藥也歸芍地黃補血藥也二門相稱歸地補
陰藥也附子 茯苓 鹿膠 兔絲 補陽藥也
精不足者補之以味乃天地生成之味非烹飪調
和之味也如羊肉黑豆之類 黑瘦人腸胃時燥
口乾渴髮鬚枯悴儼膚不澤筋骨疼夜甚陰血
虛津液不足常用潤劑燥藥宜禁四物二冬花粉

為主。肥白人。行則氣促。腠理不密。自汗時出。四肢倦怠。屬氣虛有溼。痰宜燥劑。忌潤劑。必以參朮芪草。益氣為主。產後氣血大虧。大補為主。須分氣血。今人止以四物增減。倘脾胃弱而氣不足者。寧不戕人。老人亦以補養為主。有外感。補中益氣。加芍蘇羌防等。解散邪去熱淨而止。內傷飲食。參朮補脾。兼以消導。痰火咳嗽。加化痰藥。冬月先發散。一切病後。瘡疽後。有外感及內傷者。悉從此法。助正伐邪。不傷氣血。可保無虞。稟賦怯弱者。心腹飽脹。不能運化。飲食四肢痿弱。怠惰嗜臥。九竅不利。面黑痿黃。補中益氣。增減以甘補之。是也。大忌尅伐。心虛者。兩寸微洪。善悲怔忡。口乾煩悶不寧。古用澤瀉炒鹽以鹹補之。不若人參茯神。柏子仁。菖蒲為佳。補心丹最的。一說虛則補其母。陳皮生薑。肝虛者。目眩無所見。耳無所聞。善恐。如人將捕之。筋痿不用。陰痿面青白。脉弦細無力。古方用陳皮生薑。以苦補之。大抵肝氣常有

餘肝血常不足。古方補母。用熟地黃。黃柏及錢氏地黃丸。是滋陰血也。肺虛者。鼻塞不利。少氣自汗。喘咳。面色淡白。毛焦落。久病產後。及瘡腫出膿。後發喘是也。必用人參。麥冬。五味。甘益氣。酸補肺也。錢氏補肺。阿膠散中。有甘草。兜零。糯米。正合此義。第不若生脈散多効爾。腎有二水。中有火。枯榮秘結。小便淋瀝。相火上炎。兩尺洪大。夢遺盜汗。耳鳴。是天乙真水不足。當滋陰六味地黃丸之類。兩尺微弱而瀉。四肢痿厥。腰膝痠食少。及不消。化腰似折。小腹痛。是元陽虛。德真火微也。人參。枸杞。兔絲。桂附。鹿茸。鹿膠之類。曰氣。曰血。曰精。曰津。液一或不足。當先理脾胃。若脾胃不和。食少不能生化。精血。縱加峻補。不能成功。昧者。但知四物養血。謂參朮不可用。肅之甚矣。大抵邪之所處。其氣必虛。木必先腐。而後蟲生。牆壁堅固。賊自難入。醫家若不審脾胃。元氣精血。妄加尅伐。涉虛之人。鮮有不致于危者。余家世業醫。目擊其弊。特為拈出。明哲幸諒之。

瀉法

實則瀉之邪氣盛則實六淫客邪外感七情飲食內傷爲痰爲火爲癰爲積或汗而散或吐而達或下而瀉或刺以決之或灸以劫之使邪氣早退正氣得復是瀉法不得妄談也謹錄于左內經曰辛甘發散爲陽花味辛藥則散桂枝麻黃乾薑生附辛熱發汗藥也大寒淫客于表者用之羌獨芷朴蒼朮芎蘇辛溫藥也感冒輕者用之石膏薄荷黃芩升麻葛根辛涼藥也內外熱盛者用之

證治大還

藥理近考 瀉法 四 貞白堂

汗法

按諸書汗法也 汗法 按諸書汗法也

風寒客于人體人毫毛畢直皮膚閉而爲熱頭痛惡寒四肢拘急脈浮而緊是爲表症宜辛以散之得汗而解冬月麻黃湯他時大羌活湯增減咳嗽寒包熱者同法 淫流關節身痛脈沉當取微汗風溼相搏一身盡痛不可大汗 胃虛過食冷物抑遏陽氣于脾土之中蒸蒸發熱升陽散火湯火鬱發之也 風熱拂鬱于表或成疹斑或生瘡疥一切咽痛齒痛風腿痛淫痰流注瘡疽初起四

肢拘急惡寒發熱悉宜取汗敗毒散加減最穩小兒痘疹亦同 中酒當出汗古方用葛花解醒是也

北人冒寒頭痛寒熱用有力人將病者兩手極力揉按至手指尖以針或磁石砭去惡血卽愈卽前砭針取汗法也

傷寒過經熱不止或發汗不微用紫蘇煎湯取一大壺置被中接汗內服辛涼藥卽出

不可汗

證治大還

藥理近考 汗法 五 貞白堂

左脈微弱 小便淋不可汗汗之必便血 諸失血家 腹中有動氣 產後 潰瘍 年高諸病久氣虛血虛人候汗卽發喘或筋惕肉瞤手足振掉等危症 咽痛 奪血者無汗奪汗者無血瘡家不可汗 陰虛脈細數遺精咳嗽勞瘵 夏暑時汗多亡陽 不當汗而汗之津液枯槁而死 月水三禁不可汗吐下

吐法

引延 延取嚏迫 凡上行者皆吐法也

在上者因而越之 尺脈有力強健者宜吐食滯中

腕展悶惡心頭痛身熱有如傷寒。寸口脈滑盛。急以鹽湯探吐。中風痰涎壅盛不能言語不遺尿。脈滑實有力者稀涎散吐之。小水不通痰滯胸膈不得下降。升柴二陳二朮湯探吐。氣虛秘者補中益氣湯先服後吐。妊娠轉胞小水不通參朮煎服探吐。肝氣鬱結心下中脘痛悶脈細結不下食者羅蔔子煎湯探吐。淫痰痛風用杉木煎湯吐。癰癩痰涎上潮小兒驚風脈滑人健而實者三聖散吐之。傷寒三四日邪傳胸膈懊憹證治太還

藥理近考 吐法 六 貞白堂

不得眠是實。瓜蒂散或梔子豆豉湯吐之。

風痰頭痛百法不應久之則傷日瓜蒂散或青黛散。

搐鼻吐之。暴嗽風涎上湧咽塞不利茶調散吐之。

瘧久不止心中脹悶脈滑實者四散飲吐之。

膏梁人多食生鱗因而生蟲發嘔面上白班時作時止藜蘆散吐之。

久患癰疽則痛不快噎食不下獨聖散加蝎稍半錢吐之。

急痛體厚淫痰盛者神應散吐之。

偏枯痰盛逆風散吐之。

頭風後有目疾有半明可救者防風散

吐之。胸膈滿背痛或臂疼可用祛風湯吐之後服烏藥散。厲風瘡癰惡瘡三聖散吐之後服苦參丸。一切暴厥中氣中風脈沉實滑數有神不省人事不遺尿者用神聖散鼻內灌之吐出涎立醒。破傷風牙關緊急角弓反張亦用神聖散吐之。

豆豉梔子芽茶苦參各連瓜蒂吐胸中之熱痰。礬

鹽酸鹹吐膈上之頑痰。輕粉鬱金桔梗吐胸中

之鬱結痰。烏頭尖附子尖吐胸中之寒痰。皂

證治太還

藥理近考 吐法 七 貞白堂

角蝎稍吐胸中之風痰。

丹溪取吐法。先以布搭脾勒肚腹於不通風處行

之。探吐將鴉翎桐油浸二三日卻以皂角洗淨

曬乾待用。逆流水和藥取吐佳。凡藥升上者

皆可吐。如防風桔梗芽茶山梔川芎蘿蔔子以薑

汁醋少許瓜蒂散少許入藥汁溫服以鴉翎子喉

中探即吐。

吐食積痰用蘿蔔子五合油炒插入漿水瀝汁入桐

油白蜜少許旋旋半溫服下以鴉翎探。

蝦汁引涎法見中風門肥人溼痰盛益氣散薑汁調吐

子和稀涎散

猪牙皂角

不蛀者去皮弦一兩 綠礬 五錢 藜蘆 半兩

右爲細末每服半錢或一二錢碎開口漿水調灌之

吐藥

桔梗蘆

人參蘆 虛人用此 艾葉 木茶 瓜蒂

附子尖

藜蘆 砒

證治大還

藥理近考 吐藥 卷上

八 貞白堂

此數味皆自吐不用探法

三聖散

防風

二兩 瓜蒂 揀淨炒微黃三兩 藜蘆 一兩

右爲粗末每服約半兩以薑汁三茶匙煎三五沸

去薑汁次入水一盞煎三沸將薑二盞同一處熬

二沸去渣澄清放溫服以吐爲度

丹溪方用

鬱金

半兩

藜蘆

一錢

苦參

一錢

右爲末薑汁調吐如吐不止嚼丁香一粒卽止又

不止葱白湯呷之

仲景瓜蒂散

凡用瓜蒂良久涎未出者含砂糖一塊下咽卽引

涎吐出 瓜蒂卽甜瓜蒂也用近皮半寸許暴乾

用法每用一二錢加膩粉一錢水調之吐風痰

佳

二仙散

瓜蒂

好茶

各等分

右爲細末每服二錢薑汁調下空心用之

吐劑用瓜蒂等藥不透者必用熱藥攻之後方

證治大還

藥理近考 吐藥 卷上

九 貞白堂

碧霞丹

石綠

細研飛

附子尖

川烏尖

錫稍

各七

右爲末入石綠和勻糊丸鷄頭大每服薄荷汁半

盞下一丸再用半盞須臾大吐

獨聖散

用砒不以多少研細每服一錢以新汲水

調下

經驗吐哮喘方 用砒一錢麝二兩清水和捏餅香

油煎黃爲末用一錢江茶末三錢調勻五更井水

下如不吐可添半錢次日服

凡服吐藥不吐。以藜汁投之。不動續續投之。無不吐者。吐後昏憤。切勿驚疑。如頭眩難忍。飲童便或
自便或凉水一口佳。

凡服草木藜蘆瓜蒂等吐不止者。飲麝香湯即止。
葱白湯止藜蘆吐。石藥吐不止。甘草貫衆湯止
之。服砒不止。地漿水解之。冷菜豆湯新汲水俱
佳。

不可吐

凡中脈微弱兩寸不滑。胸膈不悶。不可吐。脾胃素
虛。面色痿黃。右寸大而無力。不可吐。中氣虛而
痞脹不能運化。不可認為實。誤吐禍不旋踵。大都
邪在上焦。痰涎積滯中脘。阻礙升降。脈實有神者。
非吐不可。若吐而不吐。是養病以防身也。涉虛者
禁之。

吐後惟忌飽食。酸鹹硬物乾物油膩之物。吐後心火
既降。陰道必強大。禁房室。悲憂病人既不自責。必
歸罪于吐法也。不可吐者。有八性。剛暴好怒。喜淫
者。病勢已危。若弱氣衰者。吐不止者。陽敗血虛。

者吐血。咯血。衄血。嗽血。崩血。濁血。者。病人粗知醫
書。不辨邪正者。病人無正性。反復不定者。左右多
嘈雜之言者。皆不可吐。吐則轉生他病。反起謗端。
雖懇切求之。不可強從也。

下催生下乳磨積逐水破經洩氣凡下行者皆
下法也

內經曰。中滿者瀉之于內。又曰。土鬱奪之。謂下之。今
其疎泄也。積滯痰飲鬱于腸胃。流于四肢。為痛為
腫。為痞。為塊。便溺阻塞。氣血凝滯。須下以通其塞。
惟脈滑弦數有力。症兼脹痛。不得已而行。乃可須。

證治大還藥理近考 不可吐 土 貞白堂
卷上 三

審輕重虛實寒熱。若一槩妄治。是殺人速于刃爾。
下熱實

傷寒表邪傳裏。腸胃燥結。三焦俱傷。腹中痞滿。大腸
燥實。七八日不大便。繞臍硬痛。外見口乾舌燥。舌

上邊黃。中黑。脈沉數有力。為裏症。即大實結。腹大

承氣湯主之。邪在上焦。則為痞實。小承氣湯。

邪在中焦。則有燥口乾腹中堅按之三症調胃
燥也實滿

承氣湯主之。邪熱結于血分。其血必結。在男子

則為下血。譫語。小腹硬痛。小水自利。桃仁承氣湯

主之。 女人則經水適來適斷日晡如狂小柴胡加芩歸桃仁泥消導滯血忌汗下表熱未靜裏症又急謂舌乾口燥硬痛也不得不下大柴胡湯通表裏而緩治之 虛結年高病久產後切忌大下內傷元氣不足有食停滯當補瀉兼施補中益氣加大黃潤之 血少腸胃乾燥多日不大便左脈濇小口乾者導滯通幽湯倍麻仁甚者加熟大黃或間服潤腸丸妙

下寒實結

證治大還

藥理近考 下 主 貞白堂

寒痰鬱于中脘或過食寒涼肉食極粽心下硬痛手不可近必用巴豆丸或備急丸通之斬關奪門之將不可不用也傷寒寒實結胸仲景三物白散用貝母桔梗巴豆

下水結

傷寒飲水過多水停心下或脾中溼痰鬱而為水脹滿喘腫面浮脈實數有力者十棗湯瀉之。中滿腹脹喘嗽淋閉積飲拂鬱不得宣通二便阻塞脈弦數有力及肢體腫痛走注舟車神祐丸最捷中病

即止不必盡劑也 濕痰伏于肌肉為腫為痛津液不得宣通二便秘結大聖瀉川散主之

下積痰

食積痰飲膠固于腸胃為痛為痞吞酸滿悶阻礙升降脈滑實弦數有力者木香枳榔丸下之腸胃秘而不通津液不能流布也神芎丸下之

下蟲積

心腹築痛唇紅能食面上白斑或偏嗜一物生米燒酒之類是蟲積萬應丸下之 大抵下法止可施

證治大還

藥理近考 下 主 貞白堂

于初起胃氣未傷元氣尚壯脈實有力之人稍虛者即當扶助正氣消息推蕩之所謂養正積自除也慎勿猛浪戕人天年

木香枳榔丸 流溼潤燥推陳致新兼下食積

木香 枳榔 青皮 廣茂 枳殼 黃連 各五錢

黃栢 一兩 大黃 一兩 黑牽牛 半兩

水九量輕重分兩

神芎導水丸導溼熱通腸胃大便不實者忌之

黃芩 黃連 半兩 大黃 二兩 川芎 半兩 黑牽牛 四兩 滑石 兩

四薄荷五錢

舟車神祐丸 洩水溼痰飲

甘遂一兩醋炒 大戟一兩醋炒 芫花一兩醋炒 大黃二兩輕粉一錢

青皮 陳皮 木香 枳榔各半兩 用水丸

不可下

下多亡陰 不當下而下之令人開腸洞泄便溺

不禁而灰 年高產乳 表邪未淨 亡血家

潰瘍 動氣 惡心 宿滯未熟

五臟瀉法

證治大遺

藥理近考 五臟瀉法 古 貞白堂

五志過極五味過傷則火動而偏勝宜分經瀉之

大怒則火起于肝肝盛則夢山林樹木兩脇痛引

少腹脈弦數古方瀉青丸為對症藥或柴胡醋炒

青皮梔子龍膽草煎服佳甚者當歸龍薈丸肝家

溼熱盛者龍膽瀉肝湯以酸瀉之白芍藥 多喜

則心實胸中痛脇滿咳不休口舌乾燥狂亂不眠

夢見丘山煙火古方以甘瀉之用甘草如無他症

錢氏方中重則瀉心湯輕則導赤散 思慮不節

厚味不謹則脾盛脾盛則夢歌樂身重不舉病寒

氣不利古方以枳實瀉之或錢氏瀉黃散實者瀉

其子用桑皮瀉肺 積熱痰涎客于肺則肺盛肺

盛則夢哭喘咳右脇脹痛古方桑白皮瀉之或瀉

白散實則瀉其子用澤瀉 五臟惟腎無瀉法以

腎常不足也古方澤瀉瀉腎是引下焦濁火從小

便洩去非瀉腎也不可不知

瀉青丸

龍膽草酒炒 羌活 防風 梔子 川芎 當歸

大黃酒炒各等分

證治大遺

藥理近考 五臟瀉法 圭 貞白堂

有為細末蜜丸雞頭大每服一丸竹葉砂糖湯下

海藏云東垣先生治癰後風熱毒攻目翳膜遮睛

用此瀉之大効

瀉心湯

黃連一味為細末每服二分至五分甚者一錢臨

睡溫水下

導赤散 引火從小腸出也

生地 甘草稍 木通 各等分為末每服三錢

竹葉湯煎服

瀉黃散 海藏云此劑瀉脾熱

藜香七錢 山梔子一兩 石膏半兩 甘草二兩 防風四兩

右剉蜜酒微炒香為細末每服二錢水煎清汁服瀉白散

桑白皮一兩 地骨皮一兩 甘草半兩

右為細末每服二錢水一盞入粳米百粒同煎食後服易老加黃連 海藏云肺熱骨蒸宜此余意骨蒸多屬陰虛若肺風熱伏鬱固宜瀉之肺火盛須枯芩梔子骨蒸肺家氣盛者乃可用

論治大還 藥理近考 麻桑 共 貞白堂

正治從治

治寒以熱治熱以寒此正治也熱病而反用熱攻寒病而反用涼劑乃從治也且聲不同不相應氣不同不相合大寒大熱之病必能與異相拒善治者乃反其佐以同其氣復令寒熱參合使其始同終異也如熱在下而上有寒邪拒格則寒藥中入熱藥為佐內經曰若調寒熱之逆冷熱必刑則熱藥冷服下膈之後冷體既消熱性隨發寒在上而上有浮火拒格則熱藥中入寒藥為佐下膈之後

熱氣既散寒性隨發情且不違而致大益病氣隨

愈嘔煩皆除正內經所謂寒因熱用熱因寒用必

伏其所主而先其所因其始則同其終則異之義

如伏寒在胃嘔吐不納是虛火泛上古方用炮薑

理中湯水浸冷服又如傷寒少陰症瀉不止厥逆

無脈乾嘔煩悶不內藥白通湯加豬膽汁之類是

也先賢譬之人間之火可以濕伏可以水滅病之

小者似之大者則若龍雷之火逢濕則燄見水菴

燔太陽一照火即尋滅亦此理也

論治大還 藥理近考 正治從治 共 貞白堂

五臟五味補瀉

肝苦急急食甘以緩之玉莖中痛用甘草稍是緩之也欲散急食辛以散之以酸瀉之藥以辛補之

細辛實者瀉其子甘草虛則補其母地黃

心苦緩急食酸以收之五味欲爽急食鹹以爽之芒硝

以甘瀉之甘草以鹹補之黃芩實則瀉其子甘草

虛則補其母生薑

脾苦濕急食苦以燥之白朮欲緩急食甘以緩之甘草

以苦瀉之黃連以甘補之人參實則瀉其子白朮

皮虛門

肺苦氣急食苦以泄之黃柏子欲收急食酸以收

之藥以辛瀉之桑白皮以酸補之五味子實則瀉其

子澤瀉虛則補其母五味子

腎苦燥急食辛以潤之黃柏知母欲堅急食苦以堅之知母

以鹹瀉之澤瀉以苦補之黃柏實則瀉其白芍

虛則補其母五味子

張元素曰凡藥之五味隨五臟所入而為補瀉亦不

過因其性而調之酸入肝苦入心甘入脾辛入肺

證治大還

藥理近考

五臟補瀉

文

鹹入腎辛散酸收苦燥甘緩鹹寒淡滲五味之本

性一定而不可變者其或補或瀉則因五臟四時

而迭相施用者也溫涼寒熱四氣之本性也其于

五臟補瀉亦迭相施用也此特絮古因素問飲食

補瀉之義舉數藥以爲例爾學者宜因意而究之

引經報使

手少陰心

黃連

手太陽小腸

黃藥

足少陰腎

細辛

手太陰肺

桔梗

手陽明

白芷

大腸

升麻

足太陰脾

葛根

足陽明胃

升麻

石腎 葛根 手厥陰心主 柴胡 丹皮 足少陽膽 柴胡 青皮 吳茱萸 手少陽三焦 連翹 柴胡 上地骨 川芎 柴胡 皮中 青皮 下附子

臟腑標本虛實用藥式

肝藏血屬木膽火寄于中主血主目主筋主呼主怒

本病諸風眩運僵仆強直驚癇兩脇腫痛胸肋滿痛

嘔血小腹痛痛痞瘕女人經病

標病寒熱瘧頭痛吐涎目赤面青多怒耳閉煩腫筋

學卵縮丈夫癰疔女人少腹腫痛陰病

有餘瀉之

證治大還

藥理近考

用藥式

文

貞白堂

瀉子甘草

行氣香附 芎藭 瞿麥 牽牛 青橘皮

行血花紅 鱉甲 桃仁 義蓬 京三稜

穿山甲 大黃 水蛭 蜚蠊 蘇木

牡丹皮

鎮驚雄黃 金薄 鐵落 珍珠 代赭石

夜明砂 胡粉 銀薄 鉛丹 龍骨

石決明

搜風羌活 荆芥 薄荷 槐子 蔓荊子

白花蛇	獨活	防風	皂莢	烏頭
白附子	僵蠶	蟬蛻		
不足補之				
補母枸杞	杜仲	狗脊	苦參	熟地黃
兔絲子	草薢	阿膠		
補血當歸	牛膝	續斷	血竭	白芍藥
沒藥	芎藭			
補氣天麻	白朮	蔥花	細辛	密蒙花
栝子仁	決明	生薑	穀精草	
證治大還	藥理近考	用藥式	手	貞白堂
本熱寒之				
瀉木芍藥	烏藥	澤瀉		
瀉火黃連	黃芩	苦茶	豬膽	龍膽
攻裏大黃				
標熱發之				
和解柴胡	半夏	解肌桂枝	麻黃	
心藏神爲君火包絡爲相火代君行令主血主言主汗主笑				
本病諸熱驚癇感謔妄煩亂啼笑罵怔忡健忘自				

汗諸痒瘡瘍				
標病肌熱畏寒戰慄舌不能言面赤目黃手心煩熱胸脇滿痛引腰背肩肘臂				
火實瀉之				
瀉子黃連	大黃			
氣甘草	人參	木通	黃蘗	赤茯苓
血丹參	牡丹	生地	玄參	
鎮驚硃砂	牛黃	紫石英		
證治大還	藥理近考	用藥式	手	貞白堂
補母細辛	烏梅	生薑	陳皮	酸棗仁
氣桂心	澤瀉	茯神	遠志	白茯苓
石菖蒲				
血當歸	乳香	熟地	沒藥	
本熱寒之				
瀉火黃芩	竹葉	芒硝	炒鹽	麥門冬
涼血地黃	梔子	天竺黃		
標熱發之				
散火甘草	獨活	麻黃	柴胡	龍腦

脾藏智。屬土。為萬物之母。主營衛。主味。主肌肉。主四肢。

本病諸淫腫脹。痞滿。噫氣。大小便閉。黃疸。癰飲吐瀉。霍亂。心腹痛。飲食不化。

標病。身體肘腫。重困嗜臥。四肢不舉。舌本強痛。足大趾不用。九竅不通。諸瘕項強。

土實瀉之。

瀉子詞子 防風 葶藶 桑白皮

吐 豆豉 枳子 常山 瓜蒂 蘿蔔子

證治大還

藥理近考

用藥式

重 貞白堂

鬱金 薑汁 藥汁 苦參 赤小豆 鹽湯

苦茶

下 大黃 芒硝 大戟 甘遂 青礬石

續隨子 莞花

上虛補之

補母桂心 茯苓

氣 人參 黃耆 升麻 葛根 甘草

陳橘皮 藿香 葳蕤 縮砂 木 扁豆

血 白朮 蒼朮 白芍 膠飴 大棗 乾薑

木瓜 烏梅 蜂蜜

本淫除之

燥中宮 白朮 蒼朮 橘皮 吳茱萸 半夏

南星 芥子 草豆蔻

潔淨府 木通 猪苓 藿香 赤茯苓

標淫滲之

開鬼門 葛根 蒼朮 麻黃 獨活

肺藏魄。屬金。總攝一身元氣。主聞。主哭。主皮毛。

本病諸氣。膈鬱。諸痿喘。嘔氣。短欬。嗽上逆。欬吐膿血。

證治大還

藥理近考

用藥式

重 貞白堂

不得臥。小便數而欠。遺失不禁。

標病。酒漸寒熱。傷風自汗。肩背痛冷。脇臂前廉病。

氣實瀉之。

瀉子澤瀉 葶藶 桑白皮 地骨皮

除濕半夏 白礬 白茯苓 薏苡仁 木瓜

橘皮

瀉火糯米 石膏 寒水石 知母 訶子

通滯枳殼 薄荷 乾生薑 木香 厚朴

杏仁 皂夾 紫蘇梗 桔梗

氣虛補之

補母甘草 人參 升麻 黃耆 山藥

潤燥蛤蚧 阿膠 貝母 百合 麥門冬

天花粉 天門冬

欽肺烏梅 栗殼 芍藥 倍子 五味子

本熱渴之

清金黃芩 知母 梔子 沙參 麥門冬

天門冬 紫苑

本寒溫之

證治大還

藥理近考 用藥式 頁白堂

溫肺丁香 藿香 欬冬花 白豆蔻 檀香

益智 宿砂 糯米 白部

標宜散之解表麻黃 葱白 紫蘇

腎藏志 湯水為天一之源主聽主骨主二陰

本病諸寒厥逆骨痠腰痛腰冷如冰足腫肝寒少腹

滿急疝瘕大便閉泄吐利穢水液溼瀦清冷不禁

消渴引飲

標病發熱不惡熱頭眩頭痛咽痛舌燥脊股後廉痛

水腫瀉之瀉子大戟 牽牛

瀉腑澤瀉 猪苓 防風 車前子 茯苓

水弱補之補母人參 山藥

氣 知母 玄參 砂仁 補骨脂 苦參

血 黃蘗 枸杞 瑣陽 肉蓯蓉 阿膠

山茱萸 五味子

本熱攻之下傷寒少陰證口燥咽乾大承氣湯

本寒溫之

溫裏附子 乾薑 官桂 蜀椒 白朮

標寒解之解表獨活 桂枝 麻黃 細辛

證治大還 藥理近考 用藥式 頁白堂

標熱涼之清熱玄參 連翹 甘草 猪膚

命門為相火之源天地之始藏精生血降則為漏升

則為鈐主三焦元氣

本病前後痿閉氣逆裏急疝痛奔豚消渴膏淋精瀝

精寒赤白濁溺血崩中帶漏

火強瀉之瀉相火黃蘗 知母 茯苓 玄參

牡丹皮 地骨皮 生地黃 寒水石

火弱補之

益陽附子 肉桂 益智子 沉香 硫黃

破故紙 天雄 川烏頭 烏藥 胡桃

陽起石 丹砂 船茴香 當歸 蛤蚧

巴戟天 覆盆子

精脫固之溫滑牡蠣 芡實 金縷子 遠志

山茱萸 蛤粉 五味子

三焦為相火之用。分部命門元氣。主升降出入遊行

天地之間。總領五臟六腑營衛經絡。內外上下左

右之氣。號中清之府。上主納。中主化。下主出

本病諸熱。皆癰暴病。暴火暴瘡。躁擾任越。諸妄驚駭

證治大還

藥理近考 用藥式 卷上 頁一百一十五

諸血溢。血泄。諸氣逆。衝上。諸瘡瘍。痘疹。癰核

上熱則喘滿。諸嘔吐。酸胸痞。脇痛。食飲不消。頭汗

汗

中熱則善饑。而瘦解。飢中滿。諸脹腹大。諸病有聲鼓

之如鼓。上下關格不通。霍亂吐利。

下熱則暴注下迫。水液渾濁。下部腫滿。小便淋瀝。或

不通。大便閉結。下痢。

上寒則吐飲食。痰水。胸痺。前後引痛。食已還出

中寒則飲食不化。寒脹反胃。吐水。溼瀉不渴

下寒則二便不禁。腹冷。疝痛。

標病惡寒。戰慄如喪神。守耳鳴。耳聾。噎腫。喉痺。消渴

胸腫。疼痛。驚駭。手小指。次指不用。

實火瀉之汗。麻黃 柴胡 葛根 荊芥 升麻

薄荷 羌活 石膏

吐瓜蒂 滄鹽 薑汁 下大黃 芒硝

虛火補之上人參 天雄 桂心

中人參 黃耆 丁香 木香 草果

下附子 桂心 硫黃 人參 沉香 烏藥

證治大還

藥理近考 用藥式 卷上 頁一百一十六

破故紙

本熱寒之上黃芩 連翹 梔子 知母 玄參

石膏 生地黃

中黃連 連翹 生苳 石膏

下黃蘗 知母 生苳 石膏 地骨皮

牡丹皮

標熱散之解表柴胡 細辛 荊芥 羌活 葛根

石膏

膽屬木。為少陽相火。發生萬物。為決斷之官。十二臟

之主。主同肝。

本病。口苦。嘔苦汁。善太息。澹澹如人將捕之狀。目昏不眠。

標病。寒熱往來。痞瘧。胸脇痛。頭額痛。耳痛。鳴。瘰癧。結核。馬刀足。小指次指不用。

實火瀉之瀉。膽龍膽 牛膽 猪膽 生熟仁

生酸棗仁 黃連 苦茶

虛火補之溫。膽人參 細辛 半夏 炒熟仁

當歸 酸棗仁 炒 地黃

證治大還

藥理近考 用藥式 天 貞白堂 卷上 三十一

本熱平之

降火黃芩 黃連 芍藥 連翹 甘草

鎮驚黑鉛 水銀

標熱和之

和解柴胡 芍藥 黃芩 半夏 甘草

胃屬土。主容受。為水穀之海。脾土同

本病。噎膈。反胃。中滿。腫脹。吐瀉。瀉利。霍亂。腹痛。消中。

善饑。不消食。傷飲食。胃管當心痛。支兩脇。

標病。發熱。蒸蒸。身熱。身前寒。發狂。譫語。咽痺。上齒。

痛。口眼歪斜。鼻痛。鼽。衄。赤瘡。

胃實瀉之瀉。熱大黃 芒硝

飲食巴豆 神翹 山查 阿魏 硃砂 鬱金

三稜 輕粉

胃虛補之瀉。熱蒼朮 白朮 半夏 茯苓 橘皮

生薑

寒溼乾薑 附子 草果 官桂 丁香

肉豆蔻 人參 黃耆

本熱寒之降。火石膏 地黃 犀角 黃連

證治大還

藥理近考 用藥式 天 貞白堂 卷上 三十四

標熱解之解。肌升麻 葛根 豆豉

大腸屬金。主變化。為傳送之官。

本病。大便閉結。泄痢。下血。裏急後重。疽痔。脫肛。腸鳴。

而痛。

標病。齒痛。喉痺。頸腫。口乾。咽中如核。鼽。衄。自黃。手大。

指。次指痛。宿食發熱。寒慄。

腸實瀉之熱。大黃 芒硝 桃花 牽牛 巴豆

石膏 郁李仁

氣 枳殼 木香 橘皮 檳榔

腸虛補之氣 皂莢

燭 桃仁 麻黃 杏仁 地黃 乳香 松子

當歸 肉蓯蓉

淫 白朮 半夏 硫黃 蒼朮

陷 升麻 葛根

脫 龍骨 白朮 訶子 栗殼 烏梅 白礬

赤石脂 禹余糧 石榴皮

本熱寒之清熱秦朮 槐角 地黃 黃岑

本寒溫之溫裏乾薑 附子 肉豆蔻

證治大遺

藥理近考 用藥試 辛 貞白堂 三十三

標熱散之解肌石膏 白芷 升麻 葛根

小腸主分泌水穀為受盛之官

本病大便水穀不利小便短小便閉小便血小便自

利大便後血小腸氣痛宿食夜熱旦止

標病身熱惡寒噤痛頰腫口糜耳聾

實熱瀉之氣 木通 猪苓 滑石 瞿麥 澤瀉

燈草

血 地黃 蒲黃 赤茯苓 梔子 丹皮

虛寒補之氣 白朮 棟實 茴香 砂仁 神曲

扁豆

血 桂心 玄胡索

本熱寒之

降火黃蘗 黃岑 黃連 連翹 梔子

標熱散之解肌藁本 羌活 防風 蔓荊子

膀胱主津液為胞之府氣化乃能出號州都之官諸

病皆干之

本病小便淋瀝或短數或黃赤或白或遺失或氣痛

標病發熱惡寒頭痛腰脊強鼻塞足小指不用

證治大遺

藥理近考 用藥試 辛 貞白堂 三十三

實熱瀉之泄火滑石 猪苓 澤瀉 茯苓

下虛補之熱 黃蘗 知母

寒 桔梗 升麻 益智 烏藥 山茱萸

本熱利之降火地黃 梔子 茵陳 牡丹皮

黃蘗 地骨皮

標寒發之發表麻黃 桂枝 羌活 蒼朮 防己

黃耆 木賊

七方

岐伯曰氣有多少。形有盛衰。治有緩急。方有大小。又曰病有遠近。症有中外。治有輕重。近者奇之。遠者偶之。汗不以奇。下不以偶。補上治上。制以緩。補下治下。制以急。近而奇偶。制小其服。遠而奇偶。制大其服。大則數少。小則數多。多則九之。少則一之。奇之不去。則偶之。偶之不去。則反佐以從之。所謂寒熱溫涼。反從其病也。○王冰曰。臟位有高下。腑氣有遠近。病症有表裏。用藥有輕重。單方為奇。復方為偶。心肺為近。腎肝為遠。脾胃居中。腸膀胱膽亦近。遠近識見。高遠權以合宜。方奇而分量偶。方偶而分量奇。近而奇偶。制多數服之。遠而奇偶。制少數服之。則肺服九。心服七。脾服五。肝服三。腎服一。為常制也。方與其重也。寧輕。與其薄也。寧重。與其大也。寧小。是以奇方不去。偶方主之。偶方不去。則反佐以同病之氣而取之。如口瘡服涼藥不効。反喻官桂。服理中湯之類是也。完素曰。流變在乎病。

證治大還

藥理近考 七方 一

貞白堂

三言

主病在乎方。制方在乎人。方有大。小。緩。急。奇。偶。復也。制方之體。本乎氣。味。寒。熱。溫。涼。四氣生于天。酸。苦。辛。鹹。甘。淡。六味成于地。是有形為味。無形為氣。氣為陽。味為陰。辛甘發散為陽。酸苦湧泄為陰。鹹味湧泄為陰。淡味滲泄為陽。或收。或散。或緩。或急。或燥。或潤。或寒。或熱。各隨臟腑之症。而施藥之品。味。乃分七方之制也。故奇偶復三方也。大小緩急者。四制之法也。故曰治有緩急。方有大小。

證治大還

藥理近考 七方 二

貞白堂

三言

大方岐伯曰。君一臣二佐九。制之大也。君一臣二佐五。制之中也。君一臣二佐三。制之小也。又曰遠而奇偶。制大其服。近而奇偶。制小其服。大則數少。小則數多。多則九之。少則二之。完素曰。身表為遠。裏為近。大小者。制奇偶之法也。假如小承氣湯。調胃承氣湯。奇之小方也。大承氣湯。抵當湯。奇之大方也。因其攻裏而用之也。桂枝麻黃湯。偶之小方也。葛根青龍湯。偶之大方也。因其發表而用之也。故曰汗不以奇。下不以偶。張從正大方有二。有君一臣二佐九之大方。病有兼症。而邪不一。不可以三味治。

者宜之有分量大而頓服之大方。肝腎及下部之病道遠者宜之。王太僕以心肺為近腎肝為遠脾胃為中。劉河間以身表為遠身裏為近以予觀之身半以上其氣上天之分也。身半以下其氣下地之分也。中腕人之分也。

小方從正曰。小方有二。有君一臣二之小方。病無兼症邪氣專一。可以一二味治者宜之。有分兩少而頓服之小方。心肺及在上之病者宜之。徐徐細呷是也。完素曰。肝腎位遠數多則氣緩且牽制不能

證治大還

藥理近考 七方 三

真白堂

速達于下。必大劑而數少。取其迅急下走也。心肺位近數多則氣急下走不能升發于上。必小劑而數多。取其易散而上行也。王氏所謂肺服九。心服七。脾五。肝三。乃五臟生成之數也。

緩方岐伯曰。補上治上制以緩。補下治下制以急。急則氣味厚。緩則氣味薄。適其病所遠而中道氣味之者。食而過之。無越其制度也。王冰曰。假如病在腎而心氣不足。服藥宜急過之。不以氣味飼心。腎藥凌心。心復益衰矣。餘上下遠近例同。完素曰。聖

人治上不犯下。治下不犯上。治中上下俱無犯。故

曰。謀伐無過。命曰大惑。好古曰。治上必妨下。治表必連裏。用黃芩以治肺。必妨脾。用茯苓以治腎。必妨心。服乾姜以治中。必僭上。服附子以補火。必涸水。從正曰。緩方有五。有甘以緩之之方。甘草糖蜜之屬是也。病在胸膈。取其甘以緩之。有丸以緩之之方。比之湯散。其行遲慢也。有品味件多之緩方。藥衆則通相拘制。不得各騁其性也。有無毒治病之緩方。無毒則性純功緩也。有氣味俱薄之緩方。氣

證治大還

藥理近考 七方 四

真白堂

味薄則長于補上。治上比至其下。藥力已衰矣。

急方完素曰。味厚者為陰。味薄者為陽。故味厚則下泄。味薄則通氣。味厚者為陽。氣薄為陽中之陰。故氣厚則發熱。氣薄發泄是也。好古曰。治主宜緩。緩則治其本也。治客宜急。急則治其標也。表裏汗下皆有所當緩。有所當急。從正曰。急方有四。有急病急攻之急方。中風關格之病是也。有湯散蕩滌之急方。下因易散而行速也。有毒藥之急方。毒性能上涌下泄。以奪病勢也。有氣味俱厚之急方。

氣味俱厚直趨于下而力不衰也。

奇方王冰曰單方也從正曰奇方有二有獨用一物之奇方病在上而近者宜之有藥合陽數一三五七九之奇方宜下不宜汗完素曰假如小承氣湯奇之小方也大承氣抵當湯奇之大方也所謂因其攻下而為之也桂枝麻黃偶之小方也葛根青龍偶之大方也所謂因其發散而用之也。

偶方偶方有三有兩味相配之偶方有古方相合之

偶方古謂複方病在下而遠者宜之有藥合陰數

證治大遺

藥理近考

七方

五

真白堂

二四六八十之偶方宜汗不宜下王太僕言汗藥不以偶則陽氣不足以外發下不以奇則藥毒攻而致過意者下本易行故單則力孤而微汗或難出故併行則力齊而大乎而仲景制方桂枝汗藥反以五味為奇大承氣湯下藥反以四味為偶豈臨事制宜復有增損乎。

複方奇之不去則偶方是謂重方好古曰奇之不去複以偶偶之不去複以奇故曰複複者再也重也所謂十補一瀉數瀉一補也又傷寒見風脈傷風

見寒脈為脈症不相應宜以複方主之從正曰複

方有三有二方或三方或數方相合之複方如桂枝二越疑一湯五積散之屬是也有本方之外別加餘藥如調胃承氣加連翹薄荷黃芩梔子為涼膈散之類是也有分量均齊之複方如胃風湯各等分之屬是也王太僕以偶為複方今七中有偶又有複豈非偶乃二方相合複乃數方相合之謂乎。

十劑

證治大遺

藥理近考

七方

六

真白堂

徐之才曰藥有宣通補洩輕重溫滑燥溼十種是用藥之大體而本經不言後人未述凡用藥者審而詳之則靡所遺失矣。

宣劑之才曰宣可去壅生薑橘皮之類也呆曰外感六淫之邪欲傳入裏三陰實而不受逆于胸中天分氣分窒塞不通而或噦或嘔所謂壅也三陰者脾也故必破氣藥如薑橘霍枳半夏之類瀉其壅塞從正曰俚人以宣為瀉又以宣為通不如十劑之中已有瀉與通矣仲景曰春病在頭大法宜吐

證治大遺

藥理近考 十劑

卷下 七 貞白堂

是宣劑即涌劑也經曰高者因而越之木鬱達之
宣者升而上也以君名臣曰宣是矣凡風痼中風
胸中諸實痰飲寒結胸中熱鬱上而不下久則咳
喘滿脹水腫之病生焉非宣劑莫能愈也吐中有
汗如引涎追淚嚏鼻凡上行者之類皆吐法也完
素曰鬱而不散為壅必宣以散之如痞滿不通之
類是矣攻其裏則宣者上也泄者下也涌劑則瓜
蒂梔子之屬是矣發汗通表亦同時珍曰壅者塞
也宣者布也散也鬱塞之病不升不降傳化失常
或鬱久生病或病久生鬱必藥以宣布敷散之如
承流宣化之意不獨涌越為宣也是以氣鬱則香
附撫芎之屬以開之不足則補中氣以運之火鬱
微則山梔青黛以散之甚則升陽解肌以發之淫
鬱則蒼朮白芷之屬以燥之甚則風藥以勝之痰
鬱則南星橘皮之屬以化之甚則瓜蒂梨蘆之屬
以涌之血鬱微則桃仁紅花以行之甚則或吐或
利以行之食鬱溼則山查神麴以消之甚則上涌
下泄以去之皆宣劑也

證治大遺

藥理近考 十劑

卷下 八 貞白堂

通劑之才曰通可去滯通草防己之屬是也完素曰
留而不去必通以行之如水病痰癖之類以木通
防己之屬攻其滯則留者行也滑石茯苓羌花甘
遂大戟牽牛之類是也從正曰通者流通也前後
不得決便宜木通海金沙琥珀大黃之屬通之痺
痛鬱滯經隧不利亦宜通之時珍曰滯留滯也淫
熱之邪留于氣分而為痛痺癢閉者宜淡滲之劑
上助肺氣下降通其小便而洩氣中之滯木通猪
苓之類是也淫熱之邪留于血分而為痛痺腫注
二便不通者宜苦寒之藥下引通其前後而洩血
中之滯防己之類是也經曰味薄者通故淡味之
藥謂之通劑
補劑之才曰補可去弱人參羊肉之屬是也果曰人
參甘溫能補氣虛羊肉甘熱能補血虛羊肉補形
人參補氣凡氣味與二藥同者皆是也從正曰五
臟各有補瀉五味各補其臟有表虛裏虛上虛下
虛陰虛陽虛氣虛血虛經曰精不足者補之以味
形不足者溫之以氣五穀五菜五果五肉皆補養

之物也。時珍曰。經云不足者補之。又云虛者補之。又云虛則補其母。生薑之辛補肝。炒鹽之鹹補心。甘草之甘補脾。五味子之酸補肺。黃柏之苦補腎。又如茯神之補心。氣生地黃之補心血。人參之補脾氣。白芍藥之補脾血。黃芪之補肺氣。阿膠之補肺血。杜仲之補腎氣。熟地黃之補腎血。芎藭之補肝氣。當歸之補肝血之類。皆補劑。不特人參羊肉爲補也。

洩劑之才曰。洩可去閉。葶藶大黃之屬是也。果曰。葶藶治大還。

藥理近考 十劑 九 貞白堂

葶藶苦寒氣味俱厚。能洩肺之閉。又泄大腸。大黃走而不守。一能洩血閉。腸胃渣穢之物。一洩氣閉。利小便。一洩血閉。利大便。凡與二藥同者。皆然。從正曰。實則瀉之。諸痛爲實。痛隨利減。砒硝大黃。牛甘遂。巴豆之屬。皆瀉劑也。其催生下乳。磨積逐水。破經洩氣。凡下行者。皆下法也。時珍曰。去閉當作去實。經云。實者瀉之。實者瀉其子。是矣。五臟五味。皆有瀉。不獨葶藶大黃也。肝實瀉以芍藥之酸。心實以甘草之甘。脾實瀉以黃連之苦。肺實瀉以澤

瀉之鹹是矣。

輕劑之才曰。輕可去實。麻黃桂枝之屬是也。從正曰。風寒之邪。始客皮膚。頭痛身熱。宜解其表。內經所謂輕而揚之也。癰瘡疥癩。俱宜解表。汗以泄之。毒以薰之。皆輕劑也。凡薰洗。蒸炙。熨烙。刺砭。導引。按摩。皆汗法也。時珍曰。當作輕可去閉。有表閉。有裏閉。上閉。下閉。表閉。風寒傷營。腠理閉密。陽氣拂鬱。不能外出。而爲發熱惡寒。頭痛脊強。諸病宜輕揚之。劑發其汗。而表自解也。裏閉者。火熱鬱抑。津液不行。皮膚乾閉。而爲肌熱煩熱。頭痛目腫。昏瞢瘡瘍。諸病宜輕揚之。劑解其肌。而火自散也。上閉有二。一則外寒內熱。上焦氣閉。發爲咽喉閉痛之症。宜辛涼之劑以揚散之。則閉自開。一則飲食寒冷。遏揚氣在下。發爲胸膈痞滿。閉塞之證。宜揚其清。而抑其濁。則痞自泰也。下閉有二。有陽氣陷下。發爲裏急後重。數至圊而不便之症。但升其陽。而大便自順。所謂下者。舉之也。有燥熱傷肺。金其肅鬱。閉于上。而膀胱閉于下。爲小便不利之症。以升麻

證治大還

藥理近考 十劑 十 貞白堂

之類探而吐之上竅通而小便自利矣所謂病在下取之上也。

重劑之才曰重可去怯磁石鐵粉之屬是也從正曰重者鎮縵之謂也怯則氣浮如喪神守而驚悸氣上硃砂水銀沉香黃丹寒水石之類皆體重也久病咳嗽涎潮于上形羸不可攻者以此縵之經云重者因而減之實其漸也時珍曰重則凡四有驚氣亂而覓氣飛揚如喪神守者有怒則氣逆而肝火激烈病狂善怒者并鐵粉雄黃之類以平其肝

證治大選

藥理近考 十劑 土 貞白堂

有神不守舍而多驚健忘迷惑不寧者宜硃砂紫石英之類以鎮其心有恐則氣下精志失守而畏人如將捕之者宜磁石沉香之類以安其腎大抵重劑壓浮火而墜痰涎不獨治怯也故諸風掉眩及驚癇痰喘之病吐逆不止及反胃之病皆浮火痰涎爲害俱宜重劑以墜之。

滑劑之才曰滑可去著冬葵子榆白皮之屬是也完素曰澀則氣著必滑劑以利之滑能養竅故潤利也從正曰大便燥結麻仁郁李之類小便淋澀宜

葵子滑石之類前後不通而陰俱閉也名曰三焦約約者束也宜先以滑劑潤其燥然後攻之時

珍曰著者有形之邪留著于經絡臟腑之間也便溺澀滯痰涎胞胎癰腫之類是也皆宜滑藥以引去其留著之物此與木通猪苓通以去滯相類而不同木通猪苓淡滲之性去溼熱無形之邪。

榆皮甘滑之性去溼熱有形之邪故彼曰滯此曰著也大便澀者波稜牽牛之屬小便澀者車前榆皮之屬精竅澀者黃蘗葵花之屬胞絡胎澀者黃

證治大選

藥理近考 十劑 土 貞白堂

葵子王不留行之屬引痰涎自小便去者半夏茯苓之屬引瘡毒自小便去者五葉藤萱草根之屬皆滑劑也半夏南星皆辛而澀滑能洩溼氣通大蓋辛能潤能走氣能化液也或以爲燥藥謬矣溼去上燥非二物性燥也。

澀劑之才曰澀可去脫牡蠣龍骨之屬是也完素曰滑則氣脫如開腸洞泄便溺遺失之類必澀劑以收斂之從正曰寢汗不禁澀以麻黃根防風滑泄不已澀以豆蔻桔槿木賊罌粟殼喘嗽上奔澀以

證治大還

藥理近考

十劑

五

白室

烏梅訶子凡酸味同乎澀者收斂之義也然此種皆先攻其邪而後收之可也時珍曰脫者氣脫也血脫也精脫也神脫也脫則散而不收故用酸澀溫平之藥以斂其耗散汗出亡陽精滑不禁瀉利不止大便不固小便自遺久嗽亡津皆氣脫也下血不已崩中暴下諸大失血皆血脫也龍骨牡蠣海螵蛸五味子五倍子烏梅樗皮阿膠勒罌粟殼蓮房櫻灰赤石脂麻黃根之類皆澀藥也氣脫兼以補氣藥血脫兼以補血藥及兼氣藥氣者血之帥

也脫陽者見鬼脫陰者目盲此神脫也非澀藥所能收也燥劑之才曰燥可去溼桑白皮赤小豆之屬是也土氣滯勝腫滿脾溼必燥劑以除之桑皮之屬溼勝于土以苦吐之以淡滲之是也從正曰積寒久冷吐利腥穢上下所出水液澄澈清冷此大寒之病宜姜附胡椒輩以燥之脾病溼氣則白朮陳皮木香蒼朮之屬除之亦燥劑也而黃連黃柏梔子大黃其味皆苦苦屬火皆能燥溼此內經之本旨也

證治大還

藥理近考

十劑

古

白室

豈獨薑附之儔為燥劑乎時珍曰溼有外感有內傷外感之溼雨露嵐霧地氣水溼襲于皮肉筋骨經絡之間內傷之溼生于水飲酒食及脾弱固不可執一論也故風藥可以勝溼燥藥可以除溼淡藥可以滲溼洩小便可以引溼利大便可以逐溼吐痰涎可以祛溼溼而有熱苦寒之劑燥之溼而有寒辛熱之劑燥之不獨桑皮赤小豆為燥劑也溼去則燥故謂之燥

潤劑之才曰溼可去枯白石英紫石英之屬是也從正曰溼者潤溼也雖與滑類又有不同經曰辛以潤之辛能走氣能化液故也塩硝味鹹屬真陰之水誠濡枯之上藥也人有枯涸皴揭之病非獨金化蓋有火以乘之故非潤劑不能愈完素曰一枯五臟痿弱榮衛涸流必溼劑以潤之時珍曰枯者燥也陽明燥金之化秋令也風熱拂甚則血液枯涸而為燥上燥則渴下燥則結筋燥則強皮燥則揭肉燥則裂骨燥則枯肺燥則痿腎燥則消凡麻仁阿膠膏潤之屬皆潤劑也養血則富歸地

黃生津則麥冬知母花粉之屬益精則從容枸杞之屬若但以石英為潤劑則偏矣古人以服石為滋補故爾 三錫曰凡診病者必察原由新久胃氣飲食 久病有胃氣藥乃驗否則危山野農人晝則力作勞形者多 貧賤衣食不足志氣鬱悵傭人僕夫多勞傷 僧尼寡婦多鬱結陰陽不和富貴家厚味生痰飲酒動火縱情恣慾多內虛少者血氣旺病易愈老年血氣衰忌尅伐 胎產同法 嬰兒腸胃脆薄少藥為佳

論治六選

藥理近考 十劑

五

良白堂

五味宜忌

岐伯曰木生酸火生苦土生甘金生辛水生鹹辛散酸收甘緩苦堅鹹更毒藥攻邪五穀為養五氣為助五畜為益五菜為充氣令而服之以補精益氣此五味各有所利四時五臟病隨所宜也又曰陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味腎正筋柔氣血以流腠理以密骨氣以清長有天命又曰聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根二氣常存 春食食寒以養陽秋食溫冬食熱以養陰

五欲

肝欲酸心欲苦脾欲甘肺欲辛腎欲鹹此五味合五臟之氣

五宜

青色宜酸肝病宜食麻犬李韭赤色宜苦心病宜食麥羊杏薤黃色宜甘脾病宜食梗牛棗葵白色宜辛肺病宜食黃黍雞桃葱黑色宜鹹腎病宜食大豆黃卷猪栗藿

五禁

肝病禁辛宜食甘梗牛棗葵心病禁酸宜食酸麻犬李韭脾病禁酸宜食鹹大豆豕栗藿肺病禁苦宜食酸麥羊杏薤腎病禁甘宜食辛黃黍雞桃葱思遠曰春宜省酸增甘以養脾夏宜省苦增辛以養肺秋宜省辛增酸以養肝冬宜省鹹增甘以養心四季以省甘增鹹以養腎時珍曰五欲者五味入胃喜歸本臟有餘之病宜本味以通之五禁者五臟不足之病畏其所勝而宜其所不勝也

五走

論治六選

藥理近考 五欲五禁

五

良白堂

酸走筋。筋病母多食酸。多食令人癢。酸氣澀收。胞得酸而縮卷。故水道不通也。苦走骨。骨病母多食苦。多食令人變嘔。苦入下脘。三焦皆閉。故變嘔也。甘走肉。肉病母多食甘。多食令人悅心。甘氣柔潤。胃柔則緩。緩則蟲動。故悅心也。辛走氣。氣病母多食辛。多食令人洞心。辛走上焦。與氣俱行。久留心下。故洞心也。鹹走血。血病母多食鹹。多食令人渴。血與鹹相得則凝。則胃汁注之。故咽路焦而舌本乾。九鍼論作鹹走骨。骨病母多食鹹。苦走血。血證。人還。藥理近考。毫厘差過。卷下。七。貞白堂。病母多食苦。

五傷

酸傷筋。辛勝酸。苦傷氣。酸勝苦。甘傷肉。酸勝甘。辛傷皮毛。苦勝辛。鹹傷血。甘勝鹹。

五過

味過于酸。肝氣以津。脾氣乃絕。肉胝傷。腸而唇揭。味過于苦。脾氣不濡。胃氣乃厚。皮稿而毛拔。味過于甘。心氣喘滿。色黑。腎氣不平。骨痛而髮落。味過于辛。筋脈阻。弛精神乃失。筋急而爪枯。味過于鹹。

大骨氣勞。短肌心氣抑。脈凝澁而變色。時珍曰。五走五傷者。本臟之味自傷也。即陰之五宮傷在五味也。五過者。本臟之味伐其所勝也。即臟氣偏勝也。

五味偏勝

岐伯曰。五味入胃。各歸所喜。酸先入肝。苦先入心。甘先入脾。辛先入肺。鹹先入腎。久而增氣。物化之常。氣增而久。天之由也。

五味還

藥理近考。五味偏勝。卷下。六。貞白堂。

入脾爲至陰。而四氣兼之。皆爲增其味。而益其氣。故各從本臟之氣。久則從化。故久服黃連苦參反熱。從苦化也。餘味倣此。氣增不已。則臟氣偏勝。必有偏絕。臟有偏絕。必有暴夭。是以藥不具五味。不備四氣。而久服之。雖暫獲勝。久必致夭。故絕粒服餌者。不暴亡。無五味資助也。杲曰。一陰一陽之謂道。偏陰偏陽之謂疾。陽劑剛勝。積若燎原。爲消狂癰疽之屬。則天癸竭而榮涸。陰劑柔勝。積若凝水。爲洞泄寒中之病。則真火微而衛散。故大寒大熱。

之藥當從權用之氣平而止有所偏助令人臟氣不平天之由也

標本陰陽

李杲曰夫治病者當知標本以身論之外為標內為本陰為標陽為本故六腑屬陽為標五臟屬陰為本臟腑在內為本十二經絡在外為標而臟腑陰陽血氣經絡又各有標本焉以病論之先受為本後傳為標故百病必先治其本後治其標否則邪氣滋甚其病益蓄縱先生輕病後生重病亦先治其輕後治其重則邪氣乃伏有中滿及病大小便不利則無問先後標本必先治滿及大小便為其急也故曰緩則治其本急則治其標又從前來者為實邪後來者為虛邪實則瀉其子虛則補其母假如肝受心火為前來實邪當於肝經刺榮穴以瀉心火為先治其本於心經刺榮穴以瀉心火為後治其標用藥則入肝之藥為引用瀉心之藥為君經曰本而標之先治其本後治其標是也又如肝受腎水為虛邪當於腎經刺井穴以補肝木為

大遺

藥理近考 標陰陽 元

貞白堂

先治其標後于肝經刺合穴以瀉腎水為後治其本用藥則入腎之藥為引補肝之藥為君經云標而本之先治其標後治其本是也

升降浮沉

李杲曰藥有升降浮沉化生長收藏成以配四時春升夏浮秋收冬藏土居中化是以味薄者升而生氣薄者降而收氣厚者浮而長味厚者沉而藏氣味平者化而成但言補之以辛甘溫熱及氣味之薄者即助春夏之升浮便是瀉秋冬收藏之藥也在人之身肝心是矣但言補之以酸苦鹹寒及氣味之厚者即助秋冬之降浮便是瀉春夏生長之藥也在人之身肺腎是矣淡味之藥滲即為升泄即為降佐使諸藥者也用藥者循此則生逆此則死縱令不死亦厄困矣○王好古曰升而使之降須知抑也沉而使之浮須知載也辛散也而行之也橫甘發也而行之也上苦泄也而行之也下酸收也其性縮鹹更也其性舒其不同如此鼓掌成聲沃火成沸二物相合象在其間矣五味相制四

大遺

藥理近考 升降浮沉 辛

貞白堂

氣相和。其變可輕用哉。本草不言淡味。涼氣亦缺。文也。味薄者升。甘平。辛平。辛微溫。微苦平。之藥是也。

氣薄者降。甘寒。甘涼。甘淡。寒涼。酸溫。酸平。鹹平。之藥是也。

氣厚者浮。甘熱。辛熱。是也。

味厚者沉。苦寒。鹹寒。是也。

氣味平者。兼四氣四味。甘平。甘溫。甘涼。甘辛平。甘微苦平。之藥是也。

六經

藥理近考 升降浮沉

主 頁白堂

李時珍曰。酸鹹無升。甘辛無降。寒無浮。熱無沉。其性然也。而升者。引之以鹹寒。則沉而直達下。焦沉者。引之以酒。則浮而上至顛頂。此非窺天地之奧。而達造化之權者。不能至此。一物之中。有根升稍降。生升熟降。是升降在物。亦在人也。

四時用藥例

李時珍曰。經曰。必先歲氣。毋伐天和。又曰。升降浮沉。則順之。寒熱溫涼。則逆之。故春月宜加辛溫之藥。薄荷荊芥之類。以順春升之氣。夏月宜加辛熱之

藥。香薷生薑之類。以順夏浮之氣。長夏宜加甘苦辛溫之藥。人參白朮蒼朮黃蘗之類。以順化成之

氣。秋月宜加酸溫之藥。芍藥烏梅之類。以順秋降之氣。冬月宜加苦寒之藥。黃芩知母之類。以順冬沉之氣。所謂順時氣而養天和也。經又云。春省酸增甘。以養脾氣。夏省苦增辛。以養肺氣。長夏省甘增鹹。以養腎氣。秋省辛增酸。以養肺氣。冬省鹹增苦。以養腎氣。此則既不伐天和。而又防其太過。所以禮天地之大德也。昧者。捨本從標。春用辛涼。以伐木。夏用鹹寒。以抑火。秋用苦溫。以泄金。冬用辛熱。以涸水。謂之時藥。殊背素問逆順之理。以夏月伏陰。冬月伏陽。推之可知矣。雖然。月有四時。日有四時。或春得秋病。夏得冬病。神而明之。機而行之。變通權宜。又不可泥一也。王好古曰。四時總以芍藥為脾劑。蒼朮為胃劑。柴胡為時劑。十一臟皆取決於少陽。為發生之始故也。凡用純寒純熱之藥。及寒熱相雜。並宜用甘草。以調和之。惟中滿者。禁用甘爾。

六經

藥理近考 四時用藥例

主 頁白堂

妊娠服禁

玃斑水蛭及重蠱烏頭附子配天雄野葛水銀并巴豆牛膝薏苡與蜈蚣三稜代赭芫花麝大戟蛇蛻黃雌雄牙硝芒硝牡丹桂槐花牽牛皂角同半夏南星與通草瞿麥乾薑桃仁通礪砂乾漆蟹甲爪地膽茅根莫用好。

引經藥報使

小腸膀胱屬太陽藥本羌活是本鄉三焦膽與肝包絡少陽厥陰柴胡強大腸陽明並足胃葛根白芷升麻當太陰肺脈中焦起白芷升麻葱白鄉脾經少與肺部異升麻兼之白芍詳少陰心經獨活主腎經獨活加桂良通經用此藥爲使豈有何病到膏肓。

六陳

藥有六味陳久者良狼朮半橘枳實麻黃狼毒朱莢半夏橘皮也。

十八反

本草名言十八反半夏貝欬芩攻烏。

謂半夏瓜蒌貝母白芨白欬與烏頭相反。

藻戟遂芫俱戰草。

海藻大戟甘遂芫花俱與甘草相反。

諸參辛芍叛藜蘆

苦參人參沙參玄參細辛芍藥俱與藜蘆相反。凡湯藥丸散中不可合用也。若要令反而吐者則不忌也。

十九畏

硫黃元是火之精朴硝一見便相爭水銀莫與砒相

見狼毒最怕蜜陀僧巴豆性烈最爲上偏與羊牛

不順情丁香莫與鬱金見牙硝難合京三稜川烏

草烏不順犀人參又忌五靈脂官桂善能調冷氣

若逢石脂便相欺大凡修合看逆順炮燂炙煉要

精微。

卒中暴厥 中風 中氣 中食 痰

中寒 中惡

世以卒然仆倒昏不知人爲中風以卒然者爲中臟痰涎壅盛者爲痰厥不知真氣太弱燄火泛上者

十居八九。若虛極而陽暴脫。則尿出而厥矣。急煎參黃。加竹瀝薑汁灌之。外用皂角細辛薑蒲為末吹入鼻取嚏。有嚏可治。無則不治。以此可驗。其淺深凶吉。速于臍下太艾炙之。亦有尿出而補接得活者。候用他藥。即無生意。

有因暴怒而厥者。名中氣輕者。用烏藥順氣散重者。蘇合香丸。竹瀝薑汁調決開口灌之。

忽然仆倒。不可遽認為風。須仔細推詳。詢之曾動怒否。曾用食否。如氣口緊盛。其人飲食之際。忽因

藥理近考 十九畏 貞白堂

氣惱。或惱後吃食。或食後冒寒。即不能運化。和

胃口。塞滯心竅。正氣不通。則手足無所措。而昏冒

卒倒也。急以鹽湯探吐。吐淨。審因用藥。因邪邪去

香正氣散。氣滯則八味順氣湯。吐後別無他症。只

用平胃二陳。加白朮。神麴。麥藥調理。

痰涎壅盛。脈沉滑或洪。名痰厥。從類中治痰法。

暑月忽厥。為暑風。從暑治。

寒月忽厥。為中寒。從陰症治。

素弱人。夜行。或入神堂古廟。吊喪登塚。或入久空

房屋。為陰邪所逼。而昏冒。不知人。名中惡。急煎蘇合香丸。或藿香正氣散。不醒。用秦承祖灸鬼法。內服參耆湯。

諸中或木魘。或已魘。或久病忽吐出紫紅色者死。

傳心方云。治暑。濕。潮。于。心。卒。然。暈。倒。當。即。時。扶。入

暖室。正坐。當。窗。作。好。醋。炭。熏。之。令。醋。氣。衝。入。口。鼻

良久。其。涎。自。下。而。甦。唯。不。可。與。一。滴。湯。水。入。喉。涎

得。湯。水。繫。于。心。絡。不。能。去。必。成。廢。人。西北二方地

高風勁。真為風所中有之。其脈必浮乃是。

藥理近考 十九畏 貞白堂

證治大還四十卷

證治大還
採進本

國朝陳治撰治字三農華亭人是書凡診視近纂二

卷藥經近考二卷濟陰近編四卷幼幼近編四卷

醫學近編二十卷傷寒近編前集四卷後集四卷

前有喻昌及治自序治自謂五世業醫所著書有

瑣溪醫約解醫師寤言外臺秘典脈藥璣珠各種

皆斟酌盡善擇其近要者付之梨棗然是書雜錄

諸家議論證治門類繁碎殊少折衷